**PSR 2014/2020 - Misura 8 - Sottomisura 8.5.1 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali**
**Azione D - Elaborazione di piani di gestione per soggetti pubblici e loro associazioni**

# COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

## Provincia di Avellino



# Piano di Gestione Forestale 2026-2035

***Redatto ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/2017 e succ. mod. e int.***

## Relazione Tecnica e Registro di Tassazione


**Redazione:**
**R.T.P. STUDIO RDM – Bertani, Luppi, Putzolu – Associazione Professionale**
**Dott. For. Giovanni Gammarano – Ing. Giovanna Salzano**
**Dott. Geol. Vincenzo Siervo – Dott. Geol. Pierluigi Curcio**


| | | |
|---|---|---|
| **DATA: Aprile 2026** | **VERSIONE: definitiva** | **REV: 1** |

# Indice dei contenuti


PREMESSA ..... 3
I - PARTE GENERALE ..... 6
Cap. 1 - Inquadramento geografico, orografico e idrografico ..... 6
Posizione geografica ed estensione ..... 6
Orografia ..... 7
Idrografia e idrologia ..... 8
Compatibilità idrogeologica del P.G.F. ..... 10
Cap. 2 - Inquadramento geo-pedologico, climatico e fitoclimatico, la flora e la fauna ..... 11
La geologia ..... 11
La pedologia ..... 15
Il clima ..... 16
La vegetazione ..... 20
La fauna ..... 24
Cap. 3 – La storia e l'economia locale ..... 26
Storia della comunità ..... 26
Situazione demografica ed economica ..... 27
Aspetti economici ..... 35
Cap. 4 - Origine della proprietà dei beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione e cenni storici sulla sua evoluzione ..... 39
Passate pianificazioni forestali ..... 40
Passate utilizzazioni boschive ..... 41
Vincoli gravanti sui beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione ..... 42
Cap. 5 – La statistica dei beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione ..... 44
Riferimenti catastali della proprietà ..... 44
Superfici interessate ..... 44
Infrastrutture: viabilità silvo-pastorale - vie di accesso – sentieri ..... 60
II - PARTE SPECIALE ..... 61
Cap. 6 - Complesso silvo-pastorale oggetto di pianificazione ..... 61
Descrizione generale ..... 61
Cartografia del Piano ..... 62
Cap. 7 – Modalità di formazione del particellare ..... 63
Compartimentazione del complesso silvo-pastorale e formazione del particellare ..... 63
Il rilievo inventariale ..... 65
Formazione delle comprese e descrizione generale ..... 71
Cap. 7.1 - Classe economica A: Fustaia coetanea di faggio ..... 74
Descrizione delle caratteristiche della Classe economica ..... 74
Particelle forestali della Classe economica ..... 77
Determinazione della provvigione ..... 78
Analisi dendrometrica e strutturale dei soprassuoli ..... 80
Il modello colturale di riferimento ..... 87
Confronto tra stato potenziale e reale ..... 93
Determinazione della ripresa ..... 94
Piano dei tagli e modalità operative ..... 95
Cap. 7.2 - Classe economica FD: Fustaia Disetanea di faggio ..... 99
Descrizione delle caratteristiche della Classe economica ..... 99
Particelle forestali della Classe economica ..... 104
Rilievi tassatori ..... 104
Il modello colturale di riferimento ..... 105

Determinazione della ripresa ..... 108
Piano dei tagli e modalità operative ..... 109
Cap. 7.3 - Classe economica BV: Boschi vetusti ..... 110
Descrizione delle caratteristiche della Classe economica ..... 110
Rilievi tassatori ..... 112
Il modello colturale di riferimento ..... 114
Modalità operative ..... 115
Cap. 7.4 - Classe economica P: Boschi di protezione ..... 116
Descrizione delle caratteristiche della Classe economica ..... 116
Particelle forestali della Classe economica ..... 118
Il modello colturale di riferimento ..... 118
Modalità operative ..... 118
Cap. 7.5 – Classe economica C: Boschi in ricostituzione ecologica ..... 120
Descrizione delle caratteristiche della Classe economica ..... 120
Rilievi tassatori ..... 122
Piano dei tagli e modalità operative ..... 122
Cap. 7.6 - Classe economica H: Aree pascolive/improduttive/incolte ..... 124
Descrizione delle caratteristiche della Classe economica ..... 124
Rilievi dei pascoli ..... 125
Il piano dei miglioramenti ..... 127
Particelle forestali della Classe economica ..... 128
Cap. 8 - Piano dei miglioramenti ..... 129
Sistemazioni idraulico-forestali ..... 129
Miglioramento boschivo ..... 129
Viabilità ..... 130
Valorizzazione turistico-ricreativa ..... 142
Cap. 9 - Aree pascolabili (art. 100) ..... 192
Descrizione generale, suddivisione per comparti, superficie totale e superficie a P.L.T. ..... 192
Modalità e periodo di utilizzazione ..... 201
Cap. 10 - Misure di tutela delle aree sensibili e di tutela idrogeologica (art. 102) ..... 203
Cap. 11 - Misure di salvaguardia della biodiversità (artt. 79 e 101) ..... 203
Cap. 12 - Misure di tutela paesaggistica ..... 204
Cap. 13 - Misure di tutela per la gestione dei rischi naturali e l'adattamento ai cambiamenti climatici ..... 204
Cap. 14 - Modalità di godimento e stato dei diritti di Uso civico *(Art. 104)* ..... 205
Cap. 15 - Norme per la raccolta dei prodotti secondari (Articolo 105 del Regolamento regionale n. 3/2017) ..... 217
Cap. 16 - Regolamento del Pascolo (Articolo n. 18 della L. R. n. 11/96 e Articoli n. 106 e n. 129 del Regolamento regionale n. 3/2017) ..... 226
Cap. 17 - Registro di tassazione ..... 246
Allegati ..... 247
Cartografia ..... 247

# PREMESSA

La storia della pianificazione della foresta comunale di Bagnoli Irpino affonda le sue radici nella storia della pianificazione forestale italiana, con le norme dettate da Giuseppe Di Tella, ritenuto il fondatore del moderno assestamento forestale, a inizio Novecento. Questo illustre Maestro, allora capo del Distretto Forestale di Bagnoli Irpino, adottò per primo il trattamento a tagli successivi della fustaia di faggio in contrada Vallebona e iniziò la preparazione dei restanti soprassuoli a tale trattamento, migliorando le condizioni del bosco che fino a quel momento era foltissimo ma poco vigoroso.

Queste indicazioni selvicolturali trovarono un'organica applicazione nel *Piano di Assestamento dei Boschi del Comune di Bagnoli Irpino 1959-1968* redatto dall' Ing. Generoso Patrone, bagnolese, Professore di Assestamento Forestale dell'Università di Firenze, che dettò la prosecuzione del trattamento a tagli successivi, formalizzando le modalità di gestione indicate dal Di Tella. L'Istituto di Assestamento Forestale dell'Università di Firenze condusse, in quel periodo, diversi studi sulle caratteristiche dendrometriche e alsometriche dei boschi dell'Irpinia che trovarono pubblicazione in numerose ricerche sperimentali, le quali costituiscono ancora oggi un imprescindibile riferimento per la gestione di questi boschi. Il Professor Mario Cantiani curò, in particolare, gli studi sulle fustaie di faggio, con l'elaborazione di Tavole dendrometriche e alsometriche[1].

La collaborazione con l'Istituto di Assestamento di Firenze riprese nei primi anni Ottanta, con la redazione di numerosi Piani di Assestamento dei boschi comunali ricadenti nella Comunità Montana Terminio Cervialto. È di quegli anni la pubblicazione del Professor Cantiani *Il trattamento selvicolturale delle faggete dei monti Picentini*, che ha definito le indicazioni selvicolturali per le faggete di questo territorio a compimento della tavola alsometrica generale da lui elaborata in precedenza. La revisione di questi piani fu affidata a un gruppo di giovani laureati all'inizio della loro attività professionale, sotto la guida del Professor Cantiani, Direttore della Ricerca: tra questi il dott. Remo Bertani, che seguì, in particolare, la redazione del Piano di Assestamento di Bagnoli Irpino.

L'ultima versione è stata quella redatta per il decennio 2006/2015 dalla Comunità Montana Terminio Cervialto, che affidò l'incarico di revisione ai propri dipendenti Dott. Nicola Perillo, Dott. Gerardo Bruno e Dott. Michele Marino.

Il Piano presentato dal Gruppo di Lavoro si inserisce in questo contesto storico di pianificazione, coerentemente con i principi selvicolturali scaturiti dallo studio delle foreste bagnolesi, ma applicando le più moderne tecnologie di rilevamento e analisi al fine di mantenere e proiettare nel futuro i risultati raggiunti da questi illustri predecessori.

Resasi necessaria una nuova rielaborazione del Piano in parola oramai scaduto (che con il subentrato Regolamento Regionale n. 3/2017 e ss. mm. e ii., è stato ridefinito "Piano di Gestione Forestale - P.G.F.)", il Comune con Deliberazione di Giunta Comunale n° 142 del 04/12/2017 decise di candidarsi al finanziamento per la già menzionata revisione, a valere sui fondi P.S.R. 2014-2020

[1] 1959, Tavola dendrometrica a doppia entrata del faggio dell'Irpinia cresciuto in fustaia coetanea, valevole per i boschi dei Comuni di Volturara Irpina, Montella, Bagnoli Irpino, Calabritto, Senerchia ed Acerno (M. Cantiani ricerche sperimentali di dendrometria e auxometria fasc. III pp. 19) 1959, Tavola alsometrica delle fustaie coetanee di faggio dell'Irpinia, (M. Cantiani ricerche sperimentali di dendrometria e auxometria fasc. III pp. 19 pp. 46-60)

Regione Campania-Misura 8 Tipologia di intervento 8.5.1 - Azione D) e venne inoltrata la relativa domanda di sostegno.

Con DRD n° 101 del 01/07/2019 (BURC N° 39 del 08/07/2019) venne approvata dall'U.O.D. 50.07.10 del S.T.P. di Avellino la graduatoria provinciale provvisoria delle domande di sostegno a valere sulle risorse della suddetta misura del P.S.R.

Con DRD n° 240 del 19/12/2019 (BURC n° 2 del 07/01/2020) venne approvata la Graduatoria Unica Regionale Definitiva della misura 8 Tipologia di intervento 8.5.1 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali".

La domanda di sostegno del Comune di Bagnoli Irpino, utilmente collocata nella graduatoria unica regionale definitiva nella posizione n° 41 con un punteggio di 83, risultò tra le domande ammissibili e finanziabili.

La regione Campania finanziò l'investimento con Decisione Individuale di Concessione di Aiuti (D.I.C.A.) - Prot. 2020. 0151533 del 09.03.2020.

L'UOD 50.07.10 dell'S.T.P. di Avellino, con DRO prot. 2020.0151533 del 09/03/2020 n° 54250638431, approvò il finanziamento in parola nella misura del 100%.

Per l'affidamento del Servizio Professionale di Revisione del Piano di Gestione Forestale in argomento, il Comune con determinazione n°180 del 24.06.2020, reg. gen. 355 del 03.07.2020, indisse una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n.50/2016.

Con determinazione n°19 del 18.01.2021 n°24 Registro generale del 22.01.2021, il Comune aggiudicò definitivamente l'affidamento del servizio professionale di che trattasi al RTP costituito da: STUDIO RDM – mandataria/capogruppo e dai mandanti Dott. For. Giovanni Gammarano, Ing. Giovanna Salzano, Geol. Vincenzo Siervo, Geol. Pierluigi Curcio.

Pertanto, è stato redatto il presente nuovo Piano di Gestione Forestale dei beni silvo-pastorali comunali ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/2017 e ss.mm. e ii., conformemente alle norme tecniche e con le procedure di cui all'art. 84 e seguenti del già menzionato Regolamento dal Raggruppamento affidatario.

L'obiettivo del Piano consiste nel rendere compatibile la gestione produttiva del bosco con una corretta utilizzazione forestale, mirando anche alla massimizzazione delle funzioni paesaggistica, naturalistica ed ambientale, senza tralasciare quella protettiva.

Pertanto, nella stesura del Piano di Gestione, sono stati curati sia l'aspetto naturalistico che l'aspetto protettivo, cercando di armonizzare le esigenze assestamentali con gli obiettivi prefissati dagli Enti di gestione delle aree protette presenti, nonché l'aspetto floristico, vegetazionale e faunistico che riveste la zona in quanto le aree del P.G.F. ricadono nel Parco Regionale dei Monti Picentini e nei siti della Rete Natura 2000: ZSC IT8040010 "Monte Cervialto - Montagnone di Nusco" e ZPS IT8040021 "Picentini".

Si ringraziano:

- Il Sindaco pro tempore Dott. Filippo Nigro e l'Amministrazione Comunale di Bagnoli Irpino, nonché i tecnici e dipendenti comunali per la proficua collaborazione, nelle persone del Geom. Saverio Bello, dell'Inge. Soccorso Pullo, Ing. Caterina Donnarumma e dal Geom. Franco Fusco e della Dott.ssa Oriana di Sunno.

- la Dott.ssa Ing. Ambiente e Territorio Valentina Gerardina Salzano, la Dott.ssa For. Erica Mazza, il Dott. Agr. Giuseppe Bettua, il Dott. Agr. Junior Simone Pacifico, Per. Agr. Francesco Cantiani, la Cooperativa HELIX per il prezioso apporto fornito nelle fasi di rilievo in bosco e di confinazione;

- Antonio Chieffo, Giovanni Chieffo, Aniello Chieffo, Giuseppe Dell'Angelo, Antonio Di Capua, Cristian Farese, Antonio Lenzi, Antonio Nicastro, Ugo Nigro, Aniello Pallante e Alessandro Preziuso, un gruppo di giovani bagnolesi che si sono impegnati come rilevatori nella maggior

parte dei boschi comunali, percorrendo pendici spesso impervie e affrontando condizioni difficili con serietà ed entusiasmo. Si auspica che questa esperienza formativa possa rimanere un ricordo piacevole e che abbia insegnato loro ad apprezzare l'importanza di questo patrimonio, del quale saranno i futuri custodi.

- il dott. for. Marco Bagnoli e il dott. for. Simone Luppi per l'indispensabile supporto fornito con la creazione degli applicativi di campo per la raccolta dati, senza i quali non sarebbe stato possibile raccogliere ed elaborare l'enorme quantità di informazioni rilevate;

- il dott. for. Neri Baraldi per il prezioso lavoro di elaborazione dei rilievi dendrometrici e dei dati LiDAR, e la dott.ssa for. Erica Mazza per l'entusiasmo e il supporto fornito nelle diverse fasi del lavoro, inclusa l'elaborazione del piano degli interventi, nonché per l'amore e la dedizione profusi verso il territorio di Bagnoli, componenti che hanno contribuito in maniera determinante alla qualità di questo lavoro.

Si ringraziano, infine, le associazioni presenti sul territorio bagnolese, nello specifico Associazione Tartufai dei Monti Picentini, la Lacenotrekking, nelle persone dei Sig.ri Dino Cuozzo, Nello Nicastro, Ciro Di Martino, Fabio Morrone e il Duomo Trekking nella persona del Sig. Angelo Mattia Rocco.

# I - PARTE GENERALE

## Cap. 1 - Inquadramento geografico, orografico e idrografico

### Posizione geografica ed estensione

Il territorio del Comune di Bagnoli Irpino (AV) ha un'estensione di 68,81 $Km^2$. Fa parte della Comunità Montana Terminio-Cervialto, e confina con i Comuni di Acerno (SA), Calabritto, Caposele, Lioni, Montella e Nusco (AV).

L'altitudine varia dai 497 m s.l.m. della zona a valle, ai 1.809 m s.l.m. della cima più alta; il centro urbano è posizionato a 650 m s.l.m. circa. L'altopiano del Laceno è posto a 1050 m e il comprensorio sciistico interessa il versante nord del M. Rajamagra, con quote che vanno dai 1100 m s.l.m. ai 1700 m s.l.m. circa.

**Figura 1. Un'immagine dell'Altopiano del Laceno**

La principale via di collegamento è la SS 7 "Ofantina bis" che da Avellino, città capoluogo, conduce fino al paese di Bagnoli Irpino; da qui si raggiunge l'altopiano percorrendo in salita la ex S.S. 368, un tratto di 6 km costituito da brevi rettilinei e tornanti. Altre importanti arterie di collegamento sono la strada provinciale 33, che dalla strada statale S.S. 368 presso Bagnoli a 2 km conduce oltre lo scalo di Nusco verso il fiume Ofanto (9,919 km); la strada provinciale 114, che dalla strada statale S.S. 368 porta allo scalo ferroviario di Bagnoli Irpino (0,150 km); la strada provinciale 143 che da Bagnoli Irpino si congiunge all'ex S.S. 164 delle Croci di Acerno (5,920 km).

Parte del territorio comunale è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (decreto Ronchey) e nei siti vincolati di cui all'art. 136 del D. Lgs. 42/2004.

Il territorio comunale ricade anche nel Parco Regionale dei Monti Picentini e nei siti della Rete Natura 2000: ZSC IT8040010 “Monte Cervialto - Montagnone di Nusco” e ZPS IT8040021 “Picentini”.

Il comune appartiene al territorio di competenza dell’ex Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele, oggi Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.

Il complesso silvopastorale del Comune, oggetto del presente Piano di Assestamento, è dislocato sulle pendici più elevate dell’Appennino Campano, in un contesto paesaggistico tipicamente montano, situato al confine tra le province di Avellino e Salerno. Il territorio in esame si estende nella regione prevalentemente montuosa dei Monti Picentini, una sottosezione dell’orogene appenninico meridionale.

Il Massiccio del Cervialto rappresenta una delle principali formazioni montuose di quest'area, con una composizione geologica dominata da rocce calcaree e dolomitiche, tipiche dell'Appennino campano, che conferiscono al paesaggio un aspetto aspro e roccioso.

La proprietà dei boschi comunali di Bagnoli Irpino si estende su una vasta superficie, di 5.276,01 ha. Confina a nord con il comune di Nusco, ad est con i comuni di Lioni, Caposele e Calabritto, a sud con il comune di Acerno, e ad ovest con la proprietà privata situata al di sopra del centro urbano del comune di Bagnoli Irpino.

La quota massima di questi boschi raggiunge circa 1.812 m s.l.m., corrispondenti alla vetta del Monte Cervialto, mentre la quota minima si attesta intorno ai 603 m s.l.m., situata presso le Grotte di Caliendo. Questa variazione altitudinale implica una diversificazione significativa delle condizioni microclimatiche e delle tipologie vegetazionali presenti, rendendo l'area di studio di grande interesse per l'analisi ecologica e forestale.

## Orografia

L’area oggetto di studio è caratterizzata da un paesaggio montano, scarsamente antropizzato e densamente vegetato. Le forme del paesaggio attualmente osservabili sono il risultato delle continue interazioni fra attività tettonica e climatica, che hanno influenzato i processi erosivi e deposizionali in questo settore della catena sud appenninica. Il massiccio montuoso è costituito da morfostrutture carbonatiche modellate dalla tettonica recente che, attraverso la frammentazione ad opera di faglie, ha determinato la formazione di blocchi sollevati rispetto alle aree circostanti depresse.

La distribuzione delle forme dipende dall’assetto geo-strutturale delle successioni geologiche di età mesozoico-cenozoica, che ha controllato la formazione delle morfostrutture positive e negative del territorio. Il contrasto di erodibilità tra le successioni carbonatiche, che formano il nucleo roccioso dell’area, e quelle terrigene, situate nelle aree marginali meno elevate, ha determinato l’evoluzione delle forme. In particolare, i litotipi carbonatici, più coerenti, hanno dato luogo a paesaggi più aspri con versanti a pendenze maggiori, mentre i terreni terrigeni, più erodibili, hanno creato paesaggi più dolci e ondulati.

La morfostruttura positiva più elevata è rappresentata dal massiccio carbonatico del Monte Cervialto, delimitato da faglie ad alto angolo con direzioni appenninica (NE-SO) e anti-appenninica (NO-SE). Queste faglie sono localmente interrotte da faglie orientate E-O e N-S, che hanno prodotto scarpate con rigetti morfologici di centinaia di metri. Queste scarpate si raccordano con il paesaggio sottostante attraverso superfici modellate dall'accumulo di depositi detritici o detritico-colluviali.

I rilievi più alti del demanio comunale si trovano prevalentemente nel settore meridionale, con quote comprese tra 1500 e 1800 metri. In particolare, si annoverano:

- Monte Cervialto (1812 m)
- Monte Rajamagra (1661 m)
- Monte Cervarolo di Bagnoli (1552 m)
- Monte Raia della Scannella (1511 m)
- Monte Montagna Grande (1510 m)

Nel settore settentrionale, i rilievi raggiungono quote più modeste, comprese tra 1200 e 1300 metri, ad eccezione di alcune vette:

- Monte Calvello di Bagnoli (1552 m)
- Monte Calciogliano (1448 m)
- Monte di Belvedere (1437 m)

Le zone di altopiano presentano una morfologia simile, caratterizzata da conche più o meno allungate, talora collegate tra di loro, tutte interessate da fenomeni carsici. Circondato dai monti sopracitati, emerge il Piano Laceno, un'ampia pianura di circa 5 $km^2$, con la suggestiva presenza di un piccolo lago, che negli ultimi anni si è notevolmente ridotto.

Il territorio di Bagnoli Irpino, interamente compreso nel massiccio montuoso del Monte Cervialto, si innalza rapidamente sopra il paese di Bagnoli Irpino in corrispondenza di una faglia tettonica, che dalle Croci di Acerno arriva fino alla stazione di Nusco. Al di sopra di questo esteso fronte di frattura, alto in media 600 metri, la zona montana presenta una morfologia meno aspra, con rilievi ondulati che si alternano a zone di altopiano più o meno estese.

Questa configurazione fisiografica rende il territorio di Bagnoli Irpino un esempio significativo di interazione tra fattori geologici, tettonici e climatici, evidenziando la complessità e la diversità del paesaggio montano appenninico.

## Idrografia e idrologia

Il massiccio del Cervialto presenta una complessa idrografia, influenzata sensibilmente dai caratteri geo-morfologici del territorio. La natura calcarea delle rocce favorisce la percolazione delle acque in profondità, a discapito dello scorrimento superficiale, determinando un pattern idrografico unico e dinamico. La grande permeabilità delle rocce calcaree provoca una carenza di corsi d'acqua a regime perenne, favorendo invece la presenza di valloni e fossi a carattere torrentizio e di breve lunghezza. Anche la struttura stratigrafica e geomorfologica del massiccio crea condizioni favorevoli per la circolazione delle acque in una complessa rete di corsi sotterranei.

Le acque superficiali del massiccio del Cervialto si distribuiscono principalmente in tre bacini idrografici: il bacino del Fiume Calore, il bacino del Fiume Sele e il bacino del Fiume Tusciano. Le acque di scorrimento superficiale confluiscono principalmente nel fiume Calore. I principali torrenti che vi si versano includono il vallone d'Acera, il vallone del Parco, il vallone delle Querce e il vallone Caliendo. Le acque del Lago Laceno, situato alla base dei Monti Cervialto e Calvello, si immettono nel Rio Caliendo attraverso un emissario sotterraneo, contribuendo al flusso del Calore. Le acque che alimentano il bacino del Sele comprendono il torrente Acqua delle Brecce, i rii del Piano di Sazzano e le acque del versante sud del Cervialto che scendono a Piano Migliato. La sorgente di Caposele, una delle più importanti della zona, con una portata di circa 4.000 l/s, è alimentata dalla falda di base del Monte Cervialto. I torrenti di Valle d'Acera e Valle Bona confluiscono nel bacino del Tusciano, situato nella parte sud-orientale del massiccio.

La natura idrovora del massiccio montuoso favorisce la circolazione delle acque attraverso una rete di corsi sotterranei e la loro restituzione in sorgenti di varia portata. Tra le sorgenti principali si annoverano quelle della Tronola, situata a una quota media di 1.110 m s.l.m., tributaria del Calore Irpino e che alimenta un acquedotto per Bagnoli; le sorgenti Colle di Sazzano, situate a

quote di 1340 e 1240 m s.l.m. e che tributano al Sele; le sorgenti Aia della Pietra e Fontana di S. Giovanni hanno portate modeste.

Nel corso degli anni, si è osservato come vari eventi abbiano modificato il regime e deviato il corso delle acque sotterranee, con particolare rilevanza per gli eventi sismici che hanno colpito l'Irpinia nel novembre 1980. Un esempio significativo è rappresentato dalle sorgenti di Tronola, che prima del terremoto avevano una portata complessiva di 11,90 $m^3$/sec, ma che ora risultano quasi completamente asciutte durante la stagione estiva.

**Tabella 1. Principali sorgenti nel territorio comunale**
(Fonte: piano zonale di sviluppo agricolo della Comunità Montana Terminio – Cervialto -1980)

| Nome | Portata |
|---|---|
| Pozzo di Bagnoli | da 0 a 1 Lt/sec. |
| Sorgente della Preda | da 0 a 1 Lt/sec. |
| Fiumara di Tannera | da 0 a 1 Lt/sec. |
| Sorgente di Don Giovanni | da 0 a 1 Lt/sec. |



**Figura 2: Idrografia superficiale del complesso assestamentale**

La catena dei Picentini, costituita principalmente da rilievi carbonatici è, inoltre, caratterizzata da numerosi fenomeni carsici, che includono grotte, doline, polje, inghiottitoi e aree di dissoluzione chimica. Tra le grotte più significative la Grotta di Caliendo.

La Conca di Piano Laceno, colmata di materiale piroclastico argillificato, presenta un'area palustre stagionale e una circolazione sotterranea che emerge presso la citata Grotta di Caliendo.

Il reticolo idrografico del Cervialto mostra un pattern dendritico con forte controllo tettonico. L'idrografia presenta un differente grado di evoluzione in relazione alle diverse litologie: nei litotipi carbonatici prevale l'infiltrazione sul ruscellamento, mentre nei litotipi argilloso-marnosi si osserva una migliore organizzazione dei corsi d'acqua. Il drenaggio del massiccio è complessivamente centrifugo, scorrendo verso le aree topograficamente più basse, suddiviso nei tre bacini citati. Tuttavia, nella Conca di Piano Laceno, il drenaggio segue un andamento centripeto. La densità di drenaggio è bassa, compatibile con la natura carbonatica del substrato. Eventi tellurici, come il terremoto del 1980 in Irpinia, hanno influenzato il regime delle sorgenti, modificando il corso delle acque sotterranee. La potenzialità idrica globale della struttura del M. Cervialto è stimata in circa 130 milioni di $m^3$/anno.

È importante sottolineare che la complessa rete di circolazione idrica sotterranea permette l'accumulo di grandi riserve idriche, rendendo il massiccio del Cervialto una risorsa idrica fondamentale per l'intera regione Campania e per la Puglia. La continua evoluzione del regime delle sorgenti e dei corsi d'acqua superficiali richiede un costante monitoraggio per comprendere appieno le dinamiche idriche del territorio.

La complessa geologia dell'area influisce in modo significativo sulla circolazione idrica sotterranea. Tuttavia, all'interno della zona oggetto di pianificazione, si distingue il Complesso carbonatico, caratterizzato da unità tettoniche meso-cenozoiche costituite principalmente da rocce calcaree e dolomitiche. Grazie alla presenza di fratturazioni e a diffusi fenomeni carsici, queste formazioni risultano altamente permeabili. Tale configurazione consente un'elevata percentuale di infiltrazione (85-95%) e la formazione di ampi serbatoi idrici sotterranei, che alimentano diverse sorgenti di rilevanza strategica, tra cui quella di Caposele.

## Compatibilità idrogeologica del P.G.F.

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, redatto ai sensi del comma 6 ter, art. 17 della L. 18 maggio 1989, n. 183 come modificato dall'art.12 della L. 493/93, dell'ex Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele, oggi Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, contiene la individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, le norme di attuazione, le aree da sottoporre a misure di salvaguardia e le relative misure.

Rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso del territorio relative all'assetto idrogeologico del bacino idrografico, al fine di garantire al territorio un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idrogeologico.

Per quanto riguarda la compatibilità idrogeologica degli interventi previsti dal presente Piano si rimanda allo *Studio di Compatibilità Idrogeologica* a firma dei Dottori Geologi Vincenzo Siervo e Pierluigi Curcio, dal quale sono state desunte anche le descrizioni sopra riportate.

# Cap. 2 - Inquadramento geo-pedologico, climatico e fitoclimatico, la flora e la fauna

## La geologia

La Regione Campania presenta un assetto geologico-strutturale molto complesso. Al suo interno è possibile distinguere un settore a morfologia collinare e montuosa occupato dalla catena appenninica, ed un settore costiero, ad occidente, caratterizzato dalla presenza di ampie depressioni strutturali occupate attualmente da piane alluvionali (Piana Campana e Piana del Sele).

Gli eventi che hanno generato l'assetto geologico-strutturale della Campania sono strettamente connessi agli eventi che hanno generato il quadro strutturale della penisola italiana. Le principali strutture geologiche della penisola italiana sono rappresentate da quattro elementi strutturali di primo ordine:

- **area tirrenica**, caratterizzata da crosta continentale assottigliata e, in alcune zone (Tirreno meridionale), da crosta oceanica, formatasi a partire dal Tortoniano superiore - Messiniano inferiore in seguito a processi di *rifting* avvenuti all'interno di una catena preesistente;
- **catena appenninica**, costituita da coltri di ricoprimento, a convergenza adriatica, e dai depositi di riempimento di bacini che si impostavano sulle coltri di ricoprimento in avanzamento;
- **l'avanfossa appenninica**, costituita da sedimenti plio-quaternari in parte sepolti sotto le falde appenniniche;
- **avampaese**, costituito da una potente successione carbonatica mesozoica, impostata su crosta continentale, in graduale approfondimento verso SW al di sotto delle coltri appenniniche.




**Figura 3. Schema tettonico dell'Appennino meridionale.**
1) Plio-Quaternario marino e continentale; 2) Vulcaniti plio-quaternarie; 3) Unità umbro-marchigiane; 4) Unità interne sicilidi e liguridi; 5) Unità della Piattaforma apula; 6) Unità della Piattaforma sud-appenninica e delle relative avanfosse; 7) Unità Lagonegrese e molisano-sannitiche e dell'avanfossa miocenica; 8) sovrascorrimenti; 9) faglie; 10) fronte dell'alloctono

In questo contesto strutturale, la Campania comprende un piccolo settore della catena appenninica. Quest'ultima presenta una complessa struttura a falde di ricoprimento derivanti dallo scollamento e dall'accorciamento delle coperture sedimentarie di domini paleogeografici appartenenti al margine settentrionale della placca africano-adriatica e trasportati verso l'avampaese padano-adriatico-ionico a partire dall'Oligocene superiore.

L'evoluzione tettonica dell'Appennino, dall'Oligocene superiore fino al Miocene medio, viene messa in relazione alla convergenza tra la placca europea e quella africano-adriatica, mentre a partire dal Tortoniano superiore fino al Quaternario la propagazione dei *thrusts* nella catena e l'apertura del bacino tirrenico sono stati controllali dal *roll-back* della litosfera dell'avampaese in subduzione.

Il fianco tirrenico dell'Appennino campano-lucano è caratterizzato da una serie di depressioni tettoniche estensionali (Piana del Garigliano-Golfo di Gaeta, Graben Campano, Piana del Sele-Golfo di Salerno, Golfo di Policastro) che ribassano di migliaia di metri sotto il livello del mare ampi settori interni dell'edificio a falde costruitosi con le precedenti fasi compressive mio-plioceniche.

La Piana del Sele si colloca all'interno di una di tali depressioni peri-tirreniche: quella nota come "depressione del Sele" o come "graben della Piana del Sele-Golfo di Salerno". Si tratta di una morfostruttura depressa che è delimitata dagli alti strutturali dei Monti Lattari e dei Monti Picentini, a nord, e dai rilievi compresi tra i Monti Alburni ed il Cilento, a sud-est. La parte continentale della depressione è caratterizzata da colline marginali (alte fino a 400 m) che si sono individuate con la deposizione e la deformazione dei Conglomerati di Eboli Auct. (Pleistocene inferiore) e, a valle di queste, da una piana alluvionale-costiera che si è formata a partire dal Pleistocene medio (Figura 4).




**Figura 4. Schema tettonico dell'area**

Come si può osservare dalla Carta Geologica d'Italia (Figura 5), la ricchezza geologica e morfologica dei Monti Picentini evidenzia una storia geodinamica complessa, con una successione di eventi compressivi, estensionali e trascorrenti che hanno determinato un assetto strutturale unico e articolato. Questa complessità si riflette anche nella distribuzione delle unità geologiche e nelle caratteristiche idrogeologiche dell'area, con una forte influenza sull'infiltrazione e circolazione delle acque sotterranee, nonché sulla morfologia dei versanti e delle valli.




**Figura 5. Stralcio Carta Geologica d'Italia, foglio 186**

L'assetto strutturale attuale è il risultato di un'evoluzione geologica legata alla collisione tra la placca euroasiatica e quella africana, iniziata nel Cretaceo inferiore, circa 100 milioni di anni fa. Questa collisione ha portato alla chiusura dell'Oceano Tetide, un vasto bacino che separava i due continenti. La chiusura di questo oceano è stata cruciale nella formazione di importanti catene montuose, tra cui le Alpi e gli Appennini, che rappresentano la sutura tra le due grandi placche crostali. Questo processo di collisione ha innescato una serie di eventi tettonici che hanno determinato l'attuale conformazione del Mediterraneo centrale e delle sue strutture orogeniche principali.

La catena dei Monti Picentini costituisce una delle unità morfostrutturali più estese dell'Appennino campano-lucano. Essa è formata da una serie di falde tettoniche originate dall'accrezione di prismi sedimentari, sviluppatesi a partire dalla fase di collisione tra la placca europea e quella Adria, un frammento della più ampia placca africana. Questa fase di accavallamento, nota come orogenesi alpina, si è verificata tra il tardo Oligocene e il Miocene, causando il sollevamento delle falde e il sovrascorrimento della placca europea su quella Adria. Tale configurazione tettonica ha conferito ai Monti Picentini una struttura complessa, successivamente modellata da ulteriori eventi deformativi.

Dopo la fase compressiva iniziale, la struttura dei Monti Picentini ha subito deformazioni di tipo estensionale e trascorrente, indotte da sistemi di faglie orientati prevalentemente NO-SE e NE-SO. Queste faglie hanno giocato un ruolo determinante nel modellare l'attuale conformazione morfostrutturale dell'Appennino meridionale. Il massiccio dei Monti Picentini si estende in direzione NO-SE per circa 35 km e in direzione NE-SO per circa 25 km, presentando caratteristiche topografiche imponenti. Il massiccio risulta delimitato su tutti i lati da importanti sistemi di faglie che hanno contribuito al suo sollevamento rispetto alle aree circostanti.

Il lato nord-occidentale dei Monti Picentini è delimitato dalle faglie di Chiusano, mentre il lato sud-orientale è caratterizzato da una linea più regolare rappresentata dalla faglia Materdomini-Puglietta, orientata NNE-SSW, che separa la struttura dei Picentini dal graben della valle del Sele. A sud, il massiccio è limitato dalle faglie Ogliara-Faiano e Monte Monna-Mercato-Monticelli-Eboli, orientate NO-SE, con rigetti verticali più pronunciati rispetto alle altre faglie descritte. A nord, la delimitazione è affidata alle faglie Castelvetere sul Calore-Cassano Irpino e Bagnoli Irpino-Stazione di Nusco, con orientamento rispettivamente NO-SE e NE-SO.

Il massiccio dei Monti Picentini è suddiviso in due settori principali lungo una linea immaginaria che unisce Mercato San Severino e Calabritto. Questa divisione separa una parte settentrionale, caratterizzata da affioramenti della porzione alto-giurassica e cretacea della successione carbonatica mesozoica, prevalentemente costituita da calcari, da una parte meridionale, dove affiorano principalmente le rocce dolomitiche della porzione triassico-giurassica della stessa successione.

Nell'area dei Monti Picentini si riconoscono tre principali unità tettoniche, elencate in ordine di impilamento, dalla più alta alla più bassa:

- **Unità pelagiche interne**: Rappresentate dall'Unità sicilide, queste formazioni derivano dallo scollamento della copertura sedimentaria del bacino neo-tetideo, associato alla crosta oceanica. L'Unità sicilide è costituita principalmente da litotipi argillosi, noti come Argille Varicolori, e da torbiditi calcaree dell'epoca eocenico-miocenica. Queste rocce affiorano principalmente nelle aree più basse del massiccio, ai suoi margini.

- **Unità di piattaforma carbonatica esterna**: Comprendono l'Unità della Piattaforma sud-appenninica (Alburno-Cervati), caratterizzata da facies sedimentarie che riflettono ambienti deposizionali peritidali e subtidali di alta energia. Nell'area dei Monti Picentini affiorano l'Unità dei Monti Lattari-Picentini e l'Unità di Monte Marzano-Maddalena, costituite principalmente da rocce calcaree nella parte superiore e dolomitiche nella parte inferiore, di età triassico-cretacea. Queste unità costituiscono il nucleo della catena e affiorano estesamente su tutta l'area.

- **Unità di bacino esterno**: Rappresentata dall'Unità lagonegrese, questa formazione è costituita da successioni carbonatiche e calcareo-clastiche, che passano lateralmente a sedimenti pelagici profondi. Nell'area affiorano l'Unità di Frigento-Monte Arioso e l'Unità del Fortore-Groppa d'Anzi. Queste unità sono caratterizzate da flysch, calcari, calcari marnosi e scisti silicei, e affiorano ai margini del massiccio, spesso in contatto di sovrascorrimento con le unità carbonatiche.

Al di sopra delle principali unità tettoniche, si trovano depositi sin-orogenici di età miocenica-plio-pleistocenica. Questi depositi sono costituiti da sedimenti silicoclastici torbiditici e si sviluppano in bacini di *wedge-top* posti sul dorso delle unità tettoniche accavallate. I depositi quaternari presenti

nell'area sono rappresentati principalmente da sedimenti alluvionali, di versante, lacustri, palustri e di frana, che completano l'evoluzione geologica recente del massiccio.

## La pedologia

La zona del Monte Cervialto è situata interamente nella **Soil Region 59.7**, che include le provincie pedologiche: Montagna Appenninica (MAP), Pianure Intermontane (PIM) e Collina Preappenninica (CAP).

La Soil Region 59.7 è caratterizzata principalmente da *Cambisols* e *Leptosols*, con la presenza di *Luvisols*, che si sviluppano su rocce calcaree mesozoiche e terziarie tipiche dell'Appennino meridionale.

Tuttavia, sebbene la geologia della regione sia dominata da formazioni calcaree, la maggior parte dei suoli ha origine vulcanica, derivante da depositi piroclastici prodotti dalle eruzioni dei Campi Flegrei e del Somma-Vesuvio. Queste eruzioni, avvenute negli ultimi 40.000 anni, hanno avuto un carattere esplosivo, generando ingenti quantità di materiali vulcanoclastici.




**Figura 6. Estratto della Carta dei sottosistemi di terre delle Regione Campania**

Sono generalmente suoli profondi e fertili nelle aree con bassa pendenza. Tuttavia, in zone di alta pendenza, la profondità e la fertilità del suolo diminuiscono, esponendo il substrato calcareo sottostante.

Sulla base della Carta dei sottosistemi di terre delle Regione Campania si possono individuare i seguenti principali sottosistemi pedologici:

**MAP 4.4: Rilievi montuosi calcarei con coperture piroclastiche**. Questo sottosistema copre la maggior parte del territorio silvopastorale, in particolare a sud di una linea che va dal valico di Colle della Molella alle pendici occidentali di Aria della Preda. I suoli qui sono profondi, con una profondità utile alle radici moderatamente elevata, limitata da orizzonti ricchi di scheletro. La tessitura è moderatamente fine, con scheletro scarso in superficie e abbondante in profondità. La reazione del suolo varia da neutra a moderatamente alcalina in profondità. Sono suoli non calcarei in superficie, moderatamente calcarei in profondità, con alta Capacità di Scambio Cationico (CSC) e bassa capacità di acqua disponibile (AWC) pari a 91.0 mm. Presentano una elevata riserva di acqua nei pori di grandi dimensioni, rilasciata facilmente anche in condizioni di relativa secchezza. La presenza di elevate quantità di vetro vulcanico conferisce alta fertilità ai suoli, favorendo la crescita vegetativa. Nei contesti forestali, questi suoli accumulano grandi quantità di sostanza organica nell'orizzonte "A", svolgendo un importante ruolo nel sequestro di carbonio organico e riducendo il flusso di anidride carbonica nell'atmosfera.

**MAP 4.7: Montagna calcarea denudata con accumuli cineritici**. Questo sottosistema è tipico della zona a nord della ZSC. I suoli sono poco profondi, con scarsa profondità utile alle radici, limitata dal

substrato calcareo compatto. La tessitura è media, con scheletro comune e di piccole dimensioni. La reazione del suolo varia da neutra a debolmente alcalina, con alta CSC e bassa AWC pari a 69.0 mm. La permeabilità (Ksat) è moderatamente alta e i suoli sono ben drenati. Nei versanti più ripidi, si trovano prevalentemente suoli sottili e rocciosi a causa dell'erosione idrica su substrato calcareo compatto, con orizzonti superficiali spessi e scuri. Questi suoli sono generalmente ben drenati, eccetto quelli nelle depressioni carsiche, che sono privi di carbonati e mostrano caratteristiche lacustri in condizioni di idromorfia permanente. La variabilità della fertilità legata all'inclinazione dei versanti si traduce in differenze significative nelle dimensioni degli alberi a parità di età.

**PIM 5.3: Pianure e conche fluvio-lacustri terrazzate interne ai rilievi calcarei.** Questo sottosistema comprende suoli profondi con una profondità utile alle radici elevata, limitata da orizzonti induriti (surge). I suoli sono privi di scheletro, con tessitura che varia da grossolana a media in profondità. La reazione è neutra, i suoli non sono calcarei e presentano una CSC variabile da media ad alta in funzione della profondità, con un'AWC alta pari a 217.5 mm.

La situazione descritta rappresenta un esempio significativo di interazione tra geologia e pedologia all'interno della Soil Region 59.7. La presenza di suoli di origine vulcanica su un substrato calcareo contribuisce a una notevole diversità pedologica che varia in funzione della pendenza e della composizione dei depositi piroclastici. Questa diversità si riflette nelle differenti capacità di ritenzione idrica, nella fertilità del suolo e nella capacità di scambio cationico, influenzando direttamente la vegetazione e l'ecosistema forestale della zona.

Il ruolo dei suoli nella conservazione dell'ecosistema è cruciale, specialmente in contesti forestali dove l'accumulo di sostanza organica contribuisce significativamente al sequestro di carbonio. La gestione sostenibile di queste risorse pedologiche è essenziale per mantenere la biodiversità e la funzionalità ecologica. Questi suoli non solo supportano una ricca vegetazione, ma svolgono anche una funzione fondamentale nel mitigare i cambiamenti climatici attraverso la riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

## Il clima

L'area in esame può essere classificata a "clima mediterraneo" con aspetti di continentalità determinati sia dalla distanza dalla costa che dall'andamento orografico e altimetrico. Non mancano abbondanti precipitazioni nevose invernali con presenza della neve al suolo, soprattutto in quota, per molti giorni.

Le condizioni climatiche e le risorse idriche di un'area sono due fattori strettamente legati tra loro da relazioni misurabili e stimabili sulla base di dati termopluviometrici disponibili. Infatti, utilizzando semplici parametri climatici come le precipitazioni, la temperatura e l'evapotraspirazione si possono determinare sia le quantità di afflussi che entrano nel sistema sia la quantità di acqua che viene perduta dal sistema stesso sotto forma di percolazione ed evapotraspirazione.

Se poi viene presa in considerazione anche la capacità di immagazzinamento dell'acqua nel suolo, diviene possibile calcolare il regime idrico di un'area.

Nell'area in esame si riscontra un clima caldo e temperato. L'inverno ha molta più piovosità dell'estate. Il clima è stato classificato come **Csb** in accordo con il sistema di Köppen e Geiger.

La classificazione climatica secondo Köppen indica un clima del tipo:

**Csb** - climi temperati con estate secca (*Sommertrocken temperierte Klimate*), con almeno un mese invernale (dicembre, gennaio e febbraio nell'emisfero boreale) avendo come minimo il triplo delle precipitazioni del mese estivo (giugno, luglio o agosto nell'emisfero boreale) più secco, che devono

essere inferiori a 30 mm. La temperatura media del mese più caldo deve essere inferiore a 22 °C con almeno 4 mesi sopra 10 °C.
Il valore più basso per l'umidità relativa viene misurato ad agosto (61.99 %). L'umidità relativa è più alta a dicembre (82.45 %). In media, il minor numero di giorni di pioggia si registra ad agosto (giorni: 5.33). Il mese con i giorni più piovosi è novembre (giorni: 13.57).

Per l'inquadramento climatico del territorio di Bagnoli Irpino si è fatto riferimento ai dati del periodo 2011-2020, considerato un periodo storico sufficientemente affidabile, della Stazione termopluviometrica di Montella, localizzata a circa 4 Km da Bagnoli con un'altitudine di 528 mt s.l.m.

**Tabella 2. Bilancio idrologico con valori di temperatura (T), precipitazioni (P), evapotraspirazione potenziale (PE) e reale (AE), deficit idrico (D) e surplus (S) del suolo, per la stazione termopluviometrica di Montella, calcolati secondo il modello Thornthwaite e Mather, per un contenuto di acqua disponibile nel suolo teorico di 200 mm.**

| Parametro | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tmed °C | 4,7 | 5,4 | 7,6 | 11,2 | 14,5 | 18,8 | 21,2 | 21,1 | 17,4 | 12,7 | 9,1 | 4,7 | 12,4 |
| Tmin °C | -0,2 | 0,2 | 1,5 | 3,6 | 6,7 | 10,2 | 12,2 | 12,1 | 10,3 | 6,3 | 3,8 | -0,6 | 5,5 |
| Tmax°C | 9,9 | 11,0 | 13,8 | 18,4 | 21,9 | 26,9 | 29,7 | 30,4 | 25,2 | 20,1 | 15,2 | 11,1 | 19,5 |
| P mm | 150,8 | 178,0 | 171,8 | 103,3 | 102,4 | 61,1 | 53,6 | 34,0 | 106,9 | 133,2 | 190,0 | 175,5 | 1460,6 |
| PE mm | 18,4 | 20,9 | 32,9 | 49,2 | 73,1 | 99,9 | 115,5 | 100,0 | 63,0 | 39,0 | 24,4 | 17,2 | 653,5 |
| AE mm | 18,4 | 20,9 | 32,9 | 49,2 | 73,1 | 99,9 | 102,0 | 68,6 | 63,0 | 39,0 | 24,4 | 17,2 | 608,6 |
| S | 132,4 | 157,1 | 138,9 | 54,1 | 29,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,9 | 94,2 | 165,6 | 158,3 | 973,8 |
| D | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,9 |

Sulla base dei dati di precipitazione media mensile P e di temperatura media mensile T, riportati in Tabella 2, utilizzando il modello proposto da Thornthwaite e Mather, è stato effettuato il calcolo dell'evapotraspirazione potenziale (PE) e reale (AE).

L'evaporazione, che è la causa determinante dell'aridità di un clima, rappresenta l'acqua che viene ceduta all'atmosfera dalla superficie del suolo e dagli specchi d'acqua, oltre che attraverso l'attività metabolica delle piante (traspirazione). L'insieme di questi due processi viene definito evapotraspirazione, che rappresenta quindi la quantità di acqua totale che viene restituita all'atmosfera. L'evapotraspirazione reale (AE) rappresenta la quantità di acqua che effettivamente evapora dal suolo e che traspira dalle piante, mentre l'evapotraspirazione potenziale (PE) è invece la quantità di acqua che evaporerebbe se le riserve idriche del suolo fossero costantemente rinnovate. L'evapotraspirazione reale è quindi sempre inferiore a quella potenziale quando le piante non hanno a disposizione tutta l'acqua che sarebbero in grado di traspirare. Il valore di PE è quindi un indice rappresentativo del fabbisogno idrico della vegetazione. Applicando il modello messo a punto da Thornthwaite e Mather è possibile calcolare L'evapotraspirazione potenziale e il bilancio idrico di qualsiasi località della quale si conoscano i valori medi di temperatura, della piovosità e del valore dell'acqua disponibile del suolo (AWC).

L'AWC (*Available Water Capacity*) rappresenta la quantità di acqua, in mm, che il suolo è in grado di trattenere e che è utilizzabile dalle piante. È un valore che è funzione di alcuni parametri del suolo, quali la tessitura ed il tenore di sostanza organica. Per l'area oggetto dell'indagine è stato adottato un valore medio teorico di 200 mm in considerazione dei valori tessiturali dei suoli prevalenti nella zona e del loro contenuto medio in sostanza organica.
Nella Tabella 2, oltre ai valori di temperatura (T), di precipitazione (P), di evapotraspirazione reale (AE) e potenziale (PE), sono stati riportati anche i valori del Deficit Idrico (D) e del Surplus Idrico (S). Il valore del deficit (D) è dato dalla differenza tra PE ed AE e fornisce un valore utile a

stimare la quantità di acqua necessaria a bilanciare le perdite dovute alla evapotraspirazione potenziale, ed è una misura dell'intensità e della durata dell'aridità. Il valore del Surplus (S), tiene conto invece dell'eccesso di precipitazioni rispetto alla evapotraspirazione potenziale, ed indica la quantità di acqua che, una volta saturata la riserva idrica del suolo, va ad alimentare le falde freatiche ed il deflusso superficiale.

Alcune semplici relazioni permettono inoltre di ottenere l'indice di aridità e l'indice di umidità dell'area.

Nel complesso, dai dati sopra riportati si osserva che le precipitazioni hanno un totale annuale abbastanza tipico per il comprensorio in esame, con un valore medio annuale abbastanza elevato, pari a 1.460,6 mm e massimi di piovosità autunnali e primaverili. Il mese più piovoso risulta essere **novembre** con 190,0 mm medi totali.

La stagione meno piovosa è, invece, sicuramente quella estiva: le precipitazioni divengono decisamente più ridotte ma non assenti; il mese più secco dell'anno risulta essere **agosto** con 34,0 mm medi mensili di precipitazioni.

Anche i dati di temperatura, nella loro distribuzione media mensile, ma anche nella distribuzione delle minime e massime, mostrano una distribuzione caratteristica delle montagne picentine, con **luglio** che risulta essere il mese con temperature medie mensili più alte pari a 21,2 °C medi mensili.

I valori di temperatura più bassi si rilevano invece nei mesi di **dicembre** e di **gennaio**, con valori medi piuttosto bassi (4,7° C), sempre riferendosi alle medie del periodo 2011-2020. Da rilevare che anche le temperature minime medie mensili, risultano inferiori a 0°C in dicembre e gennaio, mentre le massime superano i 30°C solo nel mese di agosto.

Ovviamente, nella parte di territorio posta a quote più elevate possono registrarsi temperature minime anche estreme, con valori di molto inferiori a 0° (punte di -20°).

Di seguito, in Tabella 3, si riporta la formula climatica che è utile alla determinazione del tipo climatico secondo Thornthwaite, oltre ai valori degli indici di umidità (Ih), di aridità (Ia) e l'indice di umidità globale (Im).

**Tabella 3. Tipo climatico secondo Thornthwaite con indici di aridità e di umidità riferiti alla stazione termopluviometrica di Montella**

| Formula climatica<br>Stazione termopluviometrica di Montella<br>A B'1 r a' | | |
|---|---|---|
| Indice di aridità<br>6,87 | Indice di umidità<br>149,0 | Indice di umidità globale<br>142,1 |

Con riferimento alla formula climatica riportata in Tabella 3, il tipo climatico di Bagnoli può essere, quindi, definito come segue:

- Tipo climatico **perumido (A)**, con valore dell'indice di umidità globale (Im) superiore a 100;
- Varietà del clima **primo mesotermico (B'1)** con **PE** (evapotraspirazione potenziale) compresa tra 570 e 712 mm;
- Le variazioni stagionali dell'umidità indicano che **non vi è deficienza idrica in estate o la deficienza idrica è molto piccola** (r) avendo l'indice di aridità inferiore a 16.7.
- Valore della **concentrazione estiva dell'efficienza termica** bassa < 48%.

Come si può osservare dalla Tabella 3, i caratteri del clima di una certa località sono riassunti da una formula climatica, costituita da una successione di 4 lettere che indicano: il valore di Im (tipo

di clima), quello dell'efficienza termica annua, il tipo di variazione stagionale dell'umidità ed il valore della concentrazione estiva dell'efficienza termica.

L'analisi delle formule climatiche permette di osservare che secondo la classificazione di Thornthwaite il tipo di clima viene definito **Perumido**, cioè con valori di Im (indice di umidità globale) maggiore di 100 e con piovosità media totale elevata, di poco superiore ai 1400 mm annui.

La varietà del clima, indicata dalla seconda lettera, corrisponde al **primo mesotermico** (B'1), significando un valore della Evapotraspirazione potenziale totale annua moderato e sensibilmente più basso delle precipitazioni, pari a 653.57 mm. Tale valore, come quello della concentrazione estiva dell'efficienza termica, serve per poter collegare il clima alla vegetazione, ed esprime l'esigenza delle piante in termini di acqua necessaria per la loro crescita.

Inoltre, la variazione stagionale dell'umidità, indicata dalla terza lettera, indica l'assenza di deficienza idrica in estate o una deficienza molto piccola. Nella Tabella 2 si osserva infatti che il surplus idrico inizia a settembre e si protrae a lungo, fino a metà giugno, mentre il deficit idrico, molto basso e pari a 44,9 mm annui totali, inizia a fine giugno e ha una durata che arriva fino ai primi di settembre quando, con l'inizio delle piogge autunnali, si arriva a ricostituire in breve tempo le riserve idriche. Il massimo deficit idrico si ha in agosto con 31,4 mm.

Il valore della concentrazione estiva dell'efficienza termica, che esprime in percentuale il valore della evapotraspirazione potenziale in mm dei tre mesi estivi ed è indicato dalla quarta lettera della formula climatica, è sempre piuttosto basso, inferiore al 48%.

Di seguito, in Figura 7, si riporta il grafico con l'andamento delle precipitazioni, delle temperature e della evapotraspirazione potenziale medie mensili, oltre al surplus e deficit idrico del suolo.




**Figura 7. Andamento medio mensile delle temperature, delle precipitazioni, della evapotraspirazione potenziale, del Deficit e del Surplus idrico del suolo riferite al periodo 2011-2020 per la stazione**

Dal punto di vista fitogeografico il territorio in oggetto si inserisce all'interno del Distretto Tirrenico (comprendente la gran parte del territorio laziale e campano), e con maggior dettaglio nel Settore Campano-Calabro (Giacomini & Fenaroli, 1958).

Adottando la classificazione bioclimatica proposta da Blasi & Michetti (2005) il territorio di Bagnoli Irpino rientra per intero nella Regione Temperata.

Secondo la classificazione fitoclimatica di Pavari de Philippis la gran parte del territorio ricade nella Zona fitoclimatica del *Fagetum*, caratterizzata da abbondanti piogge, assenza di siccità estiva, elevata umidità atmosferica. In questa zona vegetano piante con buona resistenza al freddo (mesofile) e che necessitano di molta umidità per il loro sviluppo (igrofile): faggio, alcuni aceri e abete bianco. Il *Fagetum* raggiunge le seguenti quote: settentrione 1200 m, centro 1500 m, meridione e isole 1700 m. Negli Appennini, il *Fagetum* è l'ultima zona altitudinale; pertanto, il limite superiore confina con il limite della vegetazione arborea (cioè, il limite oltre il quale la vegetazione arborea non riesce più a crescere e lascia il posto alla vegetazione arbustiva ed erbacea).

Le pendici più basse delle coste del Cervialto ricadono invece nella zona del *Castanetum* caratterizzato generalmente da abbondanti piogge, che possono variare a seconda delle zone. Nella sottozona fredda, la piovosità può superare i 700 mm annui, mentre in altre aree risulta inferiore. La zona si suddivide in due sottozone: la sottozona calda, che presenta un clima più secco con la possibilità di periodi di siccità estiva, e la sottozona fredda, che invece è caratterizzata da un clima più umido e da precipitazioni più abbondanti. La vegetazione spontanea è dominata da specie decidue come il castagno (*Castanea sativa*), le querce e altre latifoglie, che prosperano in queste condizioni climatiche favorevoli. I limiti altitudinali indicativi del *Castanetum* sono, nel meridione e nelle isole, fino a 1000-1200 m s.l.m.

## La vegetazione

### *Descrizione delle componenti arborea, arbustiva ed erbacea*

La vegetazione forestale si estende sulla gran parte della superficie silvopastorale, caratterizzandone il paesaggio, nel quale si trovano estese faggete che nelle esposizioni più favorevoli giungono fino al crinale. Sono estesi anche gli ostrieti e i boschi misti di latifoglie che ricoprono i versanti più scoscesi, occupando la maggior parte della superficie boscata del sito insieme alle faggete. La vegetazione forestale, a tratti, ed in particolar modo nella zona a nord del Piano Laceno, risulta mosaicata con cenosi arbustive (per lo più ginestreti e roveti e aree in evoluzione naturale), praterie d'altitudine a graminacee, radure e rupi calcaree colonizzate da tipiche comunità vegetali.

I **boschi di faggio** (*Fagus sylvatica*) ricoprono più della metà del complesso, fino a quote considerevoli in quanto il Monte Cervialto è fra le due vette più elevate (1800 m s.l.m.) dei Monti Picentini. Molte delle faggete che si estendono alle quote più elevate appaiono come fustaie eccezionalmente rigogliose e talvolta maestose. Il faggio, che costituisce generalmente popolamenti puri, può trovarsi sui versanti esposti a sud e ad ovest, anche consociato ad altre specie: tra queste prevalgono l'ontano napoletano, che si trova consociato alla betulle nelle zone percorse da incendio (Serrone Pizzuto), e con minori percentuali l'acero montano, il sorbo degli uccellatori e l'olmo montano. Altra specie meritevole di segnalazione perché endemica di queste zone è *Acer lobelii*, presente sporadicamente in alcune stazioni particolarmente umide.

La faggeta, per definizione, non ha uno strato erbaceo particolarmente ricco di specie floristiche; tuttavia, tali formazioni sono in gran parte accompagnate dalla presenza di agrifoglio e tasso, specie caratteristiche deli all'habitat 9210* "Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*". Questa tipologia di boschi è ascrivibile alla Serie sud-appenninica neutrobasifila del faggio (*Ranunculo brutii-Fago sylvaticae sigmetum*).

Dal punto di vista fitosociologico le faggete dell'Irpinia sembrano inquadrarsi abbastanza bene nelle due associazioni individuate dal Gentile (1969) per l'Appennino meridionale: *Aquifolio-Fagetum* e *Asyneumati-Fagetum*.

L'*Aquifolio-Fagetum* corrisponde alla fascia inferiore di vegetazione del faggio, caratterizzato in primo luogo dalla presenza di *Ilex aquifolium*, accompagnato fedelmente da *Daphne laureola*, nelle foreste poste sotto i 1400 - 1500 m s.l.m. Nelle faggete irpine, però, la *Daphne* è ugualmente presente in tutte le esposizioni, mentre l'agrifoglio abbonda, anche sotto copertura densa, soprattutto nei versanti più soleggiati. Nella vegetazione del sottobosco sono pure comuni: *Melica uniflora, Lathyrus venetus, Euphorbia amygdaloides ed Allium triquetum var. pendulinum*, considerate specie caratteristiche dell'associazione.

Nell'ambito di questa fascia vegetazionale è da ascrivere anche la presenza di *Alnus cordata* che, ben lontano dal poter essere considerato tipico di una variante umida dell'Aquifolio-Fagetum predilige, come già detto, i versanti esposti a sud, sud-ovest ed ovest, manifestando oltre ad una maggiore resistenza del faggio alla siccità , spiccato carattere di specie pioniera, come dimostrano la sua facilità di propagazione nelle zone percorse dall'incendio e la sua rapidità nel colonizzare terreni detritici o denudati come avviene con l'apertura di strade di esbosco che spesso vengono completamente invase dall'ontano subito dopo il loro abbandono. In questi boschi, sempre in corrispondenza di questa fascia vegetazionale, è abbastanza facile reperire vecchi esemplari di tasso, soprattutto lungo i fossi e negli avvallamenti.

Al di sopra dei 1500 m si dovrebbe entrare nell'*Asyneumati-Fagetum*, associazione caratterizzata da *Asyneuma trichocalycinum, Stellaria nemorum, Ranunculus brutius e Lamium galeobdolon.*

È molto difficile però individuare i limiti altitudinali di queste due associazioni, che si fanno sfumati soprattutto nelle esposizioni nord e che sono comunque legati a numerosi fattori stazionali, non escluse le condizioni di copertura del soprassuolo. In Valle d'Acera, ad esempio, in boschi adulti a densità normale, esposti a nord-est, è facile ·trovare *Stellaria nemorum* a 1250 m e, nelle situazioni di particolare freschezza del terreno, non è rara la presenza di *Oxalis acetosella*, considerata generalmente caratteristica di una variante di altitudine dell'*Asyneumati-Fagetum*.

Nella fascia più alta del Cervialto e della Rajamagra (1652 m), prevalentemente nei versanti esposti a nord, il sottobosco è spesso caratterizzato dall'abbondanza di *Dryopteris filix-mas*; la presenza in queste stesse stazioni di *Adenostyles alpina* e di *Oxalis acetosella* nonché di *Elymus europaeus*, farebbe pensare alle due varianti dell'*Asyneumati-Fagetum* tipiche delle stazioni più fresche e meno antropizzate. In una stazione di questo genere, sul Cervialto, sono stati rinvenuti alcuni esemplari di *Evonymus latifolius*, già segnalato da Trotter (1913) per altre località in Comune di Montella.

È, comunque, difficile stabilire una tipologia schematica per queste foreste, a causa del diverso sovrapporsi e combinarsi di numerosi fattori ambientali e dell'intervento antropico. Gli elementi che meglio sembrano agire da fattori discriminanti sono l'esposizione e la morfologia, l'esposizione in primo luogo.

Nei versanti settentrionali, in particolare sul versante nord e nord-est di Raja della Scannella i boschi mostrano una fisionomia simile e una comune evoluzione della flora a seguito di interventi selvicolturali. Le specie erbacee predominanti in queste aree includono *Asperula odorata, Cardamine bulbifera, Viola sylvestris, Sanicula europaea, Geranium robertianum, Oxalis acetosella e Rubus glandulosus*, tra altre. Dove la densità del bosco è rimasta alta, il sottobosco è assente o costituito da acetosella e sporadiche viole, con accumulo di lettiera indecomposta. L'asperula reagisce prontamente all'alleggerimento della copertura, mentre il rovo compare nelle aree più illuminate. Quando l'area basimetrica scende sotto i 28-30 $m^2$/ha, il rovo diventa dominante, indicando un potenziale problema per la rinnovazione forestale.

In diversi versanti non esiste una correlazione diretta tra il tipo di vegetazione erbacea e la fertilità stazionale, determinata dall'altezza delle piante dominanti. A quote maggiori, l'altezza del soprassuolo diminuisce senza cambiare la composizione del sottobosco erbaceo.

Nei versanti esposti a sud, sud-ovest e ovest, l'apertura di buche può portare al ricoprimento del terreno da parte delle graminacee e a un progressivo inaridimento della superficie. Questo fenomeno, se estremizzato, può rendere l'ambiente ostile alla rinnovazione, un problema che si verifica più frequentemente a quote elevate dove il terreno è già superficiale e la pendenza è maggiore.

L'altitudine, che non sembra influenzare i versanti meglio esposti, può esaltare l'effetto dell'esposizione solare nei versanti soleggiati, dove è più comune trovare boschi lacunosi con sottobosco a gramineto, radure e pietraie vicino al crinale. In questi versanti è cruciale mantenere una copertura arborea molto chiusa. In tali condizioni, il sottobosco è costituito da Viola, Sanicula, *Geranium, Dentaria e Asperula*, specie tipiche di popolamenti chiusi e terreni ricchi di humus. Questo indica che non è la composizione chimica del terreno a influenzare la vegetazione, ma le condizioni di elevata esposizione solare che alterano il bilancio idrico, risolvibili solo con una maggiore densità del soprassuolo.

In boschi meno chiusi, è facile che entri *Vinca minor*, specie dei *Quercetalia pubescentis*, indicatrice di xerotermia. Tra le graminacee frequenti ci sono *Melica uniflora, Brachypodium sylvaticum, Festuca ovina, Festuca heterophylla, Festuca sylvatica e Dactylis glomerata*. Condizioni più oligotrofiche sono segnalate dalla presenza massiccia di *Luzula sylvatica*.

Nelle radure, si insedia la felce *Pteridium aquilinum*, creando condizioni ambientali sfavorevoli alla rinnovazione, che, se presente, è solo di origine agamica, e difficilmente evolverà verso migliori condizioni edafiche. Inoltre, è rilevante la presenza di ovini e bovini, che continua a influenzare l'area.

Anche la configurazione del terreno influenza direttamente la vegetazione erbacea e l'insediamento della rinnovazione, creando particolari condizioni microclimatiche. Nei versanti più caldi e soleggiati, gli avvallamenti mantengono il terreno fresco più a lungo, favorendo una flora nemorale esigente, come *Stellaria*, *Oxalis*, *Asperula*, *Sanicula*, *Viola*, *Lamium galeobdolon*, *Allium ursinum* e *Geranium striatum*, con elevati indici di ricoprimento. In queste aree, un alleggerimento della copertura porta alla comparsa del rovo anziché delle graminacee, come accade nei versanti settentrionali.

I **boschi misti di latifoglie**, prevalentemente composti da *Fraxinus ornus*, *Ostrya carpinifolia*, *Carpinus orientalis* e *Alnus cordata*, coprono vaste aree al di sotto dei 900 m s.l.m. Sui versanti più ripidi (coste del Cervialto) dominano le formazioni di orno-ostrieto, appartenenti alla Serie sud-appenninica neutrobasifila del carpino nero (*Seslerio autumnalis-Acero obtusati sigmetum*).

Le **boschi di leccio** (*Quercus ilex*), rappresentano formazioni di latifoglie sempreverdi mediterranee su stazioni rupicole. Coprono una superficie ridotta (circa 64 ha) e si trovano in piccoli nuclei sui versanti che da Bagnoli Irpino salgono fino a Piano Laceno. Strutturalmente, il piano arboreo, alto tra i 5 e i 15 m, è spesso monospecifico, con la presenza occasionale di *Fraxinus ornus* e *Ostrya carpinifolia*.

I **rimboschimenti** sono stati realizzati principalmente alla fine dell'800 e negli anni '70-'80, per proteggere le sorgenti del Sele. Le specie principali utilizzate sono state il pino nero e, in minor misura, il pino silvestre. Più recentemente, sono state utilizzate anche douglasia, cipresso, abete bianco, abete rosso e alcune latifoglie. Questi rimboschimenti, più recenti, hanno un basso valore naturalistico a causa della ridotta diversità floristica. Tuttavia, le foreste più mature offrono habitat per diverse specie di uccelli, come i picchi.

Le **formazioni arbustive** sono rappresentate principalmente da formazioni di ginestra dei carbonai e da ginepreti.

La ginestra dei carbonai (*Cytisus scoparius*) è una specie pioniera, capace di colonizzare rapidamente terreni disturbati grazie alla sua capacità di fissare l'azoto atmosferico attraverso una

simbiosi con batteri rizobiali. Queste formazioni si trovano principalmente su terreni acidi e poveri di nutrienti, spesso in aree che sono state soggette a disturbi antropici come il disboscamento o il pascolo eccessivo. Succedono ecologicamente ai felceti di *Pteridium aquilinum* e si riscontrano prevalentemente nelle zone a terreno più profondo degli impluvi e degli avvallamenti. . La ginestra dei carbonai forma densi cespugli, che possono raggiungere altezze comprese tra 1 e 3 metri. Le comunità di *Cytisus scoparius* sono spesso accompagnate da altre specie erbacee e arbustive che tollerano suoli acidi e poveri di nutrienti.

Le formazioni dominate dal ginepro comune (*Juniperus communis*) sono caratterizzate da una distribuzione ampia, che va dalla fascia basale a quella montana. Queste cenosi secondarie tendono a colonizzare ambienti pascolivi, prevalentemente su terreni poveri di nutrienti e sviluppati su substrati calcarei, in aree dove le attività silvopastorali sono ridotte. Il ginepro comune forma piccoli nuclei di vegetazione che si espandono gradualmente con l'insediamento di altre specie arbustive. Nel complesso silvopastorale sono piuttosto rare e molto localizzate in piccoli nuclei radi.

Le **praterie** ricoprono una superficie abbastanza estesa. In generale si tratta di praterie montane a carattere camefitico ed emicriptofitico. In alcuni casi hanno carattere rupicolo, in corrispondenza di calcarei-dolomitici. La tipologia più interessante è quella dei prati da sfalcio collinari e montane, ascrivibile all'habitat 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine", che si estende nella zona di altopiano di Piano Laceno. In quest'ultimo caso si tratta di cenosi di origine secondaria, rappresentate da prati regolarmente sfalciati, tendenzialmente umidi.

Nella ZSC "Monte Cervialto e Montagnone di Nusco" (IT8040010) è stata segnalata la presenza dei seguenti habitat di interesse comunitario:

- 3240: Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix elaeagnos*
- 6210: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*)
- 6510: Praterie magre da fieno a bassa altitudine *Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*
- 8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
- 91AA: Boschi orientali di Quercia bianca
- 91B0: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*
- 91M0: Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
- 9210: Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex* (bassa altitudine - nuclei sporadici con *Taxus* e/o *Ilex*)
- 9260: Foreste di *Castanea sativa*
- 92A0: Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*
- 9340: Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia* (e aree di trasformazione in leccete)

### *Emergenze floristiche*

La Zona Speciale di Conservazione (ZSC) "Monte Cervialto e Montagnone di Nusco" ospita diverse specie floristiche di interesse conservazionistico. Tra queste, spiccano *Oxytropis caputoi*, *Stipa crassiculmis subsp. picentina*, *Sesleria autumnalis*. Queste specie sono particolarmente rilevanti nelle praterie d'altitudine e nelle faggete di alta quota. La loro presenza riflette la biodiversità e l'importanza ecologica dell'area, che include anche comunità vegetali appenniniche e mediterranee di notevole valore conservazionistico.

Tra le specie arboree di notevole interesse sono da ricordare:

- *Acer cappadocicum lobelii*, noto anche come acero di Lobelius, è un albero endemico dell'Italia centro-meridionale, non è attualmente considerato a rischio, ma la conservazione delle sue popolazioni naturali è importante per mantenere la biodiversità e la salute degli ecosistemi montani;
- betulla (*Betula pendula*) in Campania, la betulla è meno comune rispetto ad altre regioni europee, ma può essere trovata in aree montane e collinari, dove le condizioni climatiche sono più fresche e umide. Nel massiccio del Cervialto si riscontra ai margini della faggeta nelle zone aperte in ambienti luminosi e in consociazione con l'ontano napoletano nelle zone degradate dagli incendi (Serrone Pizzuto);
- L'ontano napoletano (*Alnus cordata*), un endemismo dell'Italia meridionale, è particolarmente diffuso in Campania, Basilicata e Calabria. Si trova spesso all'interno della faggeta, dove svolge un importante azione di ricostituzione nelle zone interessate da disturbi naturali o antropici;
- L'olmo montano (*Ulmus glabra*), sempre più raro a causa della grafiosi, si riscontra allo stato sporadico soprattutto sulle pendici del Cervialto.

### La fauna

La fauna della zona è stata oggetto di un'approfondita indagine nell'ambito della redazione dl Piano di Gestione della Zona Speciale di Conservazione "Monte Cervialto e Montagnone di Nusco" (IT8040010) a cui si rimanda.

Tra i mammiferi, spicca la presenza del lupo (*Canis lupus*), una specie che, nonostante in passato fosse a rischio di estinzione, mostra oggi un discreto recupero, rilevato grazie a studi faunistici condotti anche con l'uso di video trappole. Altri mammiferi presenti sono il cinghiale (*Sus scrofa*), introdotto con popolazioni non autoctone che si sono diffuse esponenzialmente, creando problemi per le attività agricole e per la produzione di tartufi, a causa del loro comportamento di scavo.

Tra i predatori, oltre al lupo, si trovano diversi mustelidi come la faina (*Martes foina*), la puzzola (*Mustela putorius*), la donnola (*Mustela nivalis*), il tasso (*Meles meles*) e la martora (*Martes martes*). Un altro canide presente è la volpe (*Vulpes vulpes*), la quale, grazie alla sua adattabilità, si avvicina frequentemente ai centri abitati in cerca di cibo. Tra i felidi, è segnalata la presenza del raro gatto selvatico (*Felis sylvestris*), che predilige i versanti esposti a sud.

La zona ospita anche numerose specie di roditori, come il topo selvatico dal collo giallo (*Apodemus flavicollis*) e l'arvicola rossastra (*Clethrionomis glareolus*), e insettivori come la talpa (*Talpa* sp.) e il riccio (*Erinaceus europaeus*).

I chirotteri sono ben rappresentati, con specie come il ferro di cavallo maggiore (*Rhinolophus ferrumequinum*), il ferro di cavallo minore (*Rhinolophus hipposiderus*), il pipistrello di Savi (*Hypsugo savii*) e il vespertilio di Blyth (*Myotis blythii*).

La classe animale meglio rappresentata è quella degli uccelli. L'avifauna comprende numerose specie, dalle più comuni a quelle rare, come il falco pellegrino (*Falco peregrinus*) e il

biancone (*Circaetus gallicus*). Nelle faggete mature si possono osservare picchi di varie specie, come il picchio rosso mezzano (*Picoides medius*), il picchio verde (*Picus viridis*) e il raro picchio nero (*Drycopus martius*). Tra gli uccelli rapaci sono ben rappresentati gli accipitriformi, tra cui la poiana (*Buteo buteo*) e l'aquila reale (*Aquila chrysaetos*), oltre agli strigiformi come la civetta (*Athene noctua*) e il barbagianni (*Tyto alba*). I passeriformi sono anch'essi numerosi, tra cui la ballerina gialla (*Motacilla cinerea*) e le diverse specie di lanidi come l'averla piccola (*Lanius collurio*).

Tra i rettili, la ZSC ospita una varietà di sauri, tra cui la lucertola muraiola e il ramarro, oltre a diversi serpenti come il biacco (*Hierophis viridiflavus*), il cervone e la vipera comune (*Vipera aspis*). Gli anfibi presenti includono il tritone crestato italiano (*Triturus carnifex*) e la salamandrina dagli occhiali (*Salamandrina terdigitata*), che insieme ad altre specie arricchiscono la biodiversità dell'area.

Gli invertebrati comprendono specie di particolare interesse conservazionistico, come il coleottero *Rosalia alpina*, che popola le praterie d'altitudine e le radure. La presenza di questa ricca varietà faunistica dimostra che i boschi della zona rappresentano un ambiente ecologico ideale per la riproduzione e la conservazione di numerose specie, confermando l'importanza.

Particolarmente critica è la presenza del cinghiale (*Sus scrofa*) che rappresenta una specie critica per la produzione di tartufi a causa del suo comportamento di scavo e ricerca di cibo. I cinghiali competono direttamente con i tartufai, utilizzando il loro potente olfatto per trovare i tartufi. Inoltre, il *rooting* dei cinghiali può danneggiare la micorriza, essenziale per la crescita dei tartufi, e alterare la struttura del terreno, riducendo la produzione a lungo termine. Misure di gestione, come la caccia controllata e la costruzione di recinzioni, sono utilizzate per mitigare questi impatti, ma bilanciare la conservazione dei cinghiali con la protezione della produzione di tartufi rimane una sfida complessa.

## Cap. 3 – La storia e l'economia locale

### Storia della comunità

Il nome del paese deriverebbe da "*baniolum*", che indicherebbe l'abbondanza di acque nell'area. Secondo il De Meo, Bagnoli sorse dopo la distruzione di Sebazia, "in un con Montella", con la quale fu sempre considerato un tutt'uno, fino a quando se ne staccò.

Il paese sorse probabilmente sotto il dominio dei Longobardi e del loro castello, intorno all'anno 870. Tuttavia, la testimonianza più antica relativa al borgo di Bagnoli risale solo al 901, quando era posseduto da un certo Erimanno conte di Conza; l'origine del paese sarebbe comunque confermata da un documento risalente al 1001, noto come "*Charta longobarda*".

L'arrivo dei Normanni, intorno all'anno Mille, servì a ricomporre il paese unendo tutti i suoi casali. Numerosi furono i feudatari che si alternarono nell'esercizio dei diritti feudali su Bagnoli, tra cui i D'Aquino, fino a quando, nel 1445, il Re Alfonso I D'Aragona concesse ad un suo valoroso soldato (lo spagnolo Garzia Cavaniglia) il feudo di Montella con Bagnoli e Cassano, che venne elevato a Contea dando nuovo impulso al paese non solo nell'artigianato (famosa la seta di Bagnoli) ma anche nelle arti. In particolare, il Conte Troiano I Cavaniglia, prode ed estremamente colto, cercò di far sviluppare Bagnoli, stimolando le sue attività "industriali" (tessuti, tintorie ed altro), ma soprattutto cercò di calamitare in loco, ospitandoli nel suo castello verso il 1500, numerosi intellettuali come Iacopo Sannazaro ed accademici, come Giano Anisio, che definì Bagnoli, in virtù delle sue bellezze, "*Domus deorum*".

Tale "incubatore culturale" favorì la crescita e maturazione di molti artisti, quali Leonardo da Capua (medico e letterato, favorito della regina Cristina di Svezia, nato nel 1618, morto nel 1683), Giambattista Abiosi, Ambrogio Salvi ed artisti-intagliatori come Scipione Infante, Andrea d'Asti, Iacopo Cestaro e Leonardo Calderoni, che con le loro opere contribuirono ad abbellire diversi palazzi e edifici religiosi.

Nel 1611, il feudo divenne Ducato e venne governato dalla famiglia dello spagnolo Bernardo de Quisos, la cui vedova Beatrice Majorga (o Mayorca), si imparentò, nel 1644, con la famiglia degli Strozzi di Firenze, che tennero il Ducato, con Ferdinando Mayorca Renzi Strozzi, fino all'abolizione della feudalità (1806).

Nel quadriennio 1743-46 il territorio fu soggetto alla giurisdizione del regio consolato di commercio di Ariano, nell'ambito della provincia di Principato Ultra.

Nell'archivio della biblioteca statale di Montevergine esiste una sezione dedicata alle "Famiglie locali", in cui sono conservati documenti appartenuti a famiglie "notevoli per la storia dell'Irpinia", tra cui figurano le seguenti di Bagnoli Irpino: Cione, De Rogatis, Dell'Osso, Pallante.

Durante i moti carbonari del 1820, venne fondata a Bagnoli una delle prime vendite, detta "I figli del sole", a cui presero parte molti locali, che vennero, poi, condannati.

Bagnoli, in aggiunta ai già citati Scipione Infante, Iacopo Cestaro, Leonardo di Capua e Michele Lenzi, ha dato in natali a tanti altri personaggi celebri: Giovanni Abbiosi, medico e matematico (XV secolo), Alessandro Ronca, Ammiraglio nella battaglia di Lepanto, Antonio D'Asti, nato nel 1677 (autore del testo "Sull'uso ed autorità della ragion civile nelle provincie del regno d'Occidente"), G. Crisostomo Borelli (valido oratore - XVII secolo), Giovanni Pallante (poeta e giurista, nato nel 1705), F. Rinaldi Gargani (canonico lateranense, generale d'Ordine e vescovo di Belcastro).

## Situazione demografica ed economica

### *Andamento demografico*

L'andamento demografico si è presentato nei decenni abbastanza irregolare e, dopo un picco positivo avuto nei primi anni '60 ha subito un decremento pressoché costante fino all'ultimo rilevamento del 2021, come si desume dalla tabella e dal grafico che seguono.

### *Grafici e statistiche (dati ISTAT) dell'andamento demografico*

**Tabella 4. Evoluzione Residenti**

| Anno | Residenti | Variazione | Note |
|---|---|---|---|
| 1861 | 4.012 | - | Il primo censimento della popolazione viene effettuato nell'anno dell'unità d'Italia. |
| 1871 | 3.753 | -6,5% | Come nel precedente censimento, l'unità di rilevazione basata sul concetto di "famiglia" non prevede la distinzione tra famiglie e convivenze. |
| 1881 | 3.409 | -9,2% | Viene adottato il metodo di rilevazione della popolazione residente, ne fanno parte i presenti con dimora abituale e gli assenti temporanei. |
| 1901 | 3.906 | +14,6% | La data di riferimento del censimento viene spostata a febbraio. Vengono introdotte schede individuali per ogni componente della famiglia. |
| 1911 | 3.553 | -9,0% | Per la prima volta viene previsto il limite di età di 10 anni per rispondere alle domande sul lavoro. |
| 1921 | 4.024 | +13,3% | L'ultimo censimento gestito dai comuni gravati anche delle spese di rilevazione. In seguito, le indagini statistiche verranno affidate all'Istat. |
| 1931 | 3.400 | -15,5% | Per la prima volta i dati raccolti vengono elaborati con macchine perforatrici utilizzando due tabulatori Hollerith a schede. |
| 1936 | 3.611 | +6,2% | Il primo ed unico censimento effettuato con periodicità quinquennale. |
| 1951 | 4.359 | +20,7% | Il primo censimento della popolazione a cui è stato abbinato anche quello delle abitazioni. |
| 1961 | 4.428 | +1,6% | Il questionario viene diviso in sezioni. Per la raccolta dei dati si utilizzano elaboratori di seconda generazione con l'applicazione del transistor e l'introduzione dei nastri magnetici. |
| 1971 | 4.020 | -9,2% | Il primo censimento di rilevazione dei gruppi linguistici di Trieste e Bolzano con questionario tradotto anche in lingua tedesca. |
| 1981 | 3.851 | -4,2% | Viene migliorata l'informazione statistica attraverso indagini pilota che testano l'affidabilità del questionario e l'attendibilità dei risultati. |
| 1991 | 3.220 | -16,4% | Il questionario viene tradotto in sei lingue oltre all'italiano ed è corredato di un "foglio individuale per straniero non residente in Italia". |
| 2001 | 3.323 | +3,2% | Lo sviluppo della telematica consente l'attivazione del primo sito web dedicato al Censimento e la diffusione dei risultati online. |
| 2011 | 3.274 | -1,5% | Il Censimento 2011 è stato il primo censimento online con i questionari compilati anche via web ed anche l'ultimo censimento di tipo tradizionale con rilevazione a cadenza decennale. |
| 2021 | 3.029 | -7,5% | Il Censimento 2021 è stato il primo censimento permanente della popolazione ad essere utilizzato per determinare la popolazione legale, che d'ora in poi sarà aggiornata con cadenza quinquennale invece che decennale. |




**Figura 8. Grafico andamento demografico dal 1861 al 2021**

Nel grafico che segue sono riportate le **variazioni della popolazione di Bagnoli negli anni di censimento (1861-2021)** espresse in percentuale a confronto con le variazioni della provincia di Avellino e della regione Campania.




**Figura 9. Grafico variazione percentuale popolazione ai censimenti dal 1861 al 2021**

Di seguito l'esame di dettaglio dei dati ISTAT dell'andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Bagnoli Irpino** dal 2001 al 2022. La Tabella 5 riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

**Tabella 5. Variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno**

| Anno | Data rilevamento | Popolazione residente | Variazione assoluta | Variazione percentuale | Numero Famiglie | Media componenti per famiglia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 31 dicembre | 3.331 | - | - | - | - |
| 2002 | 31 dicembre | 3.356 | +25 | +0,75% | - | - |
| 2003 | 31 dicembre | 3.368 | +12 | +0,36% | 1.273 | 2,64 |
| 2004 | 31 dicembre | 3.370 | +2 | +0,06% | 1.303 | 2,58 |
| 2005 | 31 dicembre | 3.341 | -29 | -0,86% | 1.304 | 2,56 |
| 2006 | 31 dicembre | 3.327 | -14 | -0,42% | 1.329 | 2,50 |
| 2007 | 31 dicembre | 3.314 | -13 | -0,39% | 1.340 | 2,47 |
| 2008 | 31 dicembre | 3.315 | +1 | +0,03% | 1.356 | 2,44 |
| 2009 | 31 dicembre | 3.299 | -16 | -0,48% | 1.355 | 2,43 |
| 2010 | 31 dicembre | 3.286 | -13 | -0,39% | 1.376 | 2,39 |
| 2011 (1) | 8 ottobre | 3.288 | +2 | +0,06% | 1.390 | 2,37 |
| 2011 (2) | 9 ottobre | 3.274 | -14 | -0,43% | - | - |
| 2011 (3) | 31 dicembre | 3.265 | -21 | -0,64% | 1.399 | 2,33 |
| 2012 | 31 dicembre | 3.270 | +5 | +0,15% | 1.410 | 2,32 |
| 2013 | 31 dicembre | 3.261 | -9 | -0,28% | 1.416 | 2,30 |
| 2014 | 31 dicembre | 3.243 | -18 | -0,55% | 1.407 | 2,30 |
| 2015 | 31 dicembre | 3.217 | -26 | -0,80% | 1.423 | 2,26 |
| 2016 | 31 dicembre | 3.160 | -57 | -1,77% | 1.399 | 2,26 |
| 2017 | 31 dicembre | 3.139 | -21 | -0,66% | 1.405 | 2,23 |
| 2018* | 31 dicembre | 3.121 | -18 | -0,57% | 1.415,02 | 2,21 |
| 2019* | 31 dicembre | 3.103 | -18 | -0,58% | 1.403,31 | 2,21 |
| 2020* | 31 dicembre | 3.030 | -73 | -2,35% | 1.408,00 | 2,15 |
| 2021* | 31 dicembre | 3.029 | -1 | -0,03% | 1.428,00 | 2,12 |
| 2022* | 31 dicembre | 3.028 | -1 | -0,03% | 1.449,00 | 2,09 |

(1) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.
(2) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.
(3) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.
(*) popolazione post-censimento

Dal **2018** i dati tengono conto dei risultati del **censimento permanente della popolazione**, rilevati con cadenza annuale e non più decennale. A differenza del censimento tradizionale, che effettuava una rilevazione di tutti gli individui e tutte le famiglie ad una data stabilita, il nuovo metodo censuario si basa sulla combinazione di rilevazioni campionarie e dati provenienti da fonte amministrativa.

La popolazione residente a **Bagnoli Irpino** al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da *3.274* individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati *3.288*. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra *popolazione censita* e *popolazione anagrafica* pari a *14* unità (-0,43%). Il confronto dei dati della popolazione residente dal 2018 con le serie storiche precedenti (2001-2011 e 2011-2017) è possibile soltanto con operazioni di **ricostruzione intercensuaria** della popolazione residente.

*Grafici e statistiche (dati ISTAT) al 31 dicembre di ogni anno.*




**Figura 10. Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Bagnoli Irpino dal 2001 al 2022.**

Il grafico che segue riporta le variazioni annuali della popolazione di Bagnoli Irpino espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Avellino e della regione Campania.

**Figura 11. Grafico variazione percentuale popolazione**

*Flusso migratorio della popolazione*

Il grafico seguente visualizza il numero dei **trasferimenti di residenza** (flusso migratorio) da e verso il comune di Bagnoli Irpino negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe del comune. Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).




**Figura 12. Grafico flusso migratorio della popolazione**

La tabella seguente riporta il dettaglio del **comportamento migratorio dal 2002 al 2022**. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

**Tabella 6. Comportamento migratorio dal 2002 al 2022**

| Anno 1 gen-31 dic | Iscritti | | | Cancellati | | | Saldo Migratorio con l'estero | Saldo Migratorio totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DA altri comuni | DA estero | altri iscritti (a) | PER altri comuni | PER estero | altri cancell. (a) | | |
| 2002 | 50 | 8 | 0 | 36 | 3 | 0 | +5 | +19 |
| 2003 | 41 | 16 | 7 | 24 | 11 | 9 | +5 | +20 |
| 2004 | 29 | 9 | 0 | 32 | 2 | 1 | +7 | +3 |
| 2005 | 23 | 6 | 0 | 27 | 2 | 0 | +4 | 0 |
| 2006 | 29 | 8 | 0 | 36 | 5 | 0 | +3 | -4 |
| 2007 | 30 | 15 | 0 | 42 | 3 | 1 | +12 | -1 |
| 2008 | 35 | 17 | 1 | 35 | 3 | 0 | +14 | +15 |
| 2009 | 36 | 6 | 0 | 37 | 2 | 2 | +4 | +1 |
| 2010 | 37 | 11 | 0 | 34 | 2 | 0 | +9 | +12 |
| 2011 (1) | 30 | 7 | 0 | 18 | 1 | 0 | +6 | +18 |
| 2011 (2) | 10 | 5 | 0 | 12 | 0 | 7 | +5 | -4 |
| 2011 (3) | 40 | 12 | 0 | 30 | 1 | 7 | +11 | +14 |
| 2012 | 53 | 11 | 8 | 33 | 2 | 7 | +9 | +30 |
| 2013 | 35 | 9 | 11 | 37 | 4 | 0 | +5 | +14 |
| 2014 | 38 | 7 | 2 | 51 | 8 | 2 | -1 | -14 |
| 2015 | 32 | 3 | 3 | 33 | 4 | 1 | -1 | 0 |
| 2016 | 36 | 4 | 2 | 53 | 4 | 11 | 0 | -26 |
| 2017 | 26 | 13 | 1 | 30 | 9 | 0 | +4 | +1 |
| 2018* | 34 | 19 | 1 | 37 | 2 | 0 | +17 | +15 |
| 2019* | 28 | 2 | 0 | 32 | 3 | 0 | -1 | -5 |
| 2020* | 44 | 5 | 0 | 57 | 7 | 12 | -2 | -27 |
| 2021* | 37 | 5 | 0 | 37 | 4 | 0 | +1 | +1 |
| 2022* | 40 | 11 | - | 40 | 2 | - | +9 | +9 |

(a) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.
(1) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)
(2) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)
(3) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.
(*) popolazione post-censimento

*Movimento naturale della popolazione*

**Il movimento naturale di una popolazione** in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.




**Figura 13. Grafico movimento naturale della popolazione**

La Tabella 7 riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2022. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

**Tabella 7. Dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2022**

| Anno | Bilancio demografico | Nascite | Variaz. | Decessi | Variaz. | Saldo Naturale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 gennaio-31 dicembre | 35 | - | 29 | - | +6 |
| 2003 | 1 gennaio-31 dicembre | 28 | -7 | 36 | +7 | -8 |
| 2004 | 1 gennaio-31 dicembre | 25 | -3 | 26 | -10 | -1 |
| 2005 | 1 gennaio-31 dicembre | 17 | -8 | 46 | +20 | -29 |
| 2006 | 1 gennaio-31 dicembre | 19 | +2 | 29 | -17 | -10 |
| 2007 | 1 gennaio-31 dicembre | 24 | +5 | 36 | +7 | -12 |
| 2008 | 1 gennaio-31 dicembre | 26 | +2 | 40 | +4 | -14 |
| 2009 | 1 gennaio-31 dicembre | 20 | -6 | 37 | -3 | -17 |
| 2010 | 1 gennaio-31 dicembre | 14 | -6 | 39 | +2 | -25 |
| 2011 (1) | 1 gennaio-8 ottobre | 11 | -3 | 27 | -12 | -16 |
| 2011 (2) | 9 ottobre-31 dicembre | 2 | -9 | 7 | -20 | -5 |
| 2011 (3) | 1 gennaio-31 dicembre | 13 | -1 | 34 | -5 | -21 |
| 2012 | 1 gennaio-31 dicembre | 22 | +9 | 47 | +13 | -25 |
| 2013 | 1 gennaio-31 dicembre | 9 | -13 | 32 | -15 | -23 |
| 2014 | 1 gennaio-31 dicembre | 23 | +14 | 27 | -5 | -4 |
| 2015 | 1 gennaio-31 dicembre | 17 | -6 | 43 | +16 | -26 |
| 2016 | 1 gennaio-31 dicembre | 19 | +2 | 50 | +7 | -31 |
| 2017 | 1 gennaio-31 dicembre | 12 | -7 | 34 | -16 | -22 |
| 2018* | 1 gennaio-31 dicembre | 22 | +10 | 40 | +6 | -18 |
| 2019* | 1 gennaio-31 dicembre | 27 | +5 | 39 | -1 | -12 |
| 2020* | 1 gennaio-31 dicembre | 23 | -4 | 31 | -8 | -8 |
| 2021* | 1 gennaio-31 dicembre | 21 | -2 | 48 | +17 | -27 |
| 2022* | 1 gennaio-31 dicembre | 29 | +8 | 38 | -10 | -9 |

(1) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)
(2) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)
(3) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.
(*) popolazione post-censimento

*Struttura della popolazione dal 2002 al 2023*

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.




**Figura 14. Struttura per età della popolazione**

**Tabella 8. Struttura per età della popolazione**

| *Anno 1° gennaio* | *0-14 anni* | *15-64 anni* | *65+ anni* | *Totale residenti* | *Età media* |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 544 | 2.158 | 629 | 3.331 | **40,5** |
| 2003 | 537 | 2.170 | 649 | 3.356 | **40,9** |
| 2004 | 533 | 2.182 | 653 | 3.368 | **41,1** |
| 2005 | 529 | 2.162 | 679 | 3.370 | **41,6** |
| 2006 | 493 | 2.176 | 672 | 3.341 | **41,9** |
| 2007 | 460 | 2.195 | 672 | 3.327 | **42,5** |
| 2008 | 435 | 2.209 | 670 | 3.314 | **42,9** |
| 2009 | 431 | 2.220 | 664 | 3.315 | **43,1** |
| 2010 | 420 | 2.230 | 649 | 3.299 | **43,3** |
| 2011 | 396 | 2.235 | 655 | 3.286 | **43,8** |
| 2012 | 373 | 2.217 | 675 | 3.265 | **44,3** |
| 2013 | 362 | 2.237 | 671 | 3.270 | **44,4** |
| 2014 | 345 | 2.241 | 675 | 3.261 | **44,9** |
| 2015 | 339 | 2.211 | 693 | 3.243 | **45,4** |
| 2016 | 317 | 2.211 | 689 | 3.217 | **45,8** |
| 2017 | 299 | 2.165 | 696 | 3.160 | **46,3** |
| 2018 | 281 | 2.152 | 706 | 3.139 | **46,7** |
| 2019* | 278 | 2.133 | 710 | 3.121 | **46,9** |
| 2020* | 283 | 2.096 | 724 | 3.103 | **47,1** |
| 2021* | 283 | 2.017 | 730 | 3.030 | **47,6** |
| 2022* | 285 | 2.005 | 739 | 3.029 | **47,8** |
| 2023* | 287 | 1.975 | 766 | 3.028 | **48,1** |

(*) popolazione post-censimento

### *Indicatori demografici*

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Bagnoli Irpino.

**Tabella 9. Indici demografici**

| Anno | Indice di vecchiaia | Indice di dipendenza strutturale | Indice di ricambio della popolazione attiva | Indice di struttura della popolazione attiva | Indice di carico di figli per donna feconda | Indice di natalità (x 1.000 ab.) | Indice di mortalità (x 1.000 ab.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1 gen-31 dic | 1 gen-31 dic |
| 2002 | 115,6 | 54,4 | 80,6 | 86,4 | 0,0 | 10,5 | 8,7 |
| 2003 | 120,9 | 54,7 | 75,9 | 88,5 | 0,0 | 8,3 | 10,7 |
| 2004 | 122,5 | 54,4 | 69,7 | 90,9 | 0,0 | 7,4 | 7,7 |
| 2005 | 128,4 | 55,9 | 70,9 | 94,4 | 0,0 | 5,1 | 13,7 |
| 2006 | 136,3 | 53,5 | 70,7 | 99,3 | 0,0 | 5,7 | 8,7 |
| 2007 | 146,1 | 51,6 | 80,5 | 103,8 | 0,0 | 7,2 | 10,8 |
| 2008 | 154,0 | 50,0 | 83,7 | 107,0 | 0,0 | 7,8 | 12,1 |
| 2009 | 154,1 | 49,3 | 85,0 | 110,4 | 0,0 | 6,0 | 11,2 |
| 2010 | 154,5 | 47,9 | 92,0 | 115,9 | 0,0 | 4,3 | 11,8 |
| 2011 | 165,4 | 47,0 | 95,5 | 117,4 | 0,0 | 4,0 | 10,4 |
| 2012 | 181,0 | 47,3 | 97,4 | 115,2 | 0,0 | 6,7 | 14,4 |
| 2013 | 185,4 | 46,2 | 104,4 | 117,6 | 0,0 | 2,8 | 9,8 |
| 2014 | 195,7 | 45,5 | 113,1 | 122,5 | 0,0 | 7,1 | 8,3 |
| 2015 | 204,4 | 46,7 | 116,9 | 125,4 | 0,0 | 5,3 | 13,3 |
| 2016 | 217,4 | 45,5 | 128,2 | 127,9 | 0,0 | 6,0 | 15,7 |
| 2017 | 232,8 | 46,0 | 130,8 | 129,8 | 0,0 | 3,8 | 10,8 |
| 2018 | 251,2 | 45,9 | 144,5 | 132,4 | 0,0 | 7,0 | 12,8 |
| 2019 | 255,4 | 46,3 | 156,4 | 130,6 | 0,0 | 8,7 | 12,5 |
| 2020 | 255,8 | 48,0 | 165,3 | 128,3 | 0,0 | 7,5 | 10,1 |
| 2021 | 258,0 | 50,2 | 200,0 | 134,0 | 0,0 | 6,9 | 15,8 |
| 2022 | 259,3 | 51,1 | 225,4 | 139,0 | 0,0 | 9,6 | 12,5 |
| 2023 | 266,9 | 53,3 | 237,1 | 142,6 | 0,0 | - | - |

- **Indice di vecchiaia:** Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. *Ad esempio, nel 2023 l'indice di vecchiaia per il comune di Bagnoli Irpino dice che ci sono 266,9 anziani ogni 100 giovani.*
- **Indice di dipendenza strutturale:** Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). *Ad esempio, teoricamente, a Bagnoli Irpino nel 2023 ci sono 53,3 individui a carico, ogni 100 che lavorano.*
- **Indice di ricambio della popolazione attiva:** Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. *Ad esempio, a Bagnoli Irpino nel 2023 l'indice di ricambio è 237,1 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.*
- **Indice di struttura della popolazione attiva:** Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). *Ad esempio, nel 2023 per il comune di Bagnoli Irpino la popolazione in età lavorativa più anziana è una volta e mezza rispetto alla popolazione di età lavorativa più giovane.*

- **Carico di figli per donna feconda:** È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.
- **Indice di natalità:** Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. *Per il 2023 per Bagnoli Irpino non è riportato; per il 2022, era di 9,6 nascite per mille abitanti.*
- **Indice di mortalità:** Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. *Per il 2023 per Bagnoli Irpino non è riportato; per il 2022, era di 12,5 morti per mille abitanti.*

## Aspetti economici

Nonostante la diminuzione registrata negli ultimi decenni, le tradizionali attività rurali, favorite dalla natura del territorio comunale, rappresentano ancora significative fonti di reddito: la silvicoltura fornisce, oltre a grandi quantità di legname, prodotti pregiati come il tartufo nero, le fragole e il fungo porcino mentre l'agricoltura è specializzata nella produzione di castagne, nocciole, frutta, olive, cereali e ortaggi. L'allevamento del bestiame consente un'ottima produzione artigianale di latticini e formaggi freschi e stagionati, nonché di insaccati.

L'industria si compone di alcune piccole imprese, rivolte principalmente alla lavorazione dei prodotti agricoli, del legno e dei metalli. Il terziario, stimolato dalla buona affluenza turistica, annovera servizi privati qualificati (agenzie assicurative e immobiliari) e una rete commerciale piuttosto articolata.

L'Altopiano Laceno è divenuto una meta turistica durante tutto l'anno, anche nella stagione invernale, data la presenza di impianti di risalita e campi da sci, oltre che, ovviamente, strutture ricettive ed un villaggio residenziale.

Altra attrazione turistica sono alcune grotte naturali, assai interessanti dal punto di vista naturalistico. Si tratta, innanzitutto, delle Grotte di Caliendo, un corridoio lungo circa 3 chilometri, allo sbocco del piccolo emissario sotterraneo del Lago Laceno. Esse presentano delle tipiche stalattiti, stalagmiti e delle cascatine, a cui si può accedere soltanto tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno. Inoltre, si ricorda la Grotta Santa Nesta, in cui San Guglielmo fu eremita a lungo.

Si riportano di seguito alcuni indicatori economici relativi all'occupazione, alle attività presenti e al reddito.

**Tabella 10. Mercato del lavoro | Occupazione - Indicatori ai confini del 2011 (dati ISTAT)**

| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di occupazione maschile | 2002 | 115,6 | 54,4 |
| Tasso di occupazione femminile | 2003 | 120,9 | 54,7 |
| Tasso di occupazione | 2004 | 122,5 | 54,4 |
| Indice di ricambio occupazionale | 2005 | 128,4 | 55,9 |
| Tasso di occupazione 15-29 anni | 2006 | 136,3 | 53,5 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 2007 | 146,1 | 51,6 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 2008 | 154,0 | 50,0 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extra commercio | 2009 | 154,1 | 49,3 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 2010 | 154,5 | 47,9 |
| Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 2011 | 165,4 | 47,0 |
| Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 2012 | 181,0 | 47,3 |
| Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 2013 | 185,4 | 46,2 |
| Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 2014 | 195,7 | 45,5 |

**Tabella 11. Mercato del lavoro | CONFRONTI TERRITORIALI AL 2011 (dati ISTAT)**

| Indicatore | Bagnoli Irpino | Campania | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di occupazione maschile | 49.3 | 46.4 | 54.8 |
| Tasso di occupazione femminile | 23.6 | 23.8 | 36.1 |
| Tasso di occupazione | 36.4 | 34.6 | 45 |
| Indice di ricambio occupazionale | 293.5 | 290.4 | 298.1 |
| Tasso di occupazione 15-29 anni | 26.4 | 23 | 36.3 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 14 | 7.3 | 5.5 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 25.9 | 21.5 | 27.1 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extra commercio | 39.7 | 52.5 | 48.6 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 20.4 | 18.7 | 18.8 |
| Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 22.2 | 31.5 | 31.7 |
| Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 26.4 | 17.8 | 21.1 |
| Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 21.6 | 19.9 | 16.2 |

**Tabella 12. Numero di imprese/aziende per settore e variazioni intercensuali (dati ISTAT)**

| | 1991 | 2001 | Variazione '91/'01 |
|---|---|---|---|
| Industria | 44 | 45 | 2,27 % |
| Commercio | 91 | 69 | -24,18 % |
| Servizi | 77 | 102 | 32,47 % |
| Artigianato | 56 | 52 | -7,14 % |
| Istituzionali | 8 | 18 | 125,00 % |
| | 1990 | 2000 | Variazione '90/'00 |
| Agricoltura | 342 | 305 | -10,82 % |

**Tabella 13. Mercato del lavoro | Attività della popolazione - Indicatori ai confini del 2011 (dati ISTAT)**

| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 62.4 | 57.4 | 56.2 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 27.6 | 26.5 | 29.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 44.3 | 41.4 | 42.9 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 30.9 | 38.2 | 29.4 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 108.7 | 39.3 | 34 |

**Tabella 14. Mercato del lavoro | Attività della popolazione - Confronti Territoriali al 2011 (dati ISTAT)**

| Indicatore | Bagnoli Irpino | Campania | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 56.2 | 57.4 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 29.7 | 33.2 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 42.9 | 44.8 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 29.4 | 35.3 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 34 | 42.4 | 50.8 |

**Tabella 15. Mercato del lavoro | DISOCCUPAZIONE - Indicatori ai confini del 2011 (dati ISTAT)**

| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 21.3 | 14.8 | 12.3 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 48.8 | 34.1 | 20.6 |
| Tasso di disoccupazione | 30.3 | 21.2 | 15.2 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 72.7 | 55.3 | 44.1 |

**Tabella 16. Mercato del lavoro | DISOCCUPAZIONE - Confronti Territoriali al 2011 (dati ISTAT)**

| Indicatore | Bagnoli Irpino | Campania | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 12.3 | 19.1 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 20.6 | 28.4 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 15.2 | 22.7 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 44.1 | 55.4 | 34.7 |

**Tabella 17. Reddito Medio 2001-2016 - persone fisiche residenti a Bagnoli Irpino**

| Anno | Dichiaranti | Popolazione | %pop | Importo | Media/Dich. | Media/Pop. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1.912 | 3.331 | 57,4% | 18.610.641 | 9.734 | 5.587 |
| 2002 | 2.012 | 3.356 | 60,0% | 19.581.017 | 9.732 | 5.835 |
| 2003 | 2.094 | 3.368 | 62,2% | 21.154.766 | 10.103 | 6.281 |
| 2004 | 1.980 | 3.370 | 58,8% | 21.931.919 | 11.077 | 6.508 |
| 2005 | 2.086 | 3.341 | 62,4% | 23.247.648 | 11.145 | 6.958 |
| 2006 | 2.023 | 3.327 | 60,8% | 24.031.160 | 11.879 | 7.223 |
| 2007 | 2.116 | 3.314 | 63,9% | 25.413.290 | 12.010 | 7.668 |
| 2008 | 2.093 | 3.315 | 63,1% | 25.463.261 | 12.166 | 7.681 |
| 2009 | 2.034 | 3.299 | 61,7% | 25.494.049 | 12.534 | 7.728 |
| 2010 | 2.033 | 3.286 | 61,9% | 25.233.800 | 12.412 | 7.679 |
| 2011 | 2.009 | 3.265 | 61,5% | 25.300.136 | 12.593 | 7.749 |
| 2012 | 2.063 | 3.270 | 63,1% | 25.862.506 | 12.536 | 7.909 |
| 2013 | 2.024 | 3.261 | 62,1% | 26.569.950 | 13.127 | 8.148 |
| 2014 | 1.990 | 3.243 | 61,4% | 26.508.404 | 13.321 | 8.174 |
| 2015 | 1.960 | 3.217 | 60,9% | 26.797.780 | 13.672 | 8.330 |
| 2016 | 1.974 | 3.160 | 62,5% | 26.752.777 | 13.553 | 8.466 |

Elaborazione su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Importi in euro, dati rapportati alla popolazione Istat al 31 dicembre




**Figura 15. Grafico Reddito Medio 2001-2016 - persone fisiche residenti a Bagnoli Irpino**

## Cap. 4 - Origine della proprietà dei beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione e cenni storici sulla sua evoluzione

Si riporta quanto contenuto nel Piano di Assestamento precedente al paragrafo "*Notizie storiche sul trattamento selvicolturale delle faggete*" come riferimento storico ai boschi di Bagnoli Irpino.

> *"…Si è ritenuto, in questo paragrafo, utile riportare il percorso storico seguito dalle faggete di Bagnoli Irpino per una maggiore comprensione dello stato di fatto. Notizie storiche certe sulle modalità dei trattamenti selvicolturali eseguiti si hanno dal 1834 in poi. Queste informazioni sono dovute alle ricerche concluse dal Di Tella nel 1902 e sintetizzate nella sua Relazione sulle condizioni fisico-economiche del bosco comunale demaniale LACENO di Bagnoli Irpino e proposte sulla sua utilizzazione razionale.*

Questo è un documento, pubblicato per la prima volta all'interno della relazione del piano 1984-1993, elaborato, per conto del dipartimento di Avellino, dall'Autore, allora Sottoispettore forestale del Distretto di S. Angelo dei Lombardi.

Si è ritenuto opportuno stralciare e riportare integralmente, anche in questa sede, dal capitolo IV dedicato alla Storia del bosco il paragrafo intitolato "Tagli eseguiti-trattamenti".

> Tagli eseguiti-trattamenti
>
> *Prima del 1834 non risulta che nel bosco comunale di Bagnoli venissero fatti tagli regolari. Si fu in detto anno che il Consiglio Comunale di Bagnoli (allora decurianato) deliberava di sottoporre il suo bosco ad una rotazione di tagli. Il Consiglio forestale della cessata Amministrazione napoletana in seduta del 20 maggio 1835, ritenendo il bosco di Bagnoli dell'estensione di moggia 6265 pari ad ettari 1448,40 deliberò che si dividesse in 120 sezioni, ciascuna di moggia antiche 35/2 – pari ad ettari 12,07, da tagliarsi una all'anno, rasente terra secondo legge, con lasciarsi gli alberi di dote del numero di 15 a moggia (58 per ettaro) non di una sola specie, ma miste per trarre profitto da ogni specie di legno. Ad esempio, la difesa, parte essenziale di ogni taglio regolare sarà questa pubblicata nelle dovute regole (Come testualmente decideva il Consiglio Forestale).*
>
> *Nel maggio 1836 il misuratore giurato forestale iniziava la divisione del bosco in sezioni dalla contrada Valle Piana, la più prossima al paese, delimitandone 10 a ciascuna della predetta estensione di moggia 35/2.*
>
> *Nel 1838 il Guardia Generale del Circondario silvano martellava le prime due sezioni già distaccate. Però nessun taglio venne eseguito in quelle sezioni fino al 1847, nel quale anno il Decuriato si faceva a chiedere il taglio simultaneo di 10 sezioni e tale taglio in seguito a parere del Guardia Generale espresso con verbale di verifica del 25 giugno 1847, veniva accordato dal Consiglio forestale, solo però per quattro sezioni simultaneamente, non più alla contrada "Valle Piana", bensì alla contrada "Vallebona" verso i confini con la provincia di Salerno. Nel 1851 difatti si procedeva dal misuratore forestale e dal Guardia Generale al distacco, martellata e stima di dette 4 sezioni dell'estensione complessiva di 142 tomola locali (ettari 48,23), ciascuna di tomoli 35/2 (ettari 12,97) conformemente a quanto era stato prescritto dal Consiglio forestale nel 1834. Soltanto però nel 1859 venne iniziato il taglio di quelle 4 sezioni ultimato nel 1864, e da quell' anno i successivi tagli si eseguirono come è riassunto nel seguente prospetto (tav. V-1). Come rilevasi dal prospetto che precede vennero dunque tagliate sinora 74 sezioni dell'estensione complessiva di ha 1090, 2478, più di 2/5 dell'intero bosco.*

*Il metodo seguito nel taglio di tutte quelle sezioni è stato quello che venne prescritto da Consiglio forestale nel 1834 e poscia dalle prescrizioni forestali di massima della vigente legge e cioè il taglio a raso con riserva di 60 piante per ettaro.*

*A prescindere dalla considerazione preliminare che questo metodo si presenti a priori inadatto al buon governo delle fustaie di faggio, come suggeriscono i migliori selvicoltori, nel caso speciale del bosco di Bagnoli il modo come venne applicato questo sistema di tagli fu talmente irregolare che se ne scorgono ora le conseguenze nella stentata, lenta ed irregolare riproduzione ottenuta in quelle sezioni dove la riproduzione non è mancata addirittura, come per le superiori di Vallebona e Valledacera e per quelle di Raia della Scannella.*

*Come si è detto agli articoli riguardanti il terreno e il clima, il suolo è generalmente poco profondo specie sulle pendici, il clima è rigido ed i venti vi dominano sensibilmente e furiosamente".*

## Passate pianificazioni forestali

Come emerge dal capitolo precedente, in ossequio alle norme stabilite dal Consiglio Forestale nel 1834, ribadite successivamente dalle prescrizioni forestali di massima vigenti per legge in quell'epoca, il primo trattamento di queste fustaie di faggio è stato quello del taglio raso con riserve di circa 60 piante per ettaro.

Questo metodo applicato, per altro, in modo quanto mai irregolare, si dimostrò inadatto e dannoso al buon governo delle fustaie di faggio per tre ordini di considerazioni, come scrive nella ricordata relazione il Di Tella.

In primo luogo, perché le riserve, portate improvvisamente dallo stato foltissimo a quello di perfetto isolamento, venivano, senza preparazione a trovarsi esposte agli impeti dei venti e delle meteore. Ben poche quindi, specie sui crinali, resistevano e rimanevano in piedi e queste poche intristite, danneggiate, battute dai venti perdevano in gran parte la loro vigorìa e di rado potevano rispondere all'ufficio di dare semi abbondanti e fecondi. In secondo luogo, perché il suolo delle particelle venendosi a trovare, dopo il taglio, esposto alla luce ed al sole ben presto si induriva e inerbiva per cui, ancorché subito dopo l'utilizzazione avvenisse un'abbondante fruttificazione, il seme non trovava le condizioni necessarie al suo sviluppo e la riproduzione delle tagliate non poteva essere che assai scarsa e stentata. In terzo luogo, infine, per il pascolo che non veniva nei primi anni vietato e quindi le difese non venivano rispettate in modo energico e rigoroso.

Per ovviare alle dannose conseguenze sopra ricordate, il Di Tella prescrisse, nella citata relazione, l'adozione del trattamento tagli successivi, come quello più adatto alla fustaia di faggio.

L'intensità dei tagli intercalari, sempre secondo il Di Tella, doveva essere tale da portare i singoli boschi dallo stato di densità foltissimo in cui si trovavano il rapporto distanziale venne invero accertato uguale a quello normale, corrispondente ad un rapporto distanziale uguale a 16, e ciò per conseguire un triplice fine:

1) migliorare le condizioni di vegetazione del bosco e quindi l'incremento e la produzione;
2) utilizzare tutto il legname riconosciuto esuberante per la normale dotazione del bosco e ricavarne una certa massa, senza toccare la provvigione;
3) preparare gradatamente il bosco all'applicazione dei tagli successivi, traendone con l'osservazione degli effetti di questi diradamenti, qualche utile ammaestramento pratico.

In ottemperanza, quindi, alle norme dettate dal Di Tella, fu possibile introdurre nelle faggete di Bagnoli, a partire dal 1902, il trattamento dei tagli successivi uniformi che, sebbene non sia stato sempre praticato con sani criteri di razionalità e prudenza, pure ha contribuito ad avviare la foresta verso quelle forme di normalità produttiva quale è raro riscontrare in altre faggete del Meridione.

Come riportato in premessa Il Comune di Bagnoli Irpino è munito di Piano di Assestamento Forestale sin dal 1959, che per il decennio 1959/1968 venne redatto dal Prof. Generoso Patrone. Successivamente il Piano venne rielaborato per il decennio 1984/1993 dai dottori R. Bertani, L. Morgante e A. Oradini. L'ultima versione, per il decennio 2006/2015 è stata quella redatta dalla Comunità Montana Terminio Cervialto che affidò l'incarico di revisione ai propri dipendenti Dott. Nicola Perillo, Dott. Gerardo Bruno e Dott. Michele Marino.

## Passate utilizzazioni boschive

Nella tabella che segue sono riportate le utilizzazioni forestali relative al decennio di validità dell'ultimo Piano, in base alle notizie reperite presso gli Uffici comunali.

**Tabella 18. Utilizzazioni forestali relative al decennio di validità dell'ultimo Piano**

| Anno di taglio | Part.lla Forest. | Località | Assortimento e quantitativo da prelevare da progetto | | Collaudo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 240 | Impiccato | toppi da sega (mc) | 641,54 | NO |
| | | | tronchetti (mc) | 538,07 | |
| | | | legna da ardere (q.li) | 889,87 | |
| 2016 | 198 | Cervarolo di Sazzano | toppi da sega (mc) | 1.136,50 | SI |
| | | | tronchetti (mc) | 437,12 | |
| | | | legna da ardere (q.li) | 1.573,61 | |
| 2016 | 151 | Cervarolo di Sazzano | tondame da sega (mc) | 811,36 | SI |
| | | | tronchetti (mc) | 249,65 | |
| | | | legna da ardere (q.li) | 1.685,13 | |
| 2016 | 288A | Colle del Leone | tondame (mc) | 1.321,37 | SI |
| | | | tronchetti (mc) | 394,44 | |
| | | | legna da ardere (q.li) | 2.307,44 | |
| 2016 | 285 | Conca di Marco | tondame da sega (mc) | 1.816,66 | SI |
| | | | tronchetti (mc) | 698,72 | |
| | | | legna da ardere (q.li) | 2.515,38 | |
| | 302 | Coste di Cervialto | tondame da sega (mc) | 1.577,28 | NO Sospesa |
| | | | tronchetti (mc) | 315,46 | |
| | | | legna da ardere (q.li) | 1.892,74 | |
| 2018 | 295B | Felicecchia | tondame da sega (mc) | 74,85 | SI |
| | | | tronchetti (mc) | 21,39 | |
| | | | legna da ardere (q.li) | 96,23 | |
| 2018 | 152 | Cervarolo di Sazzano | tondame da sega (mc) | 239,25 | SI |
| | | | tronchetti (mc) | 344,52 | |
| | | | legna da ardere (q.li) | 2.170,48 | |
| 2018 | 278 | Vallebona | tondame da sega (mc) | 731,48 | SI |
| | | | tronchetti (mc) | 281,34 | |
| | | | legna da ardere (ql) | 1.012,82 | |
| 2018 | 225 | Valle d'Acero | tondame da sega (mc) | 347,47 | In corso di utilizzazione |
| | | | tronchetti (mc) | 406,24 | |
| | | | legna da ardere (mc) | 160,05 | |
| 2019 | 286 | Conca di Marco | legname da opera (mc) | 1.812,39 | SI |
| | | | tronchetti (mc) | 249,05 | |
| | | | legna da ardere (q.li) | 3.387,61 | |
| | | | legna da ardere (q.li) | 461,56 | |
| | | | legna da ardere (mc) | 322,63 | |
| | | | legna da ardere (mc) | 53,67 | |
| 2019 | 282 | Vallone dall'Acero | tronchi + tronchetti (mc) | 2.224,11 | SI |
| | | | legna (mc) | 197,22 | |
| | | | ramaglia (mc) | 71,28 | |
| 2019 | 255/B | Valle d'Acero | tronchi + tronchetti (mc) | 143,71 | SI |
| | | | toppi da sega (mc) | 868,62 | |
| | | | legna (mc) | 115,66 | |
| | | | ramaglia + frascame (mc) | 33,05 | |
| 2020 | 221 | Valle d'Acero | tronchi (mc) | 349,87 | Verbale di riscontro finale, certificato di regolare esecuzione e verbale di sopralluogo finale |
| | | | tronchetti (ql) | 1.429,10 | |
| | | | legna da ardere (ql) | 858,90 | |
| | | | fascine (ql) | 222,40 | |
| 2021 | 294 | Colle del leone | tronchi (mc) | 364,69 | Verbale di sopralluogo finale, verbale di riscontro finale e certificato di regolare esecuzione |
| | | | tronchetti (mc) | 398,75 | |
| | | | legna da ardere (mc) | 232,95 | |
| | | | ramaglia +frascame (mc) | 48,75 | |

| Anno di taglio | Part.lla Forest. | Località | Assortimento e quantitativo da prelevare da progetto | | Collaudo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 272 | Vallebona | tondame da sega (mc) | 1.456,30 | Certificato regolare esecuzione |
| | | | tronchetti (mc) | 324,22 | |
| | | | legna da ardere (mc) | 498,04 | |
| | | | legna da ardere (q.li) | 4.980,41 | |
| 2023 | 251 | Valle d'Acero | tronchi (mc) | 652,57 | In corso di utilizzazione |
| | | | tronchetti (mc) | 340,62 | |
| | | | legna da ardere (mc) | 176,72 | |
| | | | fascine (mc) | 47,38 | |
| 2023 | 134 | Corsa dei Cavalli | tronchi (mc) | 828,59 | ultimato |
| | | | tronchetti (mc) | 209,34 | |
| | | | legna da ardere (mc) | 144,57 | |
| | | | frascame (mc) | 31,38 | |
| 2023 | Taglio straordinario messa in sicurezza Seggiovie | Varie | tondame da sega (mc) | 526,36 | ultimato |
| | | | legna da ardere (mc) | 716,29 | |

## Vincoli gravanti sui beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione

**Vincolo Idrogeologico** (L. 3267/1923);

**PSAI** ex Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele – oggi Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (L. 18 maggio 1989 n. 183 – L. R. n. 8 del 07/02/1994);

**Bellezze naturali** (L. 1497/1939 transitata nel D.lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42), tutta la superficie oggetto di pianificazione ricade nel vincolo di cui all'art. 136 ad eccezione della loc. Piano Laceno con annesse piste da sci (fino a 1400 mt di quota) e il versante nord del monte Raja Magra;

**Parco Regionale** - Parco Regionale dei Monti Picentini e nei siti della Rete Natura 2000:

**Aree Rete Natura 2000 -** ZSC IT8040010 "Monte Cervialto - Montagnone di Nusco" e ZPS IT8040021 "Picentini" (Direttiva habitat 92/43/CEE, D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e D.P.R. 120 del 12 marzo 2003) e ZPS (Direttiva 79/409/CEE Uccelli);

**Legge quadro in materia di incendi boschivi** (L. 21 novembre 2000, n. 353);

Dal catasto incendi del comune risultano gli eventi, sviluppatisi nella proprietà comunale, riportati nella tabella che segue.

**Tabella 20. Aree percorse dal fuoco di proprietà Comunale oggetto di pianificazione**

| ANNO | Foglio catastale | Particella catastale | Superficie percorsa dal fuoco - Ha |
|---|---|---|---|
| 2009 | 25 | 12 | 61,29 |
| 2009 | 18 | 11 | 0,98 |
| 2009 | 23 | 29 | 36,03 |
| 2009 | 23 | 33 | 0,53 |
| 2009 | 26 | 1 | 58,30 |
| 2009 | 28 | 4 | 1,38 |
| 2011 | 25 | 13 | 0,98 |
| 2011 | 7 | 22 | 9,21 |
| 2011 | 7 | 32 | 0,03 |
| 2012 | 23 | 33 | 1,73 |
| 2015 | 13 | 16 | 10,91 |

| ANNO | Foglio catastale | Particella catastale | Superficie percorsa dal fuoco - Ha |
|---|---|---|---|
| 2015 | 13 | 33 | 0,17 |
| 2015 | 13 | 34 | 0,53 |
| 2015 | 13 | 43 | 0,08 |
| 2017 | 3 | 40 | 0,09 |
| 2017 | 13 | 15 | 1,40 |
| 2017 | 13 | 16 | 5,63 |
| 2017 | 13 | 22 | 3,46 |
| 2017 | 13 | 1 | 1,55 |
| 2018 | 1 | 192 | 0,07 |
| 2023 | 12 | 1 | 2,43 |
| 2024 | 11 | 29 | 3,50 |

**Usi civici** (L. 1766/1927 – L. R. 11/1981). Per i dettagli sugli Usi Civici vedasi il capitolo 5.

**Per i dettagli si fa riferimento alla cartografia tematica allegata al Piano.**

# Cap. 5 – La statistica dei beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione

## Riferimenti catastali della proprietà

L'elenco delle particelle catastali della proprietà da assestare è riportato analiticamente nella tabella che segue; dalla proprietà oggetto di pianificazione, in fase di ricognizione sul campo e con l'ausilio delle ortofoto e dalle immagini satellitari, sono state escluse come previsto dal Regolamento Regionale, le aree destinate ad altri usi, diversi da quelli silvo-pastorali (impianti, aree coltivate ad uso agricolo, infrastrutture, etc.).

La superficie catastale lorda, rilevata dai dati catastali (Tabella 19) risulta di **Ha 5.301,486**. Da detta superficie, come innanzi evidenziato, **sono state escluse tutte le aree non destinate a scopi silvo-pastorali** per cui la superficie complessiva, oggetto di pianificazione è di **Ha 5.035,91 tenendo conto che una parte di detta differenza è imputabile anche al disallineamento fra le mappe catastali ed il calcolo delle aree eseguito con il sistema GIS.**

La discrepanza tra le superfici di particelle o aree territoriali calcolate mediante sistemi GIS (Geographic Information System) e quelle riportate nei documenti catastali è una condizione ampiamente diffusa e tecnicamente giustificabile. Tale divergenza non è sintomo di errore, ma è il risultato di differenze strutturali e concettuali tra due modalità di rappresentazione e misurazione del territorio, ciascuna con finalità, precisione e inquadramento normativo propri.

È quindi del tutto normale che il confronto tra superfici GIS e superfici catastali conduca a risultati differenti. Le superfici calcolate con strumenti GIS, quando basate su dati topografici moderni e georeferenziati, offrono una precisione geometrica superiore rispetto a quelle derivate dal catasto, la cui funzione primaria non è mai stata quella di restituire una misura geometrica esatta. La consapevolezza di queste differenze è fondamentale per un uso corretto e consapevole delle diverse fonti territoriali nei contesti tecnici, pianificatori e gestionali.

## Superfici interessate

**Tabella 21. Elenco particelle catastali del Comune di Bagnoli Irpino oggetto di Pianificazione**

| COMUNE | FG | PART | SUPERFICIE BOSCATA (HA) | SUPERFICIE PASCOLO (HA) | ALTRA SUPERFICIE (HA) | SUPERFICIE CATASTALE (HA) | USI CIVICI (HA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnoli Irpino | 2 | 62 | 0,6868 | 0 | 0 | 0,6868 | 0,6868 |
| Bagnoli Irpino | 2 | 63 | 2,6319 | 0 | 0 | 2,6319 | 2,6319 |
| Bagnoli Irpino | 3 | 40 | 3,6899 | 0 | 0 | 3,6899 | 3,6899 |
| Bagnoli Irpino | 3 | 41 | 1,2740 | 0 | 0 | 1,2740 | 1,2740 |
| Bagnoli Irpino | 3 | 57 | 2,0954 | 0 | 0 | 2,0954 | 2,0954 |
| Bagnoli Irpino | 3 | 58 | 3,6887 | 0 | 0 | 3,6887 | 3,6887 |
| Bagnoli Irpino | 3 | 94 | 6,8088 | 0 | 0 | 6,8088 | 6,8088 |
| Bagnoli Irpino | 3 | 156 | 1,1105 | 0 | 0 | 1,1105 | no |
| Bagnoli Irpino | 6 | 48 | 2,6476 | 0 | 0 | 2,6476 | 2,6476 |
| Bagnoli Irpino | 7 | 21 | 0,2572 | 0 | 0 | 0,2572 | no |
| Bagnoli Irpino | 7 | 22 | 126,5072 | 0 | 38,58 | 165,0872 | 165,0872 |
| Bagnoli Irpino | 7 | 23 | 7,4723 | 0 | 0 | 7,4723 | 7,4723 |
| Bagnoli Irpino | 7 | 24 | 0,3747 | 0 | 0 | 0,3747 | 0,3747 |
| Bagnoli Irpino | 7 | 25 | 0,0263 | 0 | 0 | 0,0263 | 0,0263 |
| Bagnoli Irpino | 7 | 26 | 0,3381 | 0 | 0 | 0,3381 | 0,3381 |
| Bagnoli Irpino | 7 | 27 | 0,4008 | 0 | 0 | 0,4008 | 0,4008 |
| Bagnoli Irpino | 7 | 28 | 0,1847 | 0 | 0 | 0,1847 | no |
| Bagnoli Irpino | 7 | 29 | 0,6026 | 0 | 0 | 0,6026 | no |

| COMUNE | FG | PART | SUPERFICIE BOSCATA (HA) | SUPERFICIE PASCOLO (HA) | ALTRA SUPERFICIE (HA) | SUPERFICIE CATASTALE (HA) | USI CIVICI (HA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnoli Irpino | 7 | 30 | 134,8831 | 0 | 3,241 | 138,1241 | 138,1241 |
| Bagnoli Irpino | 7 | 34 | 26,936 | 0 | 0 | 26,9360 | 26,9360 |
| Bagnoli Irpino | 7 | 36 | 5,9569 | 0 | 0 | 5,9569 | 5,9569 |
| Bagnoli Irpino | 7 | 37 | 0,6744 | 0 | 0 | 0,6744 | no |
| Bagnoli Irpino | 7 | 39 | 0,8301 | 0 | 0 | 0,8301 | no |
| Bagnoli Irpino | 7 | 40 | 0,7002 | 0 | 0 | 0,7002 | no |
| Bagnoli Irpino | 7 | 41 | 0,2516 | 0 | 0 | 0,2516 | no |
| Bagnoli Irpino | 7 | 42 | 0,2692 | 0 | 0 | 0,2692 | no |
| Bagnoli Irpino | 7 | 43 | 0 | 0,4103 | 0 | 0,4103 | no |
| Bagnoli Irpino | 7 | 44 | 0,358 | 0 | 0 | 0,358 | no |
| Bagnoli Irpino | 7 | 45 | 0,4948 | 0 | 0 | 0,4948 | 0,4948 |
| Bagnoli Irpino | 7 | 46 | 0,3483 | 0 | 0 | 0,3483 | 0,3483 |
| Bagnoli Irpino | 7 | 47 | 0,4963 | 0 | 0 | 0,4963 | 0,4963 |
| Bagnoli Irpino | 7 | 48 | 0,0939 | 0 | 0 | 0,0939 | no |
| Bagnoli Irpino | 7 | 49 | 0,1556 | 0 | 0 | 0,1556 | no |
| Bagnoli Irpino | 7 | 50 | 0,1939 | 0 | 0 | 0,1939 | no |
| Bagnoli Irpino | 7 | 51 | 0,1697 | 0 | 0 | 0,1697 | no |
| Bagnoli Irpino | 7 | 52 | 0,1116 | 0 | 0 | 0,1116 | no |
| Bagnoli Irpino | 7 | 53 | 0,1677 | 0 | 0 | 0,1677 | no |
| Bagnoli Irpino | 7 | 54 | 0,1663 | 0 | 0 | 0,1663 | no |
| Bagnoli Irpino | 7 | 55 | 0,1317 | 0 | 0 | 0,1317 | no |
| Bagnoli Irpino | 7 | 56 | 0,2271 | 0 | 0 | 0,2271 | 0,2271 |
| Bagnoli Irpino | 7 | 57 | 1,0725 | 0 | 0 | 1,0725 | no |
| Bagnoli Irpino | 7 | 58 | 0,4408 | 0 | 0 | 0,4408 | no |
| Bagnoli Irpino | 7 | 59 | 0,2268 | 0 | 0 | 0,2268 | no |
| Bagnoli Irpino | 7 | 60 | 0,5565 | 0 | 0 | 0,5565 | no |
| Bagnoli Irpino | 7 | 61 | 0,1894 | 0 | 0 | 0,1894 | no |
| Bagnoli Irpino | 7 | 73 | 0,3775 | 0 | 0 | 0,3775 | 0,3775 |
| Bagnoli Irpino | 10 | 119 | 1,0247 | 0 | 0 | 1,0247 | 1,0247 |
| Bagnoli Irpino | 10 | 126 | 0,4049 | 0 | 0 | 0,4049 | no |
| Bagnoli Irpino | 10 | 127 | 0,8677 | 0 | 0 | 0,8677 | 0,8677 |
| Bagnoli Irpino | 10 | 128 | 0,2548 | 0 | 0 | 0,2548 | no |
| Bagnoli Irpino | 10 | 129 | 0,1405 | 0 | 0 | 0,1405 | no |
| Bagnoli Irpino | 10 | 132 | 0,7623 | 0 | 0 | 0,7623 | 0,7623 |
| Bagnoli Irpino | 10 | 140 | 0,1447 | 0 | 0 | 0,1447 | 0,1447 |
| Bagnoli Irpino | 10 | 144 | 7,2524 | 0 | 0 | 7,2524 | 7,2524 |
| Bagnoli Irpino | 10 | 148 | 2,3546 | 0 | 0 | 2,3546 | 2,3546 |
| Bagnoli Irpino | 10 | 156 | 0,2652 | 0 | 0 | 0,2652 | no |
| Bagnoli Irpino | 10 | 157 | 1,1252 | 0 | 0 | 1,1252 | 1,1252 |
| Bagnoli Irpino | 10 | 163 | 0,7925 | 0 | 0 | 0,7925 | 0,7925 |
| Bagnoli Irpino | 10 | 167 | 1,2055 | 0 | 0 | 1,2055 | 1,2055 |
| Bagnoli Irpino | 10 | 169 | 1,9631 | 0 | 0 | 1,9631 | 1,9631 |
| Bagnoli Irpino | 10 | 170 | 0,0495 | 0 | 0 | 0,0495 | 0,0495 |
| Bagnoli Irpino | 10 | 171 | 0,3442 | 0 | 0 | 0,3442 | 0,3442 |
| Bagnoli Irpino | 10 | 176 | 0,4991 | 0 | 0 | 0,4991 | 0,4991 |
| Bagnoli Irpino | 10 | 183 | 0,0796 | 0 | 0 | 0,0796 | 0,0796 |
| Bagnoli Irpino | 10 | 189 | 3,2276 | 0 | 0 | 3,2276 | 3,2276 |
| Bagnoli Irpino | 11 | 20 | 38,931 | 0 | 0 | 38,9310 | 38,9310 |
| Bagnoli Irpino | 11 | 24 | 0,4257 | 0 | 0 | 0,4257 | 0,4257 |
| Bagnoli Irpino | 11 | 25 | 0,3892 | 0 | 0 | 0,3892 | 0,3892 |
| Bagnoli Irpino | 11 | 26 | 0,0749 | 0 | 0 | 0,0749 | 0,0749 |
| Bagnoli Irpino | 11 | 27 | 0,2762 | 0 | 0 | 0,2762 | 0,2762 |
| Bagnoli Irpino | 11 | 29 | 0 | 53,4538 | 0 | 53,4538 | 53,4249(*) |
| Bagnoli Irpino | 11 | 38 | 0,1234 | 0 | 0 | 0,1234 | no |
| Bagnoli Irpino | 11 | 39 | 0,2646 | 0 | 0 | 0,2646 | no |

| COMUNE | FG | PART | SUPERFICIE BOSCATA (HA) | SUPERFICIE PASCOLO (HA) | ALTRA SUPERFICIE (HA) | SUPERFICIE CATASTALE (HA) | USI CIVICI (HA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnoli Irpino | 11 | 40 | 0,1535 | 0 | 0 | 0,1535 | no |
| Bagnoli Irpino | 11 | 41 | 0,1506 | 0 | 0 | 0,1506 | no |
| Bagnoli Irpino | 11 | 42 | 0,2874 | 0 | 0 | 0,2874 | no |
| Bagnoli Irpino | 11 | 43 | 0,0876 | 0 | 0 | 0,0876 | no |
| Bagnoli Irpino | 11 | 44 | 0,1952 | 0 | 0 | 0,1952 | no |
| Bagnoli Irpino | 11 | 45 | 0,2116 | 0 | 0 | 0,2116 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 1 | 198,1851 | 0 | 93,73 | 291,9151 | 289,7751(*) |
| Bagnoli Irpino | 12 | 2 | 0,7924 | 0 | 0 | 0,7924 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 3 | 0,2022 | 0 | 0 | 0,2022 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 4 | 0,0789 | 0 | 0 | 0,0789 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 5 | 0,4577 | 0 | 0 | 0,4577 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 6 | 0,3299 | 0 | 0 | 0,3299 | 0,3299 |
| Bagnoli Irpino | 12 | 7 | 0,2118 | 0 | 0 | 0,2118 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 8 | 0,1703 | 0 | 0 | 0,1703 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 9 | 0,4048 | 0 | 0 | 0,4048 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 10 | 0,2608 | 0 | 0 | 0,2608 | 0,2608 |
| Bagnoli Irpino | 12 | 11 | 0,1023 | 0 | 0 | 0,1023 | 0,1023 |
| Bagnoli Irpino | 12 | 12 | 7,4074 | 0 | 0 | 7,4074 | 7,4074 |
| Bagnoli Irpino | 12 | 13 | 0,3175 | 0 | 0 | 0,3175 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 14 | 0,4683 | 0 | 0 | 0,4683 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 15 | 0,3702 | 0 | 0 | 0,3702 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 16 | 0,3928 | 0 | 0 | 0,3928 | 0,3928 |
| Bagnoli Irpino | 12 | 17 | 0,2573 | 0 | 0 | 0,2573 | 0,2573 |
| Bagnoli Irpino | 12 | 18 | 0,2609 | 0 | 0 | 0,2609 | 0,2609 |
| Bagnoli Irpino | 12 | 20 | 0,1758 | 0 | 0 | 0,1758 | 0,1758 |
| Bagnoli Irpino | 12 | 21 | 0,2454 | 0 | 0 | 0,2454 | 0,2454 |
| Bagnoli Irpino | 12 | 44 | 0,0863 | 0 | 0 | 0,0863 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 45 | 0,7114 | 0 | 0 | 0,7114 | 0,2403(*) |
| Bagnoli Irpino | 12 | 46 | 0,1564 | 0 | 0 | 0,1564 | 0,1564 |
| Bagnoli Irpino | 12 | 47 | 1,4472 | 0 | 0 | 1,4472 | 1,4472 |
| Bagnoli Irpino | 12 | 48 | 21,3007 | 0 | 0 | 21,3007 | 21,3007 |
| Bagnoli Irpino | 12 | 49 | 0,3078 | 0 | 0 | 0,3078 | 0,3078 |
| Bagnoli Irpino | 12 | 51 | 0,2054 | 0 | 0 | 0,2054 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 52 | 0,2678 | 0 | 0 | 0,2678 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 53 | 0,2228 | 0 | 0 | 0,2228 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 54 | 0,1071 | 0 | 0 | 0,1071 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 55 | 0,2546 | 0 | 0 | 0,2546 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 56 | 0,1532 | 0 | 0 | 0,1532 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 57 | 0,1734 | 0 | 0 | 0,1734 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 58 | 0,144 | 0 | 0 | 0,144 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 59 | 0,609 | 0 | 0 | 0,609 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 60 | 0,3766 | 0 | 0 | 0,3766 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 61 | 0,1078 | 0 | 0 | 0,1078 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 62 | 0,7428 | 0 | 0 | 0,7428 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 63 | 0,1551 | 0 | 0 | 0,1551 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 64 | 0,139 | 0 | 0 | 0,139 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 65 | 0,3201 | 0 | 0 | 0,3201 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 66 | 0,0906 | 0 | 0 | 0,0906 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 67 | 0,1284 | 0 | 0 | 0,1284 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 68 | 0,0954 | 0 | 0 | 0,0954 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 69 | 0,1316 | 0 | 0 | 0,1316 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 70 | 0,0899 | 0 | 0 | 0,0899 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 71 | 0,1617 | 0 | 0 | 0,1617 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 72 | 0,1599 | 0 | 0 | 0,1599 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 73 | 0,2692 | 0 | 0 | 0,2692 | no |

| COMUNE | FG | PART | SUPERFICIE BOSCATA (HA) | SUPERFICIE PASCOLO (HA) | ALTRA SUPERFICIE (HA) | SUPERFICIE CATASTALE (HA) | USI CIVICI (HA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnoli Irpino | 12 | 74 | 0,1052 | 0 | 0 | 0,1052 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 75 | 0,0996 | 0 | 0 | 0,0996 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 76 | 0,1151 | 0 | 0 | 0,1151 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 77 | 0,1381 | 0 | 0 | 0,1381 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 78 | 0,2583 | 0 | 0 | 0,2583 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 79 | 0,1364 | 0 | 0 | 0,1364 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 80 | 0,0943 | 0 | 0 | 0,0943 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 81 | 0,1200 | 0 | 0 | 0,1200 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 82 | 0,2463 | 0 | 0 | 0,2463 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 83 | 0,1054 | 0 | 0 | 0,1054 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 84 | 0,2645 | 0 | 0 | 0,2645 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 85 | 0,2543 | 0 | 0 | 0,2543 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 86 | 0,2396 | 0 | 0 | 0,2396 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 87 | 0,2107 | 0 | 0 | 0,2107 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 88 | 0,6182 | 0 | 0 | 0,6182 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 89 | 0,2199 | 0 | 0 | 0,2199 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 105 | 0,0748 | 0 | 0 | 0,0748 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 106 | 0,2059 | 0 | 0 | 0,2059 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 107 | 0,2645 | 0 | 0 | 0,2645 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 110 | 0,032 | 0 | 0 | 0,032 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 111 | 0,1445 | 0 | 0 | 0,1445 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 112 | 0 | 0,065 | 0 | 0,065 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 113 | 0 | 0,0957 | 0 | 0,0957 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 114 | 0 | 0,0784 | 0 | 0,0784 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 115 | 0 | 0,0958 | 0 | 0,0958 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 116 | 0 | 0,1387 | 0 | 0,1387 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 117 | 0 | 0,2808 | 0 | 0,2808 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 118 | 0 | 0,303 | 0 | 0,303 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 119 | 0,4543 | 0 | 0 | 0,4543 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 120 | 0 | 0,181 | 0 | 0,181 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 121 | 0,2049 | 0 | 0 | 0,2049 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 122 | 0,0668 | 0 | 0 | 0,0668 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 123 | 0 | 0,1758 | 0 | 0,1758 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 124 | 0 | 0,135 | 0 | 0,135 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 125 | 0 | 0,2122 | 0 | 0,2122 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 126 | 0 | 0,0773 | 0 | 0,0773 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 127 | 0 | 0,0636 | 0 | 0,0636 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 128 | 0 | 0,0693 | 0 | 0,0693 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 129 | 0 | 0,076 | 0 | 0,076 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 130 | 0 | 0,1843 | 0 | 0,1843 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 131 | 0 | 0,1979 | 0 | 0,1979 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 132 | 0 | 0,1861 | 0 | 0,1861 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 133 | 0 | 0,1346 | 0 | 0,1346 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 134 | 0 | 0,0417 | 0 | 0,0417 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 135 | 0 | 0,5238 | 0 | 0,5238 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 136 | 0 | 0,3498 | 0 | 0,3498 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 137 | 0 | 0,1716 | 0 | 0,1716 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 143 | 0 | 0,4514 | 0 | 0,4514 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 144 | 0 | 0,0078 | 0 | 0,0078 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 145 | 0 | 0,2298 | 0 | 0,2298 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 146 | 0 | 0,4553 | 0 | 0,4553 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 147 | 0 | 0,237 | 0 | 0,237 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 148 | 0 | 0,1969 | 0 | 0,1969 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 149 | 0,4793 | 0 | 0 | 0,4793 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 153 | 0 | 0,1485 | 0 | 0,1485 | no |

| COMUNE | FG | PART | SUPERFICIE BOSCATA (HA) | SUPERFICIE PASCOLO (HA) | ALTRA SUPERFICIE (HA) | SUPERFICIE CATASTALE (HA) | USI CIVICI (HA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnoli Irpino | 12 | 154 | 0 | 0,1101 | 0 | 0,1101 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 155 | 0 | 0,0507 | 0 | 0,0507 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 156 | 0 | 0,0687 | 0 | 0,0687 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 160 | 0,0445 | 0 | 0 | 0,0445 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 161 | 0,0752 | 0 | 0 | 0,0752 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 162 | 0,0374 | 0 | 0 | 0,0374 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 165 | 0,106 | 0 | 0 | 0,106 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 167 | 0,522 | 0 | 0 | 0,522 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 168 | 0,3765 | 0 | 0 | 0,3765 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 169 | 0,1712 | 0 | 0 | 0,1712 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 170 | 0 | 0,1429 | 0 | 0,1429 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 171 | 0,1181 | 0 | 0 | 0,1181 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 172 | 0,1757 | 0 | 0 | 0,1757 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 173 | 0,1928 | 0 | 0 | 0,1928 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 175 | 0,0947 | 0 | 0 | 0,0947 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 176 | 0,2472 | 0 | 0 | 0,2472 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 177 | 0,1858 | 0 | 0 | 0,1858 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 178 | 0,3902 | 0 | 0 | 0,3902 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 179 | 0,2920 | 0 | 0 | 0,2920 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 180 | 0,2290 | 0 | 0 | 0,2290 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 190 | 0,0200 | 0 | 0 | 0,0200 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 191 | 0,0752 | 0 | 0 | 0,0752 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 247 | 0,0286 | 0 | 0 | 0,0286 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 251 | 0,0162 | 0 | 0 | 0,0162 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 252 | 0,0027 | 0 | 0 | 0,0027 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 253 | 0,4144 | 0 | 0 | 0,4144 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 254 | 0,0991 | 0 | 0 | 0,0991 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 255 | 0 | 0,1417 | 0 | 0,1417 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 256 | 0 | 0,0237 | 0 | 0,0237 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 257 | 0 | 0,2927 | 0 | 0,2927 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 258 | 0 | 0,0515 | 0 | 0,0515 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 259 | 0 | 0,0739 | 0 | 0,0739 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 260 | 0 | 0,0674 | 0 | 0,0674 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 261 | 0 | 0,0544 | 0 | 0,0544 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 262 | 0 | 0,0005 | 0 | 0,0005 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 263 | 0 | 0,0134 | 0 | 0,0134 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 264 | 0 | 0,0466 | 0 | 0,0466 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 265 | 0 | 0,0305 | 0 | 0,0305 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 266 | 0 | 0,1273 | 0 | 0,1273 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 267 | 0 | 0,0321 | 0 | 0,0321 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 268 | 0,1286 | 0 | 0 | 0,1286 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 269 | 0,0233 | 0 | 0 | 0,0233 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 270 | 0,0298 | 0 | 0 | 0,0298 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 271 | 0,1872 | 0 | 0 | 0,1872 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 272 | 0,0652 | 0 | 0 | 0,0652 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 274 | 0,0317 | 0 | 0 | 0,0317 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 401 | 0,3447 | 0 | 0 | 0,3447 | no |
| Bagnoli Irpino | 12 | 402 | 0,0380 | 0 | 0 | 0,0380 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 1 | 0 | 0,3401 | 0 | 0,3401 | 0,3401 |
| Bagnoli Irpino | 13 | 2 | 0,4629 | 0 | 0 | 0,4629 | 0,4629 |
| Bagnoli Irpino | 13 | 3 | 0,5901 | 0 | 0 | 0,5901 | 0,5901 |
| Bagnoli Irpino | 13 | 4 | 0,4210 | 0 | 0 | 0,4210 | 0,4210 |
| Bagnoli Irpino | 13 | 5 | 0 | 0,5148 | 0 | 0,5148 | 0,5148 |
| Bagnoli Irpino | 13 | 6 | 0 | 0,2613 | 0 | 0,2613 | 0,2613 |
| Bagnoli Irpino | 13 | 7 | 0,3519 | 0 | 0 | 0,3519 | no |

| COMUNE | FG | PART | SUPERFICIE BOSCATA (HA) | SUPERFICIE PASCOLO (HA) | ALTRA SUPERFICIE (HA) | SUPERFICIE CATASTALE (HA) | USI CIVICI (HA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnoli Irpino | 13 | 8 | 0 | 0,4437 | 0 | 0,4437 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 9 | 0 | 16,7739 | 0 | 16,7739 | 16,7739 |
| Bagnoli Irpino | 13 | 10 | 0 | 0,1371 | 0 | 0,1371 | 0,1371 |
| Bagnoli Irpino | 13 | 11 | 12,7362 | 0 | 0 | 12,7362 | 12,0242(*) |
| Bagnoli Irpino | 13 | 15 | 47,3965 | 0 | 0 | 47,3965 | 47,1547(*) |
| Bagnoli Irpino | 13 | 16 | 104,5257 | 0 | 0 | 104,5257 | 104,5257 |
| Bagnoli Irpino | 13 | 17 | 0,2636 | 0 | 0 | 0,2636 | 0,2636 |
| Bagnoli Irpino | 13 | 18 | 0,8277 | 0 | 0 | 0,8277 | 0,8277 |
| Bagnoli Irpino | 13 | 19 | 0,1547 | 0 | 0 | 0,1547 | 0,1547 |
| Bagnoli Irpino | 13 | 20 | 0 | 1,2617 | 0 | 1,2617 | 1,2617 |
| Bagnoli Irpino | 13 | 21 | 0 | 0,3574 | 0 | 0,3574 | 0,3574 |
| Bagnoli Irpino | 13 | 22 | 138,6107 | 0 | 25,3014 | 163,9121 | 163,9121 |
| Bagnoli Irpino | 13 | 23 | 0,2406 | 0 | 0 | 0,2406 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 24 | 0 | 0,8376 | 0 | 0,8376 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 25 | 0 | 0,3299 | 0 | 0,3299 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 26 | 0 | 0,3335 | 0 | 0,3335 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 27 | 0 | 0,5816 | 0 | 0,5816 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 28 | 0 | 0,3715 | 0 | 0,3715 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 29 | 0 | 0,3502 | 0 | 0,3502 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 30 | 0 | 0,1993 | 0 | 0,1993 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 31 | 0 | 0,9112 | 0 | 0,9112 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 32 | 0 | 0,3825 | 0 | 0,3825 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 33 | 0 | 0,2444 | 0 | 0,2444 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 34 | 0 | 0,7051 | 0 | 0,7051 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 35 | 0 | 0,7440 | 0 | 0,7440 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 36 | 0 | 0,2543 | 0 | 0,2543 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 37 | 0 | 0,2498 | 0 | 0,2498 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 38 | 0 | 0,1204 | 0 | 0,1204 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 39 | 0 | 0,6316 | 0 | 0,6316 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 40 | 0 | 0,3127 | 0 | 0,3127 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 41 | 0 | 0,2826 | 0 | 0,2826 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 42 | 0 | 0,3260 | 0 | 0,3260 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 43 | 0,1308 | 0 | 0 | 0,1308 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 44 | 0,3944 | 0 | 0 | 0,3944 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 45 | 0 | 0,7506 | 0 | 0,7506 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 46 | 0,4515 | 0 | 0 | 0,4515 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 47 | 0,284 | 0 | 0 | 0,284 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 48 | 0,4979 | 0 | 0 | 0,4979 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 49 | 0,6118 | 0 | 0 | 0,6118 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 50 | 0,4048 | 0 | 0 | 0,4048 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 51 | 0 | 0,3861 | 0 | 0,3861 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 52 | 0 | 0,5775 | 0 | 0,5775 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 53 | 0,5273 | 0 | 0 | 0,5273 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 54 | 0,2698 | 0 | 0 | 0,2698 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 55 | 0,4021 | 0 | 0 | 0,4021 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 56 | 0,2900 | 0 | 0 | 0,2900 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 57 | 0,3661 | 0 | 0 | 0,3661 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 58 | 0,3091 | 0 | 0 | 0,3091 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 59 | 0,4158 | 0 | 0 | 0,4158 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 60 | 0,5482 | 0 | 0 | 0,5482 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 61 | 0,4616 | 0 | 0 | 0,4616 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 62 | 0,2567 | 0 | 0 | 0,2567 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 63 | 0,1754 | 0 | 0 | 0,1754 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 64 | 0,1461 | 0 | 0 | 0,1461 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 65 | 0,2048 | 0 | 0 | 0,2048 | no |

| COMUNE | FG | PART | SUPERFICIE BOSCATA (HA) | SUPERFICIE PASCOLO (HA) | ALTRA SUPERFICIE (HA) | SUPERFICIE CATASTALE (HA) | USI CIVICI (HA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnoli Irpino | 13 | 66 | 0,2604 | 0 | 0 | 0,2604 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 67 | 0,1810 | 0 | 0 | 0,1810 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 68 | 0,1448 | 0 | 0 | 0,1448 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 69 | 0,0493 | 0 | 0 | 0,0493 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 70 | 0,1915 | 0 | 0 | 0,1915 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 71 | 0,1198 | 0 | 0 | 0,1198 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 72 | 0,1136 | 0 | 0 | 0,1136 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 73 | 0,0920 | 0 | 0 | 0,0920 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 74 | 0,0641 | 0 | 0 | 0,0641 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 75 | 0,1374 | 0 | 0 | 0,1374 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 76 | 0,0902 | 0 | 0 | 0,0902 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 77 | 0,2431 | 0 | 0 | 0,2431 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 78 | 0,1256 | 0 | 0 | 0,1256 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 79 | 0,1993 | 0 | 0 | 0,1993 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 80 | 0,2526 | 0 | 0 | 0,2526 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 81 | 0,3773 | 0 | 0 | 0,3773 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 82 | 0,1137 | 0 | 0 | 0,1137 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 83 | 0,0836 | 0 | 0 | 0,0836 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 84 | 0,3549 | 0 | 0 | 0,3549 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 85 | 0,0967 | 0 | 0 | 0,0967 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 86 | 0,1330 | 0 | 0 | 0,1330 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 87 | 0,0848 | 0 | 0 | 0,0848 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 88 | 0,0789 | 0 | 0 | 0,0789 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 89 | 0,2118 | 0 | 0 | 0,2118 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 90 | 0,1924 | 0 | 0 | 0,1924 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 91 | 0,1024 | 0 | 0 | 0,1024 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 92 | 0,1578 | 0 | 0 | 0,1578 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 93 | 0,2939 | 0 | 0 | 0,2939 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 94 | 0,2254 | 0 | 0 | 0,2254 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 95 | 0,1881 | 0 | 0 | 0,1881 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 96 | 0,2218 | 0 | 0 | 0,2218 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 97 | 0,1642 | 0 | 0 | 0,1642 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 98 | 0,1812 | 0 | 0 | 0,1812 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 99 | 0,1791 | 0 | 0 | 0,1791 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 100 | 0,1582 | 0 | 0 | 0,1582 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 101 | 0,1409 | 0 | 0 | 0,1409 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 102 | 0,1312 | 0 | 0 | 0,1312 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 103 | 0,1329 | 0 | 0 | 0,1329 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 104 | 0,1443 | 0 | 0 | 0,1443 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 105 | 0,2258 | 0 | 0 | 0,2258 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 106 | 0,1124 | 0 | 0 | 0,1124 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 107 | 0,1559 | 0 | 0 | 0,1559 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 108 | 0,1867 | 0 | 0 | 0,1867 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 109 | 0,2877 | 0 | 0 | 0,2877 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 110 | 0,223 | 0 | 0 | 0,223 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 111 | 0,0863 | 0 | 0 | 0,0863 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 112 | 0,3306 | 0 | 0 | 0,3306 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 113 | 0,3210 | 0 | 0 | 0,3210 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 114 | 0,1510 | 0 | 0 | 0,1510 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 115 | 0,1363 | 0 | 0 | 0,1363 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 116 | 0,3223 | 0 | 0 | 0,3223 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 117 | 0,2822 | 0 | 0 | 0,2822 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 118 | 0,3125 | 0 | 0 | 0,3125 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 119 | 0,0866 | 0 | 0 | 0,0866 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 120 | 0,0979 | 0 | 0 | 0,0979 | no |

| COMUNE | FG | PART | SUPERFICIE BOSCATA (HA) | SUPERFICIE PASCOLO (HA) | ALTRA SUPERFICIE (HA) | SUPERFICIE CATASTALE (HA) | USI CIVICI (HA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnoli Irpino | 13 | 121 | 0,0867 | 0 | 0 | 0,0867 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 122 | 0,1027 | 0 | 0 | 0,1027 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 123 | 0,4674 | 0 | 0 | 0,4674 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 124 | 0,2949 | 0 | 0 | 0,2949 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 125 | 0,0995 | 0 | 0 | 0,0995 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 126 | 0,2454 | 0 | 0 | 0,2454 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 127 | 0,4820 | 0 | 0 | 0,4820 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 128 | 0,0736 | 0 | 0 | 0,0736 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 129 | 0,0848 | 0 | 0 | 0,0848 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 130 | 0,1977 | 0 | 0 | 0,1977 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 131 | 0 | 0,4332 | 0 | 0,4332 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 132 | 0 | 0,1122 | 0 | 0,1122 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 133 | 0 | 0,2217 | 0 | 0,2217 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 134 | 0,4984 | 0 | 0 | 0,4984 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 135 | 0 | 0,6743 | 0 | 0,6743 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 136 | 0 | 0,3351 | 0 | 0,3351 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 137 | 0,4602 | 0 | 0 | 0,4602 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 138 | 0 | 0,3896 | 0 | 0,3896 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 139 | 0 | 0,2915 | 0 | 0,2915 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 140 | 0 | 1,2447 | 0 | 1,2447 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 141 | 0 | 0,2473 | 0 | 0,2473 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 142 | 0 | 0,2234 | 0 | 0,2234 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 143 | 0 | 0,2680 | 0 | 0,2680 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 144 | 0,2865 | 0 | 0 | 0,2865 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 145 | 0 | 0,2659 | 0 | 0,2659 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 146 | 0 | 0,2493 | 0 | 0,2493 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 147 | 0 | 0,1992 | 0 | 0,1992 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 148 | 0 | 0,2647 | 0 | 0,2647 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 149 | 0 | 0,2414 | 0 | 0,2414 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 150 | 0 | 0,1695 | 0 | 0,1695 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 151 | 0 | 0,1884 | 0 | 0,1884 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 152 | 0 | 0,2484 | 0 | 0,2484 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 153 | 0 | 0,1754 | 0 | 0,1754 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 154 | 0 | 0,1598 | 0 | 0,1598 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 155 | 0 | 0,7158 | 0 | 0,7158 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 156 | 0 | 0,4122 | 0 | 0,4122 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 157 | 0 | 0,2513 | 0 | 0,2513 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 158 | 0 | 0,6646 | 0 | 0,6646 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 159 | 0 | 0,3370 | 0 | 0,3370 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 160 | 0 | 0,1249 | 0 | 0,1249 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 161 | 0 | 0,2496 | 0 | 0,2496 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 162 | 0 | 0,4185 | 0 | 0,4185 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 163 | 0,4414 | 0 | 0 | 0,4414 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 164 | 0 | 0,2452 | 0 | 0,2452 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 165 | 0 | 0,1881 | 0 | 0,1881 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 166 | 0 | 0,5017 | 0 | 0,5017 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 167 | 0 | 0,3450 | 0 | 0,3450 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 168 | 0 | 0,0996 | 0 | 0,0996 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 169 | 0 | 0,4821 | 0 | 0,4821 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 170 | 0,1871 | 0 | 0 | 0,1871 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 171 | 0 | 0,7185 | 0 | 0,7185 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 172 | 0 | 0,3572 | 0 | 0,3572 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 173 | 0 | 0,4941 | 0 | 0,4941 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 174 | 0,1609 | 0 | 0 | 0,1609 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 175 | 0,1239 | 0 | 0 | 0,1239 | no |

| COMUNE | FG | PART | SUPERFICIE BOSCATA (HA) | SUPERFICIE PASCOLO (HA) | ALTRA SUPERFICIE (HA) | SUPERFICIE CATASTALE (HA) | USI CIVICI (HA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnoli Irpino | 13 | 176 | 0,0927 | 0 | 0 | 0,0927 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 177 | 0,0475 | 0 | 0 | 0,0475 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 178 | 0,2555 | 0 | 0 | 0,2555 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 179 | 0,2694 | 0 | 0 | 0,2694 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 180 | 0,4081 | 0 | 0 | 0,4081 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 181 | 0,2455 | 0 | 0 | 0,2455 | no |
| Bagnoli Irpino | 13 | 182 | 0 | 0,2080 | 0 | 0,2080 | no |
| Bagnoli Irpino | 15 | 55 | 0,0674 | 0 | 0 | 0,0674 | 0,0674 |
| Bagnoli Irpino | 15 | 56 | 0,0273 | 0 | 0 | 0,0273 | 0,0273 |
| Bagnoli Irpino | 15 | 57 | 0,1215 | 0 | 0 | 0,1215 | 0,1215 |
| Bagnoli Irpino | 15 | 69 | 0,3688 | 0 | 0 | 0,3688 | 0,3688 |
| Bagnoli Irpino | 15 | 84 | 0,5634 | 0 | 0 | 0,5634 | 0,5634 |
| Bagnoli Irpino | 15 | 95 | 0,1630 | 0 | 0 | 0,1630 | 0,1630 |
| Bagnoli Irpino | 15 | 101 | 0,0665 | 0 | 0 | 0,0665 | 0,0665 |
| Bagnoli Irpino | 15 | 113 | 13,2161 | 0 | 0 | 13,2161 | 13,2161 |
| Bagnoli Irpino | 15 | 114 | 0,1227 | 0 | 0 | 0,1227 | 0,1227 |
| Bagnoli Irpino | 16 | 2 | 3,8724 | 0 | 0 | 3,8724 | 3,8724 |
| Bagnoli Irpino | 16 | 3 | 0 | 3,8777 | 0 | 3,8777 | no |
| Bagnoli Irpino | 17 | 101 | 3,9474 | 0 | 0 | 3,9474 | 3,9474 |
| Bagnoli Irpino | 17 | 102 | 0,3134 | 0 | 0 | 0,3134 | no |
| Bagnoli Irpino | 17 | 163 | 10,3858 | 0 | 0 | 10,3858 | 10,3858 |
| Bagnoli Irpino | 17 | 164 | 0,2534 | 0 | 0 | 0,2534 | 0,2534 |
| Bagnoli Irpino | 18 | 1 | 23,6214 | 0 | 0 | 23,6214 | 22,3426(*) |
| Bagnoli Irpino | 18 | 5 | 3,7373 | 0 | 0 | 3,7373 | 0,0547(*) |
| Bagnoli Irpino | 18 | 8 | 1,4804 | 0 | 0 | 1,4804 | 1,1346(*) |
| Bagnoli Irpino | 18 | 11 | 409,3255 | 0 | 13,6814 | 423,0069 | 423,0069 |
| Bagnoli Irpino | 19 | 30 | 0 | 0,3182 | 0 | 0,3182 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 31 | 0,5518 | 0 | 0 | 0,5518 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 1 | 0,1211 | 0 | 0 | 0,1211 | 0,1211 |
| Bagnoli Irpino | 19 | 36 | 0 | 24,7149 | 0 | 24,7149 | 19,5186(*) |
| Bagnoli Irpino | 19 | 37 | 0 | 0,2920 | 0 | 0,2920 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 39 | 0 | 0,1937 | 0 | 0,1937 | 0,1937 |
| Bagnoli Irpino | 19 | 43 | 0 | 0 | 42,8185 | 66,2925 | 42,8185(*) |
| Bagnoli Irpino | 19 | 238 | 0,2056 | 0 | 0 | 0,2056 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 239 | 0 | 0,1437 | 0 | 0,1437 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 240 | 0 | 0,1684 | 0 | 0,1684 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 243 | 0,2841 | 0 | 0 | 0,2841 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 244 | 0 | 0 | 0,3017 | 0,3017 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 245 | 0 | 0 | 0,5232 | 0,5232 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 246 | 0 | 0 | 0,0514 | 0,0514 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 247 | 0,2467 | 0 | 0 | 0,2467 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 248 | 0 | 0 | 0,2240 | 0,2240 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 249 | 0 | 0 | 0,4684 | 0,4684 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 251 | 0 | 0 | 0,4310 | 0,4310 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 252 | 0 | 0 | 0,6372 | 0,6372 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 253 | 0 | 0 | 0,2707 | 0,2707 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 254 | 0 | 0 | 0,1293 | 0,1293 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 255 | 0 | 0 | 0,1749 | 0,1749 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 256 | 0 | 0 | 0,1516 | 0,1516 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 257 | 0 | 0 | 0,2102 | 0,2102 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 258 | 0 | 0 | 0,0739 | 0,0739 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 259 | 0 | 0,2742 | 0 | 0,2742 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 260 | 0 | 0 | 0,1582 | 0,1582 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 261 | 0 | 0 | 0,2887 | 0,2887 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 262 | 0 | 0 | 0,2508 | 0,2508 | no |

| COMUNE | FG | PART | SUPERFICIE BOSCATA (HA) | SUPERFICIE PASCOLO (HA) | ALTRA SUPERFICIE (HA) | SUPERFICIE CATASTALE (HA) | USI CIVICI (HA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnoli Irpino | 19 | 263 | 0 | 0,0972 | 0 | 0,0972 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 264 | 0 | 0,1615 | 0 | 0,1615 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 266 | 0 | 0,2569 | 0 | 0,2569 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 267 | 0 | 0,1227 | 0 | 0,1227 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 270 | 0 | 0,3651 | 0 | 0,3651 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 271 | 0 | 0 | 0,0772 | 0,0772 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 272 | 0 | 0,1451 | 0 | 0,1451 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 273 | 0 | 0,1025 | 0 | 0,1025 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 274 | 0 | 0,1806 | 0 | 0,1806 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 275 | 0 | 0,1785 | 0 | 0,1785 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 276 | 0 | 0,0959 | 0 | 0,0959 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 277 | 0 | 0,5903 | 0 | 0,5903 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 278 | 0,5491 | 0 | 0 | 0,5491 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 279 | 0 | 0,3274 | 0 | 0,3274 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 281 | 0 | 0,2051 | 0 | 0,2051 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 282 | 0 | 0,2937 | 0 | 0,2937 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 284 | 0 | 0,4665 | 0 | 0,4665 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 285 | 0 | 0,3551 | 0 | 0,3551 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 286 | 0 | 0,1083 | 0 | 0,1083 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 287 | 0 | 0,0834 | 0 | 0,0834 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 289 | 0 | 0,4621 | 0 | 0,4621 | no |
| Bagnoli Irpino | 19 | 323 | 71,1690 | 0 | 0 | 71,1690 | 70,8270(*) |
| Bagnoli Irpino | 20 | 1 | 2,9688 | 0 | 0 | 2,9688 | 2,6700(*) |
| Bagnoli Irpino | 20 | 2 | 0,2132 | 0 | 0 | 0,2132 | 0,0453(*) |
| Bagnoli Irpino | 20 | 5 | 0 | 3,6988 | 0 | 3,6988 | 3,6988 |
| Bagnoli Irpino | 20 | 6 | 0 | 0,7341 | 0 | 0,7341 | 0,7341 |
| Bagnoli Irpino | 20 | 7 | 0 | 0,3598 | 0 | 0,3598 | 0,3598 |
| Bagnoli Irpino | 20 | 9 | 0,1691 | 0 | 0 | 0,1691 | no |
| Bagnoli Irpino | 20 | 10 | 0,3869 | 0 | 0 | 0,3869 | 0,3869 |
| Bagnoli Irpino | 20 | 11 | 0,3060 | 0 | 0 | 0,3060 | 0,3060 |
| Bagnoli Irpino | 20 | 12 | 255,0866 | 0 | 14,5200 | 269,6066 | 268,9684(*) |
| Bagnoli Irpino | 20 | 13 | 0 | 0 | 101,207 | 101,2070 | 101,2070 |
| Bagnoli Irpino | 20 | 14 | 2,5636 | 0 | 0 | 2,5636 | 2,5636 |
| Bagnoli Irpino | 20 | 15 | 3,0437 | 0 | 0 | 3,0437 | 3,0437 |
| Bagnoli Irpino | 20 | 16 | 0,2762 | 0 | 0 | 0,2762 | 0,2762 |
| Bagnoli Irpino | 20 | 17 | 0,1591 | 0 | 0 | 0,1591 | no |
| Bagnoli Irpino | 20 | 18 | 0,2115 | 0 | 0 | 0,2115 | no |
| Bagnoli Irpino | 20 | 19 | 0,1125 | 0 | 0 | 0,1125 | no |
| Bagnoli Irpino | 20 | 20 | 0,1227 | 0 | 0 | 0,1227 | no |
| Bagnoli Irpino | 20 | 21 | 0,0878 | 0 | 0 | 0,0878 | no |
| Bagnoli Irpino | 20 | 22 | 0,3713 | 0 | 0 | 0,3713 | no |
| Bagnoli Irpino | 20 | 23 | 0,2801 | 0 | 0 | 0,2801 | no |
| Bagnoli Irpino | 20 | 24 | 0,3223 | 0 | 0 | 0,3223 | no |
| Bagnoli Irpino | 20 | 25 | 0,0904 | 0 | 0 | 0,0904 | no |
| Bagnoli Irpino | 20 | 26 | 0,2933 | 0 | 0 | 0,2933 | no |
| Bagnoli Irpino | 20 | 27 | 0,1071 | 0 | 0 | 0,1071 | no |
| Bagnoli Irpino | 20 | 28 | 0,2651 | 0 | 0 | 0,2651 | no |
| Bagnoli Irpino | 20 | 29 | 0 | 0,2115 | 0 | 0,2115 | no |
| Bagnoli Irpino | 20 | 30 | 0 | 0,1928 | 0 | 0,1928 | no |
| Bagnoli Irpino | 20 | 31 | 0 | 0,0851 | 0 | 0,0851 | no |
| Bagnoli Irpino | 20 | 32 | 0 | 0,4004 | 0 | 0,4004 | no |
| Bagnoli Irpino | 20 | 33 | 0 | 0,3955 | 0 | 0,3955 | no |
| Bagnoli Irpino | 20 | 34 | 0,6216 | 0 | 0 | 0,6216 | no |
| Bagnoli Irpino | 20 | 35 | 0,2107 | 0 | 0 | 0,2107 | no |
| Bagnoli Irpino | 20 | 36 | 0,2011 | 0 | 0 | 0,2011 | no |

| COMUNE | FG | PART | SUPERFICIE BOSCATA (HA) | SUPERFICIE PASCOLO (HA) | ALTRA SUPERFICIE (HA) | SUPERFICIE CATASTALE (HA) | USI CIVICI (HA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnoli Irpino | 20 | 37 | 0,2649 | 0 | 0 | 0,2649 | no |
| Bagnoli Irpino | 20 | 38 | 0,2301 | 0 | 0 | 0,2301 | no |
| Bagnoli Irpino | 20 | 39 | 0,3327 | 0 | 0 | 0,3327 | no |
| Bagnoli Irpino | 20 | 40 | 0,6261 | 0 | 0 | 0,6261 | no |
| Bagnoli Irpino | 20 | 41 | 0,1484 | 0 | 0 | 0,1484 | no |
| Bagnoli Irpino | 20 | 42 | 0,0921 | 0 | 0 | 0,0921 | no |
| Bagnoli Irpino | 20 | 43 | 0,1234 | 0 | 0 | 0,1234 | no |
| Bagnoli Irpino | 22 | 20 | 0 | 3,3837 | 0 | 3,3837 | 3,3837 |
| Bagnoli Irpino | 22 | 16 | 0,395 | 0 | 0 | 0,395 | 0,395 |
| Bagnoli Irpino | 22 | 20 | 3,3201 | 0 | 0 | 3,3201 | 3,3201 |
| Bagnoli Irpino | 22 | 22 | 0 | 1,235 | 0 | 1,235 | no |
| Bagnoli Irpino | 22 | 23 | 0 | 0,1525 | 0 | 0,1525 | no |
| Bagnoli Irpino | 22 | 41 | 0 | 2,4112 | 0 | 2,4112 | 2,4112 |
| Bagnoli Irpino | 22 | 42 | 0 | 1,9959 | 0 | 1,9959 | 1,9959 |
| Bagnoli Irpino | 22 | 43 | 0 | 0,4693 | 0 | 0,4693 | no |
| Bagnoli Irpino | 22 | 45 | 0 | 0,8972 | 0 | 0,8972 | no |
| Bagnoli Irpino | 22 | 91 | 0,1833 | 0 | 0 | 0,1833 | no |
| Bagnoli Irpino | 23 | 1 | 3,8062 | 0 | 0 | 3,8062 | 3,8062 |
| Bagnoli Irpino | 23 | 29 | 152,2436 | 0 | 0 | 152,2436 | 152,2436 |
| Bagnoli Irpino | 23 | 33 | 183,0238 | 0 | 0 | 183,0238 | 183,0238 |
| Bagnoli Irpino | 24 | 3 | 0 | 8,7971 | 0 | 8,7971 | 8,7971 |
| Bagnoli Irpino | 24 | 4 | 0 | 7,5247 | 0 | 7,5247 | 7,5247 |
| Bagnoli Irpino | 24 | 3 | 8,8041 | 0 | 0 | 8,8041 | 8,8041 |
| Bagnoli Irpino | 24 | 4 | 7,5307 | 0 | 0 | 7,5307 | 7,5307 |
| Bagnoli Irpino | 24 | 9 | 0,0218 | 0 | 0 | 0,0218 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 10 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0012 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 11 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0011 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 12 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0015 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 13 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0017 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 14 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0016 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 15 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0012 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 16 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0014 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 17 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0017 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 18 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0015 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 19 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0016 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 20 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0016 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 21 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0014 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 22 | 0,002 | 0 | 0 | 0,002 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 23 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0016 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 24 | 0,0216 | 0 | 0 | 0,0216 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 25 | 0,0399 | 0 | 0 | 0,0399 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 26 | 0,0034 | 0 | 0 | 0,0034 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 27 | 0,0021 | 0 | 0 | 0,0021 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 28 | 0,0026 | 0 | 0 | 0,0026 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 29 | 0,003 | 0 | 0 | 0,003 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 30 | 0,0026 | 0 | 0 | 0,0026 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 31 | 0,0023 | 0 | 0 | 0,0023 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 32 | 0,003 | 0 | 0 | 0,003 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 33 | 0,0031 | 0 | 0 | 0,0031 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 34 | 0,0025 | 0 | 0 | 0,0025 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 35 | 0,0023 | 0 | 0 | 0,0023 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 36 | 0,0028 | 0 | 0 | 0,0028 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 37 | 0,0025 | 0 | 0 | 0,0025 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 38 | 0,0023 | 0 | 0 | 0,0023 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 39 | 0,0027 | 0 | 0 | 0,0027 | no |

| COMUNE | FG | PART | SUPERFICIE BOSCATA (HA) | SUPERFICIE PASCOLO (HA) | ALTRA SUPERFICIE (HA) | SUPERFICIE CATASTALE (HA) | USI CIVICI (HA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnoli Irpino | 24 | 40 | 0,0028 | 0 | 0 | 0,0028 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 41 | 0,003 | 0 | 0 | 0,003 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 42 | 0,0023 | 0 | 0 | 0,0023 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 43 | 0,1035 | 0 | 0 | 0,1035 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 44 | 0,0626 | 0 | 0 | 0,0626 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 45 | 0,0019 | 0 | 0 | 0,0019 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 46 | 0,0026 | 0 | 0 | 0,0026 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 47 | 0,0028 | 0 | 0 | 0,0028 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 48 | 0,0029 | 0 | 0 | 0,0029 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 49 | 0,0217 | 0 | 0 | 0,0217 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 50 | 0,0585 | 0 | 0 | 0,0585 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 51 | 0,0025 | 0 | 0 | 0,0025 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 52 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0018 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 53 | 0,0021 | 0 | 0 | 0,0021 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 54 | 0,0023 | 0 | 0 | 0,0023 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 55 | 0,0023 | 0 | 0 | 0,0023 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 56 | 0,0023 | 0 | 0 | 0,0023 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 57 | 0,0023 | 0 | 0 | 0,0023 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 58 | 0,0022 | 0 | 0 | 0,0022 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 59 | 0,0021 | 0 | 0 | 0,0021 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 60 | 0,0021 | 0 | 0 | 0,0021 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 61 | 0,0020 | 0 | 0 | 0,0020 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 62 | 0,0573 | 0 | 0 | 0,0573 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 63 | 0,0023 | 0 | 0 | 0,0023 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 64 | 0,0021 | 0 | 0 | 0,0021 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 65 | 0,0020 | 0 | 0 | 0,0020 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 66 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0018 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 67 | 0,0021 | 0 | 0 | 0,0021 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 68 | 0,0019 | 0 | 0 | 0,0019 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 69 | 0,0780 | 0 | 0 | 0,0780 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 70 | 0,0020 | 0 | 0 | 0,0020 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 71 | 0,0025 | 0 | 0 | 0,0025 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 72 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0018 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 73 | 0,0204 | 0 | 0 | 0,0204 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 74 | 0,0579 | 0 | 0 | 0,0579 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 270 | 0,0144 | 0 | 0 | 0,0144 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 273 | 0,0087 | 0 | 0 | 0,0087 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 274 | 0,0130 | 0 | 0 | 0,0130 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 275 | 0,0036 | 0 | 0 | 0,0036 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 278 | 0,0072 | 0 | 0 | 0,0072 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 279 | 0,0276 | 0 | 0 | 0,0276 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 280 | 0,0165 | 0 | 0 | 0,0165 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 281 | 0,0191 | 0 | 0 | 0,0191 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 284 | 0,0027 | 0 | 0 | 0,0027 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 286 | 0,1025 | 0 | 0 | 0,1025 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 291 | 0,0334 | 0 | 0 | 0,0334 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 292 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0014 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 295 | 0,0059 | 0 | 0 | 0,0059 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 296 | 0,1274 | 0 | 0 | 0,1274 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 297 | 0,0472 | 0 | 0 | 0,0472 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 298 | 0,2142 | 0 | 0 | 0,2142 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 299 | 0,1489 | 0 | 0 | 0,1489 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 300 | 0,0241 | 0 | 0 | 0,0241 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 301 | 0,1277 | 0 | 0 | 0,1277 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 302 | 0,0487 | 0 | 0 | 0,0487 | no |

| COMUNE | FG | PART | SUPERFICIE BOSCATA (HA) | SUPERFICIE PASCOLO (HA) | ALTRA SUPERFICIE (HA) | SUPERFICIE CATASTALE (HA) | USI CIVICI (HA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnoli Irpino | 24 | 303 | 0,0496 | 0 | 0 | 0,0496 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 304 | 0,0410 | 0 | 0 | 0,0410 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 305 | 0,1599 | 0 | 0 | 0,1599 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 306 | 0,0780 | 0 | 0 | 0,0780 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 307 | 0,1728 | 0 | 0 | 0,1728 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 308 | 0,1297 | 0 | 0 | 0,1297 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 311 | 1,1377 | 0 | 0 | 1,1377 | 0,3671(*) |
| Bagnoli Irpino | 24 | 313 | 0,0351 | 0 | 0 | 0,0351 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 314 | 0,0599 | 0 | 0 | 0,0599 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 315 | 0,1505 | 0 | 0 | 0,1505 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 316 | 0,0375 | 0 | 0 | 0,0375 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 317 | 0,0236 | 0 | 0 | 0,0236 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 319 | 0,0771 | 0 | 0 | 0,0771 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 320 | 0,4732 | 0 | 0 | 0,4732 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 322 | 0,0939 | 0 | 0 | 0,0939 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 328 | 0,0525 | 0 | 0 | 0,0525 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | 330 | 426,8064 | 0 | 0 | 426,8064 | 410,3397(*) |
| Bagnoli Irpino | 24 | 332 | 0,0191 | 0 | 0 | 0,0191 | no |
| Bagnoli Irpino | 24 | X1 | 0,2834 | 0 | 0 | 0,2834 | no |
| Bagnoli Irpino | 25 | 1 | 1,3715 | 0 | 0 | 1,3715 | 1,3715 |
| Bagnoli Irpino | 25 | 3 | 0,1626 | 0 | 0 | 0,1626 | 0,0935(*) |
| Bagnoli Irpino | 25 | 4 | 0,1582 | 0 | 0 | 0,1582 | 0,1582 |
| Bagnoli Irpino | 25 | 5 | 0,3807 | 0 | 0 | 0,3807 | 0,3807 |
| Bagnoli Irpino | 25 | 6 | 1,3349 | 0 | 0 | 1,3349 | 1,3349 |
| Bagnoli Irpino | 25 | 7 | 0,0038 | 0 | 0 | 0,0038 | no |
| Bagnoli Irpino | 25 | 8 | 0,0509 | 0 | 0 | 0,0509 | no |
| Bagnoli Irpino | 25 | 10 | 0 | 0,7717 | 0 | 0,7717 | 0,7717 |
| Bagnoli Irpino | 25 | 12 | 519,4372 | 0 | 16,262 | 535,6992 | 531,7835(*) |
| Bagnoli Irpino | 25 | 13 | 0,8314 | 0 | 0 | 0,8314 | 0,8314 |
| Bagnoli Irpino | 25 | 14 | 0,0821 | 0 | 0 | 0,0821 | 0,0821 |
| Bagnoli Irpino | 25 | 15 | 0,0557 | 0 | 0 | 0,0557 | no |
| Bagnoli Irpino | 25 | 16 | 0,2348 | 0 | 0 | 0,2348 | no |
| Bagnoli Irpino | 25 | 21 | 0 | 0,5618 | 0 | 0,5618 | no |
| Bagnoli Irpino | 25 | 22 | 0 | 0,2298 | 0 | 0,2298 | no |
| Bagnoli Irpino | 25 | 23 | 0 | 0,1317 | 0 | 0,1317 | no |
| Bagnoli Irpino | 25 | 24 | 0 | 0,4729 | 0 | 0,4729 | no |
| Bagnoli Irpino | 25 | 25 | 0 | 0,4969 | 0 | 0,4969 | no |
| Bagnoli Irpino | 25 | 26 | 0 | 0,2646 | 0 | 0,2646 | no |
| Bagnoli Irpino | 25 | 27 | 0 | 0,6593 | 0 | 0,6593 | no |
| Bagnoli Irpino | 25 | 28 | 0 | 0,6804 | 0 | 0,6804 | no |
| Bagnoli Irpino | 25 | 29 | 0 | 0,2026 | 0 | 0,2026 | no |
| Bagnoli Irpino | 25 | 30 | 0 | 0,2923 | 0 | 0,2923 | no |
| Bagnoli Irpino | 25 | 31 | 0 | 0,4130 | 0 | 0,4130 | no |
| Bagnoli Irpino | 25 | 32 | 0 | 0,2381 | 0 | 0,2381 | no |
| Bagnoli Irpino | 25 | 33 | 0 | 0,5158 | 0 | 0,5158 | no |
| Bagnoli Irpino | 25 | 34 | 0,5951 | 0 | 0 | 0,5951 | no |
| Bagnoli Irpino | 25 | 35 | 0 | 0,1996 | 0 | 0,1996 | no |
| Bagnoli Irpino | 25 | 36 | 0 | 0,1959 | 0 | 0,1959 | no |
| Bagnoli Irpino | 25 | 37 | 0 | 0,2628 | 0 | 0,2628 | no |
| Bagnoli Irpino | 25 | 38 | 0 | 0,2797 | 0 | 0,2797 | no |
| Bagnoli Irpino | 25 | 39 | 0 | 0,2242 | 0 | 0,2242 | no |
| Bagnoli Irpino | 25 | 40 | 0 | 0,1797 | 0 | 0,1797 | no |
| Bagnoli Irpino | 25 | 41 | 0 | 0,2380 | 0 | 0,2380 | no |
| Bagnoli Irpino | 25 | 42 | 0 | 0,2523 | 0 | 0,2523 | no |
| Bagnoli Irpino | 25 | 43 | 0 | 0,8568 | 0 | 0,8568 | no |

| COMUNE | FG | PART | SUPERFICIE BOSCATA (HA) | SUPERFICIE PASCOLO (HA) | ALTRA SUPERFICIE (HA) | SUPERFICIE CATASTALE (HA) | USI CIVICI (HA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnoli Irpino | 25 | 44 | 0 | 0,9341 | 0 | 0,9341 | no |
| Bagnoli Irpino | 25 | 45 | 0 | 0,5661 | 0 | 0,5661 | no |
| Bagnoli Irpino | 25 | 46 | 0 | 0,1464 | 0 | 0,1464 | no |
| Bagnoli Irpino | 25 | 47 | 0 | 0,1188 | 0 | 0,1188 | no |
| Bagnoli Irpino | 25 | 48 | 0 | 0,2245 | 0 | 0,2245 | no |
| Bagnoli Irpino | 25 | 49 | 0 | 0,5789 | 0 | 0,5789 | no |
| Bagnoli Irpino | 25 | 50 | 0 | 0,5655 | 0 | 0,5655 | no |
| Bagnoli Irpino | 25 | 51 | 0 | 0,3123 | 0 | 0,3123 | no |
| Bagnoli Irpino | 25 | 52 | 0 | 1,3505 | 0 | 1,3505 | no |
| Bagnoli Irpino | 26 | 1 | 416,9289 | 0 | 24,9712 | 441,9001 | 441,9001 |
| Bagnoli Irpino | 26 | 2 | 6,8245 | 0 | 0 | 6,8245 | 6,8245 |
| Bagnoli Irpino | 26 | 3 | 0,1696 | 0 | 0 | 0,1696 | 0,1696 |
| Bagnoli Irpino | 26 | 4 | 0,2750 | 0 | 0 | 0,2750 | 0,2750 |
| Bagnoli Irpino | 26 | 5 | 17,0542 | 0 | 0 | 17,0542 | 17,0542 |
| Bagnoli Irpino | 26 | 6 | 0,3387 | 0 | 0 | 0,3387 | 0,3387 |
| Bagnoli Irpino | 26 | 7 | 1,2823 | 0 | 0 | 1,2823 | 1,2823 |
| Bagnoli Irpino | 26 | 8 | 14,2706 | 0 | 0 | 14,2706 | 14,2706 |
| Bagnoli Irpino | 27 | 1 | 0,3988 | 0 | 0 | 0,3988 | 0,3988 |
| Bagnoli Irpino | 27 | 3 | 173,6964 | 0 | 0 | 173,6964 | 173,6964 |
| Bagnoli Irpino | 27 | 4 | 0,0838 | 0 | 0 | 0,0838 | no |
| Bagnoli Irpino | 27 | 5 | 0,0026 | 0 | 0 | 0,0026 | no |
| Bagnoli Irpino | 27 | 6 | 0,0031 | 0 | 0 | 0,0031 | no |
| Bagnoli Irpino | 27 | 7 | 0,0027 | 0 | 0 | 0,0027 | no |
| Bagnoli Irpino | 27 | 8 | 0,0036 | 0 | 0 | 0,0036 | no |
| Bagnoli Irpino | 27 | 9 | 0,0032 | 0 | 0 | 0,0032 | no |
| Bagnoli Irpino | 27 | 151 | 370,7581 | 0 | 28,7710 | 399,5291 | 399,5291 |
| Bagnoli Irpino | 27 | 152 | 0,0909 | 0 | 0 | 0,0909 | no |
| Bagnoli Irpino | 27 | 153 | 0,0336 | 0 | 0 | 0,0336 | no |
| Bagnoli Irpino | 27 | 154 | 0,0741 | 0 | 0 | 0,0741 | no |
| Bagnoli Irpino | 27 | 155 | 0,0051 | 0 | 0 | 0,0051 | no |
| Bagnoli Irpino | 27 | 156 | 0,0032 | 0 | 0 | 0,0032 | no |
| Bagnoli Irpino | 27 | 157 | 0,2177 | 0 | 0 | 0,2177 | no |
| Bagnoli Irpino | 27 | 158 | 0,1318 | 0 | 0 | 0,1318 | no |
| Bagnoli Irpino | 27 | 159 | 0,0049 | 0 | 0 | 0,0049 | no |
| Bagnoli Irpino | 27 | 160 | 0,0953 | 0 | 0 | 0,0953 | no |
| Bagnoli Irpino | 27 | 161 | 0,5367 | 0 | 0 | 0,5367 | no |
| Bagnoli Irpino | 27 | 162 | 0,0042 | 0 | 0 | 0,0042 | no |
| Bagnoli Irpino | 28 | 1 | 309,2197 | 0 | 4,81 | 314,0297 | 314,0297 |
| Bagnoli Irpino | 28 | 2 | 0 | 2,2591 | 0 | 2,2591 | 2,2591 |
| Bagnoli Irpino | 28 | 3 | 0 | 1,5872 | 0 | 1,5872 | 1,5872 |
| Bagnoli Irpino | 28 | 4 | 42,6071 | 0 | 0 | 42,6071 | 42,6071 |
| Bagnoli Irpino | 28 | 5 | 21,8062 | 0 | 0 | 21,8062 | 21,8062 |
| Bagnoli Irpino | 28 | 6 | 4,5696 | 0 | 0 | 4,5696 | 4,5696 |
| Bagnoli Irpino | 28 | 7 | 1,9290 | 0 | 0 | 1,9290 | 1,9290 |
| Bagnoli Irpino | 28 | 8 | 2,6818 | 0 | 0 | 2,6818 | 2,6818 |
| Bagnoli Irpino | 29 | 1 | 0 | 3,7651 | 0 | 3,7651 | no |
| Bagnoli Irpino | 29 | 2 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0018 | no |
| Bagnoli Irpino | 29 | 3 | 0,0775 | 0 | 0 | 0,0775 | no |
| Bagnoli Irpino | 29 | 4 | 0 | 9,4375 | 0 | 9,4375 | no |
| Bagnoli Irpino | 29 | 5 | 2,3534 | 0 | 0 | 2,3534 | no |
| Bagnoli Irpino | 30 | 1 | 0 | 18,7896 | 0 | 18,7896 | no |
| Bagnoli Irpino | 30 | 18 | 0,0176 | 0 | 0 | 0,0176 | no |
| Bagnoli Irpino | 30 | 19 | 0,0260 | 0 | 0 | 0,0260 | no |
| Bagnoli Irpino | 30 | 20 | 0,0122 | 0 | 0 | 0,0122 | no |
| Bagnoli Irpino | 30 | 23 | 4,6555 | 0 | 0 | 4,6555 | no |

| COMUNE | FG | PART | SUPERFICIE BOSCATA (HA) | SUPERFICIE PASCOLO (HA) | ALTRA SUPERFICIE (HA) | SUPERFICIE CATASTALE (HA) | USI CIVICI (HA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnoli Irpino | 30 | 47 | 0,0703 | 0 | 0 | 0,0703 | no |
| Bagnoli Irpino | 30 | 66 | 1,6317 | 0 | 0 | 1,6317 | no |
| Bagnoli Irpino | 30 | 204 | 0,0122 | 0 | 0 | 0,0122 | no |
| Bagnoli Irpino | 31 | 3 | 0,0327 | 0 | 0 | 0,0327 | no |
| Bagnoli Irpino | 31 | 7 | 0,3732 | 0 | 0 | 0,3732 | no |
| Bagnoli Irpino | 31 | 8 | 0,2825 | 0 | 0 | 0,2825 | no |
| Bagnoli Irpino | 31 | 11 | 1,0818 | 0 | 0 | 1,0818 | no |
| Bagnoli Irpino | 31 | 17 | 4,7496 | 0 | 0 | 4,7496 | no |
| Bagnoli Irpino | 31 | 18 | 6,9375 | 0 | 0 | 6,9375 | no |
| Bagnoli Irpino | 31 | 42 | 0,0233 | 0 | 0 | 0,0233 | no |
| Bagnoli Irpino | 31 | 43 | 0,0238 | 0 | 0 | 0,0238 | no |
| Bagnoli Irpino | 31 | 46 | 0,0037 | 0 | 0 | 0,0037 | no |
| Bagnoli Irpino | 31 | 264 | 0,0320 | 0 | 0 | 0,0320 | no |
| Bagnoli Irpino | 31 | 265 | 25,9257 | 0 | 0 | 25,9257 | no |
| Bagnoli Irpino | 31 | Y901 | 4,8377 | 0 | 0 | 4,8377 | no |
| Bagnoli Irpino | 32 | 14 | 2,9280 | 0 | 0 | 2,9280 | no |
| Bagnoli Irpino | 32 | 15 | 5,8904 | 0 | 0 | 5,8904 | no |
| Bagnoli Irpino | 32 | 16 | 0,0022 | 0 | 0 | 0,0022 | no |
| Bagnoli Irpino | 32 | 49 | 0,7047 | 0 | 0 | 0,7047 | no |
| Bagnoli Irpino | 32 | 121 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | no |
| Bagnoli Irpino | 32 | 127 | 0,0032 | 0 | 0 | 0,0032 | no |
| Bagnoli Irpino | 32 | 129 | 0,0057 | 0 | 0 | 0,0057 | no |
| Bagnoli Irpino | 32 | 153 | 0,0009 | 0 | 0 | 0,0009 | no |
| Bagnoli Irpino | 32 | 159 | 0,0147 | 0 | 0 | 0,0147 | no |
| Bagnoli Irpino | 32 | 160 | 0,0105 | 0 | 0 | 0,0105 | no |
| Bagnoli Irpino | 32 | 323 | 0,0063 | 0 | 0 | 0,0063 | no |
| Bagnoli Irpino | 32 | 324 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0002 | no |
| Bagnoli Irpino | 32 | 333 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0012 | no |
| Bagnoli Irpino | 33 | 1 | 9,9117 | 0 | 0 | 9,9117 | no |
| Bagnoli Irpino | 33 | 14 | 0,0463 | 0 | 0 | 0,0463 | no |
| Calabritto (**) | 30 | 6 | | | | 3,7072 | no |
| Calabritto (**) | 30 | 8 | | | | 1,0023 | no |
| Calabritto (**) | 37 | 4 | | | | 16,5519 | no |
| Calabritto (**) | 37 | 5 | | | | 1,3975 | no |
| Calabritto (**) | 37 | 7 | | | | 0,2019 | no |
| Calabritto (**) | 37 | 8 | | | | 47,3923 | no |
| Calabritto (**) | 37 | 9 | | | | 4,3073 | no |

**(*) particelle parzialmente occupate e/o in contestazione (cfr. tabella 22)**
**(**) particelle in contestazione con il comune di Calabritto – escluse dalla presente pianificazione.**

Con Decreto del Regio Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Napoli **n. 9 del 6 agosto 1938**, vennero assegnati al comune di **Bagnoli Irpino Ha 5116.96.30** di terreno al diritto di legnatico e pascolo - Categoria A.

Con Decreto del Ministro delle Agricolture e Foreste del 16.09.1963 il Comune di Bagnoli Irpino venne autorizzato ad alienare ha 125.85.85 dei terreni demaniali gravati da Usi Civici.

Con Decreto del Ministero delle Agricolture e Foreste del 22.11.1976 il Comune di Bagnoli Irpino venne autorizzato ad alienare Ha 1.59.00 e a mutare di destinazione Ha 0.38.44, dei terreni demaniali gravati da Usi Civici.

Nella precedente *tabella 21* sono state elencate le proprietà comunali evidenziando quelle assoggettate ad Usi Civici. Nella tabella n. 22 che segue, invece, son stati elencati i terreni assoggettati ad Usi Civici che attualmente risultano occupati e/o in contestazione per complessivi **Ha 68,2087.**

**Tabella 22. Elenco particelle gravate da Usi Civici occupate e/o in contestazione (escluse dalla pianificazione)**

| COMUNE | FG | PART | SUPERFICIE CATASTASTALE (Ha) | SUPERFICIE OCCUPATA E/O IN CONTESTAZIONE (Ha) |
|---|---|---|---|---|
| Bagnoli Irpino | 11 | 29 | 53,4538 | 0,0289 |
| Bagnoli Irpino | 12 | 1 | 291,9151 | 2,1400 |
| Bagnoli Irpino | 12 | 34 | 0,1339 | 0,1339 |
| Bagnoli Irpino | 12 | 45 | 0,7114 | 0,4711 |
| Bagnoli Irpino | 13 | 11 | 12,7362 | 0,7120 |
| Bagnoli Irpino | 13 | 12 | 0,2316 | 0,2316 |
| Bagnoli Irpino | 13 | 13 | 0,3419 | 0,3419 |
| Bagnoli Irpino | 13 | 14 | 0,9765 | 0,9765 |
| Bagnoli Irpino | 13 | 15 | 47,3965 | 0,2418 |
| Bagnoli Irpino | 18 | 1 | 23,6214 | 1,2788 |
| Bagnoli Irpino | 18 | 5 | 3,7373 | 3,6826 |
| Bagnoli Irpino | 18 | 8 | 1,4804 | 0,3458 |
| Bagnoli Irpino | 18 | 6 | 0,1819 | 0,1819 |
| Bagnoli Irpino | 19 | 29 | 0,4813 | 0,4813 |
| Bagnoli Irpino | 19 | 35 | 0,607 | 0,607 |
| Bagnoli Irpino | 19 | 36 | 24,7149 | 5,1963 |
| Bagnoli Irpino | 19 | 38 | 0,3334 | 0,3334 |
| Bagnoli Irpino | 19 | 43 | 66,2925 | 23,474 |
| Bagnoli Irpino | 19 | 288 | 0,0906 | 0,0906 |
| Bagnoli Irpino | 19 | 323 | 71,1690 | 0,3420 |
| Bagnoli Irpino | 20 | 1 | 2,9688 | 0,2988 |
| Bagnoli Irpino | 20 | 2 | 0,2132 | 0,1679 |
| Bagnoli Irpino | 20 | 3 | 0,8859 | 0,8859 |
| Bagnoli Irpino | 20 | 4 | 0,1258 | 0,1258 |
| Bagnoli Irpino | 20 | 8 | 0,3767 | 0,3767 |
| Bagnoli Irpino | 20 | 12 | 269,6066 | 0,6382 |
| Bagnoli Irpino | 24 | 310 | 0,9744 | 0,9744 |
| Bagnoli Irpino | 24 | 311 | 1,1377 | 0,7706 |
| Bagnoli Irpino | 24 | 330 | 426,8064 | 16,4667 |
| Bagnoli Irpino | 25 | 2 | 0,1020 | 0,1020 |
| Bagnoli Irpino | 25 | 3 | 0,1626 | 0,0691 |
| Bagnoli Irpino | 25 | 9 | 1,4370 | 1,4370 |
| Bagnoli Irpino | 25 | 12 | 535,6992 | 3,9157 |
| Bagnoli Irpino | 25 | 17 | 0,2187 | 0,2187 |
| Bagnoli Irpino | 25 | 18 | 0,0968 | 0,0968 |
| Bagnoli Irpino | 25 | 19 | 0,0944 | 0,0944 |
| Bagnoli Irpino | 25 | 20 | 0,2786 | 0,2786 |
| | | | **TOTALE** | **68,2087** |

## Infrastrutture: viabilità silvo-pastorale - vie di accesso – sentieri

Nella cartografia allegata al Piano sono state evidenziate la viabilità principale e quella di servizio esistente con opportuni tematismi.

Le infrastrutture viarie, che interessano e/o sono a servizio dei complessi boscati oggetto di pianificazione, abbisognano di interventi di sistemazione/ripristino a causa soprattutto dei dissesti dovuti agli eventi meteorici e alla carente manutenzione.

Nella presente pianificazione non è prevista la realizzazione di alcuna nuova strada.

La viabilità è stata **classificata ai sensi del Decreto Interministeriale n. 563734 del 28/10/2021**:

- Viabilità ordinaria;
- Viabilità principale tipo a e tipo b;
- Viabilità secondaria tipo a e tipo b.

# II - PARTE SPECIALE

## Cap. 6 - Complesso silvo-pastorale oggetto di pianificazione

### Descrizione generale

Secondo i dati di superficie calcolati in ambito GIS, l'estensione totale della proprietà silvo-pastorale del comune di Bagnoli Irpino ammonta a 5.194,60 ettari. Rispetto alle pianificazioni precedenti, si registra una riduzione di 91,25 di cui circa 75 ettari è attribuibile a particelle di terreno attualmente oggetto di contestazione con il confinante Comune di Calabritto che, pertanto, non sono incluse nella presente pianificazione.

La proprietà comunale di Bagnoli Irpino è prevalentemente costituita da boschi di faggio, pascoli e superfici incolte. Una porzione significativa della proprietà pubblica, pari a 158,69 ettari, è destinata ad usi diversi: insediamenti e infrastrutture turistiche, oltre a coltivazioni agricole che non rientrano nel piano di gestione forestale.

**Tabella 19. Consistenza del patrimonio**

| | Uso del suolo | Ettari |
|---|---|---|
| Superficie oggetto di pianificazione | Boschi | 4.171,87 |
| | Pascoli, incolti arbusteti e formazioni in evoluzione | 854,98 |
| | Vivaio | 9,06 |
| | Totale | 5.035,91 |
| Superficie extra piano | Castagneti da frutto | 31,48 |
| | Infrastrutture sciistiche | 20,86 |
| | Arre agricole | 83,32 |
| | Edificato | 16,00 |
| | Lago | 6,52 |
| | Area Picnic | 0,51 |
| | Totale | 158,69 |
| Superficie complessiva | | 5.194,60 |

I boschi si estendono in una delle zone più elevate dell'Appennino Napoletano, al limite delle provincie di Salerno e di Avellino. Coprono le falde settentrionali ed occidentali del Monte Cervialto, tutto il monte Raja Magra e i monti Cervarolo e Raja della Scannella, che sono i tre più importanti contrafforti del Cervialto e si spingono fino ad una altitudine di circa 1800 m s.l.m. Questi boschi rivestono, di massima, ripide pendici che si addolciscono in prossimità delle pianure a pascolo quali il Piano Laceno, ed altri piani tettonici frequenti in tutto il massiccio.

I boschi e i pascoli oggetto di questo piano confinano ad oriente con boschi e pascoli del comune di Calabritto, a sud con i boschi del comune di Acerno, ad occidente con terreni di proprietà private del comune di Bagnoli Irpino e a settentrione con terreni boschivi e nudi del comune di Nusco.

## Cartografia del Piano

La base cartografica che si è utilizzata per l'elaborazione del P.G.F. è la Carta Tecnica Regionale *(aerofotogrammetria in scala 1:5.000)*. Questa carta, notevolmente dettagliata, ha un'equidistanza tra le curve di livello di 5 m.

Per riportare esattamente i limiti della proprietà comunale sono state utilizzate la mappe catastali in scala 1:1.000, 1:2.000 e 1:4.000, assemblate in una tavola di stampa in scala 1:10.000, per ovvi motivi dimensionali; per avere una visione d'insieme, anche del territorio circostante, si è fatto ricorso alle tavolette I.G.M. in scala 1:25.000.

Per la redazione della carta geologica è stata utilizzata come base la Carta Geologica Nazionale in scala 1:100.000 e per la sovrapposizione del P.G.F. con il P.S.A.I. sono state utilizzate le tavole rese disponibile dall' Autorità di Bacino.

Infine, per l'inquadramento cartografico rispetto alla aree protette (Parco Regionale e Siti della Rete Natura 2000) si è fatto riferimento alle cartografie ufficiali, messe a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e dalla Regione Campania.

Gran parte del lavoro di individuazione dei confini delle particelle forestali è stato eseguito anche con l'ausilio di ortofoto digitali e di immagini satellitari, riportati poi sul terreno con le operazioni di campagna.

**Le tavole allegate al Piano sono le seguenti:**

- Inquadramento generale – su base IGM – scala 1:25.000;
- Carta Silografica su base CTR – scala di stampa 1:10.000;
- Carta Silografica su base Catastale - scala di stampa 1:10.000;
- Carta geologica – su base C.G. N. in scala 1:100000 – scala di stampa 1:25.000;
- Carta dei miglioramenti su base CTR - scala 1:10.000;
- Carta dei tipi strutturali su base CTR - scala 1:10.000;
- Carta degli interventi selvicolturali su base CTR - scala 1:10.000;
- Carta dei vincoli su base CTR - scala 1:10.000;
- Carta del rischio da Frana in scala – PSAI – scala 1:10.000;
- Carta della Pericolosità da Frana in scala – PSAI – scala 1:10.000;
- Carta del rischio Idraulico - PSAI – scala 1:25.000;
- Carta degli usi civici su base Catastale - scala 1:10.000.

# Cap. 7 – Modalità di formazione del particellare

## Compartimentazione del complesso silvo-pastorale e formazione del particellare

Nella redazione del presente piano di gestione è stata confermata la compartimentazione della foresta in particelle, secondo la suddivisione già adottata nei precedenti strumenti pianificatori, mantenendone la numerazione originaria.

**Figura 16. La compartimentazione di dettaglio: particelle e sottoparticelle forestali**



Il criterio compartimentale impiegato, di tipo fisiografico con orientamento analitico, consente una chiara e agevole identificazione delle singole unità colturali sul terreno. I confini delle particelle, salvo rare eccezioni, coincidono con elementi morfologici e infrastrutturali ben riconoscibili quali strade, fossi, sentieri, crinali o netti limiti colturali.

Le sottoparticelle forestali, già presenti nel precedente particellare, sono state in larga parte confermate e talvolta implementate, previa fotointerpretazione e successivo controllo in campo in

occasione dei rilievi descrittivi. Per la rivisitazione delle sottoparticelle ci si è attenuti ai criteri espressi dal "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale[2]".
In particolare, si è cercato di delimitare sottoparticelle di superficie non inferiore ai 0,5 ha, omogenee per quanto riguarda la futura gestione tecnica, tracciando dei limiti sulla carta solamente se questi potevano essere utili alla gestione dei soprassuoli forestali. Nell'identificazione delle particelle, sono state contrassegnate da un numero tutte le superfici destinate a pascolo, mentre, per quanto riguarda gli incolti, ci si si è limitati ad individuare con la sigla "In" quelli più estesi all'interno delle Comprese produttive: formazioni lasciate alla libera evoluzione naturale e destinate a rimanere nelle stesse condizioni vegetazionali per un tempo indefinito.

Al fine di rendere le particelle bene individuabili sul terreno i confini sono stati segnati con strisce di vernice blu indelebile sui fusti degli alberi oppure su rocce o massi affioranti, nel verso che guarda la linea di confine. Sui vertici sono stati anche riportati i numeri delle particelle, segnandoli con la vernice dello stesso colore. Quasi certamente, per l'inevitabile deterioramento operato dagli agenti atmosferici, questa segnaletica non durerà per tutto il periodo di validità del piano e, quindi, andrà attentamente controllata e ripristinata, ove occorre.




**Figura 17. Segni convenzionali riportati per la materializzazione in bosco del particellare forestale**

La superficie totale pianificata, di ettari 5.035,91, è risultata così divisa in 370 unità per una superficie media di 13,61 ettari. Le particelle forestali ammontano a 325 a cui corrisponde una superficie media leggermente superiore, pari a 15,5 ettari. La particella forestale di maggiori dimensioni è la n°153, di 42,34 ettari; la più grande in assoluto è la particella che corrisponde all'ampia conca del Laceno destinata al pascolo: 167,41 ettari.

I rilievi eseguiti in bosco sono stati del tipo sintetico-descrittivo. Le descrizioni delle singole unità colturali forestali, redatte a seguito di sopralluoghi accurati condotti nel contesto del rilevamento campionario, sono formulate sulla base delle caratteristiche ecologico-stazionali (desunte anche attraverso l'analisi degli elementi floristici indicatori) e di tutti gli altri elementi caratterizzanti il soprassuolo (sviluppo, struttura, stadio evolutivo, condizione fitosanitaria, portamento, ecc.). Queste descrizioni sono state riportate in forma di schede, secondo uno schema predefinito, in base alla struttura informativa prevista dalla normativa assestamentale della regione Campania, come richiesto dalle specifiche tecniche descritte nel Capitolato. Ogni particella o sottoparticella è composta da una prima parte che comprende di notizie riguardanti la stazione: località, estensione superficiale, posizione fisiografica, quota, esposizione, pendenza, assetto del suolo, accidentalità. Ad ogni scheda descrittiva (scheda A) è poi associata una seconda parte

[2] Rgolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 - TITOLO III - PIANI DI GESTIONE FORESTALE – P.G.F.

informativa, nella quale si evidenzia in dettaglio la descrizione fisionomico-colturale del soprassuolo; infine vengono indicate le prescrizioni d'intervento per il decennio di validità del Piano.

Tutti i dati rilevati relativi alle particelle forestali sono contenuti in un database geografico, allegato in forma digitale al presente Piano. La descrizione dei popolamenti ha seguito uno schema gerarchico, da un primo inquadramento in macrocategorie di uso del suolo sino alle caratteristiche selvicolturali dei singoli popolamenti. Dopo aver individuato ed aggiornato le categorie d'uso reale del suolo (formazione arborea, formazione arbustiva, formazione erbacea e improduttivi), sono stati rilevati e descritti i tipi fisionomici-strutturali prevalenti, in base alla composizione specifica ed al sistema selvicolturale (boschi cedui e fustaie di faggio, boschi cedui di latifoglie mesofile, pascoli, ecc.). Poiché la struttura attuale di molti boschi del comprensorio assestamentale non è chiaramente riferibile ad una delle forme canoniche di governo e di trattamento, l'attribuzione al sistema selvicolturale è stata subordinata al grado di omogeneità fisionomica, alla destinazione prevalente ed ai conseguenti indirizzi gestionali. Il criterio discriminante è scaturito, quindi, dal modello colturale di riferimento definito sulla base delle caratteristiche ecologiche e selvicolturali dei popolamenti e degli obiettivi di gestione previsti dal progetto.

## Il rilievo inventariale

Il rilievo inventariale è consistito in:

a) cavallettamento totale delle particelle forestali;
b) rilievo con aree di saggio a raggio fisso di 400 $m^2$ di superficie;
c) rilievo LiDAR (*Light Detection and Ranging*).

I rilievi sono stati condotti tra agosto e ottobre 2022 e luglio settembre 2023.

### *a) Cavallettamento totale*

Questo rilievo è stato svolto in particelle forestali costituite da fustaie mature di faggio in fase di rinnovazione in cui nel decennio erano previsti tagli di sgombero, tagli secondari o di sementazione. Ha riguardato, quindi, le seguenti 12 particelle:

**Tabella 20. Particelle sottoposte a cavallettamento totale**

| Particella forestale | Superficie (ettari) |
|---|---|
| 199 | 14,12 |
| 258 | 32,27 |
| 271 | 9,54 |
| 278 | 9,1 |
| 279 | 11,41 |
| 280 | 12,5 |
| 282 | 22,04 |
| 285 | 17,05 |
| 286 | 18,28 |
| 288a | 20,22 |
| 288b | 21,68 |
| **Totale** | **188,21** |

Per una superficie complessiva cavallettata pari a 188,21 ettari.
Il cavallettamento totale è stato fatto con cavalletto dendrometrico misurando il diametro del fusto a monte a petto d'uomo (altezza 130 cm).
La soglia di cavallettamento è stata pari a 7,5 cm.
Le piante cavallettate sono state o segnate con raschietto.

### *b) Rilievo con aree di saggio a raggio fisso di 400 $m^2$*

In ogni area di saggio è stato misurato il diametro di tutti gli alberi a partire da una soglia di cavallettamento di 5 cm ed un campione di 9/10 altezze.
In totale sono state eseguite 1.951 aree di saggio che hanno interessato la totalità dei boschi produttivi e una parte di quelli in fase di ricostituzione ecologica per i quali erano previsti interventi colturali.

Le aree di saggio sono state eseguite nelle seguenti particelle:
3a, 3b, 6, 7, 8, 14, 15, 17, 18, 23, 24, 25, 29a, 30, 31, 32a, 33, 34, 36, 38, 41, 43, 44a, 45a, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 95a, 95b, 96, 98b, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109a, 109b, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 136, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 204, 205a, 205b, 206a, 206b, 206c, 207a, 207b, 208, 209, 210, 211, 212, 215, 220, 221, 222a, 222b, 223a, 223b, 224a, 224b, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 235, 236, 247, 248, 250, 251, 253, 254, 255a, 255b, 256, 257, 259, 260, 261a, 261b, 262, 263, 274, 275, 276a, 276b, 277, 280, 284, 291, 292, 294, 295a, 295b, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308a, 308b, 309, 310, 311.

È stato impiegato un **disegno di campionamento** di tipo sistematico non allineato, analogo a quello adottato nelle Inventario Nazionale delle Foreste e del Carbonio. Con questo disegno, il campione viene scelto seguendo una procedura che combina elementi di casualità iniziale con una struttura regolare di campionamento. L'area interessata dal rilievo campionario è stata, quindi, suddivisa secondo una griglia regolare di celle della superficie di 1,5 ettari. All'interno di ciascuna cella della griglia, è stato selezionato casualmente il punto di campionamento quale centro dell'area di saggio.



**Figura 18. Schema di campionamento: in giallo i punti di campionamento. Ciascun punto è distribuito casualmente all'interno di un quadrato di 1,5 ettari di superficie**

Questo schema di campionamento presenta diversi vantaggi, soprattutto quando è richiesta la raccolta di dati spazialmente distribuiti:

- **riduzione del bias**: il campionamento sistematico non allineato minimizza il rischio di bias legato alla posizione. a differenza del campionamento casuale semplice, dove la selezione può essere influenzata da caratteristiche specifiche del terreno o del contesto, il campionamento sistematico distribuisce i punti di campionamento in modo uniforme, riducendo il rischio che i dati raccolti siano influenzati da anomalie locali.
- **migliore rappresentatività**: distribuendo i punti di campionamento in modo uniforme, questo metodo garantisce una copertura più omogenea dell'area di studio. Questo aumenta la probabilità che il campione rappresenti accuratamente l'intera popolazione o area di interesse, migliorando la qualità e la generalizzabilità dei risultati.
- **efficienza temporale ed economica**: questo metodo può essere più efficiente in termini di tempo e costi rispetto al campionamento casuale. la previsione e la pianificazione dei punti di campionamento possono ridurre il tempo necessario per il campo e ottimizzare l'uso delle risorse.
- **compatibilità con analisi spaziali**: il campionamento sistematico non allineato è particolarmente utile per le analisi spaziali, in quanto i dati raccolti sono distribuiti in modo prevedibile e possono essere facilmente integrati in modelli spaziali e GIS (sistemi informativi geografici). questo facilita l'analisi di pattern e trend spaziali.
- **minore varianza tra i campioni**: rispetto al campionamento casuale semplice, il campionamento sistematico non allineato tende a produrre una minore varianza tra i campioni, poiché i punti di campionamento sono distribuiti in modo più uniforme. Questo può migliorare l'accuratezza delle stime e delle inferenze statistiche.
- **migliore copertura in aree eterogenee**: in aree con variazioni significative nel terreno o nelle caratteristiche ambientali, il campionamento sistematico non allineato può garantire che queste variazioni siano meglio rappresentate nel campione, fornendo dati più dettagliati e affidabili.

- **facilità di ripetizione del campionamento**: questo metodo facilita la ripetizione del campionamento in studi longitudinali o di monitoraggio, poiché i punti di campionamento sono sistematici, è più facile ritornare agli stessi punti in periodi successivi per raccogliere dati comparabili nel tempo.

Al fine di calcolare la provvigione di ciascuna particella forestale interessata dal campionamento sono stati elaborati i dati delle singole aree di saggio, perequando le altezze con l'uso di una funzione semilogaritmica.

I volumi totali delle aree di saggio, dati dalle sommatorie dei volumi delle singole piante, sono stati quindi rapportati ad ettaro e mediati per fornire il dato a livello di particella forestale.

Per determinare con precisione il volume delle particelle cavallettate, è stata perequata una curva ipsometrica specifica per ciascuna particella. Questa curva è stata elaborata utilizzando dati di rilievo di almeno 40 altezze proporzionalmente distribuite nelle diverse classi diametriche.

### *c) Il rilievo LiDAR (Light Detection and Ranging).*

Nei mesi di agosto-settembre 2022, su tutta la superficie del complesso forestale, è stata eseguita la ripresa aerea con camera metrica RGB e il rilievo LiDAR (*Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation*) tramite sensore (*laser scanner*).

Il LiDAR (*Light Detection and Ranging*) è una tecnica di telerilevamento "attivo" per l'esecuzione di rilievi topografici ad alta risoluzione. Il rilievo viene effettuato tramite mezzo aereo sul quale è installato un laser scanner composto da un trasmettitore (essenzialmente un laser), da un ricevitore (costituito da un telescopio), e da un sistema di acquisizione dati. La peculiarità del sistema è l'altissima velocità di acquisizione dei dati abbinata ad un'elevata risoluzione.

Ciò che si ottiene con un rilievo LiDAR è una nuvola di punti, dove ad ogni punto è associato un dato relativo alle coordinate geografiche (sistema WGS 84), alla quota (Z) calcolata sulla base della differenza di tempo intercorsa tra il segnale emesso e quello riflesso ed il valore dell'intensità di segnale riflessa (I). Analizzando i punti riflessi si osserva un ritorno multiplo del segnale, ed in presenza di vegetazione (non eccessivamente densa) il Lidar penetra riflettendo punti a vari livelli della fronda e al suolo.

La nuvola dei punti LiDAR contiene al suo interno informazioni geografiche su tutti gli elementi riflettenti presenti. Poiché il laser acquisisce la posizione di molteplici impulsi, si procede ad una classificazione del volume di dati al fine di attribuire ad ogni singolo punto un significato fisico specifico, discriminando gli impulsi che risultano appartenenti al suolo dagli impulsi classificabili come superfici arboree ed arbustive, elementi antropici quali cavi elettrici, ponti, edifici, automobili, etc.

Dalla nuvola di punti totali si ottiene un Modello Digitale di Superficie (in inglese DSM, *Digital Surface Model*), mentre per elaborazioni successive, che comprendono sia un filtraggio automatico che manuale, si estraggono i soli punti che appartengono al suolo da cui si ottiene un Modello Digitale del Terreno (DTM, *Digital Terrain Model*). Per differenza tra DSM e DTM, per le zone forestali, si ottiene il modello digitale delle chiome (CHM - *Canopy Height Model* – vedi carta dell'altezza dei soprassuoli).

Sussistendo un'elevata correlazione statistica tra altezza delle chiome e volume legnoso di un soprassuolo, il CHM è uno strumento di estrema utilità per il calco della provvigione legnosa dei boschi (vedi carta della provvigione legnosa).

Tali rilievi, oltre a fornire un'immagine aerea (ortofoto) aggiornata, commissionata appositamente per il servizio, hanno consentito di ottenere un notevole incremento della qualità dei

dati dendrometrici relativamente sia al loro grado di accuratezza, sia a livello di singola unità colturale, sia di geolocalizzazione.

In particolare, il rilievo aereo LiDAR ha consentito di ottenere:

- DTM (*Digital Terrain Model*): modello digitale del terreno, ovvero la rappresentazione dell'andamento del terreno;
- DSM (*Digital Surface Model*): modello digitale di superficie, che include edifici e la vegetazione non penetrabile dall'impulso del laser;
- CHM (*Canopy Height Model*): modello digitale delle chiome.

Come accennato, contemporaneamente al rilievo mediante sensore LiDAR è stata realizzata anche la ripresa con camera metrica RGB che ha permesso di realizzare una ortofoto ad alta risoluzione, datata agosto-settembre 2021.

Il modello digitale delle chiome (*Canopy Height Model* - CHM), derivato dal DTM e dal DSM, ha consentito di trarre una serie di dati utili, sia per implementare il set di indicatori delle caratteristiche strutturali e qualitative dei soprassuoli forestali (Tipi strutturali), sia per evidenziare in maniera molto chiara e precisa gli oggetti territoriali extra forestali per la digitalizzazione delle unità omogenee.

Le immagini LiDAR sono state, quindi, utilizzate per leggere in modo più accurato la morfologia del terreno anche sotto copertura arborea (*Hillshade*), e per ricavare informazioni accessorie come esposizioni dei versanti (*Aspect*) e pendenza (*Slope*), e per valutare lo sviluppo del reticolo idrografico e stimare con precisione l'altezza dei soprassuoli (CHM).

I dati derivanti dal rilievo LiDAR sono stati utilizzati per stimare con buona accuratezza la massa volumica presente nei boschi, correlandola con i diversi tipi strutturali. Il dato LiDAR ha offerto, infatti, la possibilità di localizzare ogni singolo popolamento all'interno di una foresta, di misurarne l'altezza e anche l'area occupata. Partendo da queste informazioni, integrabili con l'ortofoto di precisione, e con l'esecuzione di rilievi sul campo, è stato possibile realizzare mappe molto precise di distribuzione degli alberi ma soprattutto dei volumi legnosi nella foresta, elemento molto importante della pianificazione boschiva.

Grazie al rilievo LiDAR è stato possibile redigere una carta dei tipi strutturali (allegata al piano), molto accurata e dettagliata, che ha consentito di stimare e localizzare con precisione i diversi strati campionari in cui è stata suddivisa la foresta ai fini del calcolo della provvigione.

I dati LiDAR sono stati elaborati in ambiente ArcMap; dalla sottrazione algebrica tra *Digital Surface Model* (DSM) e *Digital Terrain Model* (DTM) è stato ricavato il *Digital Crown Model* (DCM), che esprime per ciascun pixel l'altezza della copertura arborea rispetto al terreno.

In corrispondenza delle coordinate di ogni unità campionaria, sul supporto LiDAR CHM è stata individuata un'area circolare di 11,3 m di raggio corrispondente alla superficie dell'unità campionaria individuata al suolo. Una volta prodotti i CHM per le singole aree interessate da punti di campionamento al suolo, sono state estratte con funzionalità GIS di MapAlgebra (statistiche zonali), per l'estensione di ciascuna area di saggio, le principali metriche presumibilmente correlate al volume legnoso: media, mediana, minimo, massimo, deviazione standard dei valori di altezza in metri.

Si è, quindi provveduto, alla ripartizione delle unità campionarie a seconda della composizione in popolamenti di conifere ed in popolamenti di latifoglie. La metrica "media delle altezze CHM" nell'area di saggio è risultata essere la variabile di gran lunga più significativa per spiegare in termini previsionali il volume al suolo attraverso dati LiDAR, come peraltro riscontrato in numerose esperienze precedenti soprattutto quando i dati CHM LiDAR derivino, come nel caso in esame, da scansioni a bassa risoluzione.

La relazione tra i volumi ad ettaro calcolati dalle aree di saggio e le altezze medie derivate dal CHM è stata determinata mediante una semplice funzione di regressione lineare del tipo:

$$V = a + b\ (CHM)$$

Utilizzando le equazioni di regressione è stato possibile stimare il volume locale per ettaro, per ogni pixel del CHM disponibile, in riferimento ad una finestra di analisi pari a 11,3 metri di raggio (ampiezza delle aree di saggio rilevate al suolo). Successivamente, è stata calcolata la media dei valori di volume all'interno delle sottoparticelle forestali, al fine di avere un dato di provvigione medio per ognuna di esse, soprattutto per quelle non erano indagate tramite aree di saggio a terra.

L'esito di tale processo è rappresentato nelle figure e costituisce una sorta di visualizzazione della variabilità spaziale del volume per ettaro a livello di unità colturale.

Tali tipi di rappresentazione possono essere di ausilio sia in fase di progettazione dell'intervento, sia in quella di martellata, per dosare meglio l'entità della ripresa alle singole caratteristiche dei popolamenti e perseguire una più regolare distribuzione dei diversi tipi strutturali nell'ambito dell'unità colturale.

Lo studio della risorsa pascolo è stato condotto con un approccio integrato, nell'ottica di una visione globale dell'economia della zona, che solo in parte può tenere conto della redditività diretta di queste attività. In particolare, le superfici oggetto di studio risultano di particolare interesse per l'elevata valenza ambientale, in termini di biodiversità floristica e paesaggistica.

Una volta cartografate tramite ortofoto, le superfici pascolive sono state oggetto di rilievi in campo, mirati all'individuazione dei seguenti aspetti:

- caratterizzazione della vegetazione di interesse pabulare e stima del potenziale foraggero;
- individuazione delle infrastrutture presenti quali caseggiati, ricoveri per il bestiame, eventuali strutture per la caseificazione e la stagionatura del formaggio, l'approvvigionamento idrico e la presenza di energia elettrica;
- accertamento delle modalità di pascolamento utilizzato e dei carichi presenti;
- accertamento della provenienza dei capi monticati e delle tipologie aziendali interessate alla monticazione;
- reperimento di informazioni di carattere socioeconomico, mediante interviste con interlocutori preferenziali.




**Figura 19. Spazializzazione della provvigione dei boschi mediante LiDAR**

Il metodo di rilievo utilizzato è stato quello definito dal Sottoprogetto 4.2 del P.F. Ri.Selv.Italia, secondo cui la vegetazione viene suddivisa in sei categorie, a diverso valore foraggero noto, in base alla percentuale di presenza delle seguenti tipologie di vegetazione erbacea e arboreo-arbustiva:

- Graminacee pabulari (GP);
- Graminacee non pabulari (GN);
- Leguminose (LE);
- Specie appartenenti ad altre famiglie botaniche (AL);
- Specie spinose o velenose (SV);
- Specie arboree e arbustive (AR).

La stima dei valori pastorali è stata eseguita in 50 (cinquanta) punti di campionamento circolari di 2 metri di raggio, opportunamente georeferenziati con GPS.

## Formazione delle comprese e descrizione generale

In continuità con le pianificazioni precedenti il Piano, pur rivedendo parzialmente la compartimentazione funzionale della foresta sulla base di nuovi vincoli ed esigenze (tutta la proprietà ricade all'interno del Parco dei Monti Picentini e nella ZSC IT8040010 – "Monte Cervialto e Montagnone di Nusco") ne ha conservato la visione strategica di fondo nei principi della durevolezza e della sostenibilità delle modalità di gestione impostate dai precedenti assestatori.

L'assegnazione di una destinazione funzionale alle diverse unità colturali è fondamentale per innestare una strategia, da declinare più nel dettaglio nelle comprese, per raggiungere gli obiettivi prefissati, cercando di soddisfare contemporaneamente diverse esigenze.

La zonizzazione del territorio forestale sulla base della funzione preminente ha tenuto conto del nuovo Decreto Interministeriale sulla pianificazione forestale (28 ottobre 2021 n. 563765) che ha introdotto una notevole semplificazione nel numero delle funzioni, così definite:

- protettiva diretta;
- naturalistica e per la conservazione della biodiversità;
- produttiva;
- sociale e culturale;
- altre funzioni

Come precedentemente accennato, la Foresta ricade all'interno ZSC IT8040010 – "Monte Cervialto e Montagnone di Nusco" per la quale, in base al Piano di Gestione, sono state emanate Misure di conservazione specifiche che disciplinano l'uso delle riserve e che sovraintendono alle consuetudinarie modalità di gestione forestale.

Nel contesto in esame la funzione naturalistica, ovvero il mantenimento delle condizioni di vita per equilibrate popolazioni floristiche e faunistiche, non si pone in inconciliabile contrasto con le altre funzioni assegnate, ma viene assunta come prerequisito imprescindibile ai fini dell'utilizzazione sostenibile delle risorse forestali o ambientali in genere. Dal punto di vista di una gestione forestale sostenibile e multifunzionale, la destinazione assegnata a ciascuna unità gestionale non esclude necessariamente le altre, ma a seconda del contesto può rappresentare o la funzione preminente, o la funzione che rende minimi i conflitti fra le diverse destinazioni possibili. Infatti, ogni sottoparticella può svolgere molteplici funzioni, che coesistono con quella prevalente, e che possono beneficiare delle stesse scelte gestionali.

In particolare, si sottolinea che le particelle a cui viene attribuita una prevalente destinazione produttiva svolgono contemporaneamente anche un'importante funzione naturalistica, di conservazione della biodiversità, e allo stesso tempo protettiva nei confronti dell'erosione e del dissesto idrogeologico. Quest'ultima funzione non viene meno nel momento in cui si eseguono interventi selvicolturali ma, anzi, attraverso l'esecuzione degli stessi è possibile esaltare anche la funzione di protezione che il soprassuolo esercita, perché si favorisce lo sviluppo di piante più stabili, con chiome più ampie e più resistenti nei confronti degli agenti meteorici. Allo stesso modo, un diradamento o un avviamento a fustaia può esaltare la funzione turistico-ricreativa migliorando l'aspetto estetico e la funzionalità del popolamento, e allo stesso tempo garantire un reddito economico all'ente gestore.

L'insieme dei popolamenti, forestali e non, è stato suddiviso in 3 classi funzionali e 7 comprese; queste ultime, distinte in base alle caratteristiche dei soprassuoli e al modello colturale di riferimento. Le superfici relative alle singole comprese sono riepilogate nel prospetto seguente.

**Tabella 21. Compartizione in funzione preminente e in comprese del complesso assestamentale**

| Funzione prevalente | Compresa | Superficie GIS ha | % |
|---|---|---|---|
| Produttiva | A: Fustaia Coetanea di faggio | 2.263,51 | 45,6% |
| | Pascoli | 275,48 | 5,6% |
| Protezione idrogeologica | FD: Fustaia Disetanea di faggio | 392,81 | 7,9% |
| | P: Boschi di protezione | 733,07 | 14,8% |
| Naturalistica conservativa | BV: Boschi vetusti | 39,97 | 0,8% |
| | C: Boschi in ricostituzione ecologica | 1.247,19 | 25,1% |
| Vivaio | V: vivaio forestale | 9,06 | 0,2% |
| **TOTALE SUPERFICIE DELLE COMPRESE** | | **4.961,09** | **100%** |
| Aree nude-praterie etc. - destinate al solo pascolamento ed individuate in cartografia come **"In"** | | 74,82 | |
| **TOTALE COMPLESSIVO** | | **5.035,91** | |

La sintesi degli obiettivi delineati, delle potenzialità e dei vincoli della pianificazione sovraordinata si traduce nella formazione delle comprese, che costituiscono le unità di gestione

organiche della pianificazione assestamentale. Questi comparti operativi risultano costituiti da un insieme di particelle forestali, sufficientemente omogenee per destinazione funzionale obiettivi di gestione, composizione dendrologica e modalità di trattamento. Hanno in comune determinate caratteristiche, derivanti:

- dalla preminenza di una funzione specifica, che ne condiziona le modalità gestionali e conseguentemente la scelta di eventuali interventi selvicolturali;
- da oggettive riscontranze ecologiche e/o selvicolturali e/o stazionali e/o economiche (tipo vegetazionale, equilibrio ecologico, forma di governo, condizioni stazionali, macchiatico, condizioni di degrado, ecc.).

Nell'ambito della stessa funzione (Tabella 21) le comprese sono discriminate sulla base del modello colturale di riferimento, definito sulla base della composizione dendrologica (intesa in senso ampio), delle modalità di trattamento selvicolturale e del tempo di ritorno. Soltanto per alcune di esse (Fustaia Coetanea di faggio e Fustaia Disetanea di faggio) è stato possibile definire un modello selvicolturale completo sulla base dei parametri indicati. Negli altri casi, per le caratteristiche delle formazioni vegetali che le costituiscono, le comprese sono state considerate principalmente come un insieme di popolamenti, anche relativamente eterogenei, in cui con una gestione ponderata della realtà, basata su interventi colturali non rigidamente vincolati a un modello di riferimento strettamente definito, sarà comunque possibile raggiungere gli obiettivi prefissati. Ciò consentirà sia di erogare continuativamente un insieme di beni e servizi, sia di ridurre nel tempo eventuali elementi di non conformità.

Come emergerà più chiaramente nei paragrafi successivi, per le caratteristiche ecologiche selvicolturali contingenti, in questa prima fase dell'assestamento sono state istituite soltanto due comprese tipiche. Probabilmente, nelle successive fasi dell'assestamento, per alcune comprese speciali potranno essere disposte modalità di intervento finalizzate al raggiungimento del modello colturale di riferimento, ed assurgere così al rango di comprese tipiche.

Alla destinazione funzionale **produttiva** sono state assegnate le formazioni forestali dislocate in stazioni accessibili, di discreta o buona fertilità, prive di limitazioni di ordine idrogeologico o conservazionistico, nelle quali non risulti preminente un'altra funzione. Le superfici assegnate a questa funzione hanno una estensione complessiva 2.263,51. pari al 45% della superficie dell'intero complesso forestale, e sono in grado di ospitare popolamenti arborei capaci, per caratteristiche colturali e provvigionali, di produrre periodicamente diversi assortimenti legnosi.

Alla stessa funzione sono state assegnate anche le superfici che, per caratteristiche stazionali, possono essere destinate permanentemente alla produzione zootecnica mediante il pascolo degli animali domestici. Si tratta, peraltro, di formazioni vegetali di notevole interesse conservazionistico riferibili per gran parte all'habitat 6510 – "Praterie magre da fieno a bassa altitudine ad *Alopecurus pratensis e Sanguisorba officinalis":* un habitat floristicamente diversificato tipico delle piane intermontane della zona. La superficie di questa compresa è pari a 275,48 ettari corrispondente al 5% del complesso assestamentale.

La superficie complessiva destinata alla funzione di **protezione idrogeologica** è di 1.125,88 ettari pari al 22% del complesso assestamentale. In tale destinazione vi rientrano due tipi molto diverse di Comprese: la Fustaia Disetanea di faggio e i Boschi di protezione. La Compresa della Fustaia Disetanea di faggio fu istituita da Patrone nel "Piano di Assestamento dei Boschi del Comune di Bagnoli Irpino" per il decennio 1959-1968, sulle pendici del Cervarolo che si affacciano sul Piano Laceno. L'obiettivo era salvaguardare le sorgenti della Tronola e proteggere il sottostante villaggio.

Nel successivo Piano di Assestamento[3] Tale compresa è stata estesa alle pendici più acclivi della Rajamagra ove i boschi assolvono anche ad un'importante funzione estetica e turistica.

Alla Compresa denominata dei "Boschi di Protezione" sono state assegnate tutte le particelle ubicate in stazioni molto vulnerabili, molto acclivi, e talora in precario equilibrio fisico o biologico, in cui sono controindicate modalità di gestione basate sulle ordinarie utilizzazioni forestali. Si tratta di una "Compresa speciale ad evoluzione naturale controllata" nella quale l'attività selvicolturale è eventualmente limitata ad interventi contingentemente necessari (tagli fitosanitari o di stabilizzazione), senza però escludere la possibilità di formulare un programma di interventi di apporto (semina o piantagioni) o di agevolazione dello sviluppo naturale. Vi ricadono, pertanto, anche boschi piuttosto eterogenei per composizione dendrologica ma che svolgono un'importante azione di difesa del suolo dall'erosione e delle colture sottostanti, prevalentemente castagneti, dal rotolio dei massi.

Nell'ambito della destinazione funzionale **naturalistica e conservativa** sono state istituite tre Comprese: Boschi vetusti, Boschi in ricostituzione ecologica, Praterie; complessivamente occupano una superficie di 1.361,98 pari a poco meno del 27% della superficie assestamentale.

La compresa dei "Boschi vetusti" istituita per finalità strettamente conservative, può definirsi come una compresa speciale ad evoluzione naturale incontrollata. È costituita da boschi di faggio dislocati sulle pendici più alte del Cervarolo che, ormai da più di un secolo, si sviluppano in assenza di interventi umani significativi, consentendo un'evoluzione naturale degli ecosistemi.

Nella compresa dei "Boschi in ricostituzione ecologica" per la preminenza delle caratteristiche stazionali su quelle dendrologico-strutturali, sia per motivi prettamente assestamentali-gestionali, includono diversi tipi di bosco. Questi sono in parte riconducibili alle serie di degradazione delle faggete, sia arborei che arbustivi, e in parte derivano da rimboschimenti effettuati in un passato, più o meno remoto, di cui talora permangono solo alcuni lembi. Queste caratteristiche conferiscono a questo comparto una forte eterogeneità compositiva e selvicolturale.

Sempre alla funzione naturalistica e conservativa è stata designata la compresa delle Praterie alla quale è assegnato il compito di conservazione/ripristino dell'habitat 6210 "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*)". Complessivamente interessa una superficie di 74,82 ettari

## Cap. 7.1 - Classe economica A: Fustaia coetanea di faggio

### Descrizione delle caratteristiche della Classe economica

Questa compresa si estende su 2.263,51 ettari (corrispondente a circa il 45% del totale della superficie assestamentale), ed è dislocata prevalentemente nel settore centro-meridionale della proprietà boschiva comunale. Nella zona nord questi boschi hanno una distribuzione meno continua e più frammentata, localizzata in poche aree fresche e fertili, esposte prevalentemente a settentrione.

[3] Piano di Assestamento dei Boschi del Comune di Bagnoli Irpino per il decennio 1984, 1993 – Bertani R., Morgante L. Oradini A.



**Figura 20. Distribuzione dei boschi della Compresa A**

Le aree boschive di maggiore estensione si dispiegano sui rilievi di Montagna Grande, delle Ripe del Moggio e del Vallone della Neve. Coprono in particolare le pendici più basse del Cervialto, rivolte a ovest e a sud, e quelle di Valle Bona, che dalla Rajamagra scendono fino a incontrare il Piano dei Vaccari e i boschi del Comune di Acerno. Un nucleo boschivo di minore estensione si estende sul versante del Cervarolo, affacciandosi sul Piano di Sazzano.

La Compresa A è costituita da 125 particelle (Scheda 2), situate tra una quota minima di 1.000 m s.l.m. e una quota massima di 1.675 m s.l.m. All'interno di questi limiti altitudinali, la faggeta si ritrova in tutte le esposizioni, con una prevalenza di versanti esposti a nord est. Il grafico radar indica, infatti, una distribuzione anisotropica della superficie territoriale in relazione all'orientamento cardinale. La maggiore esposizione è osservata lungo l'asse Nord-Est, seguita da Nord-Ovest ed Est, confermando una predominanza di superfici orientate verso queste direzioni. Le minori esposizioni sono rilevate lungo gli assi Sud e Sud-Ovest, indicando una presenza ridotta di superfici disposte verso tali quadranti.




**Figura 21. distribuzione anisotropica della superficie**

I boschi insediati sui versanti più dolci, con pendenza inferiore al 20%, interessano circa il 30% della superficie totale; quelli su pendici debolmente acclivi, con pendenze moderate comprese tra il 20 ed il 40%, sono distribuiti in modo abbastanza uniforme per circa il 25% della superficie totale; le zone moderatamente acclivi, con pendenza tra il 40 ed il 60%, si attestano al 20%.




**Figura 22. Rappresentazione della superficie della Compresa A in classi di pendenza**

I boschi che occupano pendici acclivi (tra il 60 ed il 70%) e molto acclivi (con pendenza maggiore del 70%) si riscontrano prevalentemente in alcuni tratti di Valle Bona e nelle particelle della compresa che dispiegano sulle alte pendici del Cervialto esposte ad ovest (Figura 22). Rispettivamente, queste ultime due classi di pendenza interessano circa il 20 ed il 15% della superficie della compresa.

I suoli della Compresa A, come già precedentemente descritto, sono costituiti da materiali piroclastici che poggiano su un basamento calcareo. Presentano una serie di caratteristiche distintive che li rendono particolarmente fertili e molto produttivi: sono molto porosi, permettendo un eccellente drenaggio; sono ricchi di minerali essenziali come potassio, fosforo e magnesio, che favoriscono la crescita delle piante; hanno pH neutro o leggermente alcalino che migliora la disponibilità di nutrienti; possiedono, infine, una notevole capacità di trattenere l'acqua, mantenendo un equilibrio ottimale che supporta le piante anche durante periodi di siccità.

I boschi della Compresa A sono generalmente ben serviti da strade e piste forestali. Tuttavia, alcune zone rimangono difficilmente accessibili e potrebbero essere migliorate recuperando sentieri e piste storiche. Nel capitolo dedicato alla viabilità, si entrerà nel dettaglio delle caratteristiche delle infrastrutture esistenti, con particolare attenzione allo stato di manutenzione. Verranno inoltre evidenziate le necessità di intervento per migliorare l'accessibilità delle aree boschive.

Riguardo alla composizione dendrologica, il faggio (*Fagus sylvatica*) è di gran lunga la specie più abbondante, rappresentando una presenza significativa rispetto a tutte le altre specie. Anche l'agrifoglio (*Ilex aquifolium*) è piuttosto comune, sebbene in quantità molto inferiore rispetto al faggio. È molto frequente nelle particelle 79, 167, 192 dove in alcuni casi crea ostacolo alla rinnovazione del faggio, e nelle particelle 166 e 230.

Sono meno frequenti il carpino nero (*Ostrya carpinifolia*), relegato alle zone più xeriche dei suoli più superficiali, e l'ontano napoletano (*Alnus cordata*), diffuso soprattutto nelle esposizioni sud. Nelle stazioni più termofile si riscontrano anche l'acero opalo (*Acer opalus*), l'orniello (*Fraxinus ornus*) e qualche cerro (*Quercus cerris*): quest'ultimo dove il suolo è abbastanza profondo. Il maggiociondolo (*Laburnum anagyroides*) è presente a diverse altitudini mentre l'acero montano (*Acer pseudoplatanus*) si riscontra isolato, alle quote più elevate, con il sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*). Da segnalare, tra gli aceri, la presenza dell'Acero di Lobel (*Acer lobelii*), che sembra diffondersi con una certa facilità, e il tasso (*Taxus baccata*), più diffuso nella zona sud della compresa. Sono rari l'olmo campestre (*Ulmus minor*), il pioppo tremolo (*Populus tremula*) e l'acero campestre (*Acer campestre*). Gli arbusti, per la densa copertura esercitata dal faggio sono rari: si riscontrano soltanto qualche nocciolo (*Corylus avellana*), qualche biancospino (*Crataegus monogyna*) e la dafne (*Daphne laureola*).

Tra le specie erbacee, le più presenti sono le graminacee *Melica uniflora, Brachypodium sylvaticum, Festuca ovina, Festuca heterophylla, Festuca sylvatica e Dactylis glomerata* che formano tappeti densi dove le condizioni sono più xeriche. Dove, invece, il terreno rimane fresco più a lungo, si riscontra una flora nemorale esigente, come *Stellaria* sp., *Oxalis* sp., *Asperula* sp., *Sanicula* sp., *Viola* sp., *Lamium galeobdolon*, *Allium ursinum* e *Geranium striatum*, *Vinca minor*. Nelle stazioni oligotrofiche si registra un'ampia diffusione della *Luzula sylvatica*.

L'intera superficie della Compresa A ricade nell'area protetta Parco Regionale del Monti Picentini istituita nel 1995. È gestita dall'Ente Parco Regionale dei Monti Picentini, che è responsabile della conservazione attiva del suo patrimonio naturale e culturale. Come già accennato, rientra inoltre nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT8040010 - "Monte Cervialto e Montagnone di Nusco".

## Particelle forestali della Classe economica

Le particelle sono elencate a parte, nell'allegato Schema 2.

## Determinazione della provvigione

### *Rilievi tassatori e provvigione reale*

Come precedentemente descritto, la provvigione reale è stata ottenuta attraverso un rilievo inventariale articolato, che ha previsto le seguenti fasi:

### *a) Cavallettamento delle Particelle Forestali*

Il cavallettamento totale è stato eseguito in particelle forestali costituite da fustaie mature di faggio o in fase di rinnovazione, nelle quali si prevede di eseguire tagli finali di maturità nel corso del decennio. In totale sono state interessate 11 particelle forestali, per una superficie complessiva cavallettata di 188,21 ettari.

**Tabella 22. Rilievo tassatorio per cavallettamento totale**

| N° Part | Superficie ettari | Numero totale soggetti | Area basimetrica totale $m^2$ | Volume totale $m^3$ | Numero soggetti ad ettaro | Area basimetrica ad ettaro $m^2$ | Volume ad ettaro $m^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 14,12 | 8.549 | 719 | 9.892,12 | 605 | 50,9 | 700,6 |
| 258 | 32,27 | 15.605 | 1.494 | 18.502,59 | 484 | 46,3 | 574,4 |
| 271 | 9,54 | 3.869 | 477 | 7.543,93 | 406 | 50,0 | 791,2 |
| 278 | 9,1 | 4.611 | 350 | 3.968,63 | 507 | 38,5 | 449,7 |
| 279 | 11,41 | 4.157 | 458 | 8.059,76 | 364 | 40,1 | 706,6 |
| 280 | 12,5 | 5.467 | 536 | 12.445,64 | 437 | 42,9 | 995,4 |
| 282 | 22,04 | 6.510 | 656 | 12.975,58 | 295 | 29,8 | 602,4 |
| 285 | 17,05 | 5.391 | 512 | 9.760,98 | 316 | 30,1 | 578,7 |
| 286 | 18,28 | 10.373 | 803 | 11.678.64 | 567 | 43,9 | 641,1 |
| 288a | 20,22 | 11.801 | 752 | 11.978,22 | 584 | 37,2 | 598,7 |
| 288b | 21,68 | 10.611 | 1.070 | 16.976,21 | 489 | 49,4 | 787 |
| **Totale** | **188,21** | **82.264** | **7.585** | **123.782,31** | | | |

Il rilievo è stato condotto utilizzando un cavalletto dendrometrico, con il quale è stato misurato il diametro del fusto a monte a petto d'uomo, ossia ad un'altezza di 130 cm, a partire da una soglia di cavallettamento di 12,5 cm. Le piante misurate sono state segnate con raschietto.

Oltre al cavallettamento totale, sono state rilevate le altezze di un campione di almeno 40 alberi per ogni particella, distribuiti tra le varie classi di diametro. Per queste misurazioni, è stato utilizzato lo strumento Haglöf Vertex.

### *b) Rilievo con Aree di Saggio a Raggio Fisso di 400 $m^2$*

Le aree di saggio a raggio fisso di 400 $m^2$ sono state utilizzate per ottenere dati dettagliati e rappresentativi delle particelle forestali. Queste aree sono state distribuite sulla base di un disegno sistematico non allineato per coprire l'intera superficie delle particelle in esame, garantendo un campionamento rappresentativo e privo di bias.

In totale nella compresa sono state eseguite 1327 aree di saggio che hanno interessato 112 particelle (6, 7, 14, 15, 60, 79, 81, 95a, 95b, 96, 109a, 109b, 110, 111, 115, 117, 118, 127, 128, 129,

133, 134, 142, 143, 144, 145, 146, 150, 151, 152, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 173, 174, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 198, 204, 205b, 208, 209, 211, 212, 215, 220, 221, 222a, 223a, 224b, 225, 228, 229, 230, 232, 233, 235, 236, 247, 248, 250, 251, 253, 254, 255a, 255b, 256, 257, 259, 260, 261a, 261b, 262, 263, 274, 275, 276a, 276b, 277, 280, 284, 291, 292, 294, 295a, 295b, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308a, 308b, 309, 310, 311). Al fine di ottenere una stima il più accurata possibile dei dati di volume, anche ai fini della spazializzazione con l'impiego del LiDAR, in ogni area di saggio è stato raccolto un campione di dieci altezze per la costruzione della curva ipsometrica.

**Tabella 23. Dati ottenuti dal campionamento**

| N° ads | N/ha | G/ha | V/ha |
|---|---|---|---|
| 1327 | 907 | 47,7 | 598 |
| | | | |
| *Dev standard* | 538 | 13 | 230 |
| *E standard* | 14,8 | 0,4 | 6,3 |
| *E%* | 1,6 | 0,8 | 1,1 |

Il numero medio di alberi per ettaro è risultato pari a 907, indicando una densità relativamente alta. Tuttavia, la deviazione standard di 538 suggerisce una significativa variabilità nella densità degli alberi tra le diverse aree di saggio, che va posto in relazione alle diverse fasi di sviluppo dei popolamenti. L'errore standard calcolato è di 14,8, con un errore percentuale di 1,6%. Questo basso valore di errore percentuale indica che la stima del numero medio di alberi per ettaro è molto precisa.

L'area basimetrica ha una media di 47,7 $m^2$/ha, che è decisamente elevata. La deviazione standard è di 13, mostrando una moderata variabilità tra le aree di saggio. L'errore standard è di 0,4 e l'errore percentuale è di appena 0,8%, a riscontro di una stima estremamente precisa.

Il volume medio di legno per ettaro è stato stimato in 598 $m^3$/ha, un valore che riflette una considerevole quantità di legname disponibile. La deviazione standard è di 230, suggerendo una notevole variabilità del volume tra le diverse aree di saggio. L'errore standard calcolato è di 6,3 e l'errore percentuale è dell'1,1%, indicando una stima del volume medio per ettaro molto precisa.

In sintesi, i dati mostrano una stima accurata e rappresentativa delle caratteristiche del bosco campionato. Nonostante la variabilità osservata nei dati tra le diverse aree di saggio, le basse percentuali di errore indicano che le stime ottenute sono affidabili. Questo livello di precisione è fondamentale per una gestione sostenibile delle risorse forestali, permettendo decisioni informate sulla pianificazione e l'uso delle foreste.

Per la determinazione del volume degli alberi sono state utilizzate:

- per il faggio, una tavola dendrometrica a doppia entrata appositamente redatta sulla base di 107 alberi modelli rilevati mediante Laser Scanner Terrestre (TLS), una tecnica avanzata di misurazione e mappatura tridimensionale che utilizza la tecnologia del laser per ottenere dati dettagliati sulle caratteristiche del fusto e dei rami degli alberi;
- per l'ontano napoletano la "Tavola dendrometrica dell'Ontano Napoletano cresciuto in fustaia coetanea" redatte da M. Cantiani (1959), applicando la correzione di altezza;
- per gli aceri la "Tavola dendrometrica dell'Acero Montano cresciuto in fustaia coetanea" redatte da M. Cantiani (1959), applicando la correzione di altezza;
- per le specie meno diffuse sono state applicate le tavole dell'INFC.

## *c) Spazializzazione del Volume mediante LiDAR*

La spazializzazione del volume è stata realizzata impiegando dati LiDAR (*Light Detection and Ranging*). I dati LiDAR, combinati con le misurazioni sul campo, hanno fornito una rappresentazione precisa del volume complessivo all'interno delle particelle forestali.

### Analisi dendrometrica e strutturale dei soprassuoli

Le condizioni dei soprassuoli della compresa sono abbastanza varie, e si è ritenuto opportuno fornirne un quadro sufficientemente dettagliato per poter pianificare interventi di gestione forestale mirati e adeguati alle specifiche esigenze di ciascuna area, garantendo così la sostenibilità e l'ottimizzazione delle risorse disponibili.

In base ai rilievi dendrometrici effettuati, è stata condotta un'analisi di ciascuna classe strutturale, al fine di ottenere una visione specifica della variabilità interna dei dati dendrometrici. Di seguito viene presentata la distribuzione quantitativa risultante da tale analisi.




**Figura 23. Ripartizione della superficie della Compresa A in tipi strutturali**

Il grafico di Figura 23 rappresenta la distribuzione della superficie forestale in funzione delle diverse classi strutturali, evidenziando come la superficie occupata dai popolamenti varia a seconda della loro fase di sviluppo. Le spessine, con un'altezza compresa tra 4 e 8 metri, occupano una porzione di territorio estremamente ridotta, pari a soli 7 ettari. Le perticaie giovani, con altezze tra 8 e 12 metri, coprono una superficie di 16 ettari, mentre le perticaie adulte, con altezze tra 12 e 16 metri, si estendono su 65 ettari. Questi dati indicano che le fasi iniziali del ciclo colturale occupano apparentemente una porzione relativamente limitata del territorio e probabilmente sottostimata. Ciò si deve alla presenza di numerosi popolamenti in cui coesistono ancora piante del vecchio ciclo colturale che, sulla base dell'altezza prevalente, si trovano classificate negli stadi di sviluppo adulti o maturi.

Il passaggio alle fustaie giovani, con altezze comprese tra 16 e 20 metri, mostra un significativo incremento della superficie, che raggiunge i 193 ettari. Questo incremento continua nelle fustaie adulte (20-24 metri), che occupano 313 ettari, e raggiunge il suo massimo nelle fustaie mature con altezze comprese tra 24 e 28 metri, che coprono 405 ettari. La predominanza di queste classi strutturali mature evidenzia che la maggior parte della superficie forestale è occupata da popolamenti in una fase avanzata di sviluppo, caratterizzati da una struttura complessa e consolidata.

Nelle fustaie mature con altezze comprese tra 28 e 32 metri, la superficie occupata diminuisce leggermente a 322 ettari, mentre nelle fustaie con altezze superiori a 32 metri, si osserva una riduzione più marcata, con una copertura di 67 ettari. Questo decremento nelle classi di massima altezza suggerisce che, sebbene esista una porzione significativa di popolamenti forestali maturi, solo una parte relativamente ridotta ha raggiunto l'apice dello sviluppo strutturale in termini di altezza.

Nel complesso, il grafico sottolinea come la superficie forestale sia prevalentemente dominata da popolamenti maturi, con una presenza minore di classi giovanili e molto mature, indicando una distribuzione delle classi strutturali che potrebbe richiedere specifici interventi selvicolturali per mantenere l'equilibrio del bosco e assicurare la sostenibilità del suo ciclo di crescita.




**Figura 24. Numero di alberi medio ad ettaro per tipo strutturale e relativa variabilità**

L'analisi del numero di alberi per tipo strutturale, come evidenziato nel grafico in Figura 24, mostra la variazione del numero di piante varia funzione dello stadio di sviluppo delle formazioni boschive. Nelle spessine e nelle perticaie giovani, l'apparente scarsa numerosità delle piante è dovuta alla presenza di numerosi esemplari che non raggiungono la soglia di rilevamento standard. Si tratta di dati indicativi che fanno riferimenti a soggetti del vecchio ciclo colturale o a nuclei di prerinnovazione.

Il numero medio di piante raggiunge il suo picco nelle perticaie adulte (12-16 metri), con 1.378 esemplari per ettaro, segnalando una densità particolarmente elevata in questa fase intermedia di sviluppo. Presentano un valore mediano del numero di piante leggermente inferiore a 1.500 individui per ettaro, accompagnato da una maggiore variabilità rispetto alle perticaie giovani, evidenziando una distribuzione dei dati più ampia.

Con il passaggio alle fustaie giovani (16-20 metri), il numero medio di piante inizia a diminuire principalmente per effetto della selezione naturale, attestandosi a 1.274 esemplari per ettaro, segno che inizia a verificarsi una riduzione della densità a favore della crescita individuale degli alberi. Registrano un valore mediano del numero di piante appena superiore a 1500, con una variabilità simile a quella delle perticaie adulte, ma con una distribuzione dei dati leggermente più estesa.

Le fustaie adulte (20-24 metri) mostrano un'ulteriore riduzione nel numero medio di piante, che scende a 1.126 esemplari per ettaro. Mostrano un valore mediano del numero di piante di circa 1300 per ettaro, caratterizzato da un'elevata variabilità e una distribuzione dei valori più eterogenea.

La tendenza discendente continua nelle fustaie mature (24-28 metri), con 857 esemplari per ettaro, e nelle fustaie mature con altezze comprese tra 28 e 32 metri, che registrano 651 esemplari per ettaro.

Infine, le fustaie mature, con altezze superiori a 32 metri, mostrano il numero medio di piante più basso, pari a 450 esemplari per ettaro. Questa riduzione significativa riflette la fase avanzata di sviluppo, in cui la densità degli alberi è drasticamente diminuita a causa della mortalità naturale e dei diradamenti, lasciando spazio a pochi individui di grandi dimensioni che dominano la foresta.




**Figura 25. Area basimetrica media ad ettaro per tipo strutturale e relativa variabilità**




**Figura 26. Volume medio ad ettaro per tipo strutturale e relativa variabilità**

Anche dall'analisi congiunta dei dati relativi all'area basimetrica e al volume nelle diverse classi strutturali (Figura 25 e Figura 26), emerge un quadro coerente sull'evoluzione strutturale delle formazioni boschive.

Le perticaie giovani (h 8-12 m) presentano i valori mediani più bassi, sia per l'area basimetrica, che si attesta intorno a 25 $m^2$/ha, sia per il volume, con circa 200 $m^3$/ha. Queste classi mostrano una variabilità relativamente contenuta, con pochi valori estremi, indicando una struttura piuttosto uniforme e omogenea.

Nelle perticaie adulte (h 12-16 m), si osserva un incremento sia dell'area basimetrica, che raggiunge una mediana di 40 $m^2$/ha, sia del volume, che si attesta intorno ai 400 $m^3$/ha. La variabilità aumenta rispetto alle perticaie giovani, con una distribuzione dei dati più ampia, suggerendo una crescente diversificazione strutturale man mano che gli alberi maturano.

Le fustaie giovani (h 16-20 m) mostrano un'ulteriore crescita, con un'area basimetrica mediana che supera i 50 $m^2$/ha e un volume mediano poco superiore ai 500 $m^3$/ha. Anche la variabilità continua ad aumentare, con una distribuzione dei valori più ampia ed eterogenea, riflettendo un processo di sviluppo in cui le differenze individuali tra gli alberi diventano più pronunciate.

Nelle fustaie adulte (h 20-24 m), l'area basimetrica mediana sale a circa 55 $m^2$/ha, mentre il volume mediano si attesta intorno ai 600 $m^3$/ha. In questa fase, la variabilità continua a crescere, indicando un'evoluzione verso una struttura forestale più complessa e diversificata.

Le fustaie mature (h 24-28m) presentano un'area basimetrica mediana di circa 60 $m^2$/ha e un volume mediano intorno ai 700 $m^3$, con un notevole incremento della variabilità e la presenza di numerosi valori estremi. Questo suggerisce che, in questa fase di sviluppo, la foresta ha raggiunto un elevato grado di complessità strutturale, con una significativa diversificazione delle caratteristiche degli alberi.

Nelle fustaie mature con altezze comprese tra 28 e 32 metri, l'area basimetrica mediana aumenta ulteriormente a circa 65 $m^2$/ha, mentre il volume mediano raggiunge i 900 $m^3$/ha. Questa classe presenta una distribuzione ancora più ampia e una variabilità significativa, segnalando una maggiore eterogeneità nella struttura degli alberi.

Infine, le fustaie mature con altezze superiori a 32 metri mostrano un'area basimetrica mediana leggermente inferiore, intorno ai 60 $m^2$/ha, mentre il volume mediano è il più elevato tra tutte le classi, superando i 1.000 $m^3$/ha. La variabilità rimane alta, con un range di dati molto ampio e numerosi valori estremi, indicando una struttura forestale estremamente diversificata e complessa.

In sintesi, con l'aumentare dell'altezza e della maturità delle formazioni boschive, si osserva un progressivo incremento sia dell'area basimetrica che del volume mediano, accompagnato da un aumento della variabilità all'interno delle classi. Questo fenomeno suggerisce una crescente eterogeneità strutturale nelle foreste più alte e mature, dove le differenze tra gli alberi diventano più marcate e la complessità della struttura forestale raggiunge il suo apice.

Di seguito si riporta una sintesi per gli stadi di sviluppo più significativi dei dati esposti:

**Perticaie giovani (h 8-12 m)**

I popolamenti ricadenti in questa classe si estendono su soli 43 ettari e si ritrovano in massima parte nell'area sudorientale del complesso, oltre che sui versanti con esposizioni nord e su tutta la lunghezza di alcuni crinali. La classe presenta in media 990 piante per ettaro, un volume medio di circa 130 $m^3$/ha ed un'area basimetrica di 22,7 $m^2$/ha, da cui è stato calcolato un diametro medio di 17,1 cm.

Quest'ultimo dato, in particolare, indica che il popolamento è composto prevalentemente da alberi giovani o poco sviluppati e può presupporre la possibilità di interventi di diradamento selettivo per favorire la crescita delle piante migliori. Mettendo in relazione questi dati con le tavole alsometriche di Cantiani, ci troviamo in una situazione di ottima fertilità e si delinea la necessità di effettuare dei tagli di diradamento dove non sono ancora stati effettuati.



### Perticaie adulte (h 12-16 m)

I popolamenti ricadenti in questa classe si estendono per quasi 154 ettari e si ritrovano maggiormente nelle esposizioni sud dei versanti distribuiti in modo maggioritario nell'area meridionale del complesso, ma presenti su tutto il territorio. La classe presenta in media 1.378 piante per ettaro, un volume medio di quasi 310 $m^3$/ha ed un'area basimetrica di 39,9 $m^2$/ha, da cui è stato calcolato un diametro medio di 19,2 cm.
Si tratta di popolamenti in crescita, nei quali, se non si è già intervenuti, si può supporre di intervenire con diradamenti anche di modesta intensità per diminuire il numero delle piante per ettaro, al fine di lasciar sviluppare al meglio le piante in miglior stato, nonostante dal raffronto con le tavole alsometriche ci troviamo di fronte a popolamenti di ottimo sviluppo e mediamente equilibrati tra numero di piante e accrescimenti diametrici.



### Fustaie giovani (h 16-20 m)

Questa classe strutturale, estesa su poco più di 300 ettari, è presente su tutto il territorio, ma si incontra sui versanti esposti a nord ed est nella parte settentrionale del complesso e nelle aree prossime alla sommità dei rilievi e sui medi versanti nella parte meridionale. La classe presenta in media 1.274 piante per ettaro, un volume medio di circa 430 $m^3$/ha ed un'area basimetrica di 44,9 $m^2$/ha, da cui è stato calcolato un diametro medio di 21,2 cm.
Anche per questa classe strutturale, laddove non si sia già intervenuti, si prefigura la possibilità di attuare dei tagli di diradamento per diminuire la densità dei popolamenti e la competizione tra i singoli individui per assicurare uno sviluppo adeguato alle piante con le migliori caratteristiche, dal momento che il numero di piante ad ettaro è mediamente alto.



### Fustaie adulte (h 20-24m)

Le fustaie adulte vegetano sulle pendici meno acclivi e sui medi versanti dei rilievi del complesso, indipendentemente dall' esposizione e comunque sparse su tutto il territorio per un totale di 513 ettari. La classe presenta in media 1126 piante per ettaro, un volume medio di circa 530 $m^3$/ha ed un'area basimetrica di 47,5 $m^2$/ha, da cui è stato calcolato un diametro medio di 23,2 cm.
Se in questa categoria strutturale si riscontrano popolamenti nei quali non sono ancora stati effettuati tagli di diradamento, questi si rendono assolutamente necessari. Il numero delle piante per ettaro di questa categoria mostra la presenza di numerosi popolamenti che necessitano tagli di diradamento.



### Fustaie mature (h 24-28m)

Le fustaie mature con altezze comprese tra 24 e 28 metri si riscontrano maggiormente nelle aree di valle della porzione centro meridionale del complesso e a fondo delle pendici nella parte meridionale, mentre sono poco rappresentate nella zona settentrionale. In totale, l'estensione di questa classe nella compresa è di 671 ettari. La classe presenta in media 857 piante per ettaro, un volume medio di circa 650 $m^3$/ha ed un'area basimetrica di 49,5 $m^2$/ha, da cui è stato calcolato un diametro medio di 27,1 cm.
Si tratta, quindi, di popolamenti ben sviluppati nei quali la concorrenza tra individui va scemando a favore della stabilità del popolamento e del suo sviluppo sia in altezza che in diametro. I popolamenti in cui sono stati effettuati i tagli intercalari si presentano con ottimi sviluppi, mentre sono necessari i tagli laddove non sono ancora stati eseguiti.



## Fustaie mature (h 28-32m)

Le fustaie mature con altezze comprese tra 28 e 32 metri si trovano negli ampi fondivalle dell'area meridionale del complesso, dove la fertilità è alta e il suolo abbondante, per un totale di 542 ettari. La classe presenta in media 651 piante per ettaro, un volume medio di circa 750 $m^3$/ha ed un'area basimetrica di 51,4 $m^2$/ha, da cui è stato calcolato un diametro medio di 31,7 cm.
I popolamenti che ricadono in questa classe presentano sviluppi molto buoni ed accrescimenti elevati.



## Fustaie mature (h >32m)

Le fustaie mature con altezze superiori ai 32 metri si trovano nei fondivalle e nelle vallecole più fertili delle aree centrale e meridionale del complesso. La classe si estende per 144 ettari e presenta in media 450 piante per ettaro, un volume medio di quasi 800 $m^3$/ha ed un'area basimetrica di 48,8 $m^2$/ha, da cui è stato calcolato un diametro medio di 37,1 cm.
I popolamenti che ricadono in questa classe presentano sviluppi molto buoni, ma la diminuzione dell'area basimetrica rispetto alla classe precedente è indice di popolamenti in cui gli accrescimenti tendono a diminuire indicando la presenza di popolamenti giunta alla piena maturità.



## Il modello colturale di riferimento

Un modello colturale di riferimento ben definito non solo facilita la gestione sostenibile della foresta, ma anche la realizzazione degli obiettivi ecologici ed economici a lungo termine, garantendo al contempo la resilienza del sistema forestale agli impatti ambientali e alle pressioni antropiche.

La costruzione di un modello colturale rappresenta una fase cruciale nella gestione forestale, poiché fornisce le basi per la pianificazione degli interventi e la previsione dello sviluppo futuro della foresta. Questo processo richiede l'integrazione di diversi strumenti e concetti tecnici, tutti volti a garantire che la gestione si allinei con gli obiettivi prefissati, mantenendo allo stesso tempo la sostenibilità ecologica ed economica della foresta.

Il punto di partenza nella costruzione del modello colturale è definito da quattro parametri fondamentali:

- composizione dendrologica, da intendersi anche in senso piuttosto lato;
- turno;
- modello di sviluppo (o di coltivazione) che indica la normalità strutturale-colturale alle diverse età e che, pertanto, è chiaramente legato anche al sistema dei diradamenti da adottare;
- submodello di rinnovazione.

Sulla base dei rilievi eseguiti in foresta e dall'analisi della vegetazione potenziale, la composizione dendrologica di questi soprassuoli può essere individuata in una foresta di faggio, in cui questa specie vegeta prevalentemente in purezza. Altre specie, come l'ontano napoletano, gli aceri (montano, di Lobel e opalo), l'olmo montano, la betulla, il tasso e l'agrifoglio, per quanto la loro presenza debba essere favorita, non dovrebbero superare, in condizioni normali, una presenza superiore al 5 - 10%.

Questa formazione forestale è stata sottoposta, da circa un secolo, alla gestione tramite tagli successivi uniformi: presenta, perciò, una struttura monostratificata che, contrariamente a quanto avviene in altri ecosistemi forestali, rappresenta la condizione naturale di questo tipo di bosco. Le faggete, specialmente in certe condizioni ambientali e climatiche, tendono naturalmente a sviluppare popolamenti omogenei, dove gli alberi, prevalentemente della stessa specie e classe di età, si distribuiscono uniformemente in altezza e diametro. In questo contesto, la monostratificazione non è il risultato di una gestione forestale che ha impoverito la diversità strutturale, ma piuttosto un'espressione della dinamica ecologica tipica delle faggete: ciò suggerisce che l'ecosistema è in equilibrio con le pratiche di gestione adottate e con le condizioni ambientali locali. Il trattamento a tagli successivi uniformi, codificato e descritto da Cantiani, è in grado di dare risultati molto soddisfacenti, sia sotto l'aspetto selvicolturale sia economico.

Questa modalità di trattamento coincide sostanzialmente con le indicazioni delle tavole alsometriche redatte dallo stesso Autore per le faggete dell'Irpinia. Queste tavole, basate su dati raccolti attraverso rilievi forestali, permettono di stimare l'evoluzione di vari parametri selvicolturali come l'altezza dominante, il diametro medio, l'area basimetrica e la massa legnosa, in funzione dell'età del popolamento. Le tavole forniscono quindi una guida per prevedere il comportamento della foresta sotto diverse condizioni di gestione, e sono essenziali per pianificare gli interventi futuri in modo razionale ed efficace.

Confrontando i dati raccolti sul campo con i modelli delle tre classi di fertilità previsti dalle tavole si è riscontrata una sostanziale coerenza con le curve delle altezze. Le tavole di Cantiani sono state quindi adottate come riferimento per la costruzione del modello per la faggeta di questa compresa.




**Figura 27. Curva della massa totale per le classi di fertilità delle faggete dell'Irpinia, in blu la curva adottata per le fustaie della compresa.**




**Figura 28. Variazioni dell'incremento medio di massa totale**

Dall'analisi dei valori tabulari delle altezze medie con quelli ottenuti dalle numerose aree di saggio realizzate, è stato possibile elaborare un modello colturale dalle caratteristiche intermedie tra le seconda e la terza classe di fertilità (Figura 27). La tavola così ottenuta evidenzia una certa stabilità nell'incremento medio della massa totale a partire dai 120 anni.

Questo dato consente di fissare a 140 anni l'età media degli alberi destinati al taglio di sementazione. Il submodello di rinnovazione, che verrà approfondito successivamente, prevede un periodo di 20 anni per consentire alla rinnovazione di raggiungere una densità sufficiente a garantire lo sviluppo regolare degli stadi successivi.

Adottare un turno di 140 anni in una faggeta situata all'interno di un'area protetta offre una serie di vantaggi significativi, sia dal punto di vista ecologico che per i servizi ecosistemici che la foresta è in grado di fornire. Innanzitutto, un ciclo di vita così lungo permette agli alberi di accumulare una maggiore quantità di biomassa, con un notevole incremento dello stoccaggio di carbonio. Questo processo è essenziale per mitigare il cambiamento climatico, poiché le foreste mature agiscono come potenti serbatoi di carbonio, trattenendolo nel legno, nelle radici e nel suolo per periodi prolungati.

Inoltre, l'adozione di un turno di 140 anni favorisce la conservazione della biodiversità. Le foreste più antiche offrono habitat diversificati e complessi, indispensabili per molte specie che dipendono da tali ambienti per sopravvivere. Cavità nei tronchi, un sottobosco ben sviluppato e altre caratteristiche tipiche delle foreste mature sono cruciali per garantire la presenza e la sopravvivenza di una vasta gamma di specie, contribuendo così alla ricchezza biologica dell'area protetta.

Dal punto di vista della protezione del suolo, le foreste mature offrono una copertura vegetale più consistente, che aiuta a ridurre l'erosione e a mantenere l'integrità del suolo. Questo è particolarmente importante nelle aree protette, dove la conservazione del suolo è essenziale per preservare la qualità dell'acqua e prevenire il degrado ambientale.

In termini di servizi idrologici, le faggete mature giocano un ruolo fondamentale nel regolare il ciclo dell'acqua, migliorando la ritenzione idrica e riducendo il rischio di inondazioni. Un turno più lungo permette alla foresta di sviluppare una copertura vegetale che filtra e assorbe l'acqua, contribuendo a mantenere l'equilibrio idrico dell'ecosistema.

Oltre agli aspetti ecologici, le foreste mature hanno un valore paesaggistico e ricreativo elevato, offrendo un potenziale maggiore per attività ecoturistiche e ricreative in armonia con la conservazione dell'ambiente. Questo contribuisce a valorizzare l'area protetta non solo dal punto di vista naturale, ma anche socioeconomico.

Stabilito il turno in 140 anni, il trattamento prevede una serie di diradamenti e di tagli finali di maturità che seguono fedelmente le indicazioni di Cantiani.

*Il modello di sviluppo*

**Età 20 anni**: In questa fase si esegue un eventuale taglio di sfollamento accompagnato da una ripulitura. L'obiettivo è eliminare le piante soprannumerarie, difettose, estranee o superdominanti, migliorando la qualità complessiva del popolamento forestale.

**Età 30, 45, 60, 80, 100 anni**: In questi intervalli di tempo si effettuano diradamenti bassi di intensità moderata. Lo scopo è eliminare gradualmente quasi completamente il piano dominato e subdominato, intervenendo saltuariamente sugli alberi intermedi subdominanti, soprattutto quelli difettosi o situati in gruppi troppo fitti.

**Età 120 anni**: A questo stadio, si procede con un diradamento basso ma piuttosto intenso. Questo intervento sopprime completamente il piano dominato e si estende anche al piano dominante, con l'obiettivo di eliminare principalmente le piante malformate e difettose.

La scelta di questo metodo è guidata da considerazioni economiche e selvicolturali. Nei primi stadi di vita della fustaia, è preferibile mantenere una densità di copertura sufficiente per favorire l'allungamento e prevenire l'eccessiva ramificazione dei fusti. Solo a partire dal sessantesimo anno si possono intensificare i diradamenti, mantenendoli comunque moderati per evitare un'eccessiva apertura delle chiome, che potrebbe causare una rinnovazione precoce o una trasformazione del suolo con l'insediamento di un sottobosco ricco che potrebbe ostacolare la rinnovazione naturale della faggeta.




**Figura 29. Sviluppo della massa (totale, corrente e principale) e intensità e periodicità dei diradamenti e dei tagli di rinnovazione**

*Il sub modello di rinnovazione*

Nella faggeta è frequente osservare la presenza di plantule nelle annate successive a quelle di pasciona, anche in aree dove il soprassuolo presenta un'elevata densità. Generalmente, annate di buona produzione di seme si verificano regolarmente ogni 8-10 anni, sebbene l'intensità della produzione possa variare. Annate di pasciona in Irpinia possono essere anche più frequenti, tuttavia, a causa del cambiamento climatico si stanno verificando annate di produzione sempre più scarsa.

Comunque, nonostante gli effetti della siccità, storicamente, nelle faggete dell'Irpinia con condizioni ecologiche favorevoli, la rinnovazione si stabilisce in modo abbondante e rapido quando si riduce la copertura del soprassuolo con tagli di sementazione ben dosati. Il novellame, estremamente fitto, cresce rapidamente fin dai primi anni di vita, raggiungendo altezze significative (fino a 3 metri) già a 15 anni nelle stazioni più fertili.

Questo grande potere rigenerativo del faggio consiglia di contenere in un periodo breve i tagli di rinnovazione che possono essere graduati come segue:

- Un **taglio di sementazione a 140 anni,** di intensità tale da ridurre la massa legnosa del 30% portandola da $m^3$ 734 a $m^3$ 514.
  Questo intervento interesserà il 50% circa delle piante esistenti e cadrà preferibilmente sui soggetti del piano dominato, aduggiati e poco sviluppati in diametro che non danno affidamento di svolgere la funzione riproduttiva e non sono idonei a sostenere l'isolamento dei tagli secondari. Se il taglio viene eseguito correttamente l'insediamento del novellame avverrà in modo rapido e sicuro. Pertanto, si decide di omettere il taglio di preparazione, che sarebbe invece necessario nelle fustaie dove non sono stati effettuati i diradamenti periodici.

- Un **taglio secondario a 150 anni,** dosato in modo da ridurre la massa legnosa a 309 $m^3$. In questo caso, se il novellame si è insediato uniformemente sulla superficie, il taglio avrà soprattutto il carattere di un taglio di luce, e andranno preferibilmente soppresse le piante dominanti ramose e a chioma più ampia, che sarebbe sconsigliabile conservare per tutto il periodo della rinnovazione non solo per la loro azione aduggiante, ma soprattutto perché provocherebbero all'atto dello sgombro danni al novelleto ben più gravi in quanto non ne possano arrecare ora che il novelleto è giovanissimo e in fase d'insediamento.

- A dieci anni dal taglio secondario (trascorsi, quindi, 20 anni dal taglio di sementazione e verificatisi almeno tre annate di pasciona) si può supporre che la densità della rinnovazione sia tale da garantire un regolare sviluppo della nuova generazione. Si potrà quindi procedere al **taglio di sgombero** (360 $m^3$) che comunque dovrebbe avvenire quando la nuova generazione, sufficientemente densa, abbia raggiunto un'altezza media di 1,0-1,5 m. Il periodo di rinnovazione previsto dal submodello è quindi di 20 anni. Evidentemente potranno verificarsi dei casi in cui lo sgombero può avvenire in tempi più brevi, soprattutto per evitare eccessivi danni alla nuova generazione, o essere ulteriormente procrastinato, là dove la crescita sia stata particolarmente lenta. È importante che nell'esecuzione dei tagli di rinnovazione si cerchi di garantire una regolare distribuzione spaziale dei soggetti da rilasciare, che andranno scelti fra quelli che presentano chiome regolarmente sviluppate.

*La produzione potenziale*

La produzione potenziale della compresa è stata stimata con la tavola alsometrica rappresenta graficamente in Figura 29, applicando la formula dei trapezi.

Da quanto è indicato nella Tabella 24 la provvigione normale presente su una compresa estesa tanti ettari quanti sono gli anni del turno è pari a 55.488 $m^3$. La provvigione normale di tutta la compresa risulta pertanto:

$$P_n = \frac{55.448}{140} x 2.263,51 = 896.479,30 \text{ m}^3$$

L'incremento corrente di massa principale della compresa di 140 ettari è:

$$Ic_p = 220+253+369 = 842$$

Mentre quello della massa intercalare, realizzabile con i diradamenti, è di:

$$Ic_c = 22.5+42+58+67+70.5+71.5 = 331,5$$

Su tutta la compresa gli incrementi sono pertanto pari a;

$$Ic_p = \frac{842}{140} x 2.263,51 = 13.613,40 \text{ m}^3$$

$$Ic_c = \frac{331.5}{140} x 2.263,51 = 5.359,67 \text{ m}^3$$

$$Ic_{TOT} = Ic_p + Ic_p = 18.973,06 \text{ m}^3$$

L'incremento percentuale ($I_p$), cioè il saggio di accrescimento naturale, risulta quindi:

$$I_p = \frac{18.973,6}{896.479,3} x 100 = 2,12\%$$

**Tabella 24. Calcolo della provvigione normale**

Modello di sviluppo

| Massa principale | | | Massa intercalare | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Età | m³ | | Età | | m³ |
| 10 | 12 | | 12 | | |
| 20 | 44 | | 44 | | |
| 30 | 91 | 22,5 | 91 | 22,5 x 15 | 337,5 |
| 40 | 149 | | 149 | | |
| 45 | | 42 | | 42 x 7,5 | 315,0 |
| 50 | 215 | | 215 | | |
| 60 | 278 | 58 | 278 | 58 x 7,5 | 435,0 |
| 70 | 343 | | 343 | | |
| 80 | 406 | 67 | 406 | 67 x 10 | 1.005,0 |
| 90 | 463 | | 463 | | |
| 100 | 514 | 70,5 | 514 | 70,5 x 1 | 1.057,5 |
| 110 | 560 | | 560 | | |
| 120 | 601 | 71,5 | 601 | 71,5 x 1( | 1.072,5 |
| 130 | 635 | | 635 | | |
| 140 | 734 | | 367 | | |
| | | | 4.676 x 10 = | 46.760 | 4.222,5 |

Sub modello di rinnovazione

| Prima del taglio | | Dopo il taglio | | |
|---|---|---|---|---|
| 140 | | 514 | | |
| 150 | 562 | | = 1.075,6 x 5 | 1.075,6 |
| 150 | | 309 | | |
| 160 | 369 | | = 3389,9 x 5 | 3.389,9 |
| | | | | 4.465,5 |

Provvigione della serie dei tagli di 140 ettari

| | | |
|---|---|---|
| Massa principale | 46.760+4,465,5 = | 51.225,5 |
| Massa intercalare | | 4.222,5 |
| | | 55.448,0 |

## Confronto tra stato potenziale e reale

Nonostante il tipo di trattamento applicato, ormai da molti decenni, abbia sempre fatto riferimento ai tagli successivi nell'applicazione pratica, si riscontrano sovente sostanziali difformità rispetto ai principi teorici del trattamento. Una delle problematiche più frequenti è quella di eseguire i primi tagli con finalità economiche, asportando tutte le piante migliori, colpendo soprattutto il piano dominante. Questa modalità di intervento porta spesso a un prelievo eccessivo, che supera il 50% del volume, privilegiando le piante di maggiori dimensioni. Di conseguenza, il novellame non riesce a insediarsi uniformemente su tutta la superficie. Al contrario, negli spazi vuoti più illuminati, si sviluppano densi e compatti strati di specie erbacee nitrofile o gramineti, a seconda dell'esposizione dei versanti.

Il ritardo nell'affermazione della rinnovazione e la scarsa qualità delle piante disseminatrici compromettono ulteriormente la situazione. Spesso, per mancanza di convenienza economica, i tagli secondari e di sgombero vengono omessi o eseguiti con ritardo. Quando questi tagli vengono finalmente effettuati su spessine adulte o perticaie, l'abbattimento e l'esbosco delle piante del vecchio ciclo provocano danni significativi, come stroncamenti del giovane popolamento. Questo compromette la qualità del soprassuolo, che risulta dominato da fenotipi peggiori e soggetti contorti e cresciuti in condizioni sfavorevoli.

I tagli, inoltre, non hanno interessato tutta la superficie della particella, ma spesso le utilizzazioni si sono limitate ai soprassuoli più ricchi di provvigione e di facile accesso in cui è stata concentrata l'intera ripresa prevista. Va inoltre osservato che molte particelle, estendendosi dal fondo valle fino al crinale, presentano popolamenti con fasi di sviluppo diverse, dovute alla variazione nella profondità del suolo lungo il pendio.

La formazione delle classi cronologiche non si è limitata a un semplice esercizio di classificazione basato su dati registrati in passato con un certo grado di approssimazione. Al contrario, ha considerato attentamente lo stato di sviluppo dei diversi popolamenti che compongono la particella, assegnando a ciascuna di esse un'età stadiale ponderata, coerente con le necessità colturali dei soprassuoli. Tale ricollocazione ragionata ha previsto:

- di assegnare alla classe precedente rispetto alla loro età presunta i soprassuoli a sviluppo ritardato con trend di crescita limitati e in ritardo rispetto alle altre particelle;
- di collocare nella classe successiva, rispetto a quella di pertinenza della loro età, particelle a sviluppo chiaramente accelerato rispetto alle altre;
- di assegnare un'età basata sul tempo previsto per la loro utilizzazione (taglio di sementazione) a quelle particelle biplane o monostratificate, ma composte da soprassuoli in due fasi di sviluppo (es. fustaia matura su perticaia adulta) a causa di tagli rinnovazione avviati ma mai completati.

La distribuzione dei soprassuoli della compresa in classi cronologiche di 20 anni di ampiezza, illustrata nella tabella seguente, permette di metterne in evidenza lo stato di forte anomalia che la caratterizza.

**Tabella 25. Distribuzione in classi cronologiche**

| Situazione | Classi cronologiche | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - 20 | 21 - 40 | 41 - 60 | 61 - 80 | 81 -100 | 101-120 | 121-140 |
| normale | 323,36 | 323,36 | 323,36 | 323,36 | 323,36 | 323,36 | 323,36 |
| reale | 243,27 | 145,74 | 73,79 | 168,99 | 300,71 | 923,07 | 407,94 |
| | | | | | | | |
| Differenza | -80,09 | -177,62 | -249,57 | -154,37 | -22,65 | 599,71 | 84,58 |

Ad un elevata concentrazione di superficie nella classe adulta (101-120), ed in minor misura matura (121-140), corrisponde una scarsa presenza di soprassuoli giovani o di età intermedia.




**Figura 30. Differenza fra la distribuzione, normale e reale, della superfice della compresa in classi cronologiche**

Tale anomalia trova riscontro anche nel notevole divario tra provvigione reale e provvigione normale messo in evidenza dal rapporto:

$$\frac{\text{PR}}{\text{PN}} = \frac{1.345.578}{896.479} = 1{,}50$$

L'eccesso di provvigione reale rispetto alla provvigione normale può essere attribuito principalmente a due fattori.

In primo luogo, la mancanza di diradamenti adeguati ha portato a un accumulo eccessivo di biomassa all'interno dei popolamenti forestali. Quando i diradamenti non vengono eseguiti o sono insufficienti, gli alberi competono intensamente per le risorse, portando a un aumento del numero di individui e della quantità di legno presente, senza però garantire un ottimale sviluppo delle singole piante.

In secondo luogo, l'elevata estensione della classe di età 101-120 anni ha contribuito in maniera significativa a questo eccesso. Questa classe, caratterizzata da alberi maturi che hanno accumulato una grande quantità di biomassa, rappresenta una porzione significativa della foresta. L'ampia estensione di questa classe di età ha quindi amplificato l'eccesso di provvigione reale rispetto a quella normale, poiché la mancanza di interventi di gestione, combinata con la maturità avanzata di queste foreste, ha portato a una situazione in cui la quantità di legno presente è ben al di sopra dei livelli considerati ottimali per una gestione forestale sostenibile.

## Determinazione della ripresa

La ripresa è stata determinata seguendo un metodo colturale orientato anteponendo le esigenze selvicolturali dei singoli popolamenti al disegno di normalizzazione planimetrica e provvigionale della foresta. Nel definire gli interventi si è comunque cercato di orientare l'evoluzione del soprassuolo verso la composizione dendrologica, il tipo colturale e la struttura definite dal modello colturale di riferimento. A questo scopo la ripresa planimetrica è stata calcolata utilizzando il metodo planimetrico organico delle classi cronologiche.

Per garantire la sostenibilità della produzione, è stato elaborato un piano orientativo dei tagli a lungo termine. Questo piano, tenendo conto della notevole longevità del faggio, che conserva una

buona capacità di disseminazione fino e oltre i 200 anni, consente di applicare immediatamente una ripresa planimetrica reale pari a quella normale. Tale approccio permetterà di evitare potenziali deficit di produzione previsti a partire dal 2044, quando i soprassuoli attualmente appartenenti alla classe cronologica 81-100 anni, e quelli della classi successive, raggiungeranno la maturità.

**Tabella 26. Piano orientativo a lungo termine**

| Distribuzione planimetrica | Classi cronologiche | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - 20 | 21 - 40 | 41 - 60 | 61 - 80 | 81 -100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 |
| Normale (ha) | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | | | |
| Reale (ha) 2024 | 243 | 146 | 74 | 169 | 301 | 923 | 408 | | | |
| 2024-2043 | 323 | 243 | 146 | 74 | 169 | 301 | 923 | 85 | | |
| 2044-2063 | 323 | 323 | 243 | 146 | 74 | 169 | 301 | 684 | | |
| 2064-2083 | 323 | 323 | 323 | 243 | 146 | 74 | 169 | 301 | 361 | |
| 2084-2103 | 323 | 323 | 323 | 323 | 243 | 146 | 74 | 169 | 301 | 38 |
| 2104-2123 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 243 | 146 | 74 | 169 | 15 |
| 2124-2143 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 243 | 80 | | |
| 2144-2164 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | | | |

La ripresa planimetrica nel decennio, relativa al taglio di sementazione che si effettua allo scadere del turno, risulta pertanto pari a 323/2 = 162 ettari.

La ripresa volumetrica indicativa decennale, risultante dalla somma degli interventi eseguiti secondo criteri esclusivamente colturali, è stata quantificata in 192.410 $m^3$, corrispondente a una ripresa media annua di 19.241 $m^3$. Questo valore supera di 268 $m^3$ la ripresa normale, una differenza marginale che è comunque giustificata dall'eccesso di provvigione reale evidenziato nel capitolo precedente.

Se del resto si usa come indicatore l'entità della provvigione calcolata con alcune delle formule dei metodi provvigionali risulta:

Patrone: 28.326 $m^3$

Hundeshagen: 28.217 $m^3$

A conferma di una scelta molto prudenziale.

## Piano dei tagli e modalità operative

Come risulta dai dati riportati nella Tabella 27, che riassume gli interventi previsti e riportati nello schema 3 riportato nel capitolo 17, nel decennio di validità del piano dovrebbe essere percorsa dai tagli una superficie di 1.303, 3 ettari per un volume di 19.241 $m^3$. Di questi ultimi, circa un terzo deriva da tagli finali di maturità e due terzi da diradamenti.

**Tabella 27. Riassunto degli interventi previsti**

| Tipo di intervento | Superficie (ha) | Volume $m^3$ |
|---|---|---|
| Taglio di sementazione | 152,6 | 29.080 |
| Tagli secondari | 213,0 | 42.330 |
| Diradamenti | 937,7 | 119.960 |
| Totale | 1303,3 | 191.370 |

Il **taglio di sementazione** interessa 152,6 ettari, con un volume di prelievo pari a 2.908 $m^3$. Questo tipo di intervento, finalizzato alla rinnovazione naturale della foresta, è generalmente limitato in estensione ma critico per il mantenimento della struttura forestale e la continuità ecologica. Il volume, relativamente modesto, estratto in questa fase riflette la prudenza necessaria per preservare la capacità di rigenerazione del bosco.
Il taglio di sementazione è un intervento chiave per garantire la sostenibilità delle foreste: quando eseguito con cura e competenza, non solo assicura la rigenerazione naturale del bosco, ma anche la preservazione della sua biodiversità, la stabilità del suolo e la capacità della foresta di continuare a fornire servizi ecosistemici essenziali per le generazioni future. La sua corretta applicazione è, pertanto, un elemento fondamentale nella gestione forestale sostenibile. I tagli effettuati fino ad ora, mirati alla rimozione delle piante migliori, asportando più del 50% del volume del bosco, hanno in alcuni casi pregiudicato il processo naturale (particelle di Sazzano), in altri hanno allungato il periodo di rinnovazione determinando un notevole disordine colturale all'interno delle particelle (versante sud del Cervialto). È essenziale riconoscere questi errori e applicare le modalità di intervento descritte da Cantiani, che di nuovo si riportano, come linee guida fondamentali per ristabilire l'equilibrio colturale, favorire la rigenerazione naturale e assicurare una gestione forestale sostenibile e resiliente nel tempo:

> *"Il taglio di sementazione dovrà interessare il 50% circa delle piante esistenti e cadrà* ***sui soggetti del piano dominato, aduggiati e poco sviluppati in diametro*** *che non danno affidamento di svolgere la funzione riproduttiva e non sono idonei a sostenere l'isolamento dei tagli secondari."*

Queste modalità promuovono un approccio più equilibrato e selettivo, mirato a conservare la biodiversità, migliorare la struttura del bosco e preservare le piante di qualità per garantire la continuità e la salute della foresta per le future generazioni.

I **tagli secondari** coprono una superficie maggiore di 213,0 ettari, con un prelievo di 4.337 $m^3$. Questi interventi, che seguono il taglio di sementazione, sono essenziali per garantire lo sviluppo del novellame. I tagli secondari previsti devono essere eseguiti con l'obiettivo di portare a termine, nei termini stabiliti, il processo di rinnovazione avviato con il taglio di sementazione. In questo caso specifico, tali interventi assumono un'importanza ancora maggiore poiché devono anche correggere gli errori commessi in passato, dove la rimozione selettiva delle migliori piante ha compromesso la struttura e la qualità del soprassuolo. Di conseguenza, sarà necessaria una notevole perizia e competenza da parte di chi effettuerà la martellata.

Il taglio dovrà essere attentamente modulato sulle caratteristiche stazionali e dovrà tenere conto dell'andamento della rinnovazione in ogni area specifica della foresta. In alcuni tratti, dove la rinnovazione è già ben affermata, il taglio potrà assumere la forma di un piccolo sgombero, rimuovendo gli alberi residui per liberare spazio e luce per le nuove piantine. In altre aree, dove il novellame si è appena insediato o è in fase di insediamento, sarà necessario un taglio di luce, permettendo alle giovani piante di crescere e affermarsi sotto protezione.

Infine, in quelle zone dove non si è intervenuti con il taglio di sementazione precedente, sarà necessario procedere con un nuovo taglio di sementazione. Questo intervento permetterà di avviare il processo di rinnovazione, garantendo che l'intera area forestale possa rigenerarsi in modo uniforme e sostenibile.

La riuscita dei tagli secondari dipenderà dalla capacità di adattare gli interventi alle condizioni specifiche di ogni tratto della foresta. Questo richiede un approccio flessibile, basato su un'attenta osservazione e una profonda conoscenza delle dinamiche forestali. Solo così sarà possibile correggere gli errori del passato e garantire che il processo di rinnovazione si concluda con successo, assicurando la stabilità e la sostenibilità del bosco nel lungo termine.

La componente più significativa in termini di superficie e volume è rappresentata dai **diradamenti**, che interessano 937,7 ettari e da cui si ottiene un volume di 11.996 $m^3$. I diradamenti rivestono un ruolo fondamentale nella formazione di soprassuoli stabili e longevi. Questi interventi non solo permettono di selezionare i migliori fenotipi, favorendo la crescita di alberi più robusti e di qualità superiore, ma offrono anche l'opportunità di intervenire sulla composizione dendrologica del bosco. Attraverso i diradamenti, è possibile promuovere la presenza di specie sporadiche, spesso sottorappresentate, contribuendo così ad arricchire la biodiversità dell'ecosistema forestale. Questa maggiore diversità biologica rende il soprassuolo più resiliente ai cambiamenti climatici (eventi meteorici estremi) e agli attacchi di parassiti, aumentando la stabilità ecologica complessiva.

I diradamenti previsti, caratterizzati da un macchiatico positivo, hanno inoltre il potenziale di migliorare il valore economico del bosco. Questi interventi consentono infatti di ottimizzare la qualità e la quantità di legname disponibile, migliorando la redditività a lungo termine senza compromettere la sostenibilità ecologica. Consegnare alle future generazioni un bosco più stabile ed economicamente interessante è uno degli obiettivi principali di una gestione forestale oculata e lungimirante.

Oltre ai benefici diretti per il bosco, i diradamenti possono servire come un'eccellente opportunità formativa per le ditte di utilizzazione forestale che non sono ancora completamente strutturate. Questi interventi, che non richiedono un elevato grado di meccanizzazione e non sono particolarmente impegnativi, permettono alle aziende più piccole o alle nuove realtà di acquisire esperienza sul campo. Questo "apprendistato operativo" è cruciale per costruire una base di competenze tecniche che potrà essere applicata in contesti più complessi in futuro.

Nell'esecuzione dei diradamenti si dovrà procedere secondo le modalità descritte nel modello colturale di riferimento, con interventi moderati dal basso che avranno, tuttavia, un'intensità superiore di quella prevista per recuperare la mancanza di interventi precedenti.

Il primo passo nel diradamento basso è l'identificazione delle piante da rimuovere. L'attenzione si dovrà concentrare sugli alberi più piccoli, deboli e malformati, che competono con le piante dominanti. Questi alberi, ombreggiati e con scarso accesso alla luce, sono destinati a crescere lentamente e a sopperire nella competizione per risorse disponibili (luce, acqua, sostanze minerali). L'eliminazione di queste piante permette di liberare spazio vitale e risorse per gli alberi dominanti e codominanti, che hanno un potenziale di crescita più elevato. Si tratta di un intervento che sostanzialmente anticipa la selezione naturale coerente con la gestione di una foresta che ricade in un'area protetta.

Il fatto che i diradamenti costituiscano la maggior parte del volume prelevato suggerisce una gestione orientata a lungo termine, volta a migliorare la qualità del bosco piuttosto che a massimizzare il rendimento immediato. Questo approccio, sebbene più conservativo nel breve periodo, è essenziale per assicurare la stabilità e la resilienza delle foreste in un contesto di cambiamenti ambientali e climatici.

Dal momento che tutti i tagli previsti hanno un carattere eminentemente colturale, è fondamentale prevedere, già in fase di assegnazione del taglio, l'introduzione di una penalità per i casi in cui una parte degli interventi previsti o delle superfici programmate non venga effettivamente interessata. Questa misura è necessaria per garantire che le ditte esecutrici rispettino integralmente il piano di gestione forestale, evitando che si concentrino solo sulle aree più facilmente accessibili o economicamente vantaggiose. Come già accennato, la ripresa volumetrica è da considerarsi indicativa, a differenza di quella planimetrica che è vincolante. Pertanto, anche eventuali riprese leggermente superiori (fino al 10%) rispetto a quelle stabilite possono essere considerate accettabili, purché siano eseguite correttamente dal punto di vista colturale.

L'obiettivo principale è assicurare una gestione equilibrata e sostenibile del bosco, evitando che il legname venga prelevato soltanto nelle zone più comode, il che potrebbe portare a un disordine colturale e compromettere gli obiettivi ecologici a lungo termine. L'introduzione di una penalità serve da deterrente, incoraggiando le ditte a eseguire i lavori su tutta la superficie prevista, rispettando i criteri di ripresa distribuiti in modo omogeneo.

In questo modo, si contribuisce a mantenere la qualità del soprassuolo, a preservare la biodiversità e a garantire che gli interventi abbiano il giusto impatto su tutta l'area interessata, evitando concentrazioni di prelievi che potrebbero destabilizzare la struttura del bosco.

## Cap. 7.2 - Classe economica FD: Fustaia Disetanea di faggio

### Descrizione delle caratteristiche della Classe economica

La compresa della Fustaia Disetanea di faggio si estende su 22 particelle, coprendo una superficie complessiva di 392,81 ettari.



**Figura 31. Distribuzione dei boschi della compresa "Fustaia Disetanea di faggio" all'interno del demanio comunale**

Istituita da Patrone nel Piano di Assestamento del 1959-1968, questa compresa rappresenta uno dei primi esempi di applicazione di questo metodo di gestione per le faggete dell'Appennino. Originariamente, la compresa comprendeva esclusivamente le faggete situate sul versante occidentale del Monte Cervarolo, con l'obiettivo di proteggere il sottostante Villaggio Laceno e di fornire una funzione di protezione idrogeologica per la Sorgente Tronala.

Nel Piano di Assestamento successivo, sono state incluse anche alcune particelle del Monte Rajamagra, localizzate su versanti acclivi esposti a nord, ampliando così l'area di gestione. Nell'attuale Piano, la compresa è stata ulteriormente estesa per includere le particelle che occupano i versanti, scoscesi e più alti, del Monte Cervialto.

Pur non presentandosi come un unico corpo senza elementi di discontinuità al suo interno, si possono distinguere due comparti caratterizzati principalmente dall'esposizione e secondariamente dalla morfologia. Il comparto Cervarolo - Cervialto raggiunge la quota più elevata a 1.804 m s.l.m. in prossimità della vetta del Monte Cervialto (1.808 m s.l.m.) e quella meno elevata (1.052 m s.l.m.) in corrispondenza del vivaio della Tronola; l'esposizione è prevalentemente ad Ovest e le pendenze sono molto elevate, soprattutto sul fianco del Cervialto, mentre i versanti del Cervarolo hanno pendenze più contenute che aumentano con il procedere della quota altimetrica. Il raggruppamento centrale, invece, occupa una vasta area compresa tra 1.097 m s.l.m. e 1.667 m s.l.m. che si dispiega prevalentemente sul versante esposto a nord del Monte Ria Magra.




**Figura 32. Rappresentazione della superficie della Compresa B in classi di pendenza**

Per le caratteristiche morfologiche di questi versanti, l'obiettivo principale dell'istituzione di questa compresa è la difesa idrogeologica; tuttavia, essa svolge anche una significativa funzione paesaggistica. I boschi del Monte Cervarolo, infatti, hanno un impatto visivo significativo su Piano Laceno, contribuendo in maniera sostanziale alla bellezza e alla percezione estetica del paesaggio circostante. D'altra parte, i boschi della Rajamagra sono situati in prossimità della zona della seggiovia e degli impianti sciistici, aree di grande rilevanza turistica e ricreativa.

Considerata la doppia funzione di queste aree boschive (protezione idrogeologica e valorizzazione paesaggistica) è fondamentale adottare un modello colturale che risponda efficacemente a entrambe le finalità. Da un lato, la gestione forestale deve garantire la stabilità del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, frane e altre problematiche legate all'instabilità del terreno, che potrebbero avere conseguenze negative sia per la sicurezza del territorio sia per le infrastrutture presenti. Dall'altro lato, è essenziale preservare e migliorare l'estetica del paesaggio, mantenendo un bosco ben curato, armonioso e che si integri con il contesto turistico, particolarmente nelle aree vicine agli impianti sciistici e alle zone frequentate dai visitatori.

Da un punto di vista dendrologico, la composizione di questa Compresa è analoga a quella della Compresa A. Il faggio (*Fagus sylvatica*) costituisce la specie largamente dominante di questi soprassuoli in cui tuttavia si riscontrano, ma soltanto allo stato sporadico, i sorbi (*Sorbus aucuparia*, e *S. aria*), l'acero montano (*Acer pseudoplatanus*), l'acero opalo (*A. opalus*), il salicone (*Salix caprea*) e, limitatamente ad alcune particelle poste alle quote inferiori, l'orniello (*Fraxinus ornus*), il carpino nero (*Ostrya carpinifolia*) e il cerro (*Quercus cerris*). Anche queste ultime specie, nell'ambito della faggeta, si rinvengono generalmente come sporadici soggetti isolati. Il pino nero (*Pinus nigra*) è presente nella particella 112 dove forma un popolamento abbastanza esteso derivante da un vecchio rimboschimento ma ormai in evoluzione verso la faggeta. Più consistente la presenza dell'ontano napoletano (*Alnus cordata*), talora con più soggetti vicini.

Le specie arbustive più diffuse sono l'agrifoglio *(Ilex aquifolium),* ma quasi sempre con esemplari solati, non forma popolamenti estesi come nella Compresa A, il rovo *Rubus hirtus* e la *Daphne laureola.* La presenza delle specie erbacee è limitata ai tratti in cui la copertura arborea consente la penetrazione di sufficiente luce diffusa o diretta; generalmente si tratta di specie a foglia larga di bassa e media statura, di regola distribuite a chiazze. Tra le più diffuse, che talora caratterizzano anche in senso fisionomico la faggeta, vanno annoverate: *Anemone apennina, Ruscus aculeatus, Ajuga reptans, Allium ursinum, Anemone apennina, Arisarum proboscideum, Arum italicum ssp. Italicum, Asperula taurina ssp. Taurina, Campanula trachelium ssp. Trachelium, Cardamine bulbifera, Cardamine enneaphyllos, Digitalis micrantha, Dioscorea communis, Doronicum columnae, Epipactis helleborine, Euphorbia amygdaloides, Geranium robertianum, Hedera helix ssp. Helix, Lathyrus venetus, Limodorum abortivum, Linaria purpurea, Luzula sylvatica, Melica uniflora, Mycelis muralis ssp. Muralis, Neottia nidus-avis, Oxalis acetosella, Poa sylvicola, Polygonatum odoratum, Polystichum setiferum.*

Sotto l'aspetto strutturale-colturale la compresa è caratterizzata da popolamenti monoplani e coetanei che si estendono su superfici relativamente ampie, dell'ordine dei 5-6 ettari, con diversi popolamenti di superficie superiore ai 10 ettari.

Le ragioni di questo assetto strutturale sono da ricercare nell'origine di questi soprassuoli che derivano dalle modalità di trattamento applicate nel passato. Dapprima il taglio a raso borbonico, che prevedeva il rilascio di 80 riserve ad ettaro, e successivamente il trattamento a tagli successivi uniformi più o meno regolarmente applicato.

In entrambi casi, i tagli sono stati estesi su superfici generalmente più ampie di quelle degli attuali tipi strutturali, la cui eterogeneità trova principale riscontro nelle forti differenze di fertilità che caratterizzano le stazioni di alto, medio e basso versante. Come accennato, infatti, nel capitolo sulle caratteristiche pedologiche, la fertilità di questi suoli è determinata dalla presenza delle ceneri vulcaniche depositatesi sulla matrice rocciosa calcarea. In seguito a processi erosivi, questo materiale tende ad accumularsi a valle lasciando scoperte le parti sommitali dei versanti dove talora riaffiora il substrato roccioso. Si tratta del resto di una diversità limitata alla differenza di pochi metri di statura tra popolamenti vicini, che sovente sfumano l'uno nell'altro senza che si riesca a percepire una netta soluzione di continuità. Ben diversa è la situazione auspicabile di bosco disetaneo, ancorché per gruppi più o meno ampi. Una certa diversità strutturale, nella fustaia di faggio, si registra soltanto nella particella 113, nella quale sono stati sperimentati i primi interventi di disetaneizzazione.




**Figura 33. Carta dei tipi strutturali (CHM) del versante della Rajamagra. Si evidenzia l'uniformità strutturale dei soprassuoli su ampie superfici.**

Tale uniformità risulta evidente anche dalla distribuzione della superficie tra i diversi tipi riportata in Tabella 28, che non presenta un andamento disetaneo.

**Tabella 28. Estensione complessiva dei tipi strutturali nella compresa della Fustaia disetanea di faggio**

| Tipo strutturale | Classe di altezza dei popolamenti | Superficie |
|---|---|---|
| | m | ha |
| Novelleti | 2-4 | 0,0 |
| Spessine | 4-8 | 0,7 |
| Perticaie giovani | 8-12 | 11,9 |
| Perticaie adulte | 12-16 | 30,9 |
| Fustaie giovani | 16-20 | 64,6 |
| Fustaie adulte | 20-24 | 81,7 |
| Fustaie mature | 24-28 | 79,6 |
| Fustaie mature | 28-32 | 82,4 |
| Fustaie mature | >32 | 38,2 |
| Totale | | 392,81 |

La distribuzione normale implicherebbe, infatti, un equilibrio tra le diverse fasi di sviluppo dei popolamenti forestali, con una rappresentazione bilanciata delle superfici relative alle varie classi di altezza e tipologie strutturali. Il grafico di Figura 34 mette in evidenza, invece, uno squilibrio tra lo stato reale e lo stato normale dei popolamenti forestali. Lo stato reale mostra una carenza di popolamenti giovani e una sovrabbondanza di popolamenti maturi, rispetto a quanto previsto in una distribuzione equilibrata.

Se si analizza la distribuzione per particella, tale anomalia risulta ancora più pronunciata: le classi di popolamenti giovani prevalgono nella zona del Cervialto, mentre le classi mature sono principalmente concentrate nella zona del Cervarolo, dove occupano interamente diverse particelle (Figura 35).




**Figura 34. Fustaia disetanea di faggio: confronto della distribuzione della superficie normale e reale dei tipi strutturali.**




**Figura 35. Fustaia disetanea di faggio rappresentazione dei tipi strutturali.**

Negli ultimi decenni per varie ragioni, principalmente di ordine amministrativo e conservazionistico, si è verificata una sensibile sottoutilizzazione di queste fustaie che, se da un lato ha favorito un sensibile incremento delle provvigioni legnose, dall'altro, ha trascurato le cure colturali necessarie ai popolamenti più giovani compromettendo le possibilità di sviluppo di questi soprassuoli.

In mancanza dei tagli colturali, l'elevata concorrenza tra gli alberi e gli effetti della selezione naturale che avviene nel piano dominato, costituito da soggetti esili, bassi e sofferenti che vanno dissecando, ha ulteriormente consolidato queste strutture monoplane limitando la capacità di rigenerazione naturale del bosco.

## Particelle forestali della Classe economica

Le particelle sono elencate a parte, nell'allegato Schema 2.

## Rilievi tassatori

Per determinare la provvigione reale è stato utilizzato lo stesso disegno di campionamento adottato per le altre comprese. In questo caso sono state eseguite 218 aree di saggio ripartite tra le diverse particelle:

**Tabella 29. Rilievo per aree di saggio**

| Particella numero | ADS | Superficie | Piante/ha | Area basimetrica ad ettaro | Volume ad ettaro | Volume totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | n° | ha | n° | m² | m³ | m³ |
| 112 | 6 | 13,77 | 555 | 44,2 | 503,8 | 6.715,5 |
| 113a | 9 | 7,06 | 436 | 35,2 | 425,2 | 3.002,1 |
| 131 | 10 | 13,65 | 1.048 | 37,0 | 427,6 | 5.780,0 |
| 148 | 19 | 25,72 | 751 | 47,9 | 629,6 | 16.192,7 |
| 171 | 9 | 18,14 | 858 | 51,5 | 752,6 | 13.627,7 |
| 195 | 14 | 23,44 | 812 | 46,0 | 661,8 | 15.396,8 |
| 196 | 16 | 25,49 | 462 | 37,8 | 544,8 | 13.880,2 |
| 205a | 17 | 22,40 | 1.832 | 57,0 | 597,6 | 13.348,9 |
| 206a | 21 | 34,63 | 2.216 | 58,6 | 591,7 | 20.416,9 |
| 206b | 18 | 24,86 | 1.209 | 55,1 | 755,0 | 18.760,8 |
| 206c | 20 | 27,61 | 2.063 | 52,6 | 527,2 | 14.382,0 |
| 207a | 16 | 23,11 | 686 | 50,6 | 759,8 | 17.557,5 |
| 207b | 18 | 22,95 | 985 | 51,9 | 693,3 | 15.859,0 |
| 210 | 9 | 13,91 | 841 | 55,6 | 563,8 | 7.838,0 |
| 226 | 7 | 8,69 | 2.266 | 62,5 | 636,7 | 5.380,1 |
| 227 | 9 | 11,15 | 1.540 | 55,2 | 579,0 | 6.403,0 |
| 234 | | 14,85 | | | 389,9 | 5.464,5 |
| 237 | | 10,24 | | | 456,1 | 4.669,4 |
| 239 | | 11,36 | | | 452,7 | 5.109,8 |
| 264 | | 16,01 | | | 399,1 | 6.385,5 |
| 265 | | 14,58 | | | 422,6 | 6.069,6 |
| 303 | | 9,19 | | | 486,2 | 4.463,0 |
| Totale | **218** | **392,81** | | | | **226.703** |

Non sono state interessate dal campionamento le particelle 234, 237, 239, 264, 265, 303 dislocate sulle pendici più alte del Cervialto, in quanto costituite prevalentemente da popolamenti giovani per i quali non sono previsti interventi nel decennio di validità del piano. Per queste particelle il rilievo è stato ottenuto dalle elaborazioni del dato LiDAR. Per il calcolo dei volumi è stata utilizzata la stessa procedura già descritta per i boschi della compresa A.

## Il modello colturale di riferimento

Il trattamento disetaneo a piccoli gruppi nella faggeta è stato proposto in molti piani di assestamento dell'Appennino meridionale, sovente in condizioni analoghe a quelle dei Monti Picentini, per caratteristiche climatiche e soprattutto pedologiche. Vi è, tuttavia, da rilevare che spesso i risultati ottenuti non sono stati soddisfacenti, anche nei casi più fortunati. A questo proposito si riportano alcune considerazioni del Professor Cantiani (1984) sulle faggete disetanee di protezione dell'Irpinia.

> "*Molto si è detto e teorizzato sulla normalità del tipo colturale disetaneo delle fustaie di faggio, ma pochi hanno messo in evidenza la notevole difficoltà che il selvicoltore incontra per condurre verso la disetaneità le fustaie adulte e mature che hanno strutture coetanee o paracoetanee. Ed è questa la situazione in cui si trovano molte faggete dei Monti Picentini per effetto dei tagli a raso con riserva effettuati il secolo scorso.*
> *In queste fustaie l'apertura di piccole buche della superficie di 400-500 $m^2$ in soprassuoli chiusi adulti o maturi, al fine di creare i primi gruppi di rinnovazione, è stata molto deludente perché l'improvvisa illuminazione del suolo, avviando i noti processi ossidativi dell'humus e favorendo un esuberante sviluppo di flora nitrofila, ha impedito l'insediamento del novellame di faggio.*
> *Quando questi tagli a "scacchiera sono stati ripetuti una o due volte, a distanza di 10-15 anni, si è constato che, per effetto dell'illuminazione laterale, si sono insediati densi strati di rinnovazione anche promettente, sia all'interno dei popolamenti chiusi, sia al margine delle chiarie*".

Questa diffusione della rinnovazione naturale conduce, secondo queste esperienze, un ritorno delle strutture coetanee vanificando tutto il programma di disetaneizzazione.

> *"Migliori risultati invece si ottengono quando si opera con moderati tagli di sementazione a gruppi che, invece di aprire delle buche a raso, si limitano ad alleggerire la copertura del popolamento interessando solo il piano dominato".*

Anche in questo caso, tuttavia, i gruppi di rinnovazione formano superfici che superano i 2.000, 3.000 $m^2$ di ampiezza.

Secondo alcuni autori il concetto di "foresta disetanea" viene legato al trattamento a taglio a scelta che, con l'utilizzazione frequente (periodo di curazione) di piante economicamente mature (diametro di recidibilità), consente di creare popolamenti a copertura permanente, capaci di rinnovarsi con continuità. Secondo altri, nella denominazione di "bosco disetaneo" si comprende una complessa mescolanza di gruppi coetanei, localizzati in aree "disperse" aventi un'ampiezza varia, che devono essere singolarmente ed indipendentemente allevati ed utilizzati secondo i tipici trattamenti delle fustaie coetanee a rinnovazione naturale.

Il modello colturale di riferimento viene proposto sulla base di quest'ultima definizione: può configurarsi in un "bosco disetaneo per gruppi coetanei, estesi da 2-3 mila metri quadri a 1-2 ettari", cioè da una formazione stabile, differenziata e relativamente facile da trattare. Tali gruppi dovranno essere scalati nel tempo e distribuiti nello spazio in modo tale da costituire, nell'insieme, una sorta di bosco disetaneo a struttura composita (secondo la definizione data da Patrone) costituita da popolamenti di ordine sia "atomistico" che "molecolare". Si verrà così a creare una struttura disetanea, provvista di suoi particolari caratteri, in una certa misura differenti rispetto a quelli considerati classici del consorzio disetaneo per piede d'albero.

Un modello colturale basato sul trattamento a tagli successivi a gruppi dovrebbe essere in grado di:

- assicurare al faggio, oltre a favorevoli condizioni edafiche, condizioni di clima interno e di struttura forestale adeguate alle esigenze della specie;
- garantire al suolo una copertura permanente, per prevenire le degradazioni e non creare difficoltà alla potenziale rinnovazione naturale, né diminuire la capacità produttiva;
- realizzare una struttura del soprassuolo che migliori le caratteristiche di questi habitat.

Nella composizione dendrologica, lo stato normale può configurarsi in una cenosi pura di faggio in cui le altre specie, per quanto la loro presenza sia molto auspicabile e gradita, è destinata ad essere molto marginale. Nonostante si tratti di una composizione presumibilmente vicina a quella originaria, andranno comunque sempre salvaguardati gli aceri, il tasso, l'ontano, il sorbo degli uccellatori e l'olmo montano.

Per quanto riguarda i parametri dendrometrici e provvigionali i valori di incremento, provvigione e periodo di curazione sono stati calcolati con l'impiego della tavola alsometrica approntata per le fustaie della Compresa A.

La provvigione normale, calcolata con la formula dei trapezi sulla compresa di 140 ettari, quanti gli anni di un turno orientativo, risulta di 396 $m^3$/ha a metà del periodo di curazione. Applicando le formule proposte da Susmel si avrebbero invece 256 $m^3$/ha a fronte di una statura di 32 m o di 290 $m^3$/ha nel caso in cui gli alberi più grandi raggiungessero i 34 m di altezza.

Del resto, com'è noto, nel modello disetaneo più che di "provvigione normale" si ritiene più opportuno parlare di "provvigione prefissata" o di "traguardo provvigionale"; se dopo un congruo periodo di gestione in condizioni di normalità, la "ferrea legge del locale" dimostri la necessità di una parziale deviazione dai suddetti parametri, la provvigione determinata con l'impiego delle tavole alsometriche potrà essere modificata nello spirito del metodo colturale assestamentale del controllo.




**Figura 36. Compresa della Fustaia disetanea di faggio: andamento dell'incremento medio e dell'incremento corrente**

L'incremento percentuale normale è stimato al 2,12 % con l'impiego delle tavole alsometriche. La lunghezza del periodo di curazione è stata determinata come intervallo di tempo necessario per avere un incremento periodico percentuale del 25% ed è risultata pari a 12 anni, a cui corrisponde una ripresa di 100 $m^3$ pari al 22,22%. In questo modo dovrebbero essere scongiurati pericoli di coetaneizzazione dall'alto, applicando prelievi troppo bassi, o dall'alto nel caso contrario.

Il modello di normalità descritto può essere configurato come un bosco disetaneo quale risultato dell'insieme e dalla compenetrazione marginale di gruppi coetanei di estensione compresa tra i 2-3 mila $m^2$ e gli 1-2 ettari. Il trattamento da applicare al bosco normale troverà quindi riferimento nel taglio saltuario, inteso come quell'insieme di interventi selvicolturali il cui elemento caratterizzante è dato dalla "simultaneità delle diverse operazioni indirizzate ad ottenere la rinnovazione, la selezione delle piante, la differenziazione strutturale, la raccolta delle piante mature, ecc." (Leibundgut, 1966). "Quel trattamento del bosco che include in sé tutte le attività di rinnovazione, modellamento e raccolta" (Leibundgut, 1946).

Nell'ambito di ciascuna particella, l'azione selvicolturale viene quindi a configurarsi come una come una serie di diradamenti dei diversi tipi strutturali, del tutto analoghi a quelli che vengano praticati nei boschi coetanei a cui segue il taglio finale di rinnovazione, che andrà condotto con la tecnica dei tagli successivi a gruppi.

Il sistema dei tagli prevede, quindi, una **serie di diradamenti e tagli**, con cadenza dodicennale, nei soprassuoli giovani e adulti. I tagli definitivi avranno inizio con il taglio di sementazione in quei gruppi che abbiano raggiunto un diametro medio di circa 50-60 cm. Il novellame dovrebbe insediarsi rapidamente in conseguenza del maggiore afflusso di luce alle chiome ed al suolo. In questi gruppi, a distanza di 12 anni, il numero delle piante andrà ridotto del 50% e i soggetti da abbattere andranno scelti preferibilmente tra quelli a chioma più ampia che sarebbe sconsigliabile conservare per tutto il periodo della rinnovazione, non solo per la loro azione aduggiante, ma soprattutto perché provocherebbero, all'atto dello sgombero, ingenti danni al novelleto. A distanza di circa 24 anni dal taglio di sementazione si potrà procedere con il taglio di sgombero.

La forma di trattamento così delineata, come è facile immaginare, è per gran parte vincolata al modello di bosco disetaneo già realizzato scelto come puro riferimento teorico. Ma come già sottolineato nella quasi totalità dei casi concreti ci troviamo di fronte a strutture coetanee in cui l'applicazione del taglio descritto si limiterebbe a perpetuare l'esistente senza riuscire a conferire ai soprassuoli la desiderata struttura disetanea. Le difficoltà dell'opera di normalizzazione strutturale-colturale ovviamente aumentano con il grado di anormalità dei soprassuoli e diventano massime quando si tratta di vere e proprie trasformazioni di struttura come nel caso in esame.

A questo si aggiungono altre difficoltà derivanti dall'età adulta di molti soprassuoli, per cui saranno sempre necessarie valutazioni attente delle piante da utilizzare, criteri culturali e curativi nonché prudenziali tali da evitare fenomeni di degrado del suolo e l'inserimento nelle chiarie di graminacee e flora nitrofila.

Dovendo operare su fustaie invecchiate, come quelle esistenti sulle alte pendici del Cervarolo, che hanno età anche superiori ai 150 anni e non hanno mai fruito dei tagli di diradamento, sarebbe utopistico pensare che si possa creare un tipo strutturale disetaneo nel periodo di un solo ciclo produttivo. Qui ci si dovrà solo preoccupare di conciliare le funzioni protettive di queste faggete con la necessità, ormai indilazionabile, della loro riproduzione naturale.

A questa esigenza si potrà provvedere con una serie di tagli di rinnovazione molto moderati e frazionati da distribuire in un lungo periodo che potrà anche raggiungere l'ampiezza di 50 anni.

Si otterrà una struttura coetaneiforme, facilmente plasmabile durante il ciclo successivo verso modelli colturali tipicamente disetanei.

Nella zona della Rajamagra, dove i boschi sono meno invecchiati, si potrà intervenire ugualmente con le stesse modalità, mettendo in sementazione gruppi dell'ampiezza variabile da 2.000 a 4.000 $m^2$, al fine di non rendere eccessivamente lacunosa la compagine del soprassuolo adulto ed evitare così i fenomeni di prerinnovazione sotto copertura, che sono inevitabili quando si interviene su piccoli nuclei.

Maggior prudenza si dovrà avere nelle aree frequentate da bovini, dove il calpestio ed il morso del bestiame e sui giovani semenzali possono accelerare fenomeni di degrado.

Per tutti questi casi è impossibile dettare delle norme vincolanti, ma è lecito consigliare, come dimostrato da diversi esempi, molta pazienza, assieme al dovuto tempismo nelle situazioni che lasciano intravedere evoluzioni nel senso voluto.

## Determinazione della ripresa

Per la determinazione della ripresa è stato adottato il metodo francese della "densità di rinnovazione desiderata sulla superficie", specificamente indicato per la disetaneizzazione di popolamenti invecchiati. Questo approccio calcola la superficie da porre in rinnovazione all'interno di ciascuna particella, utilizzando il rapporto tra la superficie totale dei popolamenti invecchiati e la differenza tra la longevità massima e l'età dei popolamenti più giovani, moltiplicato per il periodo di curazione.

Per ciascuna particella è stata così determinata la superficie da porre in rinnovazione nel periodo di validità e, per differenza, quella restante da percorrere con i tagli di diradamento. Sono state escluse dagli interventi le particelle 196, 234, 237, 239, 264, 265, e 303. La particella 196 è stata recentemente sottoposta a un taglio di sementazione, mentre le altre, situate sul versante alto del Cervialto, presentano popolamenti prevalentemente giovani o bistratificati in fase di rinnovazione. Per queste ultime, si è ritenuto opportuno attendere un ulteriore periodo di tempo fino a quando le condizioni ecologiche non si saranno stabilizzate, evitando interventi prematuri.

Nel totale della Compresa è stata identificata una superficie di 56,7 ha destinata a tagli di sementazione a gruppi e 226 ha destinati a tagli di diradamento. In termini percentuali, la ripresa planimetrica destinata ai tagli di maturità è quantificata nell'1,5% se rapportata all'intera superficie della Compresa e nel 2% se considerata solo sulle particelle coinvolte negli interventi.

In termini volumetrici la ripresa decennale presunta di massa indifferenziata è stimabile in 38.893 $m^3$, di cui circa un terzo deriva dai tagli di sementazione a gruppi, e i restanti due terzi da tagli colturali di diradamento.

Confrontando i dati di provvigione e ripresa con il modello di normalità, si ha:

$$P_n = \frac{55.448}{140} x\ 384{,}06 = 152.109{,}71$$

$$R_n = \frac{(842 + 331{,}5)}{140} x\ 384{,}06 = 3.129{,}25$$

e

$$P_r = 222.930{,}0$$

$$R_r = 3.889{,}3$$

La ripresa determinata secondo la formula di Hundeshagen:

$$R_r = R_n/P_n\ x\ P_r = 4.586.2\ m^3$$

risulta superiore di 696 $m^3$, a conferma di una scelta conservativa dettata soprattutto dalle esigenze colturali delle singole particelle.

## Piano dei tagli e modalità operative

Come accennato nel capitolo precedente, la ripresa stimata è comprensiva sia della massa principale che di quella intercalare. Pertanto, nelle operazioni di martellata non si dovrà mai tralasciare di percorre tutta la superficie della particella prelevando anche il materiale di piccole dimensioni. Dove non si interverrà con i tagli finali di rinnovazione (sementazione a gruppi) si interverrà con il diradamento dal basso.

Soprattutto per i boschi di questa compresa, valgono le stesse raccomandazioni espresse per la precedente. In particolare, anche nell'applicazione del taglio successivo per gruppi, il taglio di sementazione dovrà interessare circa il 50% delle piante esistenti, concentrandosi su quelle del piano dominato, aduggiate e poco sviluppate in diametro. I diradamenti dovranno essere condotti a carico delle piante di minori dimensioni al fine di svolgere un'azione di selezione dei soggetti d'avvenire.

Nell'avviamento e nel consolidamento della struttura dei soprassuoli verso la disetaneità riveste, inoltre, un ruolo fondamentale la distribuzione spaziale dei diversi tipi d'intervento: potrà quindi risultare utile, al momento della martellata, suddividere la particella in sottozone. Per impostare, già in tempi brevi, la struttura del bosco e della provvigione su popolamenti costituiti da alberi robusti con chiome simmetriche e profonde, si dovrà cercare di:

- tenere equidistanti, per quanto possibile, le aree in cui eseguire i tagli di rinnovazione;
- individuare precocemente quei gruppi di soggetti su cui intervenire con tempestivi diradamenti.

Pertanto, si cercherà di sacrificare con il taglio quei gruppi di soggetti con chiome appressate e filate che non sembrano dare garanzia di stabilità e di longevità nel lungo periodo e, viceversa, si cercherà di favorire con diradamenti tempestivi quelli costituiti da alberi con una chioma ben strutturata, in grado di sopportare un certo isolamento. I dati sono riassunti nello schema 3 riportato nel capitolo 17.

## Cap. 7.3 - Classe economica BV: Boschi vetusti

### Descrizione delle caratteristiche della Classe economica

L'istituzione di una "compresa dei boschi vetusti" all'interno di un parco regionale, e in particolare in una Zona Speciale di Conservazione (ZSC), riveste un'importanza strategica sia in chiave ecologica che conservazionistica. I boschi vetusti rappresentano infatti ecosistemi maturi di elevato valore naturalistico, che svolgono funzioni ecologiche fondamentali nella regolazione dei cicli biogeochimici e nella fornitura di servizi ecosistemici essenziali, quali la regolazione del ciclo idrico, la conservazione del suolo e il sequestro del carbonio atmosferico. La presenza di alberi vetusti e di un suolo ricco in sostanza organica contribuisce a incrementare la capacità di ritenzione idrica, a mitigare il rischio di eventi alluvionali e a migliorare la qualità delle acque per effetto dei processi di filtrazione e depurazione naturali.

Oltre a questi benefici, i boschi vetusti costituiscono sistemi di riferimento ecologico in grado di fornire un modello per valutare l'impatto delle attività antropiche sugli ecosistemi forestali e orientare le strategie di gestione forestale sostenibile.



**Figura 37. Distribuzione dei boschi della compresa "Boschi Vetusti" all'interno del demanio comunale**

Le Linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti individuano i requisiti minimi affinché un popolamento possa essere considerato vetusto. Tali requisiti comprendono:

- una superficie minima di almeno 10 ettari;
- la presenza di specie autoctone spontanee, coerenti con il contesto biogeografico;

- un'elevata biodiversità strutturale e specifica, legata all'assenza di disturbi significativi da almeno 60 anni;
- la presenza contemporanea di stadi seriali legati alla rigenerazione e alla senescenza naturale.

Il termine disturbi è inteso in senso tecnico e include sia eventi naturali (es. tempeste, incendi, attacchi parassitari), sia antropici (es. tagli colturali, pascolo, infrastrutture), che alterano la struttura, la composizione o la funzionalità dell'ecosistema forestale. Le Linee guida non escludono a priori i disturbi dal processo di maturazione ecologica, riconoscendone in alcuni casi il ruolo nella dinamica naturale del bosco, ma sottolineano l'importanza di ridurne frequenza e intensità, soprattutto in contesti in cui si intenda promuovere l'evoluzione verso condizioni di vetustà.

In particolare, il pascolo è considerato un disturbo significativo da evitare, in quanto può compromettere la rigenerazione naturale, la struttura stratificata del bosco e la presenza di necromassa, elementi centrali per la funzionalità degli ecosistemi forestali vetusti.

Nel complesso forestale del Comune di Bagnoli Irpino, caratteristiche di vetustà sono particolarmente evidenti nelle faggete situate alle quote più elevate del versante occidentale del Monte Cervarolo, ovvero nei soprassuoli posti a monte delle particelle della compresa FD. Si tratta di boschi che non sono stati interessati, da molto tempo, da interventi selvicolturali e che si distinguono per la presenza di alberi di grandi dimensioni, struttura complessa e ricca biodiversità. In passato, tuttavia, queste formazioni sono state interessate da pratiche di pascolo, che ne hanno condizionato in parte l'evoluzione naturale.

È importante sottolineare, tuttavia, che l'istituzione di una Compresa dei Boschi Vetusti non equivale al riconoscimento automatico dello stato di bosco vetusto per i soprassuoli inclusi. Pur presentando molte delle caratteristiche previste dal D.lgs. 34/2018 (Testo Unico in materia di Foreste e Filiere Forestali) e dalle Linee guida nazionali – quali l'assenza di interventi selvicolturali, la presenza di alberi di grandi dimensioni, elevata biodiversità, necromassa e struttura complessa – l'esercizio del pascolo ancora presente in alcune aree può rappresentare un ostacolo al pieno soddisfacimento dei criteri stabiliti.

Con l'istituzione della Compresa e il divieto tassativo dell'esercizio del pascolo, viene rimosso questo elemento di disturbo rilevante, consentendo di avviare un processo spontaneo di maturazione ecologica. Questo processo potrà favorire, nel medio-lungo periodo, l'acquisizione dei requisiti necessari per un eventuale riconoscimento formale dello stato di bosco vetusto, in linea con la normativa vigente e con gli obiettivi di conservazione della ZSC.

Dal punto di vista assestamentale, si tratta di una Compresa speciale ad evoluzione naturale incontrollata: un'area forestale in cui il processo di crescita e cambiamento degli ecosistemi avviene senza interventi umani diretti. Il modello colturale di riferimento, almeno in prospettiva, si identifica con la formazione climax o paraclimax propria delle singole particelle.

Allo stato attuale, la compresa è costituita da tre particelle forestali (149, 172, 197) che complessivamente occupano una superficie di poco meno di 40 ha (39,97). Le aree boscate si estendono in modo continuo lungo il versante alto del Monte Cervarolo a partire da una quota minima di 1300 m s.l.m. per salire fino ad oltre i 1.500 m s.l.m. negli impluvi e negli avvallamenti con suolo profondo.

Tutte le particelle hanno esposizione prevalente ad Ovest e rivestono pendici abbastanza acclivi con pendenze medie del 60- 70%.

Si tratta di soprassuoli a netta prevalenza di faggio a cui si associano sporadicamente gli aceri, di monte (*Acer pseudoplatanus*), opalo (*Acer opalus*) e di Lobel (*Acer lobelii*); nei tratti più xerotermici con poco suolo entrano il carpino nero (*Ostrya carpinifolia*) e l'orniello (*Fraxinus ornus*). Nel sottobosco le uniche specie arbustive sono qualche agrifoglio (*Ilex aquifolium,* particella 197) e la dafne (*Daphne laureola*). Nello strato erbaceo si riscontrano *Asyneuma trichocalycinum*, *Stellaria nemorum*, *Ranunculus brutius*, *Lamium galeobdolon* e *Oxalis acetosella* e, in alcune stazioni, *Dryopteris filix-mas* e *Adenostyles alpina.*

Sotto il profilo strutturale e colturale, l'area si caratterizza per la presenza di popolamenti forestali monoplani che si estendono su superfici relativamente limitate, variabili tra i 2 e i 6 ha. I popolamenti di maggior estensione, costituiti da fustaie mature, si localizzano prevalentemente negli avvallamenti e nelle incisioni del versante, dove le condizioni ecologiche favoriscono maggiori stabilità e sviluppo verticale. Procedendo verso i dossi, si osserva una graduale transizione verso tipi strutturali meno sviluppati in altezza, fino a giungere alle aree aperte, dove la copertura forestale si riduce ulteriormente o è assente. Questa distribuzione riflette l'influenza delle condizioni topografiche e microclimatiche sulle dinamiche vegetative e sullo sviluppo del soprassuolo.

## Rilievi tassatori

Anche in queste particelle, per la determinazione della massa legnosa, sono state eseguite aree di saggio circolari distribuite secondo il medesimo disegno di campionamento adottato per la compresa A. In totale sono state eseguite 29 aree di saggio, ripartite tra le tre particelle come indicato nella Tabella 30.

Dai dati dendrometrici risultanti nelle diverse aree di saggio e raggruppati per particella si può osservare una certa uniformità nella struttura forestale. La particella 197 è caratterizzata da alberi più grandi e maturi, con una densità inferiore ma un volume di legname per ettaro superiore. Le particelle 149 e 172 hanno densità di alberi più elevate, ma con diametri medi e volumi inferiori, suggerendo popolazioni forestali in una fase di sviluppo diversa dovuta essenzialmente alla diversa fertilità del suolo. La densità degli alberi ad ettaro è generalmente elevata se posta in relazione con le dimensioni degli alberi e da come desume dai valori dell'area basimetrica. Anche le provvigioni sono piuttosto elevate sebbene si registri una maggiore variabilità rispetto agli altri parametri.

La pianta di dimensioni medie misura 31,22 cm di diametro, l'area basimetrica e il volume a ettaro ammontano, rispettivamente, a 51,91 $m^2$ e 532,9 $m^3$: valori che confermano le elevate potenzialità della stazione e le capacità produttive della specie.

**Tabella 30. dati dendrometrici per area di saggio e per particella forestale**

| Part. | AdS | Alberi | Area basimetrica | Diametro medio | Altezza media | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | N° | N°/ha | $m^2$ | cm | m | $m^3$ |
| 149 | 1 | 474 | 47,02 | 35,6 | 17 | 467 |
| | 2 | 658 | 33,54 | 25,5 | 14 | 314 |
| | 3 | 1.315 | 62,91 | 24,7 | 15 | 598 |
| | 4 | 474 | 50,94 | 37,0 | 20 | 602 |
| | 5 | 1.052 | 43,26 | 22,9 | 13 | 400 |
| | 6 | 1.210 | 64,16 | 26,0 | 12 | 466 |
| | Media | 864 | 50,31 | 27,2 | 15 | 475 |
| 172 | 1 | 842 | 32,96 | 22,3 | 14 | 275 |
| | 2 | 2.026 | 43,79 | 16,6 | 15 | 415 |

| Part. | AdS | Alberi | Area basimetrica | Diametro medio | Altezza media | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | N° | N°/ha | m² | cm | m | m³ |
| 172 | 3 | 710 | 57,32 | 32,1 | 15 | 571 |
| | 4 | 1.421 | 45,26 | 20,1 | 15 | 389 |
| | 5 | 842 | 68,41 | 32,2 | 16 | 749 |
| | 6 | 973 | 70,98 | 30,5 | 16 | 718 |
| | 7 | 1.079 | 51,64 | 24,7 | 11 | 359 |
| | 8 | 763 | 75,01 | 35,4 | 20 | 891 |
| | 9 | 474 | 51,01 | 37,0 | 19 | 651 |
| | Media | 1.014 | 55,15 | 26,3 | 16 | 557 |
| 197 | 1 | 658 | 64,83 | 35,4 | 22 | 876 |
| | 2 | 552 | 77,65 | 42,3 | 26 | 1.077 |
| | 3 | 316 | 55,37 | 47,3 | 25 | 752 |
| | 4 | 579 | 38,05 | 28,9 | 12 | 305 |
| | 5 | 737 | 42,98 | 27,3 | 18 | 444 |
| | 6 | 1.079 | 57,89 | 26,1 | 14 | 477 |
| | 7 | 658 | 42,50 | 28,7 | 15 | 347 |
| | 8 | 842 | 43,53 | 25,7 | 16 | 415 |
| | 9 | 421 | 46,32 | 37,4 | 24 | 642 |
| | 10 | 737 | 37,85 | 25,6 | 16 | 356 |
| | 11 | 263 | 56,73 | 52,4 | 31 | 880 |
| | 12 | 500 | 61,97 | 39,7 | 21 | 858 |
| | 13 | 500 | 56,96 | 38,1 | 22 | 706 |
| | 15 | 710 | 43,77 | 28,0 | 14 | 416 |
| | Media | 611 | 51,89 | 32,9 | 20 | 611 |

**Tabella 31. Dati riassuntivi della compresa**

| Alberi | Area basimetrica | Diametro medio | Volume |
|---|---|---|---|
| N°/ha | m² | cm | m³ |
| 828 | 51,91 | 31,22 | 532,90 |

Dal grafico che rappresenta la distribuzione del numero di alberi per ettaro suddivisi per classi di diametro (Figura 38), si può osservare una tipica distribuzione unimodale, con un picco centrale e una diminuzione graduale verso le classi di diametro di minori dimensioni ed in quelle più grandi.




**Figura 38. Distribuzione del numero di alberi per ettaro suddivisi per classi di diametro**

Il numero di alberi per ettaro aumenta progressivamente dalle classi di diametro più piccole (10-25 cm), raggiungendo un picco massimo intorno alla classe di diametro di 45 cm, che rappresenta la densità maggiore con circa 80 alberi per ettaro. Dopo il picco, il numero di alberi per ettaro diminuisce gradualmente nelle classi di diametro superiori (50-90 cm). Tuttavia, c'è una presenza significativa di alberi anche nelle classi intermedie (35-60 cm), indicando una distribuzione equilibrata tra gli alberi di dimensioni medie e grandi.

La presenza di alberi nelle classi di diametro più grandi (oltre i 70 cm) è limitata, ma non assente, suggerendo la presenza di alcuni individui più maturi o veterani all'interno del bosco.

Questa distribuzione è indicativa di un bosco in fase matura, dove la maggior parte degli alberi ha raggiunto dimensioni significative.

## Il modello colturale di riferimento

Come esposto precedentemente, questa compresa prevede il rilascio all'evoluzione naturale per un periodo indefinito di questi soprassuoli. I boschi vetusti, o *Old-growth forests*, sono considerati essi stessi, infatti, dei modelli di riferimento per la naturalità, poiché rappresentano ecosistemi forestali con il più alto valore conservativo. Questi boschi offrono una grande varietà di habitat in grado di sostenere catene trofiche complesse, caratterizzandosi per una composizione specifica stabilizzata e una struttura in equilibrio naturale.

Per questo motivo, le foreste vetuste sono di fondamentale importanza in quanto rappresentano un riferimento per le foreste coltivate e costituiscono dei modelli (sia dal punto di vista dei processi in atto e sia dal punto di vista della eterogeneità strutturale). Ai fini dell'applicazione di una selvicoltura che imita i processi naturali è utile misurare la "differenza" tra foreste vetuste (foreste attualmente nello stadio di vetustà), foreste non più gestite con elementi di vetustà, e foreste attualmente coltivate.

## Modalità operative

La gestione di questi boschi deve prioritariamente a mirare alla conservazione della naturalità e della complessità strutturale del bosco, evitando qualsiasi intervento che possa indurre una semplificazione o un degrado dell'ecosistema. Le aree in cui non si effettuano interventi di alcun tipo, nemmeno in presenza di alberi schiantati dal vento, hanno come obiettivo primario la ricerca ecologico-naturalistica e contribuiscono in modo significativo a una rinaturalizzazione profonda del complesso forestale. In tale contesto, tutte le riserve naturali svolgono un ruolo fondamentale nel favorire una variabilità biologica ed ecosistemica equilibrata e armonica.

L'istituzione di tali compartimenti consente, inoltre, di osservare i processi naturali in condizioni indisturbate, offrendo un termine di confronto prezioso con le aree soggette a interventi selvicolturali. Questo confronto permette una comprensione più approfondita delle problematiche gestionali e delle possibili alternative, considerando il bosco non solo come fonte di produzione legnosa, ma anche nella sua dimensione ecologica e conservativa.

È importante sottolineare un aspetto di rilevante importanza nel contesto specifico dei boschi del Comune di Bagnoli Irpino: per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, è fondamentale monitorare attentamente le popolazioni di grandi erbivori selvatici, con particolare riguardo alla minimizzazione del pascolo all'interno del bosco.

Sarebbe auspicabile che questa compresa fosse inclusa nell'istituzione della rete di foreste vetuste, in modo da poter essere abbinata, come previsto dalle Linee guida allegate al Decreto, a una rete di monitoraggio e osservazione permanente che possa svolgere un ruolo di riferimento essenziale per la gestione naturalistica delle foreste.

## Cap. 7.4 - Classe economica P: Boschi di protezione

### Descrizione delle caratteristiche della Classe economica

La Compresa Boschi di protezione ha un'estensione di 733,07 ettari ed è costituita da 65 particelle distribuite tra una quota minima di 590 m (Valle di Caliendo) e una massima di 1.667 m s.l.m. (Rajamagra).



**Figura 39. Distribuzione dei boschi della compresa "Boschi di protezione" all'interno del demanio comunale**

La preminenza della funzione di protezione assegnata a questi boschi è dovuta alla morfologia del territorio, principalmente contraddistinto dai ripidi versanti delle Coste del Cervialto che degradano rapidamente nella conca di Montella.

La funzione di protezione è finalizzata alla conservazione del suolo e indirettamente all'assetto idrogeologico e paesaggistico: se i pendii venissero privati della vegetazione verrebbe alterato il deflusso delle acque meteoriche, con il relativo accorciamento dei tempi di corrivazione e l'innesco di fenomeni di erosione superficiale. La vegetazione andrebbe verso una progressiva involuzione, degradando verso formazioni vegetali primitive con zone scoperte.

Oltre alla funzione di conservazione del suolo su cui è insediato il bosco (autoprotezione), la funzione di protezione si esplica nella regimazione dei deflussi (eteroprotezione, diretta o indiretta), o nella difesa di molti castagneti da frutto posti a valle di questi ripidi versanti. Il ruolo dei boschi di protezione è, quindi, sia di riduzione del rischio, che di mitigazione degli effetti.

Il significato di "protezione" idrogeologica e ambientale deve intendersi, quindi, in riferimento a diversi aspetti di multifunzionalità: conservazione dei suoli e ripristino della fertilità;

protezione da erosioni e movimenti franosi; purificazione e protezione di riserve e corsi d'acqua; protezione e miglioramento del clima e della qualità dell'aria; protezione e miglioramento del paesaggio; conservazione di cenosi vegetali e/o specie importanti dal punto di vista conservazionistico (tutela habitat e biodiversità).

Per la gran parte, si tratta principalmente di cedui invecchiati in fase di fustaia transitoria che si estendono nella parte media e bassa dei tipici contrafforti che costituiscono i lembi marginali del massiccio montuoso del Cervialto, e che si affacciano nella valle del Calore tra i confini del territorio dei comuni di Montella e di Nusco. Si tratta di soprassuoli che occupano terreni aridi, solcati da profondi torrenti che incidono la roccia calcarea, determinando una configurazione caratterizzata da valloni e crinali, con due diverse esposizioni predominanti: quella a sud-ovest e quella a nord-ovest. Questi soprassuoli sono stati intensamente degradati in passato dal pascolo caprino, dai tagli abusivi e dagli incendi. In particolare, il persistente susseguirsi dei tagli abusivi ha portato alla soppressione quasi completa delle matricine, determinando la formazione di soprassuoli molto irregolari.

Un secondo comparto è costituito da un numero limitato di particelle che comprendono l'area sommitale del versante sud della Rajamagra e le sezioni più ripide di Vallebona.

In entrambi i comparti, sono numerosi gli affioramenti rocciosi. In generale, le particelle della compresa sono poco accessibili e difficilmente percorribili a causa delle forti acclività e dalla presenza di salti di roccia. In alcuni casi le condizioni stazionali non sono così sfavorevoli, ma i boschi non sono serviti da strade o da piste forestali e la loro utilizzazione risulta antieconomica (particelle fuori mercato).

La composizione della compresa è plasmata dalle sfavorevoli condizioni stazionali che determinano suoli superficiali e non evoluti, a causa delle forti pendenze, e che sono continuamente ringiovaniti dai fenomeni erosivi.

Questi boschi sono costituiti dalle specie tipiche della zona submontana del castagno. Più precisamente, nei popolamenti esposti a sud-ovest predominano il carpino nero (*Ostrya carpinifolia*), il leccio (*Quercus ilex*), l'orniello (*Fraxinus ornus*), l'acero opalo (*Acer opalus*) e la roverella (*Quercus pubescens*). Le particelle del settore meridionale, esposte a nord-ovest, su versanti più umidi dei primi, danno luogo a una consociazione formata da faggio (*Fagus sylvatica*), ontano napoletano (*Alnus cordata*), aceri (*Acer* sp.) e anche castagno (*Castanea sativa*), che tuttavia è presente solo sporadicamente.

Nei tratti più acclivi, dove affiorano substrati carbonatici molto permeabili e aridi, e in cui le ceneri vulcaniche non sono riuscite a depositarsi o sono state dilavate, il leccio si avvantaggia, a scapito delle specie caducifoglie nonostante le condizioni macroclimatiche siano a queste ultime piuttosto favorevoli. Così, nei tratti più ripidi della Valle di Caliendo, le cenosi forestali risultano costituite prevalentemente dal leccio con una presenza più o meno consistente di specie caducifoglie determinata dalle caratteristiche pedoclimatiche. La struttura prevalente della lecceta è assimilabile a quella di una formazione rupicola.

In generale si tratta, comunque, di soprassuoli dotati di una notevole varietà di specie arboree e arbustive anche per l'ampia fascia altitudinale in cui rientrano i boschi della compresa. Le specie arboree più frequenti sono carpino nero, orniello, roverella, acero opalo e più raramente cerro.

Nei versanti esposti a nord della Rajamagra e di Vallebona, il faggio è nettamente prevalente, anche se viene talora sostituito dal carpino nero dove il suolo diviene molto superficiale. Sono sporadici il tasso (*Taxus baccata*) e gli aceri montano (*Acer pseudoplatanus*) e di Lobel (*Acer lobelii*); è abbastanza diffuso in entrambe le situazioni l'ontano napoletano. Si tratta in genere di fustaie, adulte nella zona della Rajamagra e mature a Vallebona.

Lo strato arbustivo presente, nei boschi di latifoglie mesofile, ha mediamente una copertura ridotta. Soltanto dove lo strato arboreo è maggiormente degradato entrano con maggior vigore specie colonizzatrici anche dei mantelli mesofili come: ginestra odorosa (*Spartium junceum*), ginestra

dei carbonai (*Cytisus scoparius*) e citiso a foglie sessili (*Cytisus sessilifolius*), oltre a cornetta dondolina (*Coronilla emerus*) e ginepro rosso (*Juniperus oxycedrus*).

Nelle leccete più dense lo strato erbaceo è piuttosto limitato a causa della copertura esercitata dal leccio durante tutto l'anno, mentre sono frequenti aperture di discontinuità nella copertura, buche e radure anche ampie.

Nelle faggete lo strato arbustivo è molto poco sviluppato e costituito da rovo, dafne e qualche agrifoglio.

## Particelle forestali della Classe economica

Le particelle sono elencate a parte, nell'allegato Schema 2.

## Il modello colturale di riferimento

Data la loro specificità stazionale e costitutiva, i soprassuoli inclusi nella compresa sono stati destinati all'evoluzione naturale controllata. Un periodo di riposo colturale, sostenuto dalle dinamiche naturali, dovrebbe consolidare l'assetto di questi boschi, il cui stato dovrà essere monitorato periodicamente nelle prossime revisioni del piano. In tale contesto, sarà possibile valutare gli effetti dell'abbandono e decidere se intervenire a sostegno dell'evoluzione naturale o, come accennato, nel caso di "boschi produttivi fuori mercato", optare per soluzioni in grado di valorizzarli.

## Modalità operative

Il prevedibile decorso dell'evoluzione naturale dei soprassuoli può seguire diverse direzioni, influenzate da fattori come le caratteristiche specifiche dell'area, le condizioni climatiche e la composizione floristica attuale. In assenza di interventi umani, è probabile che si inneschi una successione ecologica naturale, con l'affrancamento di molti soggetti di origine agamica. Contemporaneamente potrebbe avvenire la ricolonizzazione da parte di specie vegetali autoctone, di radure e zone a scarsa densità, migliorando la copertura forestale e stabilizzando il suolo, riducendo così l'erosione.

La rigenerazione spontanea potrebbe favorire la crescita di nuove piante che sostituirebbero gradualmente quelle più vecchie, contribuendo a rafforzare la struttura del bosco e a renderlo più resiliente agli stress ambientali. Tuttavia, un aspetto critico da considerare è il rischio associato alla presenza di popolamenti coetanei su grandi estensioni. Con l'invecchiamento, questi popolamenti potrebbero diventare vulnerabili a eventi di collasso, a causa della diminuzione della vitalità e della resistenza degli alberi più anziani, esponendo l'area a un aumento del rischio di schianti o degrado accelerato. Questo potrebbe compromettere la stabilità complessiva del bosco e richiedere interventi per prevenire il collasso e favorire una maggiore diversificazione strutturale.

Monitorare e gestire attentamente l'evoluzione naturale è, quindi, essenziale. Se guidata in modo appropriato, potrebbe portare alla formazione di habitat di alto valore ecologico, utili per la conservazione della biodiversità e la fornitura di servizi ecosistemici. Tuttavia, è importante valutare periodicamente gli effetti della mancata gestione e decidere se intervenire per supportare l'evoluzione naturale, prevenire rischi come il collasso dei popolamenti coetanei, o valorizzare le aree in termini produttivi e ambientali.

Il rilascio dei soprassuoli all'evoluzione naturale controllata non esclude, infatti, la possibilità di interventi mirati a sostegno della loro salute e stabilità. Questo approccio consente di lasciare che i processi naturali operino per migliorare la struttura e la biodiversità dell'ecosistema, ma prevede comunque la possibilità di intervenire in caso di necessità.

Ad esempio, se dovessero emergere problemi fitosanitari, come infestazioni di parassiti o malattie che minacciano la vitalità degli alberi, sarebbe possibile eseguire trattamenti specifici per proteggere il soprassuolo. Allo stesso modo, qualora si osservassero segni di instabilità strutturale, come il rischio di collasso di popolamenti coetanei o situazioni di erosione avanzata, si potrebbero attuare interventi di stabilizzazione per preservare l'integrità del bosco.

In sintesi, l'evoluzione naturale controllata non implica un abbandono totale, ma piuttosto un equilibrio tra lasciare che la natura segua il suo corso e l'intervento umano quando necessario per garantire la salute, la stabilità e la resilienza del soprassuolo.

## Cap. 7.5 – Classe economica C: Boschi in ricostituzione ecologica

### Descrizione delle caratteristiche della Classe economica

Sono stati assegnati a questa Compresa tutti i terreni situati a nord del Piano Laceno, di proprietà comunale, ad eccezione di alcune piccole aree pianeggianti, che sono state incluse nelle comprese dei pascoli.



**Figura 40. Distribuzione della "Compresa dei boschi in fase di ricostituzione" all'interno del demanio comunale**

Dal punto di vista dell'assestamento forestale, si configura come una "Compresa speciale a gestione selvicolturale regolare," caratterizzata da un modello di normalità più o meno definito, al quale non si tende direttamente o immediatamente. In questo contesto, il modello di normalità può essere rappresentato dal bosco come espressione della vegetazione naturale potenziale, al quale si tende secondo un tempo ancora indefinito. Si tratta di un comparto provvisorio, destinato a scomporsi progressivamente man mano che i soprassuoli acquisiranno caratteristiche compositive e strutturali tali da poter essere inseriti o aggregati in una Compresa ordinaria.

La Compresa dei boschi in ricostituzione ecologica, seconda per estensione, interessa una superficie complessiva di 1.247.19 ha per un totale di 98 particelle.

Le pendici che ospitano questi boschi sono generalmente poco o moderatamente acclivi grazie ad una morfologia caratterizzata da rilievi piuttosto dolci che si ergono con modeste altitudini su un vasto altopiano. Come si può osservare dalla Figura 41, anche le esposizioni sono abbastanza uniformi nei confronti dei punti cardinali, con l'eccezione di quella ad est.

Come già accennato, la gran parte di queste particelle rientra nel perimetro del bacino idrologico del Sele: più particolarmente, del sottobacino del Vallone delle Brecce o Tredogge, ritenuto il più bisognevole di sistemazione all'epoca in cui furono realizzati i primi rimboschimenti.



**Figura 41. distribuzione anisotropica della superficie**

Le specie impiegate nei rimboschimenti, data la natura calcarea dei terreni, furono il pino nero di Villetta Barrea (*Pinus nigra* var. *italica*), il pino nero austriaco (*Pinus nigra*) e, in minore quantità, il pino silvestre (*Pinus sylvestris*), l'ontano napoletano (*Alnus cordata*) e il faggio (*Fagus sylvatica*). Tutti questi popolamenti hanno assolto alle loro funzioni: di preparazione del terreno, di correzione delle asperità superficiali, di arresto dei processi già in atto, di disgregazione della roccia calcarea, rendendo così pressoché inattivi i torrenti un tempo molto impetuosi.

La superficie complessiva rimboschita dal 1903 al 1943, cioè in 40 anni, è stata di circa 600 ettari; però, si è successivamente ridotta a causa dei tagli abusivi, della siccità, e degli incendi (in particolare, l'incendio del 1927 colpì quasi metà della pineta pura).

Attualmente, la superficie boscata della compresa ammonta a circa 850 ettari. La restante superficie è occupata da arbusti, praterie o zone rocciose prive di vegetazione.

È difficile quantificare con precisione l'estensione dei diversi tipi di bosco per la progressiva diminuzione delle conifere, in seguito ad interventi selvicolturali realizzati, o per cause naturali, e al progressivo affermarsi delle latifoglie tipiche del piano, che vanno riconquistando la propria zona di pertinenza ecologica. A parte qualche tratto di bosco ancora a prevalenza di pino nero, negli altri casi si tratta di boschi di faggio con esemplari singoli o gruppi di pino, generalmente nero.

Tra le latifoglie sono diffusi anche i soprassuoli di ontano napoletano, che fu impiegato con successo nei rimboschimenti e che tende a diffondersi spontaneamente, rendendo fertili e ricchi di humus terreni poveri e dilavati. Questa specie si è resa ancora più preziosa in quanto, spontaneamente e con sorprendente vigoria, si è insediata sui terreni denudati dagli incendi che portarono alla distruzione di molte pinete nel 1927, creando qui popolamenti densi e coetanei. Le condizioni vegetative di questi boschi spontanei di ontano sono buone, anzi sarebbero migliori se i giovani novelleti non avessero dovuto soffrire danni ad opera del pascolo: l'asportazione degli apici vegetativi col morso del bestiame ha provocato, infatti, specialmente nei popolamenti spontanei, l'emissione di rami dal colletto radicale, sicché questi boschi appaiono piuttosto cedui che fustaie.

Sia per le vicende storiche, sia per la loro posizione in una zona di transizione tra la fascia del faggio e quella del castagno, questi soprassuoli si sono rivelati particolarmente ricchi di biodiversità, come dimostra l'elevato numero di specie arboree e arbustive censite durante i rilievi dendrometrici (Tabella 32).

**Tabella 32. Diversità di specie rilevate nella Classe economica**

| Specie | Numero di soggetti |
|---|---|
| Abete bianco | 20 |
| Abete rosso | 20 |
| Acero campestre | 1 |
| Acero montano | 164 |
| Acero opalo | 301 |
| Agrifoglio | 211 |
| Carpino nero | 178 |
| Castagno | 111 |
| Cerro | 53 |
| Ciliegio selvatico | 1 |
| Douglasia | 26 |
| Faggio | 2680 |
| Maggiociondolo | 7 |
| Nocciolo | 36 |
| Olmo campestre | 11 |
| Ontano napoletano | 886 |
| Orniello | 5 |
| Perastro | 1 |
| Pino nero | 872 |
| Pioppo tremulo | 17 |
| Roverella | 14 |
| Salicone | 5 |
| Sorbo degli Ucc. | 22 |
| **Totale** | **5642** |

## Rilievi tassatori

Il rilevo dendrometrico dei boschi di questa compresa, eseguito con le modalità già precedentemente indicate ha interessato 63 particelle per un numero complessivo di 307 aree di saggio. La massa legnosa di tutta la compresa arriva oggi a 258.708,97 $m^3$, a cui corrisponde quindi una consistenza media di 356,35 $m^3$/ha.

## Piano dei tagli e modalità operative

Sono stati previsti interventi su 35 particelle, per una superficie effettiva d'intervento di 328,8 ettari, in cui eseguire esclusivamente **cure colturali**.

L'insieme degli interventi si basa su un approccio planimetrico colturale che mira a uniformare gli sforzi di gestione in termini di superficie e di tempistiche. L'obiettivo principale è quello di garantire un'efficace manutenzione e sorveglianza, facilitata dalla buona accessibilità delle aree interessate e dalle condizioni stazionali favorevoli, con l'intento di ottenere risultati sostenibili e duraturi.

Nelle **fustaie a prevalenza di faggio** (es. particelle 8, 17) il taglio di diradamento dovrà essere dal basso e di grado moderato che, senza interrompere la copertura, elimini innanzitutto i soggetti del piano dominato e diminuisca il numero di individui di origine agamica sulle grosse ceppaie eventualmente presenti. Dovranno essere rilasciati preferibilmente i soggetti dalla chioma meglio sviluppata, anche se provenienti da ceppaie, indipendentemente dalla forma del fusto. Sarà facile, così, già nel prossimo decennio intervenire con un taglio di sementazione.

Nelle **fustaie di pino** o nei tratti di soprassuolo ove la presenza di questa specie è ancora abbastanza consistente si dovrà intervenire a suo carico per favorire la sua sostituzione con le latifoglie. Dovranno cadere al taglio essenzialmente i soggetti in cattive condizioni vegetative e mal conformati, che verrebbero a deperire nel giro di pochi anni.

Negli **ontaneti** i diradamenti dovranno essere condotti con molta moderazione, data la densità in genere scarsa che caratterizza questi soprassuoli. Dovranno quindi cadere al taglio una o al massimo due dei soggetti provenienti da "ceppaia". Andranno inoltre eliminati tutti i vecchi esemplari di pino nero che si trovano in concorrenza con l'ontano, mentre dovrà essere sempre salvaguardata la presenza del faggio, dell'acero e della betulla.

Il piano degli interventi è stato redatto con un criterio prettamente planimetrico colturale cercando al tempo stesso di sottoporre ad intervento, per ciascun periodo, una superficie equivalente. Si è cercato inoltre di accorpare il più possibile gli interventi per contenere i costi e facilitare al massimo, per quanto riguarda le particelle in cui si dovranno fare rinfoltimenti, l'opera di sorveglianza. Le aree interessate infatti sono ottimamente servite da strade e facilmente controllabili dal personale addetto.

Per questi interventi sono state appositamente scelte tutte particelle ricadenti in condizioni ambientali favorevoli, in cui dovrebbe risultare abbastanza facile ottenere buoni risultati, soprattutto se verranno continuamente esercitate le necessarie opere di manutenzione e di sorveglianza, essenziali in queste condizioni per la riuscita degli interventi. I dati sono riassunti nello schema 3 riportato nel capitolo 17.

## Cap. 7.6 - Classe economica H: Aree pascolive/improduttive/incolte

### Descrizione delle caratteristiche della Classe economica

La superficie del demanio comunale di Bagnoli afferente alla compresa dei pascoli è di 275,48 ettari, dei quali soltanto una parte di cui quella maggior, si trova nell'ampia conca del Laceno. Questa presenta un suolo ricco, formatosi da terra rossa mescolata a materiali vulcanici, e offre un ambiente favorevole per il pascolo, sebbene una parte significativa della superficie sia ancora adibita a coltivazione agricola.

Oltre al Laceno, il comune di Bagnoli Irpino comprende altre aree di pascolo situate in conche tettonico carsiche minori, come il piano Acernese e il piano di Sazzano, oltre a diversi altri piccoli piani completamente circondati dai rilievi montuosi boscati. Queste aree, che nel tempo sono state in parte abbandonate dall'agricoltura, rappresentano una risorsa importante per l'attività pastorale locale.

Ulteriori superfici erbacee si sviluppano sui dossi e lungo i crinali dei principali rilievi, comprendono anche arbusteti e praterie, per una superficie complessiva di Ha 492, derivanti da disboscamenti e dissodamenti storici.

**Tabella 33. Superficie pascolabile**

| Tipologia | Totale Ha |
|---|---|
| Pascoli | 275,48 |
| Altre aree pascolabili | 492,33 |
| **TOTALE** | **767,81** |

Una parte significativa di questi territori ricade nel bacino del fiume Sele, soggetto a specifici vincoli di tutela in quanto individuato dal decreto 11 gennaio 1903, n. 46, e sottoposto a interventi di sistemazione idroforestale secondo la legge 26 giugno 1902, n. 245, finalizzata alla salvaguardia delle sorgenti che alimentano l'acquedotto pugliese. Tale normativa prevede, tra l'altro, il rimboschimento obbligatorio dei terreni nudi.

Anche al di là dei vincoli legislativi, lo stato di degrado che caratterizza gran parte di queste superfici ne esclude di fatto la classificazione come pascoli, evidenziando invece la necessità di interventi di protezione, recupero ambientale e conservazione attiva. Le cosiddette praterie di post coltura, pur costituendo una componente significativa del territorio comunale e pur essendo regolarmente percorse dal bestiame, rappresentano ecosistemi vulnerabili che richiedono una gestione orientata prioritariamente alla tutela e alla ricostituzione della copertura vegetale, piuttosto che allo sfruttamento pastorale.

Inoltre, una caratteristica diffusa in molte di queste zone è la marcata pietrosità, soprattutto sui versanti meridionali a forte pendenza, dove la percentuale di superficie improduttiva può raggiungere il 30-40%. Inoltre, sono frequenti le rotture del cotico erboso causate dai sentieri creati dal passaggio del bestiame, fenomeni che hanno innescato processi di erosione e asportazione del suolo. Questi effetti risultano particolarmente evidenti nelle aree chiaramente sovraccaricate, dove il sovrasfruttamento compromette ulteriormente la stabilità e la capacità produttiva del terreno.

Bisogna infine considerare che i 74,62 ettari classificati come incolti e radure sono localizzati prevalentemente lungo gli estesi crinali dei rilievi maggiori, quali Rajamagra, Cervialto e Cervarolo. Gran parte di queste superfici è costituita da pietraie o terreni particolarmente fragili, che per ragioni ambientali non risultano idonei al pascolo nel senso stretto del termine. Nonostante ciò, è un dato di fatto che anche in queste aree venga praticata l'attività di pascolamento, contribuendo così a

sostenere l'elevato carico di capi presenti sul demanio. Di conseguenza, si è ritenuto opportuno includere anche l'estensione di queste superfici nel computo complessivo delle aree interessate dal pascolo.

In ogni caso, poiché la delicata situazione sociale non permetterebbe un'improvvisa e totale chiusura al pascolamento, si è previsto che, nel periodo di validità del presente piano, il pascolo sia ancora esercitato su un'ampia parte di tale territorio, entro però limiti di tempo e di carico tali da ridurre al minimo l'aggressione.

## Rilievi dei pascoli

La produttività dei pascoli di Bagnoli Irpino è stata valutata attraverso aree di saggio collocate in punti rappresentativi delle diverse condizioni locali. In totale sono state effettuate 26 rilevazioni, condotte nella estate del 2023, in cui sono state censite le seguenti specie:

*Cytisus spinescens, Achillea collina, Anthoxanthum odoratum, Anthyllis vulneraria, Armeria macropoda, Arrhenatherum elatius ssp. elatius, Asphodelus macrocarpus ssp. macrocarpus, Avena barbata, Bellis perennis, Brachypodium rupestre, Briza maxima, Bromopsis erecta, Bromopsis erecta ssp. erecta, Bromus hordeaceus, Calepina irregularis, Carduus nutans, Carex flacca, Carex hirta, Cerastium tomentosum, Clinopodium alpinum ssp. meridionale, Coeloglossum viride, Crepis lacera ssp. lacera, Crepis neglecta, Cynosurus echinatus, Cynosurus cristatus, Dactylis glomerata, Echium plantagineum, Eryngium amethystinum, Festuca circummediterranea, Galium lucidum, Geranium dissectum, Helianthemum nummularium, Knautia calycina, Koeleria splendens, Linum usitatissimum ssp. angustifolium, Lotus corniculatus, cf. Lotus corniculatus, Luzula campestris ssp. campestris, Medicago lupulina, Myosotis ramosissima ssp. ramosissima, Onobrychis alba ssp. pentelica, Parentucellia latifolia, Phleum hirsutum ssp. ambiguum, Plantago lanceolata, Poa bulbosa ssp. bulbosa, Poa pratensis ssp. Pratensis.*

La vegetazione nei pascoli di Piano Laceno sembra essere inquadrabile, per lo meno in parte, nell'habitat 6510: una formazione vegetale ricca di biodiversità, con una varietà di specie tra cui la coda di cane crestata (*Cynosurus cristatus*) e altre erbe foraggere. Il resto della superficie della piana, quella meno fertile, come la gran parte della altre formazioni erbacee, è invece riferibile all'habitat 6210, composto da erbe perenni e una varietà di piante da fiore, tra cui molte specie rare, in particolare orchidee.

Al di là di quanto rilevato, è necessario tuttavia evidenziare, sulla base di ulteriori osservazioni appositamente condotte, un rapporto squilibrato tra leguminose e graminacee, con una prevalenza di leguminose come *Medicago lupulina* e *Trifolium repens*, che mostrano una maggiore resistenza al calpestamento e al morso degli animali, soprattutto degli ovini. In contrasto, le buone graminacee foraggere come *Cynosurus*, *Lolium*, *Dactylis*, *Phleum*, e *Poa* sono poco riconoscibili e difficilmente raggiungono la maturazione a meno che non siano protette, ad esempio, dalla massa fogliare di specie spinose.

Questo fenomeno è particolarmente evidente nel piano Laceno, dove il pascolo inizia molto presto, nonostante le condizioni climatiche avverse, come la lunga presenza di neve e le escursioni termiche. La vegetazione in quest'area è dominata da leguminose striscianti che difficilmente raggiungono la fioritura. Nelle zone più aride, prevalgono specie xerofile come *Potentilla calabra*, *Thymus serpyllum*, *Hieracium pilosella*, e *Arenaria serpyllifolia*, insieme a graminacee come *Cynosurus echinatus*, indicative di un terreno compattato e asfittico.

Gran parte della piana soffre di cattive condizioni di drenaggio, favorendo la crescita di specie tipiche di ambienti umidi, come *Capsella bursa-pastoris*, *Rumex crispus*, *Deschampsia caespitosa*, e alcune specie dei generi *Mentha*, *Veronica*, *Ranunculus*, *Carex*, e *Juncus*. Nei campi a riposo o abbandonati, proliferano specie avventizie e ruderali come *Anthemis*, *Urtica*, e *Dipsacus*, che conferiscono al paesaggio un aspetto disordinato e trascurato.

Nei pascoli situati alla base dei rilievi, prevalgono specie legate a terreni superficiali e calcarei, come *Hippocrepis* e *lupinella*, con graminacee come *Festuca ovina*, *Bromus*, *Koeleria*, e *Brachypodium*, quest'ultimo particolarmente diffuso nei terreni di pendice.

Il quadro vegetativo cambia nel piano di Sazzano, dove le condizioni pedoclimatiche favoriscono una maggiore densità e compattezza del cotico, con un rapporto più equilibrato tra graminacee e leguminose, e una maggiore presenza di graminacee foraggere come *Lolium* e *Cynosurus*. Tuttavia, la diffusione della specie *Cerastium tomentosum*, nota come "erba bianca", è legata agli impietramenti causati dall'erosione e dall'accumulo di detriti calcarei.

L'area è anche infestata da specie di nessun valore foraggero, talvolta tossiche, come i cardi (*Cirsium*, *Carduus*, *Carlina*), che si diffondono a causa della rottura del cotico e del terreno smosso. Un'altra specie invasiva è *Eryngium amethystinum*, che si trova soprattutto nel pascolo di Sazzano. Nelle zone aride e povere, prevalgono arbusti spinosi come *Rosa* e *Crataegus*.

La diffusione delle specie spinose, come la ginestra (*Cytisus scoparius*), è vista come una risposta dell'ecosistema al sovraccarico di pascolo. Queste piante offrono un rifugio alle graminacee, permettendo loro di fruttificare. Nei terreni acidi e degradati, come a Sazzano, la ginestra colonizza ampie superfici, favorendo ulteriormente la diffusione di specie rifiutate dal bestiame, come *Digitalis*, *Verbascum*, e *Hypericum perforatum*.

È infine da segnalare la diffusione del sambuco (*Sambucus ebulus*), soprattutto lungo i sentieri e ai margini dei boschi, spesso accompagnato dalla felce (*Pteridium aquilinum*), che prospera nei terreni freschi e acidi. Un'altra specie legata a questi substrati è *Deschampsia caespitosa*, che, pur essendo apprezzata dal bestiame, sottrae superficie utile alle buone foraggere con i suoi grossi cespi.

Nonostante lo sfruttamento eccessivo, i pascoli mostrano una buona produttività. Tuttavia, l'analisi della composizione floristica e delle condizioni pedologiche suggerisce che le potenzialità produttive sono superiori a quelle attualmente espresse. Tali potenzialità potrebbero essere sfruttate appieno adottando tecniche di gestione più razionali e implementando alcune semplici pratiche agronomiche.

La distribuzione stagionale della produzione, sebbene soggetta a variabilità climatica, appare abbastanza equilibrata, soprattutto se paragonata ad altre aree montane dell'Appennino meridionale. Tuttavia, esistono differenze significative tra i vari pascoli, principalmente dovute a fattori pedoclimatici.

Ad esempio, il piano di Sazzano, pur situato a un'altitudine maggiore di circa 200 metri rispetto al piano Laceno, gode di temperature più favorevoli, con una ripresa vegetativa che avviene con quasi 20 giorni di anticipo rispetto al Laceno. Questo consente un secondo sfalcio, spesso abbondante, in annate non particolarmente siccitose. Al contrario, il piano Laceno è caratterizzato da forti escursioni termiche giornaliere, persistenti nebbie e brinate primaverili, condizioni che rallentano la crescita vegetativa.

Nonostante il ritardo nella ripresa vegetativa al Laceno, la produzione estiva è distribuita in modo tale da prolungare l'attività vegetativa, permettendo ai pastori di ritardare l'uscita dai pascoli. Tuttavia, questo ritardo ostacola la capacità delle piante foraggere di ricostituire le proprie riserve, contribuendo così all'impoverimento della flora.

Per il calcolo del carico teorico delle U.B.A. pascolabili si rimanda al capitolo 9.

## Il piano dei miglioramenti

Per quanto riguarda il miglioramento della produttività, l'intervento che appare più raccomandabile nei pascoli di Bagnoli è la **concimazione** ternaria a prevalenza fosfo-potassica (concime 8 - 20 - 24). Tale formula ha dato risultati produttivi analoghi a quella con uguale rapporto N - P – K: sembra particolarmente indicata al contenimento delle specie indesiderabili e invadenti. Tra queste, in particolare le specie avventizie già molto diffuse, soprattutto al Laceno, e che potrebbero facilmente prendere il posto delle leguminose, depresse dall'azoto di una concimazione più ricca in tale elemento, secondo quanto viene suggerito anche dalla sperimentazione effettuata in diverse zone dell' Italia meridionale. Del resto, la restituzione di azoto organico, sotto forma di deiezioni, sembra garantita dalla costante presenza degli animali.

Per favorire la penetrazione del concime e per rianimare il cotico, ovunque fortemente infeltrito, bisogna far precedere la concimazione da un'energica erpicatura.

Sarebbero auspicabili interventi di **trasemina**, specialmente nel piano Laceno, dove vaste aree potrebbero essere trasformate in prati-pascoli, consentendo un utilizzo più intensivo delle risorse. Tuttavia, tali interventi si presentano come difficili da realizzare. La realtà dei fatti impone di considerare che la creazione di prati-pascoli richiederebbe la temporanea esclusione di parte della superficie dal pascolo brado per essere destinata allo sfalcio, una pratica incompatibile con le attuali modalità di utilizzo. Per questo motivo, non è stato possibile prevedere interventi che interrompano la continuità del pascolo in questa zona.

Per la **lotta alle specie infestanti** si procederà con modalità diverse a seconda della specie in questione:

- Il contenimento della felce può essere ottenuto con il taglio ripetuto abbinando un intervento di concimazione con 8 - 20 - 24, la calcitazione.
- Il sistema più idoneo alla lotta contro i "cardi", ovunque diffusi in forma nei pascoli di Bagnoli, il trattamento che sembra aver dato i migliori risultati consiste nello sfalcio allo stadio immediatamente precedente la fioritura. Tale operazione, oltre all'immediato beneficio, porterà gradualmente al contenimento della diffusione di tali specie e a una loro rarefazione.
- Per quanto riguarda le specie arbustive (ginestra, pruni ed altri arbusti), il problema si pone soprattutto nelle particelle 273b, 291b, 292b, 84b e parzialmente nel piano di Sazzano (particella 175), dove queste specie occupano questi appezzamenti con un coefficiente di copertura molto elevato. Per il recupero del pascolo dovrà essere eseguito il decespugliamento meccanico, seguito da una temporanea concentrazione del bestiame in questa frazione di pascolo, per impedire il ridiffondersi della specie. Questo potrebbe essere realizzato organizzando il pernottamento degli ovini con recinti mobili oppure, più semplicemente, favorendo la frequentazione di queste zone da parte degli animali mediante l'uso di sale pastorizio.

Per quanto riguarda in particolare il piano Laceno, sarebbero auspicabili interventi di **regimazione idraulica**, da effettuarsi con un adeguato sistema di affossature superficiali, non sembra invece opportuno ricorrere all'apertura di drenaggi. Il risanamento idraulico si ripercuoterebbe positivamente su composizione floristica e produttività, favorendo anche un anticipo primaverile del risveglio vegetativo.

Di seguito una sintetica descrizione dei diversi tipi d'intervento previsti:

- Erpicatura e concimazione con concime complesso ternario 8-20-24 (6 q/ha). L'operazione di concimazione deve essere ripetuta ad anni alterni, mentre l'erpicatura va eseguita ogni quattro anni;

- Contenimento della felce aquilina da effettuarsi somministrando, contemporaneamente alla concimazione con concime 8-20-24, calce idrata nella quantità di 20 q/ha. Le superfici trattate devono essere sottoposte al taglio delle felci per tre volte durante la stagione vegetativa. Il taglio deve essere eseguito quando la maggior parte delle foglie è srotolata per metà;
- Sfalcio delle spinose nel momento che precede la fioritura;
- Risanamento idrico delle superfici soggette a ristagni mediante l'apertura di canalette superficiali;
- Decespugliamento meccanico della ginestra e degli arbusti, seguito dalla temporanea concentrazione dei carichi di bestiame.

## Particelle forestali della Classe economica

Le particelle sono elencate a parte, nell'allegato Schema 2.

## Cap. 8 - Piano dei miglioramenti

Nell'ambito del presente capitolo vengono riportati, in maniera organica, gli interventi inerenti i miglioramenti fondiari previsti nel P.G.F.

Si premette che i miglioramenti fondiari previsti dal Piano di Gestione Forestale, in ossequio alle disposizioni Regionali, devono riguardare opere che rientrano nei complessi boscati assestati e/o che li interessano in maniera diretta.

Gli interventi di miglioramento sono stati programmati, di concerto con l'Amministrazione Comunale, in un'ottica gestionale che individua il bosco demaniale come risorsa ambientale non disconoscendo il ruolo di questo ecosistema come risorsa produttiva ma disciplinando tutte le opere di miglioria in rapporto alle complesse funzioni di conservazione degli equilibri ambientali.

Gli interventi previsti sono riferiti:

a. al miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di sistemazioni idraulico-forestali;
b. al miglioramento boschivo
c. al miglioramento pascoli (si rimanda all'apposito capitolo dei pascoli ed aree pascolabili)
d. al miglioramento, recupero, manutenzione della viabilità di servizio, delle vie di accesso e della sentieristica;
e. alla valorizzazione turistica dei beni silvo-pastorali;
f. alla valorizzazione degli impianti sciistici.
g. agli interventi di prevenzione e lotta agli incendi.

### Sistemazioni idraulico-forestali

Nel percorrere i boschi comunali si sono potute localizzare alcune zone (specialmente valloni) dove sono in corso fenomeni di erosione, puntuale e/o diffusa, che comunque necessitano di opere di regimazione e di sistemazione idraulico-forestale, di ripulitura degli alvei, di disgaggio dei massi pericolanti, di allontanamento dal sedime dell'alveo dei tronchi di alberi tranciati o sradicati.

Le opere di presidio a farsi dovrebbero essere sia di tipo intensivo (quali briglie e muri spondali di protezione in gabbioni rinverditi), che di tipo estensivo (rivestimento vegetale, palificate, graticciate, etc.) rientranti nell'ambito delle tecniche di ingegneria naturalistica e finalizzate alla stabilizzazione del suolo, da preferire ad altre tipologie di intervento più invasive e onerose.

In dettaglio, la manutenzione idraulico-forestale dovrebbe interessare principalmente i valloni che attraversano i complessi boscati in loc. Piano l'Acernese, Piano Laceno, pendici del Monte Rajamagra, come meglio dettagliato nella cartografia allegata.

### Miglioramento boschivo

Gli interventi di miglioramento dei complessi boscati dovranno essere effettuati a carico delle particelle ricadenti nella "Compresa C – boschi di ricostituzione ecologica", tali complessi boscati per la cui descrizione dettagliata si rimanda all'apposito capitolo e alle descrizioni particellari, sono caratterizzati dalla presenza di fustaie irregolari miste con vari stadi di sviluppo e la presenza di individui di ceppaia. Inoltre alcune particelle sono caratterizzate dalla presenza di rimboschimenti di conifere.

Gli interventi riguarderanno le particelle forestali:17, 24, 53, 68, 70, 72, 73, 78, 8, 116, 29a, 31, 41, 44a, 45a, 46, 47, 62, 85, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 121, 136, 34, 48, 64, 65, 86, 87, 88.

In queste particelle, nel periodo di validità del piano, sono previsti principalmente interventi di diradamento moderato dal basso dell'ontano e delle altre latifoglie, salvaguardando le specie

associate al faggio, e di diradamento da moderato a forte nei gruppi di conifere per favorire l'insediamento e la progressiva affermazione delle latifoglie. Gli interventi sono dettagliati nell'allegato piano dei tagli - schema 3 riportato nel capitolo 17.

## Viabilità

Per quanto riguarda la viabilità interna, che in parte è discretamente efficiente, si ritiene di poter proporre la sistemazione ed anche l'ampliamento, ove possibile, degli stradelli esistenti, allo scopo di facilitare l'accesso e l'esbosco di importanti complessi boschivi. Infatti, la salvaguardia e la conservazione del patrimonio forestale necessitano di idonea viabilità, che va migliorata per le importanti funzioni a cui assolve: facile e rapido accesso in caso di incendio; migliore e più facile utilizzazione del prodotto legnoso del bosco; supporto all'attività turistico e ricreativa.

Gli interventi programmati sono finalizzati al ripristino e al miglioramento di strade comunali, di mulattiere, di sentieri di piste forestali esistenti.

In particolare, è prevista la sistemazione delle seguenti **esistenti strade a fondo bituminoso**:

- collegamento Piano Laceno – Piano Migliato di Calabritto;
- collegamento Piano Laceno - Piano di Sazzano;
- collegamento Piano Laceno - Lioni.

Dette strade, che hanno una lunghezza complessiva di circa 68,22 Km, attualmente presentano tratti del piano viabile dissestato e con cunette (in cls, pietra e terreno) di cui ne occorre la rifunzionalizzazione e il ripristino.

È necessario, inoltre, programmare la sistemazione/manutenzione delle **piste a servizio** dei complessi boscati per una lunghezza complessiva di 131,18 Km.

Le opere a farsi, oltre al livellamento e alla sistemazione del piano viabile, dissestato sia dagli eventi meteorici che dal transito dei veicoli, dovrebbero consistere anche nella raccolta e convogliamento delle acque piovane nei punti di recapito (impluvi), mediante la realizzazione/ripristino di cunette e/o canalette drenanti trasversali a fondo naturale.

Occorrerà, dove possibile, ampliare la sede stradale soprattutto in corrispondenza dei tornanti a raggio più stretto. Evitando la costruzione di onerosi manufatti, si dovrà cercare di stabilizzare le scarpate franose, modificando il pendio ed apponendo, dove necessario, delle graticciate vive. Eventuali massi pericolanti dovranno essere rimossi ed ammucchiati entro nicchie in modo che non possano rotolare a valle.

Nella tabella che segue viene elencata la viabilità presente **classificata ai sensi del Decreto Interministeriale n. 563734 del 28/10/2021** e distinta per tipologia e stato di percorribilità:

**Tabella 34. Elenco della viabilità esistente**

| ID | CLASSIFICAZIONE ai sensi del D.Interm. n.563734 del 28/10/2021 | DESCRIZIONE | LUNGHEZZA | TIPO FONDO | STATO PERCORRIBILITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viabilità principale - tipo a | Pista camionabile | 1.724,97 | Fondo misto (bituminoso/naturale) | Fondo mediamente sconnesso con dissesti localizzati per mancato convogliamento acque meteoriche |
| 2 | Viabilità principale - tipo a | Pista camionabile | 6.887,15 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con dissesti localizzati per mancato convogliamento acque meteoriche |
| 3 | Viabilità principale - tipo a | Pista camionabile | 495,36 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con dissesti localizzati per mancato convogliamento acque meteoriche |
| 4 | Viabilità principale - tipo a | Pista camionabile | 428,88 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con dissesti localizzati per mancato convogliamento acque meteoriche |
| 5 | Viabilità principale - tipo a | Pista camionabile | 663,37 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con dissesti localizzati per mancato convogliamento acque meteoriche |
| 6 | Viabilità principale - tipo a | Pista camionabile | 1.233,73 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con dissesti localizzati per mancato convogliamento acque meteoriche |
| 7 | Viabilità principale - tipo a | Pista camionabile | 3.870,33 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con dissesti localizzati per mancato convogliamento acque meteoriche |
| 8 | Viabilità principale - tipo a | Pista camionabile | 2.415,74 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con dissesti localizzati per mancato convogliamento acque meteoriche |
| 9 | Viabilità principale - tipo a | Pista camionabile | 2.205,38 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con dissesti localizzati per mancato convogliamento acque meteoriche |
| 10 | Viabilità principale - tipo b | Pista camionabile | 2.483,12 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con dissesti localizzati per mancato convogliamento acque meteoriche |
| 11 | Viabilità principale - tipo b | Pista camionabile | 3.268,42 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con dissesti localizzati per mancato convogliamento acque meteoriche |
| 12 | Viabilità principale - tipo b | Pista camionabile | 1.889,33 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con dissesti localizzati per mancato convogliamento acque meteoriche |
| 13 | Viabilità principale - tipo b | Pista camionabile | 3.887,09 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con dissesti localizzati per mancato convogliamento acque meteoriche |

| ID | CLASSIFICAZIONE ai sensi del D.Interm. n.563734 del 28/10/2021 | DESCRIZIONE | LUNGHEZZA | TIPO FONDO | STATO PERCORRIBILITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Viabilità principale - tipo a | Pista camionabile | 2.769,64 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con dissesti localizzati per mancato convogliamento acque meteoriche |
| 15 | Viabilità principale - tipo a | Pista camionabile | 806,52 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con dissesti localizzati per mancato convogliamento acque meteoriche |
| 16 | Viabilità principale - tipo a | Pista camionabile | 1.636,70 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con dissesti localizzati per mancato convogliamento acque meteoriche |
| 17 | Viabilità principale - tipo a | Pista camionabile | 1.254,19 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con dissesti localizzati per mancato convogliamento acque meteoriche |
| 18 | Viabilità principale - tipo a | Pista camionabile | 577,32 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con dissesti localizzati per mancato convogliamento acque meteoriche |
| 19 | Viabilità principale - tipo a | Pista camionabile | 2.493,38 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con dissesti localizzati per mancato convogliamento acque meteoriche |
| 20 | Viabilità principale - tipo a | Pista camionabile | 2.562,06 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con dissesti localizzati per mancato convogliamento acque meteoriche |
| 21 | Viabilità principale - tipo a | Pista camionabile | 12.133,30 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con dissesti localizzati per mancato convogliamento acque meteoriche |
| 22 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 331,75 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 23 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 326,71 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 24 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 419,95 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 25 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 235,88 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |

| ID | CLASSIFICAZIONE ai sensi del D.Interm. n.563734 del 28/10/2021 | DESCRIZIONE | LUNGHEZZA | TIPO FONDO | STATO PERCORRIBILITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 780,32 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 27 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 709,44 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 28 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 4.178,17 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 29 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 174,95 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 30 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 456,29 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 31 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 711,21 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 32 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 969,69 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 33 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 725,46 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 34 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 192,89 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 35 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 4.449,85 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |

| ID | CLASSIFICAZIONE ai sensi del D.Interm. n.563734 del 28/10/2021 | DESCRIZIONE | LUNGHEZZA | TIPO FONDO | STATO PERCORRIBILITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 1.764,18 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 37 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 1.084,72 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 38 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 3.628,67 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 39 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 3.248,58 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 40 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 546,31 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 41 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 575,70 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 42 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 2.256,95 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 43 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 485,93 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 44 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 1.191,14 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 45 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 492,40 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |

| ID | CLASSIFICAZIONE ai sensi del D.Interm. n.563734 del 28/10/2021 | DESCRIZIONE | LUNGHEZZA | TIPO FONDO | STATO PERCORRIBILITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 653,41 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 47 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 478,28 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 48 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 285,68 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 49 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 1.030,86 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 50 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 609,22 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 51 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 572,97 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 52 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 639,86 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 53 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 609,06 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 54 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 458,93 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 55 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 440,42 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |

| ID | CLASSIFICAZIONE ai sensi del D.Interm. n.563734 del 28/10/2021 | DESCRIZIONE | LUNGHEZZA | TIPO FONDO | STATO PERCORRIBILITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 996,30 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 57 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 2.054,68 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 58 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 429,13 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 59 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 603,99 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 60 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 1.300,13 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 61 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 522,65 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 62 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 235,31 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 63 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 841,42 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 64 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 956,51 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 65 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 1.643,26 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |

| ID | CLASSIFICAZIONE ai sensi del D.Interm. n.563734 del 28/10/2021 | DESCRIZIONE | LUNGHEZZA | TIPO FONDO | STATO PERCORRIBILITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 1.652,09 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 67 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 749,20 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 68 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 1.125,37 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 69 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 660,59 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 70 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 330,32 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 71 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 209,34 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 72 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 90,13 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 73 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 1.087,11 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 74 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 243,94 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 75 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 785,57 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |

| ID | CLASSIFICAZIONE ai sensi del D.Interm. n.563734 del 28/10/2021 | DESCRIZIONE | LUNGHEZZA | TIPO FONDO | STATO PERCORRIBILITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 264,04 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 77 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 541,24 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 78 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 1.131,11 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 79 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 427,28 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 80 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 488,93 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 81 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 322,43 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 82 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 739,60 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 83 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 2.200,07 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 84 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 1.272,64 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 85 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 2.023,66 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |

| ID | CLASSIFICAZIONE ai sensi del D.Interm. n.563734 del 28/10/2021 | DESCRIZIONE | LUNGHEZZA | TIPO FONDO | STATO PERCORRIBILITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 1.729,49 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 87 | Viabilità secondaria - tipo a | Pista trattorabile | 2.507,32 | Fondo naturale | Fondo mediamente sconnesso con erosione superficiale diffusa e dissesti localizzati causati dal mancato convogliamento acque meteoriche |
| 88 | Viabilità secondaria - tipo b | Sentiero | 664,36 | Fondo naturale | Fondo sconnesso a tratti difficilmente praticabile con dissesti localizzati per mancato convogliamento e regimentazione delle acque meteoriche |
| 89 | Viabilità secondaria - tipo b | Sentiero | 326,84 | Fondo naturale | Fondo sconnesso a tratti difficilmente praticabile con dissesti localizzati per mancato convogliamento e regimentazione delle acque meteoriche |
| 90 | Viabilità secondaria - tipo b | Sentiero | 1.135,54 | Fondo naturale | Fondo sconnesso a tratti difficilmente praticabile con dissesti localizzati per mancato convogliamento e regimentazione delle acque meteoriche |
| 91 | Viabilità secondaria - tipo b | Sentiero | 959,99 | Fondo naturale | Fondo sconnesso a tratti difficilmente praticabile con dissesti localizzati per mancato convogliamento e regimentazione delle acque meteoriche |
| 92 | Viabilità secondaria - tipo b | Sentiero | 1.272,78 | Fondo naturale | Fondo sconnesso a tratti difficilmente praticabile con dissesti localizzati per mancato convogliamento e regimentazione delle acque meteoriche |
| 93 | Viabilità secondaria - tipo b | Sentiero | 802,56 | Fondo naturale | Fondo sconnesso a tratti difficilmente praticabile con dissesti localizzati per mancato convogliamento e regimentazione delle acque meteoriche |
| 94 | Viabilità secondaria - tipo b | Sentiero | 493,81 | Fondo naturale | Fondo sconnesso a tratti difficilmente praticabile con dissesti localizzati per mancato convogliamento e regimentazione delle acque meteoriche |
| 95 | Viabilità secondaria - tipo b | Sentiero | 717,74 | Fondo naturale | Fondo sconnesso a tratti difficilmente praticabile con dissesti localizzati per mancato convogliamento e regimentazione delle acque meteoriche |

| ID | CLASSIFICAZIONE ai sensi del D.Interm. n.563734 del 28/10/2021 | DESCRIZIONE | LUNGHEZZA | TIPO FONDO | STATO PERCORRIBILITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Viabilità secondaria - tipo b | Sentiero | 335,41 | Fondo naturale | Fondo sconnesso a tratti difficilmente praticabile con dissesti localizzati per mancato convogliamento e regimentazione delle acque meteoriche |
| 97 | Viabilità secondaria - tipo b | Sentiero | 1.214,39 | Fondo Naturale | Fondo sconnesso a tratti difficilmente praticabile con dissesti localizzati per mancato convogliamento e regimentazione delle acque meteoriche |
| 98 | Viabilità secondaria - tipo b | Sentiero | 875,44 | Fondo naturale | Fondo sconnesso a tratti difficilmente praticabile con dissesti localizzati per mancato convogliamento e regimentazione delle acque meteoriche |
| 99 | Viabilità secondaria - tipo b | Sentiero | 2.545,31 | Fondo naturale | Fondo sconnesso a tratti difficilmente praticabile con dissesti localizzati per mancato convogliamento e regimentazione delle acque meteoriche |
| 100 | Viabilità ordinaria | Strada ordinaria | 7.984,24 | Fondo bituminoso | Fondo prevalentemente percorribile con sconnessioni puntuali e localizzate per eventi meteorici avversi |
| 101 | Viabilità ordinaria | Strada ordinaria | 6.690,26 | Fondo bituminoso | Fondo prevalentemente percorribile con sconnessioni puntuali e localizzate per eventi meteorici avversi |
| 102 | Viabilità ordinaria | Strada ordinaria | 4.529,31 | Fondo bituminoso | Fondo prevalentemente percorribile con sconnessioni puntuali e localizzate per eventi meteorici avversi |
| 103 | Viabilità ordinaria | Strada ordinaria | 1.341,20 | Fondo bituminoso | Fondo prevalentemente percorribile con sconnessioni puntuali e localizzate per eventi meteorici avversi |
| 104 | Viabilità ordinaria | Strada ordinaria | 1.177,97 | Fondo bituminoso | Fondo prevalentemente percorribile con sconnessioni puntuali e localizzate per eventi meteorici avversi |
| 105 | Viabilità ordinaria | Strada ordinaria | 272,55 | Fondo bituminoso | Fondo prevalentemente percorribile con sconnessioni puntuali e localizzate per eventi meteorici avversi |
| 106 | Viabilità ordinaria | Strada ordinaria | 2.202,22 | Fondo bituminoso | Fondo prevalentemente percorribile con sconnessioni puntuali e localizzate per eventi meteorici avversi |
| 107 | Viabilità ordinaria | Strada ordinaria | 3.750,31 | Fondo bituminoso | Fondo prevalentemente percorribile con sconnessioni puntuali e localizzate per eventi meteorici avversi |

| ID | CLASSIFICAZIONE ai sensi del D.Interm. n.563734 del 28/10/2021 | DESCRIZIONE | LUNGHEZZA | TIPO FONDO | STATO PERCORRIBILITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Viabilità ordinaria | Strada ordinaria | 1.173,18 | Fondo bituminoso | Fondo prevalentemente percorribile con sconnessioni puntuali e localizzate per eventi meteorici avversi |
| 109 | Viabilità ordinaria | Strada ordinaria | 8.586,61 | Fondo bituminoso | Fondo prevalentemente percorribile con sconnessioni puntuali e localizzate per eventi meteorici avversi |
| 110 | Viabilità ordinaria | Strada ordinaria | 960,77 | Fondo bituminoso | Fondo prevalentemente percorribile con sconnessioni puntuali e localizzate per eventi meteorici avversi |
| 111 | Viabilità ordinaria | Strada ordinaria | 338,30 | Fondo bituminoso | Fondo prevalentemente percorribile con sconnessioni puntuali e localizzate per eventi meteorici avversi |
| 112 | Viabilità ordinaria | Strada ordinaria | 4.093,76 | Fondo bituminoso | Fondo prevalentemente percorribile con sconnessioni puntuali e localizzate per eventi meteorici avversi |
| 113 | Viabilità ordinaria | Strada ordinaria | 705,48 | Fondo bituminoso | Fondo prevalentemente percorribile con sconnessioni puntuali e localizzate per eventi meteorici avversi |
| 114 | Viabilità ordinaria | Strada ordinaria | 2.330,10 | Fondo bituminoso | Fondo prevalentemente percorribile con sconnessioni puntuali e localizzate per eventi meteorici avversi |
| 115 | Viabilità ordinaria | Strada ordinaria | 3.786,19 | Fondo bituminoso | Fondo prevalentemente percorribile con sconnessioni puntuali e localizzate per eventi meteorici avversi |
| 116 | Viabilità ordinaria | Strada ordinaria | 3.128,76 | Fondo bituminoso | Fondo prevalentemente percorribile con sconnessioni puntuali e localizzate per eventi meteorici avversi |
| 117 | Viabilità ordinaria | Strada ordinaria | 13.446,04 | Fondo bituminoso | Fondo prevalentemente percorribile con sconnessioni puntuali e localizzate per eventi meteorici avversi |

## Valorizzazione turistico-ricreativa

Relegata ad un ruolo subalterno o accessorio fino a pochi anni fa, oggi la funzione turistico-ricreativa, delle superfici boscate e delle aree naturali in genere, assume grande interesse perché attira flussi notevoli di visitatori.

L'attribuzione della qualifica di Parco Regionale al territorio in esame, anche se impone un regime di tutela più incisivo, apporta sicuramente un effetto economicamente vantaggioso, di incremento dei flussi turistici. Detti flussi, però, vanno razionalmente canalizzati, affinché trovino positivi riscontri, sia le necessità dei turisti stessi, sia le giuste aspettative della comunità locale e, sia, ma non ultime, le motivazioni stesse dell'imposizione del vincolo: le emergenze naturalistiche che si sono volute preservare e che, se sottoposte ad un carico turistico soverchiante, rischiano di essere svilite o, per taluni aspetti, definitivamente vanificate.

Non è questa la sede deputata alla definizione delle linee di gestione turistica, che dovrà invece trovare ampia trattazione negli strumenti pianificatori e gestionali del Parco. L'assestatore non può, però, non considerare le forti implicazioni connesse alla frequentazione antropica sugli ecosistemi forestali. Vengono quindi proposte diverse prescrizioni, che dovranno in futuro essere integrate a livello dell'intero complesso dei monti Picentini e subire gli eventuali adattamenti e correzioni, che l'applicazione, in via provvisoria, dovessero suggerire.

È noto che il Comune Bagnoli Irpino, in relazione alle caratteristiche dell'ambiente fisico, costituisce una realtà territoriale a spiccata vocazione turistica, agricola e pastorale.

Dal punto di vista "naturalistico" il demanio comunale è caratterizzato dalla presenza di aree ad elevata attrazione turistica tra le quali primeggiano il Monte Cervialto e le sue pendici, e la stazione sciistica di Lago Laceno. Tale territorio, senza ombra di dubbio, costituisce una delle unità paesaggistiche più belle di tutto l'Appennino Meridionale, oltre modo importante per i suoi aspetti geomorfologici e la molteplicità di elementi che concorrono a rendere la sua flora e la sua fauna quanto mai ricca ed interessante (luogo ideale ad ospitare specie selvatiche di grande interesse naturalistico: tra cui l'aquila reale ed il lupo).

È anche noto che il demanio comunale, per la sua vastità e quindi per l'elevata incidenza della sua estensione in rapporto all'intera superficie territoriale del Comune, assume un ruolo *centrale* per l'economia locale.

La fiorente attività pastorale delle epoche passate, infatti, è stata resa possibile solo grazie al demanio comunale, che costituisce la base fondiaria principale (in molti casi esclusiva) dei tradizionali allevamenti ovi-caprini e bovini.

Purtroppo, a Bagnoli Irpino, come nella maggior parte dei territori montani del Paese e soprattutto dell'intera dorsale appenninica, le *attività primarie* sono state duramente colpite da quei fenomeni di marginalità, già in atto dall'inizio del secolo scorso e poi accentuatisi dopo gli anni '50 e che hanno fatto allentare o venir meno le connessioni fra agricoltura, pastorizia e selvicoltura che, una volta strettissime, rendevano vitale l'ambiente. Tale fenomeno è stato compensato dal turismo montano sia invernale che estivo grazie al polo di Piano Laceno con il complesso sciistico rinomato a livello regionale che dal 2017 ad oggi ha subito una forte contrazione a causa della dismissione degli impianti.

L'importanza del complesso turistico, riconosciuta a livello regionale, ha però consentito il convogliamento di cospicui finanziamenti per la realizzazione di nuovi impianti sciistici di risalita e di due sciovie che sono, alla data di redazione del presente P.G.F., in fase di realizzazione.

Il Comune di Bagnoli Irpino ha come strategia consolidata quella di puntare allo **sviluppo rurale** del territorio attraverso la organizzazione di attività produttive plurime ed integrate legate all'uso ed alla valorizzazione dell'ingente patrimonio delle risorse naturali disponibili, capace di

trasformare le risorse naturali in opportunità occupazionali ed economiche per il territorio, puntando su un tipo di valorizzazione che non procuri effetti di spiazzamento sulla cultura e sulle attività preesistenti ma che, piuttosto, miri all'integrazione con il preesistente tessuto produttivo attraverso forti effetti moltiplicatori indiretti ed indotti sul reddito e sull'occupazione locale.

In questa logica, il **turismo rurale** è senz'altro l'attività che traina il territorio comunale quale componente strutturale dell'economia locale. Infatti, la qualità della risorsa *ambientale* unitamente alla natura delle tradizionali *vocazioni produttive* (selvicoltura, raccolta tartufi, agricoltura, pastorizia ed artigianato), e alle infrastrutture presenti sul Piano Laceno, consentono di posizionare competitivamente questa zona su un segmento della domanda turistica caratterizzato dalla significativa capacità di attivazione economica a livello locale.

L'obiettivo della valorizzazione delle risorse naturali è, insomma, raggiunto soprattutto attraverso la promozione e lo sviluppo del turismo, diversificato per segmenti di domanda (naturalistico, ambientale, sportivo, culturale, gastronomico, ecc.).

Bisogna rilanciare l'interesse verso la natura, da parte di un crescente numero di persone, affinché assuma una valenza economica per il territorio (valorizzazione) creando effettive occasioni di spesa attraverso l'offerta di beni e servizi come il **nuovo complesso sciistico**, la **rete sentieristica**, le **proposte tipicizzate**, sia ristorative che di occasioni di acquisto (*prodotti tipici artigianali ed alimentari*) e le **strutture di ospitalità** rinnovate sia nell'aspetto che nella forma di offerte (B&B, AB&B).

Si propone, dunque, di rinforzare il binomio turismo e montagna, già sperimentato nel passato nel comune di Bagnoli Irpino con successo sia per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e naturale, sia per il miglioramento complessivo delle condizioni economiche e del benessere della popolazione montana (i comuni più agiati sono quelli a vocazione turistica). D'altronde i presupposti per uno sviluppo turistico ci sono.

Infatti il territorio comunale vanta, nel suo complesso, qualità paesistiche non indifferenti legate alle particolarità morfologiche, al mantenimento del paesaggio montano e, soprattutto, alla diffusione di strutture e manufatti legate alle attività produttive agricole e principalmente pastorali.

Sono, infatti, disseminati un po' ovunque ovili e abbeveratoi che, seppure in parte in stato di completo abbandono, costituiscono un vasto patrimonio di edilizia rurale che merita di essere salvaguardato e recuperato per inserirlo in programmi di sviluppo rurale.

È chiaro che questo tipo di sviluppo presuppone un programma di intervento organico e di ampio respiro, centrato sull'uso sostenibile delle risorse, e che sappia mobilitare capacità imprenditoriali private e risorse finanziarie; un programma che dovrà essere promosso dal Comune ma che necessariamente dovrà essere definito con la partecipazione attiva e concertata dei soggetti privati interessati e di altri soggetti pubblici che operano sul territorio, in primo luogo: Ente Parco e Comunità Montana.

In sostanza, è richiesta una serie articolata di iniziative, sia pubbliche che private, che debbono risultare strettamente funzionali tra loro e rispondenti agli obiettivi di sviluppo che si intendono perseguire, in tale direzione è fondamentale partecipare attivamente alle attività della *"strategia aree interne"*, nel caso specifico l'Area Interna "Alta Irpinia" per ottenere finanziamenti.

Tali interventi materiali vanno ovviamente preceduti ed accompagnati da un efficace azione di promozione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica tesa a formare e consolidare sul territorio un consenso crescente che porti alla consapevolezza del patrimonio naturale di cui si dispone per poterlo considerare come una possibilità reale per lo sviluppo economico.

Ovviamente va tenuto in debita considerazione il fatto che la *valorizzazione turistica* è strettamente legata alla *valorizzazione forestale, alla valorizzazione agricola* ed alla *valorizzazione*

*zootecnica*: un connubio indissolubile per le zone montane al punto che la stessa qualità ambientale è in stretto rapporto con la qualità dell'agricoltura e delle attività silvo-pastorali.

Ai fini di uno sviluppo così ipotizzato fondamentale e strategico è il ruolo che può, e dovrà ancora una volta, essere svolto proprio dal demanio comunale, finora visto come un bene a sola destinazione silvo-pastorale ma che, invece, bisogna necessariamente considerare come un sistema ambientale costituito da aree naturali "attive" e non "passive" e la cui identità e specificità deve essere sfruttata per fini economici.

Esso costituisce, invero, un patrimonio di immenso valore e qualità, le cui peculiarità e potenzialità, anche sotto il profilo delle prospettive economiche ed occupazionali, rappresentano un unicum che va politicamente considerato e sostenuto.

Si tratta, in sostanza, di prendere coscienza del nuovo rapporto che, sempre con maggiore insistenza, si va instaurando tra ambiente e società e che porta nella gestione dei beni silvo-pastorali, seppure dinamicamente mutevole, a privilegiare funzioni fino a qualche tempo fa ritenute secondarie rispetto a quelle più propriamente produttive e protettive ed, in particolare, le funzioni naturalistiche e turistico-ricreative.

Per effetto di tale evoluzione, la gestione del demanio richiede modelli colturali innovativi e azioni più idonee alle realtà locali, capaci di armonizzare le tradizionali forme d'uso dei beni silvo-pastorali con le emergenti attività legate soprattutto alla valorizzazione turistica di tali beni.

L'importanza turistica del demanio comunale è strettamente legata alle sue caratteristiche produttive, alla sua storia, alla peculiarità dei singoli ambienti.

Il gruppo montuoso del "Cervialto" che, nell'insieme interessa i territori di due Comuni confinanti (Calabritto e Bagnoli Irpino), dato il suo elevato pregio paesaggistico, naturalistico ed ecologico, può essere considerato il vero **cuore** del Parco Regionale dei Picentini e, come tale, in grado di svolgere, in termini di sviluppo turistico dell'area, la funzione di **grande attrattore** alla pari, se non in misura maggiore, di altri pur importanti e rinomati beni naturali e culturali presenti in Campania.

Per quanto riguarda, poi, la porzione di tale complesso montuoso ricadente nel territorio di Bagnoli Irpino, è da sottolineare la straordinaria presenza, in un'area relativamente piccola, di una miriade di emergenze ambientali e naturali armonicamente legate ad ambienti seminaturali (costituenti quest'ultimi la testimonianza di secoli di attività agricole, pastorali e selvicolturali) e che, nell'insieme, determinano uno dei sistemi ambientali senz'altro più suggestivi ed ammirati, non facilmente riscontrabili in altre realtà territoriali appenniniche.

A determinare la peculiarità di tali aree come *paesaggio selvaggio* concorrono: gli imponenti costoni rocciosi (le famose *balze* o *balzate*), il susseguirsi delle conche sommitali con i vertiginosi canaloni, le aree brulle e rocciose dei crinali dei versanti, le rupi, le doline e gli altri fenomeni carsici (grotte, inghiottitoi, fossi, ecc.), *i pascoli di alta quota* che si insinuano nelle rigogliose faggete determinando la presenza di aree a spiccata attitudine ricreativa e *gli innumerevoli punti panoramici*. Agli spetti prettamente paesaggistici va poi aggiunta la ricchezza in termini di *biodiversità* (dagli elementi della macchia mediterranea al faggio, al frassino, all'acero napoletano; ad una grandissima varietà di fiori - tra cui spiccano le orchidee, i narcisi, le viole – di funghi, di altri prodotti spontanei del sottobosco, di fauna selvatica, ecc.). La peculiarità si rispecchia poi anche nei *segni della millenaria attività dell'uomo e della cultura del passato*: terrazzamenti contenuti da muri a secco, piscine (invasi rivestiti in pietra), rifugi in pietra per i pastori, il fitto intreccio di sentieri e mulattiere, ecc.

Ci troviamo, quindi, di fronte ad un'area incantevole e di eccezionale qualità ambientale e tale da costituire un patrimonio raro e diversificato; una vera e propria **risorsa esclusiva** non riproducibile altrove e, come tale, valorizzabile anche dal punto di vista turistico.

Bisogna anche dire, però, che nonostante la loro valenza paesaggistica, naturalistica ed ambientale, tali aree sono ancora note solo a pochi (per lo più studiosi, appassionati e gitanti), prive di qualsiasi infrastruttura leggera (sentieri tracciati, segnaletica, ecc.) e di un'offerta di servizi che ne consentano una rispettosa fruizione.

L'area è comunque alla piena attenzione sia del Comune che di altri Enti territoriali ed in primis della Comunità Montana "Terminio Cervialto" per la realizzazione di diversi itinerari naturalistici.

In più, la presenza del **Parco e delle aree Natura 2000 (ZSC e ZPS)** rappresenta una garanzia per tutto il territorio perché consente di conservare, in primo luogo, la diversità biologica ed ecologica dell'area e poi perché consente un utilizzo sostenibile delle risorse naturali e lo sviluppo delle attività economiche compatibili con la salvaguardia dell'ambiente.

Ovviamente siamo ancora al punto di partenza di un lungo e faticoso percorso che, come già accennato, deve vedere impegnati, in un *unico progetto di sviluppo turistico del territorio*, soggetti privati e soggetti pubblici e tra questi in primo luogo il Comune cui spetta il compito principale di promuovere ogni utile iniziativa per migliorare il proprio patrimonio a vantaggio della crescita dell'economia locale.

Per quanto riguarda l'azione pubblica essa si dovrà svolgere prevalentemente su due fronti strategici:

- **il rilancio del complesso sciistico del Laceno** quale base per la **valorizzazione in termini turistici** dell'intero demanio comunale e, al tempo stesso, per produrre effetti propulsivi nel territorio finalizzati alla *crescita di una nuova imprenditoria locale*;
- **la tutela e il miglioramento della qualità e fruibilità ambientale**, premessa indispensabile per il successo turistico rurale, e poi realizzando una serie di interventi, sia immateriali che di tipo materiale, necessari per creare le condizioni di accessibilità dei luoghi con strade sentieri e messa in sicurezza dei territori.

**Per raggiungere tali scopi si potrà usufruire nei prossimi anni dei fondi comunitari** quali **CSR, PR-FEASR, PNRR.**

In particolare, per la fruizione turistico-ricreativa si prevede la realizzazione delle seguenti opere:

- **Interventi di valorizzazione turistica** (ripristino sentieri, panche, tavoli, palizzate, punti barbecue, cartellonistica informativa e divulgativa, etc).

In questa fase assumono carattere di priorità le località: Monte Rajamagra, Monte Cervialto, Monte Cervarolo e la zona della Piana del Laceno.

### *Circuiti tematici di fruizione territoriale*

L'obiettivo è la realizzazione delle condizioni infrastrutturali e strutturali necessarie alla creazione di un prodotto turistico territoriale appetibile e competitivo sul mercato della domanda turistica e su quella del tempo libero. Inoltre, ci si prefigge di rendere accessibili e fruibili le attrattive del territorio, e di creare un tessuto imprenditoriale in grado di soddisfare la molteplice e diversificata domanda di servizi proveniente dal movimento escursionistico e turistico, al momento allo stato incipiente ma che sicuramente potrà espandersi per effetto della valorizzazione delle attrattive ambientali.

È prevista, pertanto, la realizzazione di:

a) percorsi turistici guidati attraverso:
   - *identificazione e progetto degli itinerari;*
   - *realizzazione e installazione di segnaletica;*
   - *pulizia dei percorsi;*

- *recupero di manufatti ed edifici* di particolare interesse etno-antropologico (abbeveratoi, muretti a secco, cisterne, ecc.) se di arricchimento della valenza dei percorsi;

b) Servizi per i visitatori quali:
   - *punti di sosta*;
   - *aree di sosta attrezzate*;

Tali strutture, coerenti con il paesaggio e rispettose dell'ambiente, vanno localizzate nei punti migliori per la loro fruizione quali radure, aperture nel bosco verso zone di particolare interesse paesaggistico e panoramico.

I vari elementi, pertanto, vanno realizzati con tipologia rustica e originale ed impiegando legname e pietrame del posto.

**Nell'allegata cartografia dei miglioramenti sono indicate le localizzazioni di massima di tali strutture.**

Di seguito viene riportata la descrizione dettagliata dei vari sentieri turistici presenti nell'area che per completezza di informazione vengono descritti nella lora interezza ma, **ovviamente, gli interventi previsti (sopra riportati) nel presente piano riguardano soli i tratti di sentieristica che ricadono all'interno del territorio di Bagnoli Irpino e che interessano direttamente le aree oggetto di pianificazione.**

**Tabella 35. Elenco dei sentieri turistici presenti**

| N | Sentiero | Interesse |
|---|---|---|
| 1 | Sentiero dei Boscaioli | Ambientale - Naturalistico |
| 2 | Sentiero della Fontana di Don Giovanni e Fiumara di Tannera | Ambientale - Naturalistico<br>Fontana di Don Giovanni |
| 3 | Grotta di Strazzatrippa e Fiumara di Tannera | Ambientale - Naturalistico<br>Grotta di Strazzatrippa |
| 4 | Sentiero Monte Cervialto | Ambientale - Naturalistico |
| 5 | Rajamagra per la Settevalli | Ambientale - Naturalistico<br>Pista da sci Settevalli |
| 6 | Grotta S. Pantalone | Ambientale - Naturalistico<br>Grotta S.Pantalone<br>Fontana di Chianizza |
| 7 | Acqualeggia | Ambientale - Naturalistico |
| 8 | Grotta del Caliendo | Ambientale - Naturalistico<br>Grotta del Caliendo |
| 9 | Rajamagra per la Nordica | Ambientale - Naturalistico |
| 10 | I Tre Cervi | Ambientale - Naturalistico<br>Caserma Tronola<br>Fontana del Lagaretto |
| 11 | Monte-Calvello | Ambientale - Naturalistico<br>Caserma Tronola<br>Fontana del Lagaretto<br>Sorgente Tronola |
| 12 | Montagnone di Nusco | Ambientale - Naturalistico<br>Faggio secolare "La Piovra" |
| 13 | Sentiero dell'Amore | Ambientale - Naturalistico<br>Caserma Tronola<br>Fontana del Lagaretto<br>Sorgente Tronola |

| N | Sentiero | Interesse |
|---|---|---|
| 14 | Circuito delle 13 Chiese | Ambientale - Naturalistico<br>San Guglielmo<br>San Gerardo<br>Madonna del Fiume<br>Cappella dei Grienzi<br>Santa Nesta,<br>Chiesa di S.Lorenzo<br>S.Francesco<br>Sorgente Petrella<br>Fontana del Lagaretto<br>Caserma Tronola<br>Sorgente Tronola<br>Grotta di San Guglielmo<br>Belvedere sul Lago Laceno |
| 15 | Collegamento al sentiero Italia | Ambientale - Naturalistico<br>Ponte Pinzarrino<br>Fontana di Dongiovanni |
| 16 | Il Nonno dell'Acernese | Ambientale - Naturalistico<br>Pista da sci Settevalli |
| 17 | Sentiero delle sorgenti | Ambientale - Naturalistico<br>Sorgenti del Monte Calvello |
| 18 | Sentiero del Porcino | Ambientale - Naturalistico<br>Campeggio Zauli |
| 19 | Anello panoramico del Laceno | Ambientale - Naturalistico<br>Caserma Tronola<br>Seggiovie |
| 20 | Grotta di San Guglielmo da Bagnoli | Ambientale - Naturalistico<br>Chiesa Madre a Bagnoli<br>Grotta di San Guglielmo |

## Caratteristiche tecniche del sentiero n°1 - Sentiero dei Boscaioli

### Descrizione

In partenza dal Piano Laceno la salita è dolce e la pendenza costante. Dal Bivio tra Valle Scura di Sotto e Valle Scura di Sopra e fino alla Cima del Monte Belvedere si deve superare un tratto iniziale di circa 200 m in cui la pendenza è consistente; poi vi sono circa 500 m su traverso e traccia di sentiero, seguiti da circa 200 m esposti e gli ultimi 50 m, prima di raggiungere la vetta, leggermente ripidi. La discesa per la Valle dei Porci è inizialmente facile e poi scabrosa con tratti in cui il ruscellamento dell'acqua meteorica ha scavato una stretta trincea. Più a valle il sentiero diventa più facilmente percorribile per diventare, alla fine, nei castagneti, una carrareccia. La vegetazione, scarsa nel tratto da Valle Scura di Sotto alla cima del Monte Belvedere presenta faggi anche secolari; la fauna è quella tipica dei Monti Picentini con il lupo che sta ricominciando a popolare le zone più impervie. La morfologia evidenzia la linea di confine tra la placca africana e quella europea.




### Mappa del sentiero

### Informazioni sintetiche

Tappe del sentiero: S. Maria – Piscacca (M. Magnone) – Valle Scura di Sopra – Fieste
Segnaletica orizzontale: mancante
Segnaletica verticale: mancante
*Dislivello in salita: 300 m – Dislivello in discesa: 610 m*
*Lunghezza: 9,470 km – Difficoltà: E*
*Durata andata: 3 ore – Durata ritorno: 4 ore*
*Altitudine massima: 1361 m – Altitudine minima: 755 m*
*Tipologia: Traversata*
Attività possibili sul sentiero: escursionismo a piedi su tutto il sentiero.

**Sentieri correlati**
14 – 15 – 19
**Avvertenze**
Prima di arrivare in vetta al Monte Belvedere vi è un tratto esposto di circa 200 m che si percorre in salita e in discesa. Da Valle Scura di Sopra a Fieste la discesa è scabrosa.

**Come raggiungere il sentiero**
La località Pezze di S. Maria si raggiunge da Colle Molella e dalla strada Laceno – Lioni da una stradina asfaltata che si prende a sinistra. Fieste si raggiunge dalla strada che da Bagnoli porta a Fontigliano passando per il Cimitero e, dopo la Cappella della Pietà, dopo circa 500 m, prendendo il sentiero a destra nei castagneti.

**Toponimi del percorso e relative quote**
Pezze di S. Maria (1060 m) – Valle Scura di Sotto (1300 m) – Valle Scura di Sopra (1307 m) – Monte Belvedere (1361 m) – Fieste (755 m).

**Punti di rifornimento idrico durante il percorso**
Nessun punto di rifornimento idrico lungo il percorso.

## Caratteristiche tecniche del sentiero n°2 - Sentiero della Fontana di Don Giovanni e Fiumara di Tannera

**Descrizione**

In partenza da Colle del Leone il percorso è su mulattiera con pendenza quasi subito dolce e costante. Al Bivio di Prato del Leone si va a destra con alcuni tratti in leggera salita in destra orografica del vallone. Successivamente si scende nel vallone dove si trova la Fontana di Don Giovanni. Si sale verso la sella che si trova difronte alla fontana e si scende verso la fiumara su un sentiero a tornanti. La discesa è facile pur se con pendenza apprezzabile addolcita dai tornanti. Un salto d'acqua nei pressi di un recinto di salvaguardia ad opere di captazione, può essere il luogo per effettuare una sosta contemplativa. La vegetazione, scarsa nel tratto di Prato del Leone, e la fauna sono quelle tipiche dei Monti Picentini.




**Mappa del sentiero**

**Informazioni sintetiche**

Tappe del sentiero: Colle del Leone – Fontana di Don Giovanni – Fiumara di Tannera
Segnaletica orizzontale: mancante
Segnaletica verticale: mancante
*Dislivello in salita: 310 m – Dislivello in discesa: 310 m*
*Lunghezza: 3060 m – Difficoltà: E*
*Durata andata: 1 ora e 15 minuti – Durata ritorno: 1 ora e 45 minuti*
*Altitudine massima: 1220 m – Altitudine minima: 910 m*
Tipologia: Traversata

**Attività possibili sul sentiero:**
Escursionismo a piedi su tutto il sentiero – escursionismo a cavallo e mountain bike da Colle del Leone a Fontana di Don Giovanni.

**Sentieri Correlati**
3 – 4 – 8 – 15 – 16 – 18

**Avvertenze**
La discesa ripida all'inizio del sentiero per circa 150 m e subito dopo la Fontana di Don Giovanni, per circa 500 m e fino alla Fiumara, consigliano attenzione specialmente in caso di pioggia.

**Come raggiungere il sentiero**
Colle del Leone è facilmente raggiungibile, anche in auto, attraverso la strada Lago Laceno – Calabritto/Acerno.

**Toponimi del percorso e relative quote**
Colle del Leone (1220 m) – Prato del Leone (1100 m) – Fontana di Don Giovanni (1060 m) – Fiumara di Tannera (910 m).

**Punti di rifornimento idrico durante il percorso**
Fontana di Don Giovanni, quando non è in secca.

## Caratteristiche tecniche del sentiero n°3 - Grotta di Strazzatrippa e Fiumara di Tannera

**Descrizione**

In partenza da Colle del Leone il percorso è su mulattiera con pendenza quasi subito dolce e costante. Se si parte da Cava di Rena è subito su mulattiera. Al Bivio di Prato del Leone si va a sinistra. Successivamente si attraversa il Piano del Cupone e appena leggermente in salita c'è la Grotta di Strazzatrippa. Per accedervi c'è bisogno di una corda, di lampada frontale e casco protettivo. Si sale verso la sella sopra la grotta e, prima di scendere direttamente all'emergenza, si può godere di un punto panoramico tenendosi alquanto sulla sinistra. La risorgenza si trova su versante in pendenza consistente e, per entrarci, bisogna strisciare attraverso l'ingresso. Dalla risorgenza della grotta e per altri 150 m la pendenza è ancora consistente. Dopo questo tratto si scende dolcemente per circa 1 Km alla Fiumara che conviene guadare diverse volte per arrivare ad un salto d'acqua nei pressi di un recinto di salvaguardia di opere di captazione dove si può effettuare una sosta contemplativa. La vegetazione, scarsa nel tratto di Prato del Leone, e la fauna sono quelle tipiche dei Monti Picentini.




**Mappa del sentiero**

**Informazioni sintetiche**

Tappe del sentiero: Colle del Leone/Cava della Rena – Piano del Cupone – Grotta di Strazzatrippa – Risorgenza – Fiumara di Tannera
Segnaletica orizzontale: mancante
Segnaletica verticale: mancante
*Dislivello in salita: 310 m – Dislivello in discesa: 310 m*
*Lunghezza: 5,040 km – Difficoltà: EE*
*Durata andata: 2 ore – Durata ritorno: 2h:50'*
*Altitudine massima: 1220 m – Altitudine minima: 910 m*
Tipologia: Traversata

**Attività possibili sul sentiero:**
Escursionismo a piedi su tutto il sentiero – escursionismo a cavallo e mountain bike da Colle del Leone/Cava della Rena a Grotta di Strazzatrippa.

**Sentieri Correlati**
2 – 4 – 8 – 15 – 16 – 18

**Avvertenze**
La discesa ripida all'inizio del sentiero a Colle del Leone per circa 150 m e i 150 m prima e dopo la risorgenza (grotta degli Angeli), consigliano attenzione specialmente in caso di pioggia.

**Come raggiungere il sentiero**
Colle del Leone è facilmente raggiungibile, anche in auto, attraverso la strada Lago Laceno – Calabritto/Acerno.

**Toponimi del percorso e relative quote**
Colle del Leone (1220 m) /Cava della Rena (1210 m) – Piano del Cupone (1121 m) – Grotta di Strazzatrippa (1130 m) – Risorgenza/Grotta degli Angeli (1065 m) – Fiumara di Tannera (910 m).

**Punti di rifornimento idrico durante il percorso**
Nessun punto di rifornimento idrico lungo il percorso.

## Caratteristiche tecniche del sentiero n°4 - Sentiero Monte Cervialto

**Descrizione**

La partenza del sentiero è a circa 200 m sulla sinistra della strada Lago Laceno – Calabritto/Acerno, dopo Colle del Leone. Il percorso è su mulattiera con pendenza subito dolce e costante. Dopo il Bivio Sterrato si prosegue fuori sentiero con pendenza consistente. La vegetazione è assente dal Bivio Sterrato alla cima del Monte Cervialto e Nel restante tratto è, come la fauna, quella tipica dei Monti Picentini.

**Mappa del sentiero**




**Informazioni sintetiche**

Tappe del sentiero: Colle del Leone – Monte Cervialto
Segnaletica orizzontale: mancante
Segnaletica verticale: mancante
*Dislivello in salita: 590 m – Dislivello in discesa: 590 m*
*Lunghezza: 6,830 km – Difficoltà: E*
*Durata andata: 2h:30' – Durata ritorno: 2h*
*Altitudine massima: 1810 m – Altitudine minima: 1220 m*
Tipologia: Traversata

**Attività possibili sul sentiero:**

Escursionismo a piedi su tutto il sentiero – escursionismo a cavallo e mountain bike da Colle del Leone al bivio Sterrato.

**Sentieri Correlati**

2 – 3 – 8 – 10 – 15 – 16 – 18

**Avvertenze**

Fino al bivio Sterrato la pendenza è agevole e si procede su sterrato. Dopo il bivio Sterrato si procede

fuori sentiero con pendenza consistente. Su tale tratto in discesa prestare attenzione in caso di pioggia.

**Come raggiungere il sentiero**
Colle del Leone è facilmente raggiungibile, anche in auto, attraverso la strada Lago Laceno – Calabritto/Acerno.

**Toponimi del percorso e relative quote**
Colle del Leone (1220 m) – Filicecchio Bivio Sterrato (1650 m) – Monte Cervialto (1810 m).

**Punti di rifornimento idrico durante il percorso**
Nessun punto di rifornimento idrico lungo il percorso.

## Caratteristiche tecniche del sentiero n° 5 - Rajamagra per la Settevalli

**Descrizione**
La partenza del sentiero è l'inizio della pista da sci detta Settevalli il cui percorso viene seguito, passando per l'Intermedio, fino alla cima del Monte Rajamagra.

**Mappa del sentiero**




**Informazioni sintetiche**
Tappe del sentiero: Piazzale seggiovie – Rajamagra (per la pista Settevalli)
Segnaletica orizzontale: mancante
Segnaletica verticale: mancante
*Dislivello in salita: 540 m – Dislivello in discesa:n/d*
*Lunghezza: 4060 m – Difficoltà: E*
*Durata andata: 2 ore – Durata ritorno: 1 ora e 30 minuti*
*Altitudine massima: 1625 m – Altitudine minima: 1090 m*
Tipologia: Traversata

**Attività possibili sul sentiero:**
Escursionismo a piedi su tutto il sentiero – escursionismo a cavallo e mountain bike su tutto il sentiero.

**Sentieri Correlati**
9 – 13 – 14 – 16 – 19

**Avvertenze**
La pendenza è agevole su tutto il sentiero dove si procede su sterrato. In discesa prestare attenzione in caso di pioggia.

**Come raggiungere il sentiero**
Il piazzale delle seggiovie è facilmente raggiungibile, anche in auto, attraverso la strada che porta al

Lago Laceno.

**Toponimi del percorso e relative quote**

Piazzale seggiovie (1090 m) – Intermedio (1410 m) – Monte Rajamagra tracciato di fondo (1625 m).

**Punti di rifornimento idrico durante il percorso**

Nessun punto di rifornimento idrico lungo il percorso.

## Caratteristiche tecniche del sentiero n° 6 - Grotta S. Pantalone

**Descrizione**

Il percorso è su asfalto da Bagnoli Irpino al tornante prima della Grotta di S. Pantalone, poi è su sterrato ciottoloso fino alla Fontana di Chianizza e poi su sterrato. La pendenza è consistente dal tornante prima della Grotta di S. Pantalone alla Fontana di Chianizza e dal Trono a S. Nesta. La vegetazione e la fauna, sono quelle tipiche dei Monti Picentini.

**Mappa del sentiero**




**Informazioni sintetiche**

Tappe del sentiero: Bagnoli – Grotta S.Pantalone – Chianizza – Valle Piana – Santa Nesta
Segnaletica orizzontale: parziale
Segnaletica verticale: mancante
*Dislivello in salita: 500 m*
*Lunghezza: 7480 m – Difficoltà: EE*
*Durata andata: 3 ore e 20 minuti – Durata ritorno: 2 ore e 30 minuti*
*Altitudine massima: 1118 m – Altitudine minima: 650 m*
Tipologia: Traversata

**Attività possibili sul sentiero:**

Escursionismo a piedi e in mountain bike su tutto il sentiero.

**Sentieri Correlati**

8 – 14 – 19 – 20

**Avvertenze**

La discesa è ripida nel tratto Trono – Santa Nesta e Chianizza – S.Pantalone. In discesa bisogna prestare attenzione specialmente in caso di pioggia o neve.

**Come raggiungere il sentiero**
Bagnoli Irpino e Santa Nesta sono facilmente raggiungibili, anche in auto, attraverso la strada per il Lago Laceno

**Toponimi del percorso e relative quote**
Bagnoli Irpino (650 m) – S. Domenico (655 m) – Grotta S. Pantalone (875 m) – Fontana di Chianizza (1039) – (Valle Piana (1140) – Il Trono (1188 m) – Santa Nesta (1051 m)

**Punti di rifornimento idrico durante il percorso**
Fontana di Chianizza

## Caratteristiche tecniche del sentiero n° 7 - Acqualeggia

**Descrizione**
La partenza del sentiero dal Vallone Rajamagra è sulla sella tra il Monte Rajamagra e Montagna Grande. Si prende lo sterrato che porta sul sentiero Colle Molella – Colle del Leone che si segue per un tratto fino a prendere il sentiero sulla sinistra che porta in ripida discesa verso la località Acqualeggia.

**Mappa del sentiero**




**Informazioni sintetiche**
Tappe del sentiero: Vallone Rajamagra – Acqualeggia
Segnaletica orizzontale: mancante
Segnaletica verticale: mancante
*Dislivello in salita: 150 m – Dislivello in discesa: 710 m*
*Lunghezza: 4450 m – Difficoltà: E*
*Durata andata: 2 ore e 30 minuti – Durata ritorno: 3 ore e 30 minuti*
*Altitudine massima: 1430 m – Altitudine minima: 875 m*
Tipologia: Traversata

**Attività possibili sul sentiero:**
Escursionismo a piedi su tutto il sentiero.

**Sentieri Correlati**
8 – 9

**Avvertenze**
La pendenza è consistente su tutto il sentiero tranne che nel tratto di sentiero Colle Molella – Colle del Leone dove è agevole; si procede su sterrato dal Vallone Rajamagra al sentiero Colle Molella – Colle del Leone. In discesa prestare attenzione in caso di pioggia.

**Come raggiungere il sentiero**

Il Vallone Rajamagra si raggiunge mediante i sentieri correlati; La partenza in località Acqualeggia è facilmente raggiungibile, anche in auto, attraverso la strada che da Bagnoli Irpino porta alle Croci di Acerno, salendo sulla sinistra dopo la Valle del Caliendo e andando fino in fondo sul tratto che termina senza uscita.

**Toponimi del percorso e relative quote**

Vallone Rajamagra (1430 m) – Località Acqualeggia (875 m).

**Punti di rifornimento idrico durante il percorso**

Nessun punto di rifornimento idrico lungo il percorso.

## Caratteristiche tecniche del sentiero n° 8 - Grotta del Caliendo

**Descrizione**

Il percorso è su sterrato, parte da Colle della Molella e termina a Colle del Leone, passando al bivio Grotta del Caliendo dove devia per condurre fino alla Grotta. La pendenza è quasi sempre dolce tranne che nel tratto che va dal Bivio Grotta del Caliendo fino alla Grotta del Caliendo. La vegetazione e la fauna, sono quelle tipiche dei Monti Picentini.

**Mappa del sentiero**




**Informazioni sintetiche**

Tappe del sentiero: Colle Molella – Grotta del Caliendo – Colle del Leone
Segnaletica orizzontale: mancante
Segnaletica verticale: mancante
*Dislivello in salita: 600 m – Dislivello in discesa: 460 m*
*Lunghezza: 12.200 m – Difficoltà: E*
*Durata andata: 4 ore – Durata ritorno: 3 ore e 30 minuti*
*Altitudine massima: 1425 m – Altitudine minima: 850 m*
Tipologia: Traversata

**Attività possibili sul sentiero:**

Escursionismo a piedi su tutto il sentiero.

**Sentieri Correlati**

2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 14 – 19 – 20

**Avvertenze**
La discesa è ripida nel tratto Bivio Grotta del Caliendo – Grotta del Caliendo, agevole sul restante percorso. Nel tratto Bivio Grotta del Caliendo – Grotta del Caliendo attenzione in caso di pioggia o neve perché si scivola in discesa.

**Come raggiungere il sentiero**
Colle del Leone è facilmente raggiungibile, anche in auto, attraverso la strada Lago Laceno – Calabritto/Acerno. Colle Molella è facilmente raggiungibile, anche in auto, perché si trova sulla strada Bagnoli Irpino – Lago Laceno sulla sella di scollinamento.

**Toponimi del percorso e relative quote**
Colle Molella (1084) – Grotta del Caliendo (850 m) - Colle del Leone (1220 m).

**Punti di rifornimento idrico durante il percorso**
Nessun punto di rifornimento idrico lungo il percorso.

## Caratteristiche tecniche del sentiero n° 9 - Rajamagra per la Nordica

**Descrizione**
Il percorso segue la pista da sci detta Nordica fino in cima alla Vetta del Monte Rajamagra. Sulla cresta verso ovest si gode della vista della Piana del Sele e dei Monti Lattari. La vegetazione e la fauna, è quella tipica dei Monti Picentini.

**Mappa del sentiero**

**Informazioni sintetiche**
Tappe del sentiero: Parcheggio Seggiovie – Sella del Sagrestano – Monte Raiamagra
Segnaletica orizzontale: mancante
Segnaletica verticale: mancante
*Dislivello in salita: 570 m*
*Lunghezza: 3.830 m – Difficoltà: E*
*Durata andata: 2 ore e 30 minuti – Durata ritorno: 1 ora e 40 minuti*
*Altitudine massima: 1667 m – Altitudine minima: 1097 m*
Tipologia: Traversata

**Attività possibili sul sentiero:**
Escursionismo a piedi su tutto il sentiero.

**Sentieri Correlati**
5 – 7 – 13 – 14 – 16 – 19

**Avvertenze**
La pendenza dolce dal Piazzale delle Seggiovie e fino alla Sella del Sagrestano, diventa consistente dalla Sella del Sagrestano alla vetta del Monte Rajamagra.

**Come raggiungere il sentiero**
Il Piazzale delle Seggiovie è facilmente raggiungibile, anche in auto, attraverso la strada del Lago Laceno.

**Toponimi del percorso e relative quote**
Parcheggio Seggiovie (1097 m) – Sella del Sagrestano (1430 m) – Monte Rajamagra (1667 m).

**Punti di rifornimento idrico durante il percorso**
Nessun punto di rifornimento idrico lungo il percorso.

## Caratteristiche tecniche del sentiero n° 10 - I Tre Cervi

**Descrizione**

In partenza dalla Caserma Tronola (ex Forestale) si percorre la stradina asfaltata che porta al Belvedere e all'incrocio con la strada Laceno – Lioni da dove inizia il sentiero che sale alla Sella del Lagaretto e scende alla Piana di Sazzano passando per la Fontana del Lagaretto. Dal Piano di Sazzano si sale verso il Cervarulo di Calabritto, quindi si scende leggermente per poi salire sul Monte Cervialto. Si scende, poi, verso la Valle di Giamberardino da dove si sale di poco verso il Cervarolo di Bagnoli per scendere verso la Sella del Lagaretto e, percorrendo il tratto già percorso all'andata, si scende alla Caserma della Tronola. La vegetazione e la fauna sono quelle tipiche dei Monti Picentini.

**Mappa del sentiero**




**Informazioni sintetiche**

Tappe del sentiero: Caserma Tronola – Belvedere – Sella del Lagaretto – Monte Cervarulo (di Calabritto) – Monte Cervialto – Monte Cervarolo (di Bagnoli)
Segnaletica orizzontale: mancante
Segnaletica verticale: mancante
*Dislivello in salita: 800 m – Dislivello in discesa: 800 m*
*Lunghezza: 13.890 m – Difficoltà: E*
*Durata andata: 5 ore – Durata ritorno: 5 ore*
*Altitudine massima: 1808 m – Altitudine minima: 1184 m*
Tipologia: Anello

**Attività possibili sul sentiero:**

Escursionismo a piedi su tutto il sentiero.

**Sentieri Correlati**
11 – 14 – 15 – 19

**Avvertenze**
La discesa ripida dal Monte Cervialto per circa 1 Km nei due sensi di marcia, consigliano attenzione specialmente in caso di pioggia.

**Come raggiungere il sentiero**
La Caserma della Forestale Tronola è facilmente raggiungibile, anche in auto, attraverso la strada Lago Laceno – Lioni dopo Aria della Spina.

**Toponimi del percorso e relative quote**
Caserma Tronola (1184 m) – Sella del Lagaretto (1351m) – Piano Sazzano (1246 m) – Cervarulo di Calabritto (1632 m) – Cervialto (1808 m) – Cervarolo di Bagnoli (1546 m) – Caserma Tronola (1184).

**Punti di rifornimento idrico durante il percorso**
Fontana del Lagaretto.

## Caratteristiche tecniche del sentiero n° 11 - Monte Calvello

**Descrizione**

In partenza dal Vivaio si sale lungo la recinzione a protezione della Sorgente Tronola fino alla Caserma Tronola (ex Forestale); si percorre la stradina asfaltata che porta ai due Belvedere e si sale alla Sella del Lagaretto. Dopo la leggera discesa verso la Fontana del Lagaretto, si sale verso la Sorgente del Lagaretto e la Corsa dei Cavalli. Una leggera discesa su sterrato porta allo Stazzo e, poi, l'impennata verso la vetta del Monte Calvello. La vegetazione e la fauna sono quelle tipiche dei Monti Picentini.

**Mappa del sentiero**




**Informazioni sintetiche**

Tappe del sentiero: Vivaio – Caserma Tronola – Belvedere – Sella del Lagaretto – Fontana Lagaretto – Sorgente Lagaretto – Stazzo – Monte Calvello
Segnaletica orizzontale: mancante
Segnaletica verticale: mancante
*Dislivello in salita: 620 m – Dislivello in discesa: 100 m*
*Lunghezza: 6.130 m – Difficoltà: E*
*Durata andata: 3 ore e 30 minuti – Durata ritorno: 3 ore*
*Altitudine massima: 1579 m – Altitudine minima: 1052 m*
Tipologia: Traversata

**Attività possibili sul sentiero:**

Escursionismo a piedi su tutto il sentiero – escursionismo in mountain bike da Caserma Tronola allo Stazzo.

**Sentieri Correlati**

10 – 13 – 14 – 15 – 19

**Avvertenze**

Nel ritorno la discesa è ripida dal Monte Calvello allo Stazzo e dalla Caserma Tronola alla Sorgente Tronola per cui attenzione specialmente in caso di pioggia.

**Come raggiungere il sentiero**

La Caserma della Forestale Tronola è facilmente raggiungibile, anche in auto, attraverso la strada Lago Laceno – Lioni dopo Aria della Spina.

**Toponimi del percorso e relative quote**

Vivaio (1052 m) – Caserma Tronola (1184 m) – Belvedere (1210 m) – Sella del Lagaretto (1351m) – Fontana Lagaretto (1312 m) – Sorgente Lagaretto (1375) – Corsa dei Cavalli (1400 m) – Stazzo (1346 m) – Monte Calvello (1579 m).

**Punti di rifornimento idrico durante il percorso**

Fontana del Lagaretto.

## Caratteristiche tecniche del sentiero n° 12 - Montagnone di Nusco

**Descrizione**

Dopo un tratto di circa 1,5 Km, il percorso contiene due possibili anelli; un primo anello permette l'aggiramento a sud del Serro Tondo passando nei pressi di un faggio secolare, molto bello, detto la Piovra per le sue molteplici diramazioni radicali che lo fanno sembrare appunto una piovra. L'aggiramento del Serro Tondo a nord, invece, chiude un secondo anello che porta, in senso antiorario, alla Valle dei Lupi, al Pozzo di San Guglielmo, al Montagnone di Nusco e al pozzo di Bagnoli, chiudendo l'anello con il tratto a nord del Serro Tondo. Per raggiungere la vetta del Montagnone di Nusco bisogna lasciare il percorso di questo anello per un'andata e ritorno alla vetta. La vegetazione e la fauna sono quelle tipiche dei Monti Picentini.

**Mappa del sentiero**




**Informazioni sintetiche**

Tappe del sentiero: Salve Regina – Valle dei Lupi – Pozzo di San Guglielmo – Montagnone di Nusco – Pozzo di Bagnoli – La Piovra – Salve Regina
Segnaletica orizzontale: mancante
Segnaletica verticale: mancante
*Dislivello in salita: 620 m – Dislivello in discesa: 620 m*
*Lunghezza: 11.590 m – Difficoltà: E*
*Durata andata: 5 ore – Durata ritorno: 5 ore*
*Altitudine massima: 1490 m – Altitudine minima: 1254 m –*
Tipologia: Anello

**Attività possibili sul sentiero:**

Escursionismo a piedi su tutto il sentiero.

**Sentieri Correlati**
14 – 15

**Avvertenze**
Si tratta di un percorso con continui saliscendi. Nella salita e discesa dal Montagnone di Nusco la pendenza è consistente per cui attenzione specialmente in caso di pioggia.

**Come raggiungere il sentiero**
Il toponimo di Salve Regina è facilmente raggiungibile, anche in auto, attraverso la strada Lago Laceno – Lioni dopo circa 3 Km dall'inizio della strada stessa.

**Toponimi del percorso e relative quote**
Salve Regina (1254 m) – Valle dei Lupi (1350 m) – Pozzo di San Guglielmo (1314 m) – Montagnone di Nusco (1490 m) – Pozzo di Bagnoli (1273 m) – La Piovra (1310 m) – Salve Regina (1254 m).

**Punti di rifornimento idrico durante il percorso**
Pozzo di San Guglielmo e Pozzo di Bagnoli quando non sono in secca.

## Caratteristiche tecniche del sentiero n° 13 - Sentiero dell'Amore

**Descrizione**

Partendo dal Villaggio Laceno si percorre la strada asfaltata interna che porta alla Sorgente Tronola. Nei pressi della sorgente si svolta a destra lungo il sentiero dell'acquedotto e si percorre tutto il sentiero che, a monte del Villaggio Laceno, lo supera. Dopo il superamento del Villaggio Laceno si scende leggermente fino all'incrocio asfaltato chiamato "Li Gruttuni" e si imbocca il sentiero che, in leggera salita, porta in località Serroncelli. L'anello si chiude tornando sulla strada interna asfaltata al Villaggio Laceno. La vegetazione e la fauna sono quelle tipiche dei Monti Picentini.

**Mappa del sentiero**




**Informazioni sintetiche**

Tappe del sentiero: Villaggio Laceno – Sorgente Tronola – Li Gruttuni – Serroncelli – Villaggio Laceno
Segnaletica orizzontale: presente
Segnaletica verticale: mancante
*Dislivello: irrilevante*
*Lunghezza: 5.900 m – Difficoltà: T*
*Durata andata: 1 ora e 30 minuti*
*Altitudine massima: 1100 m – Altitudine minima: 1055 m*
Tipologia: Anello

**Attività possibili sul sentiero:**

Escursionismo a piedi su tutto il sentiero.

**Sentieri Correlati**

9 – 11 – 14 – 16 – 19

**Avvertenze**
Si tratta di un percorso con continui e facili saliscendi. Nei tratti di sentiero fare attenzione specialmente in caso di pioggia.

**Come raggiungere il sentiero**
Il Villaggio Laceno è facilmente raggiungibile anche in auto dal circuito asfaltato del Lago Laceno.

**Toponimi del percorso e relative quote**
Villaggio Laceno (1055 m) – Sorgente Tronola (1100 m) – Li Gruttuni (1065 m) – Serroncelli (1100 m) – Villaggio Laceno (1055 m).

**Punti di rifornimento idrico durante il percorso**
Nessun punto di rifornimento idrico lungo il percorso.

## Caratteristiche tecniche del sentiero n° 14 - Circuito delle 13 Chiese

**Descrizione**

Da S. Francesco alla strada ferrata è su asfalto, su traccia di sentiero per un breve tratto e poi su cemento e asfalto fino a Bagnoli Irpino e Fieste. Da Fieste, dopo il castagneto, si sale su sentiero per la Valle dei Porci fino al Pozzo di Bagnoli e di San Guglielmo con tratti anche su facile sterrato. Dopo un tratto in asfalto, di nuovo su sentiero fino alla Fontana di Marcantonio da dove, su stradina asfaltata, si raggiunte il Goleto, Lioni e Caposele. Dopo la deviazione per San Gerardo, sempre su stradina asfaltata o su sterrato, si arriva al Rio Zagarone che si supera per salire a Calabritto. Poco dopo q. 449, dove c'è la confluenza del Vallone del Lupolo con il Rio Zagarone, si sale ripidamente verso il sentiero a mezza costa che porta a Madonna del Fiume. Dopo la breve deviazione di Madonna del Fiume, tornando indietro per circa 500 m, si prosegue in direzione sud-sudovest. In prossimità di q. 735 del Vallone del Lupolo, si sale la Raia della Quercia con brevi tornanti, per scendere, poi verso la Sorgente Petrella e la Cappella dei Grienzi. Lo sterrato del Piano dei Grienzi porta alla strada per Sazzano e al Piano di Sazzano stesso. Lasciando la strada si sale verso la Fontana del Lagaretto, si scollina alla Sella e si scende verso il Belvedere sul Lago Laceno, alla Caserma della Forestale e alla Sorgente Tronola. Volendo si può scendere sul circuito del Lago Laceno passando per il Vivaio, altrimenti, alla fine della recinzione della Sorgente, si prende a sinistra per il tracciato dell'acquedotto, si supera, alle sue spalle, il Villaggio Laceno e si percorre il sentiero dei Serroncelli fino a prendere a destra, poco prima di arrivare al parcheggio delle Seggiovie. Lambendo il bosco ci si porta a Santa Nesta, alla Grotta di San Guglielmo e, ritornando a Santa Nesta si sale verso la sella del Trono e si scende a Valle Piana. Percorrendo un breve tratto dello sterrato verso Colle Molella, in direzione nord prevalente, prima in falso piano e, poi, decisamente, si segue la traccia di sentiero che porta all'inizio di un nuovo tratto di sterrato in località Orno. Dopo la discesa si incontra la strada per Bagnoli Irpino che subito si lascia prendendo a sinistra allo sbocco del Vallone del Caliendo. Dopo due gomiti a 90° a destra e dopo aver lasciato sulla destra la Chiesa di S. Lorenzo, si operano due svolte a 90°, questa volta a sinistra, fino a passare sotto al ponte della Ferrovia. Proseguendo, dopo un'evidente steccato, si arriva ad un bivio a "T". Qui si sale leggermente a destra e, poi, si prosegue a sinistra ad un nuovo incrocio a "T". Proseguendo, si arriva al ponte sul Calore e, quindi a S. Francesco. La vegetazione e la fauna, sono quelle tipiche dei Monti Picentini. Si consiglia di percorrere l'intero sentiero in 4 tappe. La prima tappa si potrebbe concludere a Campo di Nusco nei pressi della stazione, dopo aver percorso circa 23 Km e superato circa 900 m di dislivello, in 7 ore circa. La seconda tappa, da Campo di Nusco, si potrebbe concludere a Caposele, dopo aver visitato il Santuario di S. Gerardo, percorso 20 Km circa e superato un dislivello di circa 200 m, in circa 6 ore. La terza tappa potrebbe portare al Lago Laceno, lunghezza 26 Km e dislivello di 1400 m, in circa 10 ore. La quarta tappa chiude l'anello a S. Francesco dopo altri 16 Km, 300 m di dislivello in salita e 700 m in discesa, in circa 5 ore.

## Mappa del sentiero




## Informazioni sintetiche

Tappe del sentiero: Circuito delle 13 Chiese: San Francesco – Chiese di Bagnoli – Goleto – San Gerardo – Madonna del Fiume – Cappella dei Grienzi – Santa Nesta – Grotta di San Guglielmo – San Lorenzo – San Francesco.
Segnaletica orizzontale: parziale
Segnaletica verticale: parziale
*Dislivello in salita e in discesa: 2.800 m*
*Lunghezza: 85 km – Difficoltà: EE*
*Durata andata: 26 ore – Durata ritorno: 26 ore*
*Altitudine massima: 1375 m – Altitudine minima: 496 m*
Tipologia: Anello

## Attività possibili sul sentiero:

Escursionismo a piedi su tutto il sentiero

## Sentieri Correlati

1 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20

## Avvertenze

Il sentiero ha uno sviluppo complessivo consistente per cui può essere percorso in più tappe. Il numero delle tappe dipende dalle capacità escursionistiche degli interessati a muoversi su fondo molto vario. Le caratteristiche variano, infatti, dal facile, sui tratti asfaltati o cementificati, al difficile, su tracce anche esposte. Nel tratto sull'asta fluviale del Rio Zagarone bisogna guadare il fiume più volte.

**Come raggiungere il sentiero**

Il sentiero è facilmente raggiungibile, anche in auto, attraverso la strada per il Lago Laceno e l'Ofantina.

**Toponimi del percorso e relative quote**

S. Francesco a Folloni (496 m) (chiesa n°1) – San Marco (645 m) (chiesa n°2) – Santa Margherita (650 m) (chiesa n°3) – San Giuseppe (655 m) (chiesa n°4) – Santa Maria Assunta (654 m) (chiesa n°5) – S. Domenico (655 m) (chiesa n°6)– Cappella della Pietà (755 m) (chiesa n°7) – Goleto (594 m) (chiesa n°8) – S. Gerardo Maiella (525 m) (chiesa n°9) – Madonna del Fiume (600 m) (chiesa n°10) – Maria SS. Dei Grienzi (931 m) (chiesa n°11) – Santa Nesta (1052 m) (chiesa n°12) – S. Lorenzo (542 m) (chiesa n°13) – S. Francesco a Folloni (496 m).

**Punti di rifornimento idrico durante il percorso**

Bagnoli Irpino – Goleto – Lioni – Caposele – Materdomini – Calabritto – Madonna del Fiume – Cappella dei Grienzi – Fontana Lagaretto – Villaggio Laceno.

## Caratteristiche tecniche del sentiero n° 15 - Collegamento al Sentiero Italia

**Descrizione**

Da Acerno seguire su strada asfaltata per la Valle del Tusciano e di Pinzarrino, in destra orografica, fino al Ponte Pinzarrino dove inizia il sentiero che segue, quasi sempre, il corso del fiume Tannera, affluente del Tusciano. Fino all'opera di presa dell'acquedotto di Acerno si guada il fiume molte volte, altre volte si sale lasciando il fiume, per ritrovarlo più a monte. Dall'opera di presa dell'acquedotto di Acerno si sale per tornanti fino a poco prima della Fontana di Dongiovanni. Prendendo il carraio a sinistra della fontana, si svolta subito a sinistra in leggera salita seguendo lo stradone fino al Prato del Leone dove si svolta a sinistra e, seguendo lo stradone, si arriva a Colle del Leone. Si prosegue a destra seguendo la strada asfaltata per Calabritto per circa 300 m e si sale sul sentiero a sinistra che porta al M. Cervialto. Si segue l'ampio stradone fino a Filicecchio dove, a destra, si lascia lo stradone e si prosegue su traccia di sentiero fino alla cima del M. Cervialto. Superate le doline, dalla cima si prosegue in direzione prevalente a 40° dal Nord verso Valle di Giamberardino. In fondo alla discesa si prosegue a sinistra con direzione prevalente verso Ovest fino ad arrivare ad un incrocio, su sella morfologica, da dove si prosegue a destra in direzione prevalente Nord, sempre su cresta, verso il M. Cervarolo di Bagnoli, il Lagaretto e Vallepiana dell'Aria della Spina. Giunti alla strada asfaltata Laceno – Lioni, attraversando la strada, si prende il sentiero per Vallepiana in direzione quasi Est, attraversando ancora una volta la strada e si raggiunge l'incrocio di Salve Regina. Si prosegue sul sentiero a sinistra in direzione prevalente Nord-Nord Ovest fino alla Valle dei Lupi e, toccando per un breve tratto la strada asfaltata, raggiungendo il Pozzo di S. Guglielmo. Si prosegue sul sentiero evidente a sinistra della stradina verso il Pozzo di Bagnoli che viene raggiunto su sterrato. Dal Pozzo di Bagnoli si prosegue sulla traccia del sentiero per la Valle dei Porci in direzione prevalente Nord Ovest fino ad incrociare il sentiero dei Boscaioli che viene seguito fino a Fieste e alla Cappella della Pietà. Bagnoli Irpino viene raggiunto passando per S. Vito. Da Bagnoli Irpino si prosegue su stradina asfaltata/cementificata in direzione prevalente Ovest, si passa sotto linea ferroviaria, si svolta a sinistra quando si arriva ad un incrocio a T e alla Cascata della Lavandaia sul Fiume Calore. Seguendo la strada asfaltata in direzione Ovest, quasi subito dopo si prende a sinistra e, per la stradina asfaltata che porta al Monastero del Monte, si arriva al piazzale del Castello. Si prosegue salendo su sterrato in direzione prevalente Ovest arrivando prima all'Acqua del Pizzillo e poi, valicando per il Varco Pellariello, si arriva al Piano di Verteglia. La vegetazione e la fauna, sono quelle tipiche dei Monti Picentini. Si consiglia di percorrere l'intero sentiero in 3 tappe. La prima tappa si potrebbe concludere a Colle del Leone, con pernottamento al Lago Laceno, dopo aver percorso circa 10 Km e superato circa 600 m di dislivello in salita e 100 m in discesa, in 5 ore circa. La seconda tappa, iniziata da Colle del Leone, si potrebbe concludere a Vallepiana, dopo aver percorso altri 12 Km circa e superato un dislivello di 600 m in salita e 650 m in discesa, in circa 6 ore. Pernottamento consigliato ancora Lago Laceno. La terza tappa potrebbe essere Vallepiana – Verteglia, di 27 Km, dislivello di circa 1000 m in salita e 1000 m in discesa, in circa 10 ore.

**Mappa del sentiero**




**Informazioni sintetiche**

Tappe del sentiero: Acerno – Fiumara di Tannera – M. Cervialto – M. Cervarolo – Bagnoli Irpino – Montella – Piano di Verteglia

Segnaletica orizzontale: parziale

Segnaletica verticale: mancante

*Dislivello in salita: 2.200 m – Dislivello in discesa: 1.750 m*

*Lunghezza: 49 km – Difficoltà: EE*

*Durata andata: 21 ore – Durata ritorno: 17 ore*

*Altitudine massima: 1808 m – Altitudine minima: 495 m*

Tipologia: Traversata

**Attività possibili sul sentiero:**

Escursionismo a piedi su tutto il sentiero.

**Sentieri Correlati**

1 – 2 – 3 – 4- 10 – 11 – 12 – 14 – 16 – 19 – 20

**Avvertenze**

Il sentiero ha uno sviluppo complessivo consistente per cui può essere percorso in più tappe. Il numero delle tappe dipende dalle capacità escursionistiche degli interessati a muoversi su fondo molto vario. Le caratteristiche variano, infatti, dal facile, sui tratti asfaltati o cementificati, al difficile, su tracce anche esposte. Nel tratto sull'asta fluviale del Tannera bisogna guadare il fiume molte volte

**Come raggiungere il sentiero**

Il sentiero è facilmente raggiungibile, anche in auto, attraverso la strada per Acerno, del Lago Laceno e l'Ofantina.

**Toponimi del percorso e relative quote**

Acerno (720 m) – Ponte Pinzarrino (753 m) – Fiumara (936 m) – Fontana di Don Giovanni (1063 m) – Colle del Leone (1219 m) – M. Cervialto (1808 m) – Valle di Giamberardino (1510 m) – M. Cervarolo (1546 m) – Vallepiana (1181 m) – Valle dei Lupi (1365 m) – Bagnoli Irpino (660 m) – Ponte sul Lacinolo (495 m) – Varco Pellariello (1229 m) – Rifugio Verteglia (1187 m).

**Punti di rifornimento idrico durante il percorso**

Acerno – Fiumara – Lago Laceno – Bagnoli Irpino – Montella – Sorgente del Pizzillo.

## Caratteristiche tecniche del sentiero n° 16 - Il Nonno dell'Acernese

**Descrizione**

Il punto di partenza è lo stesso di quello del sentiero n°4 per il M. Cervialto, ma scendendo verso il Piano Acernese. Si segue la pista all'interno del Piano Acernese fino al Campeggio Zauli che si lambisce evitando la strada per Calabritto e percorrendo un tratto di stradina interna fino a Li Gruttuni. Si prosegue sul sentiero n°13 per i Serroncelli e fino al Piazzale delle Seggiovie. Poi si sale per la ex pista Nordica fino ad arrivare dove terminava a monte l'ex skilift. Si raggiungono i pilastri della seggiovia che si seguono evitando, per quanto possibile, la pietraia. Proseguendo fino ad incrociare la pista Settevalli, la si percorre in discesa fino ad incontrare a destra la traccia di sentiero che conduce al Piano Acernese.

**Mappa del sentiero**




**Informazioni sintetiche**

Segnaletica orizzontale: parziale
Segnaletica verticale: mancante
*Dislivello in salita: 400 m*
*Dislivello in discesa: 350 m.*
*Lunghezza: 10.130 m – Difficoltà: E*
*Durata andata: 3h:30' – Durata ritorno: 3h:00'*
*Altitudine massima: 1.219 m – Altitudine minima: 1.068 m*
Tipologia: Traversata

**Attività possibili sul sentiero:**

Escursionismo a piedi su tutto il sentiero.

**Sentieri Correlati**
2 – 3 – 4 – 5 – 9 – 13 – 14 – 15 – 18 – 19

**Avvertenze**
Le caratteristiche variano dal facile, sui tratti asfaltati, al quasi difficile, su tracce pietrose e pendenti dal tratto a monte dell'ex tracciato dello skilift alla pista Settevalli. Su tale tratto prestare attenzione soprattutto in discesa e in caso di pioggia.

**Come raggiungere il sentiero**
Il sentiero è facilmente raggiungibile, anche in auto dal Lago Laceno, l'Ofantina e la strada Lago Laceno – Calabritto.

**Toponimi del percorso e relative quote**
Colle del Leone (1219 m) – Li Surruni (1068 m) – Piazzale Seggiovie (1100 m) – Skilift (1200 m) – Incrocio Settevalli (1360 m) – Acernese (1160 m).

**Punti di rifornimento idrico durante il percorso**
Lago Laceno.

## Caratteristiche tecniche del sentiero n° 17 - Sentiero delle Sorgenti

**Descrizione**

Il punto di partenza è a circa 1 Km da dall'incrocio di Salve Regina. Dopo circa 500 m da questo incrocio, si lascia la strada Laceno – Lioni imboccando la stradina che porta alla Corsa dei Cavalli e al Piano di Sazzano, a sinistra dopo circa altri 500 m. È il sentiero delle sorgenti, veramente numerose, che scaturiscono dall'acquifero legato al M. Calvello. La vegetazione e la fauna, sono quelle tipiche dei Monti Picentini.

**Mappa del sentiero**




**Informazioni sintetiche**

Tappe del sentiero: Vado dell'Asta – Mauta – Sorgente di Caposele
Segnaletica orizzontale: mancante
Segnaletica verticale: mancante
*Dislivello in discesa: 830 m*
*Lunghezza: 10.280 m – Difficoltà: E*
*Durata andata: 3 ore e 30′ – Durata ritorno: 5 ore*
*Altitudine massima: 1280 m – Altitudine minima: 450 m*
Tipologia: Traversata

**Attività possibili sul sentiero:**

Escursionismo a piedi su tutto il sentiero.

**Sentieri Correlati**

14

**Avvertenze**

Le caratteristiche tecniche del sentiero sono quelle su tratti prevalentemente su sterrato largo senza eccessive difficoltà. Solo sull'ultimo tratto, poco prima di arrivare a Caposele, si percorre un tratto su fondo cementato/asfaltato con pendenza consistente per cui bisogna prestare attenzione per evitare scivolate specialmente in caso di pioggia

**Come raggiungere il sentiero**

Il sentiero è facilmente raggiungibile, anche in auto per la strada Lago Laceno – Lioni. Subito dopo l'incrocio di Salve Regina prendere la stradina asfaltata che, con una curva a gomito, sale verso il Piano di Sazzano. Il sentiero inizia a sinistra dopo circa 500 dalla curva a gomito.

**Toponimi del percorso e relative quote**

Vado dell'Asta (1280 m) – Fontana della Mauta (1158 m) – Fonte di Cerasuolo (908 m) – Fonte Saracino (689 m) – Fontana S. Biagio (630) – Caposele (450 m)

**Punti di rifornimento idrico durante il percorso**

Fontana Mauta – Fonte Cerasuolo – Fonte Saracino – Fontana S. Biagio

## Caratteristiche tecniche del sentiero n° 18 - Sentiero del Porcino

**Descrizione**

Il punto di partenza è sulla strada Lago Laceno – Calabritto a circa 2,5 Km dal Villaggio Laceno tra il Piano Acernese e il Piano dei Vaccari. Si sale dolcemente fino alle Coste del Cervialto che si percorrono a mezza costa intorno all'isoipsa 1375. Poco prima della fine dello sterrato, si imbocca la traccia di sentiero che scende dallo stradone verso il Campeggio Zauli attraverso brevi tornanti. La vegetazione e la fauna, sono quelle tipiche dei Monti Picentini.

**Mappa del sentiero**




**Informazioni sintetiche**

Tappe del sentiero: Le coste del Cervialto: Acernese – Coste del Cervialto – Campeggio Zauli
Segnaletica orizzontale: parziale
Segnaletica verticale: mancante
*Dislivello in salita: 210*
*Dislivello in discesa: 270 m*
*Lunghezza: 4.950 m – Difficoltà: E*
*Durata andata: 1h:45' – Durata ritorno: 1h:50'*
*Altitudine massima: 1.380 m – Altitudine minima: 1115 m*
Tipologia: Traversata

**Attività possibili sul sentiero:**

Escursionismo a piedi e in Mountain Bike su tutto il sentiero.

**SENTIERI CORRELATI**

16

**Avvertenze**
Le caratteristiche tecniche del sentiero sono quelle su tratti prevalentemente su sterrato largo senza eccessive difficoltà. Solo nel tratto Bivio per Sella di Giamberardino – Campeggio Zauli diventa traccia di sentiero da percorrere con accortezza per evitare scivolate, specialmente in caso di pioggia.

**Come raggiungere il sentiero**
Il sentiero è facilmente raggiungibile, anche in auto dalla strada Lago Laceno – Calabritto a circa 2,5 Km dopo il Villaggio Laceno.

**Toponimi del percorso e relative quote**
Piano Acernese (1171 m) – Coste del Cervialto (1356 m) – Bivio per Valle di Giamberardino (1380 m) – Campeggio Zauli (1115 m).

**Punti di rifornimento idrico durante il percorso**
Nessuno.

## Caratteristiche tecniche del sentiero n° 19 - Anello panoramico del Laceno

**Descrizione**

È un percorso molto panoramico da cui si ha la possibilità di ammirare la conca tettono-carsica del Piano Laceno a 360°. Partendo dal Parcheggio delle Seggiovie di fronte al Grisone si sale fino a Ripe del Moggio e Fosse della Neve, per scendere a Colle Molella. Attraversando la strada si sale leggermente percorrendo a mezza costa fino a scendere a Lo Stazzo. Si prosegue verso Foce di Caposele e, salendo nel vallone Il Pero, si arriva al Belvedere della Tronola e alla Caserma della Forestale. Seguendo il tracciato dell'acquedotto si passa alle spalle del Villaggio Laceno e, salendo leggermente sui Serroncelli, si ritorna al Piazzale delle Seggiovie. La vegetazione e la fauna, sono quelle tipiche dei Monti Picentini.

**Mappa del sentiero**




**Informazioni sintetiche**

Tappe del sentiero: Parcheggio Seggiovie – Ripe del Moggio – Colle Molella – Belvedere del Laceno – Parcheggio Seggiovie.
Segnaletica orizzontale: parziale
Segnaletica verticale: mancante
*Dislivello in salita e in discesa: 500 m*
*Lunghezza: 16.900 m – Difficoltà: E*
*Durata andata e ritorno: 7 ore*
*Altitudine massima: 1307 m – Altitudine minima: 1030 m*
Tipologia: Anello

**Attività possibili sul sentiero:**

Escursionismo a piedi su tutto il sentiero.

**Sentieri Correlati**
1 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 20

**Avvertenze**
Le caratteristiche tecniche del sentiero variano da facili a difficili su tratti in asfalto, sterrato e tracce di sentiero. Alcuni tratti sono da percorrere con accortezza per evitare scivolate, specialmente in caso di pioggia.

**Come raggiungere il sentiero**
Il sentiero è facilmente raggiungibile, anche in auto dalla strada statale n°368 del Lago Laceno.

**Toponimi del percorso e relative quote**
Parcheggio Seggiovie (1100 m) – Ripe del Moggio (1330 m) – Colle Molella (1100 m) – Foce di Caposele (1070 m) – Aria della Spina (1190 m) – Belvedere del Laceno (1200 m) – Parcheggio Seggiovie (1100 m).

**Punti di rifornimento idrico durante il percorso**
Villaggio del Lago Laceno.

## Caratteristiche tecniche del sentiero n° - 20 Grotta di San Guglielmo da Bagnoli

**Descrizione**
È un percorso con tratti anche con pendenze consistenti. Partendo dalla Piazza della Chiesa Madre in Bagnoli si percorre via Salvio, la contrada San Lorenzo, la località Orna e un breve tratto del sentiero n°8. A Vallepiana si sale verso Il Trono e si scende alla Grotta di San Guglielmo. La vegetazione e la fauna, sono quelle tipiche dei Monti Picentini.

**Mappa del sentiero**




**Informazioni sintetiche**
Tappe del sentiero: Grotta di San Guglielmo da Bagnoli: Bagnoli – San Lorenzo Orna – Vallepiana – Grotta di San Guglielmo
Segnaletica orizzontale: parziale Segnaletica verticale: mancante
*Dislivello in salita: 660 m Dislivello in discesa: 260 m*
*Lunghezza: 8.370 m – Difficoltà: E*
*Durata andata: 4h:30' – Durata ritorno: 3h:30'*
*Altitudine massima: 1.210 m – Altitudine minima: 550 m*
Tipologia: Traversata

**Attività possibili sul sentiero:**
Escursionismo a piedi su tutto il sentiero.

**Sentieri Correlati**
6 – 8 – 14 – 15 – 19

**Avvertenze**
Le caratteristiche tecniche del sentiero sono quelle su sterrato/carrareccia e tracce di sentiero senza eccessive difficoltà. Il tratto da Il Trono a Santa Nesta, in discesa, è da percorrere con particolare accortezza per evitare scivolate, specialmente in caso di pioggia.

**Come raggiungere il sentiero**
Il sentiero è facilmente raggiungibile, anche in auto dalla strada del Lago Laceno.

**Toponimi del percorso e relative quote**
Bagnoli (650 m) – San Lorenzo (565 m) – Colle Molella (1100 m) – Vallepiana (1150 m) – Grotta di San Guglielmo (1050 m).

**Punti di rifornimento idrico durante il percorso**
Nessuno.

*Altre iniziative di tutela e valorizzazione turistica*

Rientrano tra queste, in primo luogo, tutte quelle attività che si rendono necessarie per un *coinvolgimento attivo e diretto dei soggetti imprenditoriali locali* onde evitare che l'auspicato sviluppo rurale proceda per percorsi paralleli (pubblico e privato) che, in zone come quella che ci interessa, non possono assicurare risultati incisivi ed efficaci, ed in secondo luogo le azioni tese ad evitare guasti ambientali irreparabili che possano compromettere l'immagine del territorio nel suo complesso.

Ristrutturazione del Rifugio Forestale

Si è ritenuto necessario prevedere un intervento di recupero e riqualificazione edilizia del rifugio forestale, ubicato nella particella forestale n. 316 (nella Piana del Laceno) che attualmente versa in cattivo stato di conservazione.

Il manufatto, risalente agli anni sessanta-settanta, consta di: un piano terra, un piano primo, un secondo piano e un terzo piano con sottotetto. A ristrutturazione avvenuta il Comune di Bagnoli Irpino potrebbe utilizzare l'ex-rifugio forestale come «Centro di Accoglienza e d'informazioni», come luogo di aggregazione per diverse attività sociali, quali incontri, campi di ricerca, ricettività alberghiera, escursionismo, etc.

Valorizzazione Impianti Sciistici

Secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale importante rilievo riveste la valorizzazione del complesso sciistico invernale. Infatti è stato richiesto di inserire nel Piano un terzo impianto di risalita (seggiovia-sciovia) sul versante Nord del monte Rajamagra.

Inoltre, nei pressi del lago, lungo le pendici sud del "colle della Molella" intenzione dell'Amministrazione è quella di realizzare una pista per slittini.

Opere di presidio A.I.B

Gli incendi boschivi costituiscono per fortuna un problema non preminente nel contesto della gestione del patrimonio silvo-pastorale del Comune di Bagnoli Irpino.

Gli incendi costituiscono per il territorio, nel suo complesso, e per il demanio comunale più in particolare, una "allarmante minaccia" sia per la presenza di estese aree molto vulnerabili e sia per le preoccupanti conseguenze che essi possono causare al soprassuolo boschivo.

Pertanto sono indispensabili interventi di prevenzione quali:

- viali parafuoco;
- ripulitura e controllo costante della vegetazione ai lati delle strade rurali riservando maggiore attenzione a quelle che interessano aree più esposte ai rischi di incendio;
- realizzazione di una serie di <<punti d'acqua>> per il rifornimento dei mezzi terrestri ed aerei (elicotteri) attrezzati per lo spegnimento degli incendi (da ubicare in prossimità di sorgenti).

**Logicamente tutti gli interventi sopra elencati dovranno *necessariamente costituire oggetto di apposita progettazione esecutiva da sottoporre anche all'approvazione delle Autorità competenti*.**

A puro titolo indicativo si riportano i costi stimati nella tabella che segue.

**Tabella 36. Interventi di miglioramento**

| INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO | IMPORTO INTERVENTI Euro |
|---|---|
| Interventi di ripulitura e sistemazione dei valloni | 20.000.000 |
| Sistemazione Sentieristica | 10.000.000 |
| Sistemazione di strade forestali esistenti | 15.000.000 |
| Aree attrezzate | 5.000.000 |
| Valorizzazione Impianti sciistici | 35.000.000 |
| Recupero ex caserma forestale | 2.000.000 |
| TOTALE GENERALE | 87.000.000 |

## Cap. 9 - Aree pascolabili (art. 100)

### Descrizione generale, suddivisione per comparti, superficie totale e superficie a P.L.T.

Nel territorio di proprietà comunale vengono destinati al pascolo 3.513,15 ettari dei quali: ettari 2.745,34 di aree pascolive ettari 692,99 di altre aree pascolabili incluse nelle aree boscate e risultano pascolabili aree boscate per 2.745,34 ettari. Le predette aree sono idonee alla pratica del pascolo secondo le tradizioni locali.

**Tabella 37. Superficie pascolabile totale**

| SUPERFICIE PASCOLABILE TOTALE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tipologia | | Superficie gravata da Uso civico Ettari | Superficie non gravata da Uso civico Ettari | Totale Ettari |
| Aree pascolive (articolo 126 del Regolamento regionale n. 3/2017) | Pascoli | 179,15 | 96,33 | 275,48 |
| | Altre aree pascolabili | 470,59 | 21,74 | 492,33 |
| Boschi pascolabili (articolo 126 del Regolamento regionale n. 3/2017) | Boschi pascolabili | 2.710,53 | 34,81 | 2.745,34 |
| **Totali** | | **3.360,27** | **152,88** | **3.513,15** |

**Carico di bestiame**

Si evidenzia che presso il Comune non è stato possibile reperire dati certi circa la consistenza di bestiame presente nella zona per cui detto dato non viene riportato.

Per il calcolo del carico di bestiame viene utilizzata la formula "*C=Kx(PxS)/(FxD)"* dove:

- C = numero di capi bovini normali (500-550 kg.);
- P = produzione unitaria espressa in Unità Foraggere (U.F.) per ettaro;
- S = superficie utile espressa in ettari;
- F = fabbisogno giornaliero di un capo grosso espressa in Unità Foraggere (si considerano 7 UF/capo);
- D = periodo espresso in giorni di pascolamento utile;
- K = coefficiente di utilizzazione (0,65 – 0,80);

**Tabella 38. Valori dei coefficienti e calcolo del carico U.B.A. per 1 Ha**

| Tipologia di area pascolabile | k | p | s | f | d | UBA/Ettaro/anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascoli | 0,8 | 1200 | 1,00 | 7 | 135 | 1,02 |
| Altre aree pascolabili | 0,75 | 680 | 1,00 | 7 | 135 | 0,54 |
| Boschi pascolabili | 0,65 | 400 | 1,00 | 7 | 135 | 0,28 |

Di seguito si riporta la tabella con i coefficienti di conversione capo/UBA di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, come modificato ed integrato dal Regolamento n. 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016:

**Tabella 39. Coefficienti di conversione U.B.A.**

| TIPO DI BESTIAME | Coefficiente di conversione U.B.A. |
|---|---|
| tori, vacche ed altri bovini di oltre 2 anni | 1 |
| equini di oltre 6 mesi | 1 |
| bovini da 6 mesi a 2 anni | 0,6 |
| bovini ed equini di età inferiore a 6 mesi | 0,4 |
| ovi – caprini | 0,15 |

Di seguito si riportano le Tabelle con il carico ammissibile in U.B.A. riferito alle aree boscate utilizzabili come pascolo e il dato riferito alle singole particelle forestali pascolabili nel periodo di attuazione del presente PGF.

**Tabella 40. Carico massimo di bestiame su terreni comunali pascolabili, espresso in UBA e distinto per specie**

| Tipologia di area pascolabile | Superficie (Ettari) | Carico massimo di bestiame (UBA)* | |
|---|---|---|---|
| | | UBA/Ettaro/anno | UBA totali/anno |
| Pascoli | 275,48 | 1,02 | 281,0 |
| Altre aree pascolabili | 492,33 | 0,54 | 265,8 |
| Boschi pascolabili | 2.745,34 | 0,28 | 768,7 |
| **TOTALE** | **3.513,15** | | **1.315,5** |

**Tabella 41. UBA ammissibili distinti per particella forestale**

| PARTICELLE PASCOLABILI E NUMERO U.B.A. AMMISSIBILI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESA | LOCALITA' | Particella forestale | Superficie totale Ha | Aree boscate | | | Pascoli e aree nude | | | UBA Pascolabili Totali |
| | | | | Superficie pascolabile Ha (*) | UBA/Ha | UBA pascolabili | Superficie Ha | UBA/Ha | UBA pascolabili | |
| A | Peta di Piscacca | **6** | 16,15 | 16,15 | 0,28 | 4,5 | | 0,54 | 0,0 | 4,5 |
| A | Piscacca | **7** | 12,96 | 11,39 | 0,28 | 3,2 | 1,57 | 0,54 | 0,8 | 4,0 |
| A | Peta di Piscacca | **14** | 14,89 | 14,71 | 0,28 | 4,1 | 0,18 | 0,54 | 0,1 | 4,2 |
| A | Piscacca | **15** | 10,71 | 9,52 | 0,28 | 2,7 | 1,19 | 0,54 | 0,6 | 3,3 |
| A | Valle del Pero | **60** | 7,22 | 7,22 | 0,28 | 2,0 | | 0,54 | 0,0 | 2,0 |
| A | Valle Foce di Caposele | **79** | 13,63 | 13,51 | 0,28 | 3,8 | 0,12 | 0,54 | 0,1 | 3,8 |
| A | Valle del Pero | **81** | 12,26 | 11,94 | 0,28 | 3,3 | 0,32 | 0,54 | 0,2 | 3,5 |
| A | Colle del Leone | **95a** | 17,06 | 17,02 | 0,28 | 4,8 | 0,04 | 0,54 | 0,0 | 4,8 |
| A | Felicecchia | **95b** | 11,31 | 11,15 | 0,28 | 3,1 | 0,16 | 0,54 | 0,1 | 3,2 |
| A | Corticella | **96** | 26,62 | 26,42 | 0,28 | 7,4 | 0,20 | 0,54 | 0,1 | 7,5 |
| A | Valle Grande | **109a** | 11,29 | 11,29 | 0,28 | 3,2 | | 0,54 | 0,0 | 3,2 |
| A | Fossa della Neve | **109b** | 10,82 | 10,82 | 0,28 | 3,0 | | 0,54 | 0,0 | 3,0 |
| A | Fossa della Neve | **110** | 26,99 | 26,56 | 0,28 | 7,4 | 0,43 | 0,54 | 0,2 | 7,7 |
| A | Scaffa | **111** | 15,84 | 15,60 | 0,28 | 4,4 | 0,24 | 0,54 | 0,1 | 4,5 |
| A | Lagarello | **115** | 17,52 | 15,78 | 0,28 | 4,4 | 1,74 | 0,54 | 0,9 | 5,4 |
| A | Lagarello | **117** | 12,32 | 11,99 | 0,28 | 3,4 | 0,33 | 0,54 | 0,2 | 3,5 |
| A | Lagarello | **118** | 18,58 | 15,43 | 0,28 | 4,3 | 3,15 | 0,54 | 1,7 | 6,0 |
| A | Raja di Calende | **127** | 11,81 | 11,81 | 0,28 | 3,3 | | 0,54 | 0,0 | 3,3 |
| A | Valle Piana | **128** | 12,06 | 11,57 | 0,28 | 3,2 | 0,49 | 0,54 | 0,3 | 3,5 |
| A | Teatro | **129** | 12,85 | 12,76 | 0,28 | 3,6 | 0,09 | 0,54 | 0,0 | 3,6 |
| A | Lagarello | **133** | 9,66 | 8,90 | 0,28 | 2,5 | 0,76 | 0,54 | 0,4 | 2,9 |
| A | Corsa dei Cavalli | **134** | 17,27 | 17,17 | 0,28 | 4,8 | 0,10 | 0,54 | 0,1 | 4,9 |
| A | Valle Piana | **142** | 18,17 | 18,17 | 0,28 | 5,1 | | 0,54 | 0,0 | 5,1 |
| A | Valle Piana | **144** | 12,71 | 12,66 | 0,28 | 3,5 | 0,05 | 0,54 | 0,0 | 3,6 |
| A | Valle Piana | **145** | 16,87 | 16,86 | 0,28 | 4,7 | 0,01 | 0,54 | 0,0 | 4,7 |
| A | Teatro | **146** | 18,85 | 18,80 | 0,28 | 5,3 | 0,05 | 0,54 | 0,0 | 5,3 |
| A | Cervarolo di Sazzano | **150** | 21,55 | 21,49 | 0,28 | 6,0 | 0,06 | 0,54 | 0,0 | 6,0 |
| A | Orno | **162** | 27,59 | 27,59 | 0,28 | 7,7 | | 0,54 | 0,0 | 7,7 |
| A | Orno | **163** | 12,59 | 12,59 | 0,28 | 3,5 | | 0,54 | 0,0 | 3,5 |
| A | Valle Piana | **164** | 26,74 | 26,74 | 0,28 | 7,5 | | 0,54 | 0,0 | 7,5 |
| A | Valle Piana | **165** | 8,60 | 8,60 | 0,28 | 2,4 | | 0,54 | 0,0 | 2,4 |
| A | Creta Rossa | **167** | 37,65 | 37,54 | 0,28 | 10,5 | 0,11 | 0,54 | 0,1 | 10,6 |
| A | Serroncelli | **169** | 17,92 | 17,89 | 0,28 | 5,0 | 0,03 | 0,54 | 0,0 | 5,0 |
| A | Serroncelli | **170** | 12,62 | 12,60 | 0,28 | 3,5 | 0,02 | 0,54 | 0,0 | 3,5 |
| A | Cervarolo di Sazzano | **173** | 9,95 | 9,10 | 0,28 | 2,5 | 0,85 | 0,54 | 0,5 | 3,0 |
| A | Cervarolo di Sazzano | **174** | 24,88 | 24,67 | 0,28 | 6,9 | 0,21 | 0,54 | 0,1 | 7,0 |

| PARTICELLE PASCOLABILI E NUMERO U.B.A. AMMISSIBILI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESA | LOCALITA' | Particella forestale | Superficie totale Ha | Aree boscate | | | Pascoli e aree nude | | | UBA Pascolabili Totali |
| | | | | Superficie pascolabile Ha (*) | UBA/Ha | UBA pascolabili | Superficie Ha | UBA/Ha | UBA pascolabili | |
| A | Apeticchia | **187** | 20,42 | 20,40 | 0,28 | 5,7 | 0,02 | 0,54 | 0,0 | 5,7 |
| A | Apeticchia | **188** | 15,60 | 15,55 | 0,28 | 4,4 | 0,05 | 0,54 | 0,0 | 4,4 |
| A | Montagna Grande | **189** | 24,37 | 24,36 | 0,28 | 6,8 | 0,01 | 0,54 | 0,0 | 6,8 |
| A | Ripa di Moggio | **190** | 12,93 | 12,93 | 0,28 | 3,6 | | 0,54 | 0,0 | 3,6 |
| A | Filettone | **191** | 32,71 | 32,59 | 0,28 | 9,1 | 0,12 | 0,54 | 0,1 | 9,2 |
| A | Terremoto | **192** | 36,38 | 36,37 | 0,28 | 10,2 | 0,01 | 0,54 | 0,0 | 10,2 |
| A | Serra dei Fasci | **193** | 19,98 | 19,96 | 0,28 | 5,6 | 0,02 | 0,54 | 0,0 | 5,6 |
| A | Serroncelli Soprani | **194** | 11,99 | 11,98 | 0,28 | 3,4 | 0,01 | 0,54 | 0,0 | 3,4 |
| A | Serroncelli Soprani | **198** | 17,70 | 16,81 | 0,28 | 4,7 | 0,89 | 0,54 | 0,5 | 5,2 |
| A | Cervarolo di Sazzano | **199** | 14,12 | 14,12 | 0,28 | 4,0 | | 0,54 | 0,0 | 4,0 |
| A | Cervarolo di Sazzano | **204** | 12,28 | 11,85 | 0,28 | 3,3 | 0,43 | 0,54 | 0,2 | 3,6 |
| A | Fossa della Neve | **205b** | 11,18 | 11,18 | 0,28 | 3,1 | | 0,54 | 0,0 | 3,1 |
| A | Apeticchia | **208** | 35,41 | 35,39 | 0,28 | 9,9 | 0,02 | 0,54 | 0,0 | 9,9 |
| A | Stretta dell'Acernese | **209** | 31,70 | 31,52 | 0,28 | 8,8 | 0,18 | 0,54 | 0,1 | 8,9 |
| A | Coste di Cervialto | **211** | 21,59 | 21,59 | 0,28 | 6,0 | | 0,54 | 0,0 | 6,0 |
| A | Coste di Cervialto | **212** | 29,47 | 29,38 | 0,28 | 8,2 | 0,09 | 0,54 | 0,0 | 8,3 |
| A | Valle Giamberardino | **215** | 3,49 | 3,49 | 0,28 | 1,0 | | 0,54 | 0,0 | 1,0 |
| A | Impiccato | **220** | 22,81 | 22,80 | 0,28 | 6,4 | 0,01 | 0,54 | 0,0 | 6,4 |
| A | Apeticchia | **222a** | 16,56 | 16,56 | 0,28 | 4,6 | | 0,54 | 0,0 | 4,6 |
| A | Apeticchia | **223a** | 10,58 | 10,58 | 0,28 | 3,0 | | 0,54 | 0,0 | 3,0 |
| A | Terremoto | **224b** | 6,50 | 6,50 | 0,28 | 1,8 | | 0,54 | 0,0 | 1,8 |
| A | Valle d'Acera | **225** | 16,29 | 16,29 | 0,28 | 4,6 | | 0,54 | 0,0 | 4,6 |
| A | Valle d'Acera | **228** | 24,40 | 24,00 | 0,28 | 6,7 | 0,40 | 0,54 | 0,2 | 6,9 |
| A | Sette Valli | **229** | 34,06 | 33,85 | 0,28 | 9,5 | 0,21 | 0,54 | 0,1 | 9,6 |
| A | Sette Valli | **230** | 35,75 | 35,72 | 0,28 | 10,0 | 0,03 | 0,54 | 0,0 | 10,0 |
| A | Chiuvarelli | **232** | 40,81 | 40,72 | 0,28 | 11,4 | 0,09 | 0,54 | 0,0 | 11,5 |
| A | Vallone del Turco | **233** | 34,69 | 34,69 | 0,28 | 9,7 | | 0,54 | 0,0 | 9,7 |
| A | Vallone del Turco | **235** | 13,14 | 13,14 | 0,28 | 3,7 | | 0,54 | 0,0 | 3,7 |
| A | Coste di Cervialto | **236** | 11,10 | 11,10 | 0,28 | 3,1 | | 0,54 | 0,0 | 3,1 |
| A | Coste di Cervialto | **240** | 7,36 | 6,75 | 0,28 | 1,9 | 0,61 | 0,54 | 0,3 | 2,2 |
| A | Coste di Cervialto | **247** | 14,20 | 13,78 | 0,28 | 3,9 | 0,42 | 0,54 | 0,2 | 4,1 |
| A | Coste di Cervialto | **248** | 12,92 | 12,92 | 0,28 | 3,6 | | 0,54 | 0,0 | 3,6 |
| A | Impiccato | **250** | 22,87 | 22,86 | 0,28 | 6,4 | 0,01 | 0,54 | 0,0 | 6,4 |
| A | Scarrupata | **251** | 13,98 | 13,98 | 0,28 | 3,9 | | 0,54 | 0,0 | 3,9 |
| A | Valle d'Acera | **253** | 11,59 | 11,59 | 0,28 | 3,2 | | 0,54 | 0,0 | 3,2 |
| A | Valle d'Acera | **254** | 15,01 | 15,01 | 0,28 | 4,2 | | 0,54 | 0,0 | 4,2 |

| PARTICELLE PASCOLABILI E NUMERO U.B.A. AMMISSIBILI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESA | LOCALITA' | Particella forestale | Superficie totale Ha | Aree boscate | | | Pascoli e aree nude | | | UBA Pascolabili Totali |
| | | | | Superficie pascolabile Ha (*) | UBA/Ha | UBA pascolabili | Superficie Ha | UBA/Ha | UBA pascolabili | |
| A | Valle d'Acera | **256** | 17,21 | 17,18 | 0,28 | 4,8 | 0,03 | 0,54 | 0,0 | 4,8 |
| A | Valle d'Acera | **257** | 8,93 | 8,87 | 0,28 | 2,5 | 0,06 | 0,54 | 0,0 | 2,5 |
| A | Valle d'Acera | **259** | 27,71 | 27,14 | 0,28 | 7,6 | 0,57 | 0,54 | 0,3 | 7,9 |
| A | Pagliarolo | **260** | 19,87 | 19,76 | 0,28 | 5,5 | 0,11 | 0,54 | 0,1 | 5,6 |
| A | Valle d'Acera | **261a** | 16,20 | 16,20 | 0,28 | 4,5 | | 0,54 | 0,0 | 4,5 |
| A | Valle d'Acera | **261b** | 14,86 | 14,86 | 0,28 | 4,2 | | 0,54 | 0,0 | 4,2 |
| A | Pagliarulo | **262** | 16,87 | 16,87 | 0,28 | 4,7 | | 0,54 | 0,0 | 4,7 |
| A | Chiuvarelli | **263** | 24,81 | 24,81 | 0,28 | 6,9 | | 0,54 | 0,0 | 6,9 |
| A | Vallebona | **273** | 0,93 | 0,93 | 0,28 | 0,3 | | 0,54 | 0,0 | 0,3 |
| A | Vallebona | **274** | 25,84 | 25,82 | 0,28 | 7,2 | 0,02 | 0,54 | 0,0 | 7,2 |
| A | Raja della Scannella | **275** | 19,12 | 19,12 | 0,28 | 5,4 | | 0,54 | 0,0 | 5,4 |
| A | Valle d'Acera | **276a** | 10,31 | 10,29 | 0,28 | 2,9 | 0,02 | 0,54 | 0,0 | 2,9 |
| A | Valle d'Acera | **276b** | 12,54 | 12,54 | 0,28 | 3,5 | | 0,54 | 0,0 | 3,5 |
| A | Vallebona | **277** | 18,56 | 18,56 | 0,28 | 5,2 | | 0,54 | 0,0 | 5,2 |
| A | Vallone dell'Acero | **284** | 17,45 | 17,45 | 0,28 | 4,9 | | 0,54 | 0,0 | 4,9 |
| A | Conca di Marco | **291** | 28,65 | 28,62 | 0,28 | 8,0 | 0,03 | 0,54 | 0,0 | 8,0 |
| A | Sierro della Zà Popa | **292** | 24,83 | 24,79 | 0,28 | 6,9 | 0,04 | 0,54 | 0,0 | 7,0 |
| A | Piano Acernese | **295a** | 15,83 | 15,71 | 0,28 | 4,4 | 0,12 | 0,54 | 0,1 | 4,5 |
| A | Vallebona | **295b** | 19,28 | 19,18 | 0,28 | 5,4 | 0,10 | 0,54 | 0,1 | 5,4 |
| A | Colle del Leone | **296** | 8,95 | 8,94 | 0,28 | 2,5 | 0,01 | 0,54 | 0,0 | 2,5 |
| A | Colle del Leone | **297** | 23,48 | 19,47 | 0,28 | 5,5 | 4,01 | 0,54 | 2,2 | 7,6 |
| A | Vallone del Cupone | **298** | 10,72 | 10,72 | 0,28 | 3,0 | | 0,54 | 0,0 | 3,0 |
| A | Vallone del Cupone | **300** | 23,92 | 23,90 | 0,28 | 6,7 | 0,02 | 0,54 | 0,0 | 6,7 |
| A | Felicecchia | **301** | 19,49 | 17,65 | 0,28 | 4,9 | 1,84 | 0,54 | 1,0 | 5,9 |
| A | Felicecchia | **302** | 20,89 | 20,86 | 0,28 | 5,8 | 0,03 | 0,54 | 0,0 | 5,9 |
| A | Coste di Cervialto | **304** | 22,47 | 21,85 | 0,28 | 6,1 | 0,62 | 0,54 | 0,3 | 6,5 |
| A | Colle delle Radici | **305** | 21,65 | 21,32 | 0,28 | 6,0 | 0,33 | 0,54 | 0,2 | 6,1 |
| A | Colle delle Radici | **306** | 18,48 | 18,47 | 0,28 | 5,2 | 0,01 | 0,54 | 0,0 | 5,2 |
| A | Piano Migliato | **307** | 19,18 | 19,00 | 0,28 | 5,3 | 0,18 | 0,54 | 0,1 | 5,4 |
| A | Vallebona | **308a** | 21,10 | 20,90 | 0,28 | 5,9 | 0,20 | 0,54 | 0,1 | 6,0 |
| A | Colle del Leone | **308b** | 7,44 | 7,39 | 0,28 | 2,1 | 0,05 | 0,54 | 0,0 | 2,1 |
| A | Piano Migliato | **309** | 16,88 | 16,85 | 0,28 | 4,7 | 0,03 | 0,54 | 0,0 | 4,7 |
| A | Colle delle Radici | **310** | 23,71 | 23,67 | 0,28 | 6,6 | 0,04 | 0,54 | 0,0 | 6,6 |
| A | Piano Migliato | **311** | 15,05 | 14,02 | 0,28 | 3,9 | 1,03 | 0,54 | 0,6 | 4,5 |
| C | Costa della Guadia | **3b** | 3,31 | 2,71 | 0,28 | 0,8 | 0,60 | 0,54 | 0,3 | 1,1 |
| C | Fieste | **4b** | 10,01 | 1,70 | 0,28 | 0,5 | 8,31 | 0,54 | 4,5 | 5,0 |

| PARTICELLE PASCOLABILI E NUMERO U.B.A. AMMISSIBILI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESA | LOCALITA' | Particella forestale | Superficie totale Ha | Aree boscate | | | Pascoli e aree nude | | | UBA Pascolabili Totali |
| | | | | Superficie pascolabile Ha (*) | UBA/Ha | UBA pascolabili | Superficie Ha | UBA/Ha | UBA pascolabili | |
| C | Varco di Marro | **8** | 7,38 | 7,27 | 0,28 | 2,0 | 0,11 | 0,54 | 0,1 | 2,1 |
| C | Valle Scura di Sopra | **16** | 16,36 | 10,63 | 0,28 | 3,0 | 5,73 | 0,54 | 3,1 | 6,1 |
| C | Colle del Pozzo | **17** | 14,66 | 13,89 | 0,28 | 3,9 | 0,77 | 0,54 | 0,4 | 4,3 |
| C | Il Montagnone | **18** | 10,84 | 7,89 | 0,28 | 2,2 | 2,95 | 0,54 | 1,6 | 3,8 |
| C | Cauciogliara | **20** | 28,61 | 10,98 | 0,28 | 3,1 | 17,63 | 0,54 | 9,5 | 12,6 |
| C | Belvedere | **21** | 10,70 | 7,26 | 0,28 | 2,0 | 3,44 | 0,54 | 1,9 | 3,9 |
| C | Castagna | **24** | 8,75 | 8,68 | 0,28 | 2,4 | 0,07 | 0,54 | 0,0 | 2,5 |
| C | La Chiusa | **25** | 13,12 | 10,13 | 0,28 | 2,8 | 2,99 | 0,54 | 1,6 | 4,5 |
| C | Pettinicchio | **26** | 38,89 | 10,84 | 0,28 | 3,0 | 28,05 | 0,54 | 15,1 | 18,2 |
| C | I Morti | **27a** | 20,07 | 7,21 | 0,28 | 2,0 | 12,86 | 0,54 | 6,9 | 9,0 |
| C | I Morti | **28** | 2,30 | 1,57 | 0,28 | 0,4 | 0,73 | 0,54 | 0,4 | 0,8 |
| C | Valle dei Morti | **29a** | 8,29 | 7,57 | 0,28 | 2,1 | 0,72 | 0,54 | 0,4 | 2,5 |
| C | Valle dei Lupi | **30** | 6,84 | 5,00 | 0,28 | 1,4 | 1,84 | 0,54 | 1,0 | 2,4 |
| C | Valle dei Lupi | **31** | 17,68 | 17,41 | 0,28 | 4,9 | 0,27 | 0,54 | 0,1 | 5,0 |
| C | Acero | **32a** | 5,72 | 5,68 | 0,28 | 1,6 | 0,04 | 0,54 | 0,0 | 1,6 |
| C | Acero | **33** | 10,84 | 10,61 | 0,28 | 3,0 | 0,23 | 0,54 | 0,1 | 3,1 |
| C | Filettone | **34** | 5,24 | 5,20 | 0,28 | 1,5 | 0,04 | 0,54 | 0,0 | 1,5 |
| C | Valle del Limo | **37a** | 8,72 | 7,16 | 0,28 | 2,0 | 1,56 | 0,54 | 0,8 | 2,8 |
| C | Valle del Limo | **37b** | 4,83 | 4,43 | 0,28 | 1,2 | 0,40 | 0,54 | 0,2 | 1,5 |
| C | Lo Stazzo | **38** | 14,31 | 10,05 | 0,28 | 2,8 | 4,26 | 0,54 | 2,3 | 5,1 |
| C | Lo Stazzo | **39** | 17,32 | 10,43 | 0,28 | 2,9 | 6,89 | 0,54 | 3,7 | 6,6 |
| C | Lo Stazzo | **40** | 11,15 | 5,26 | 0,28 | 1,5 | 5,89 | 0,54 | 3,2 | 4,7 |
| C | Vallone dello Stazzo | **41** | 9,26 | 8,93 | 0,28 | 2,5 | 0,33 | 0,54 | 0,2 | 2,7 |
| C | Valle dei Sauci | **42** | 28,53 | 13,87 | 0,28 | 3,9 | 14,66 | 0,54 | 7,9 | 11,8 |
| C | Valle dei Morti | **43** | 14,36 | 12,46 | 0,28 | 3,5 | 1,90 | 0,54 | 1,0 | 4,5 |
| C | Valle dei Sauci | **44a** | 7,99 | 7,70 | 0,28 | 2,2 | 0,29 | 0,54 | 0,2 | 2,3 |
| C | Valle dei Sauci | **44b** | 4,68 | 4,38 | 0,28 | 1,2 | 0,30 | 0,54 | 0,2 | 1,4 |
| C | Valle dei Sauci | **45a** | 19,12 | 18,68 | 0,28 | 5,2 | 0,44 | 0,54 | 0,2 | 5,5 |
| C | Terrate | **46** | 16,25 | 15,14 | 0,28 | 4,2 | 1,11 | 0,54 | 0,6 | 4,8 |
| C | Terrate | **47** | 4,99 | 4,94 | 0,28 | 1,4 | 0,05 | 0,54 | 0,0 | 1,4 |
| C | Filettone | **48** | 9,42 | 8,75 | 0,28 | 2,5 | 0,67 | 0,54 | 0,4 | 2,8 |
| C | Vallone della Vecchiarella | **50** | 9,13 | 7,88 | 0,28 | 2,2 | 1,25 | 0,54 | 0,7 | 2,9 |
| C | Orto di Calcio Lento | **51** | 21,56 | 3,53 | 0,28 | 1,0 | 18,03 | 0,54 | 9,7 | 10,7 |
| C | Valle del Limo | **52** | 31,14 | 5,37 | 0,28 | 1,5 | 25,77 | 0,54 | 13,9 | 15,4 |
| C | Conca | **53** | 6,87 | 6,61 | 0,28 | 1,9 | 0,26 | 0,54 | 0,1 | 2,0 |
| C | Monte Caruso | **54** | 12,57 | 5,38 | 0,28 | 1,5 | 7,19 | 0,54 | 3,9 | 5,4 |

| PARTICELLE PASCOLABILI E NUMERO U.B.A. AMMISSIBILI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESA | LOCALITA' | Particella forestale | Superficie totale Ha | Aree boscate | | | Pascoli e aree nude | | | UBA Pascolabili Totali |
| | | | | Superficie pascolabile Ha (*) | UBA/Ha | UBA pascolabili | Superficie Ha | UBA/Ha | UBA pascolabili | |
| C | Valle del Limo | **52** | 31,14 | 5,37 | 0,28 | 1,5 | 25,77 | 0,54 | 13,9 | 15,4 |
| C | Conca | **53** | 6,87 | 6,61 | 0,28 | 1,9 | 0,26 | 0,54 | 0,1 | 2,0 |
| C | Monte Caruso | **54** | 12,57 | 5,38 | 0,28 | 1,5 | 7,19 | 0,54 | 3,9 | 5,4 |
| C | Valle dei Sauci | **55** | 14,89 | 13,88 | 0,28 | 3,9 | 1,01 | 0,54 | 0,5 | 4,4 |
| C | Monte Caruso | **56** | 13,22 | 7,29 | 0,28 | 2,0 | 5,93 | 0,54 | 3,2 | 5,2 |
| C | Valle Matauro | **57** | 35,36 | 23,27 | 0,28 | 6,5 | 12,09 | 0,54 | 6,5 | 13,0 |
| C | Colle Matauro | **59** | 12,88 | 10,18 | 0,28 | 2,9 | 2,70 | 0,54 | 1,5 | 4,3 |
| C | Valle del Pero | **61** | 11,88 | 10,52 | 0,28 | 2,9 | 1,36 | 0,54 | 0,7 | 3,7 |
| C | Raia dell'Acera | **62** | 12,88 | 10,43 | 0,28 | 2,9 | 2,45 | 0,54 | 1,3 | 4,2 |
| C | Terrate | **63** | 12,05 | 10,68 | 0,28 | 3,0 | 1,37 | 0,54 | 0,7 | 3,7 |
| C | Terrate | **64** | 8,25 | 8,12 | 0,28 | 2,3 | 0,13 | 0,54 | 0,1 | 2,3 |
| C | Filettone | **65** | 8,08 | 7,94 | 0,28 | 2,2 | 0,14 | 0,54 | 0,1 | 2,3 |
| C | La Peta | **66** | 13,89 | 8,74 | 0,28 | 2,4 | 5,15 | 0,54 | 2,8 | 5,2 |
| C | Filettone | **67** | 13,70 | 11,11 | 0,28 | 3,1 | 2,59 | 0,54 | 1,4 | 4,5 |
| C | Costa dell'Angelo | **68** | 8,44 | 6,67 | 0,28 | 1,9 | 1,77 | 0,54 | 1,0 | 2,8 |
| C | Valle Nova | **70** | 33,18 | 23,39 | 0,28 | 6,5 | 9,79 | 0,54 | 5,3 | 11,8 |
| C | S. Maria | **72** | 17,41 | 11,71 | 0,28 | 3,3 | 5,70 | 0,54 | 3,1 | 6,4 |
| C | S. Maria | **73** | 11,99 | 7,49 | 0,28 | 2,1 | 4,50 | 0,54 | 2,4 | 4,5 |
| C | S. Maria | **74** | 6,36 | 5,05 | 0,28 | 1,4 | 1,31 | 0,54 | 0,7 | 2,1 |
| C | Monte Caruso | **76** | 16,92 | 11,23 | 0,28 | 3,1 | 5,69 | 0,54 | 3,1 | 6,2 |
| C | Raia della Spina | **78** | 21,15 | 13,63 | 0,28 | 3,8 | 7,52 | 0,54 | 4,1 | 7,9 |
| C | Valle Piana | **80** | 5,05 | 4,30 | 0,28 | 1,2 | 0,75 | 0,54 | 0,4 | 1,6 |
| C | Vado dell'Asta | **82** | 16,15 | 9,39 | 0,28 | 2,6 | 6,76 | 0,54 | 3,7 | 6,3 |
| C | Salve Regina | **83a** | 9,84 | 6,54 | 0,28 | 1,8 | 3,30 | 0,54 | 1,8 | 3,6 |
| C | Vado dell'Asta | **84** | 13,47 | 10,04 | 0,28 | 2,8 | 3,43 | 0,54 | 1,9 | 4,7 |
| C | Valle Coscia | **85** | 10,45 | 9,81 | 0,28 | 2,7 | 0,64 | 0,54 | 0,3 | 3,1 |
| C | Vado dell'Asta | **86** | 8,36 | 8,32 | 0,28 | 2,3 | 0,04 | 0,54 | 0,0 | 2,4 |
| C | Vado dell'Asta | **87** | 9,30 | 9,18 | 0,28 | 2,6 | 0,12 | 0,54 | 0,1 | 2,6 |
| C | La Peta | **88** | 3,12 | 3,00 | 0,28 | 0,8 | 0,12 | 0,54 | 0,1 | 0,9 |
| C | Vallone di Ciccociangia | **89** | 10,38 | 4,81 | 0,28 | 1,3 | 5,57 | 0,54 | 3,0 | 4,4 |
| C | Vallone di Ciccociangia | **90** | 8,38 | 4,74 | 0,28 | 1,3 | 3,64 | 0,54 | 2,0 | 3,3 |
| C | Costa dell'Angelo | **92** | 7,84 | 4,23 | 0,28 | 1,2 | 3,61 | 0,54 | 1,9 | 3,1 |
| C | Raia della Spina | **97** | 9,33 | 5,40 | 0,28 | 1,5 | 3,93 | 0,54 | 2,1 | 3,6 |
| C | Serro Tondo | **98a** | 6,44 | 2,83 | 0,28 | 0,8 | 3,61 | 0,54 | 1,9 | 2,7 |
| C | Serro Tondo | **98b** | 2,66 | 2,36 | 0,28 | 0,7 | 0,30 | 0,54 | 0,2 | 0,8 |
| C | Serro Tondo | **99** | 6,78 | 6,38 | 0,28 | 1,8 | 0,40 | 0,54 | 0,2 | 2,0 |

| PARTICELLE PASCOLABILI E NUMERO U.B.A. AMMISSIBILI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESA | LOCALITA' | Particella forestale | Superficie totale Ha | Aree boscate | | | Pascoli e aree nude | | | UBA Pascolabili Totali |
| | | | | Superficie pascolabile Ha (*) | UBA/Ha | UBA pascolabili | Superficie Ha | UBA/Ha | UBA pascolabili | |
| C | Serrone Pizzuto | **100** | 14,02 | 13,40 | 0,28 | 3,8 | 0,62 | 0,54 | 0,3 | 4,1 |
| C | Serrone Pizzuto | **101** | 17,58 | 16,29 | 0,28 | 4,6 | 1,29 | 0,54 | 0,7 | 5,3 |
| C | Vado dell'Asta | **102** | 11,66 | 10,68 | 0,28 | 3,0 | 0,98 | 0,54 | 0,5 | 3,5 |
| C | Valle di Liero | **103** | 14,73 | 14,72 | 0,28 | 4,1 | 0,01 | 0,54 | 0,0 | 4,1 |
| C | Serro della Falasca | **104** | 5,17 | 5,14 | 0,28 | 1,4 | 0,03 | 0,54 | 0,0 | 1,5 |
| C | Serro della Falasca | **105** | 13,94 | 13,10 | 0,28 | 3,7 | 0,84 | 0,54 | 0,5 | 4,1 |
| C | Calvelluzzo | **106** | 3,04 | 3,04 | 0,28 | 0,9 | | 0,54 | 0,0 | 0,9 |
| C | Tronola | **113b** | 11,20 | 8,04 | 0,28 | 2,3 | 3,16 | 0,54 | 1,7 | 4,0 |
| C | Tronola | **114** | 16,61 | 12,41 | 0,28 | 3,5 | 4,20 | 0,54 | 2,3 | 5,7 |
| C | Lagarello | **116** | 5,06 | 5,04 | 0,28 | 1,4 | 0,02 | 0,54 | 0,0 | 1,4 |
| C | Corsa dei Cavalli | **119** | 11,22 | 10,00 | 0,28 | 2,8 | 1,22 | 0,54 | 0,7 | 3,5 |
| C | Corsa dei Cavalli | **120** | 15,81 | 14,65 | 0,28 | 4,1 | 1,16 | 0,54 | 0,6 | 4,7 |
| C | Valle del Ghiro | **121** | 9,15 | 9,14 | 0,28 | 2,6 | 0,01 | 0,54 | 0,0 | 2,6 |
| C | Coste del Calvello | **122** | 10,92 | 10,50 | 0,28 | 2,9 | 0,42 | 0,54 | 0,2 | 3,2 |
| C | Orno | **124** | 9,53 | 9,53 | 0,28 | 2,7 | | 0,54 | 0,0 | 2,7 |
| C | Pietra di Alessio | **130** | 11,27 | 2,62 | 0,28 | 0,7 | 8,65 | 0,54 | 4,7 | 5,4 |
| C | Fontana di Sazzano | **132** | 18,37 | 13,41 | 0,28 | 3,8 | 4,96 | 0,54 | 2,7 | 6,4 |
| C | Corsa dei Cavalli | **136** | 9,47 | 9,46 | 0,28 | 2,6 | 0,01 | 0,54 | 0,0 | 2,7 |
| C | Monte Calvello | **137a** | 9,80 | 9,62 | 0,28 | 2,7 | 0,18 | 0,54 | 0,1 | 2,8 |
| C | Monte Calvello | **138** | 9,58 | 0,54 | 0,28 | 0,2 | 9,04 | 0,54 | 4,9 | 5,0 |
| C | Aria della Preda | **153** | 42,34 | 18,19 | 0,28 | 5,1 | 24,15 | 0,54 | 13,0 | 18,1 |
| C | Sazzano | **154** | 41,14 | 13,92 | 0,28 | 3,9 | 27,22 | 0,54 | 14,7 | 18,6 |
| C | Piano di Sazzano | **176** | 14,85 | 12,91 | 0,28 | 3,6 | 1,94 | 0,54 | 1,0 | 4,7 |
| C | Gioco dei Colombi | **312** | 3,45 | 3,45 | 0,28 | 1,0 | | 0,54 | 0,0 | 1,0 |
| C | Valle dell'Ulivo | **314** | 15,06 | 4,25 | 0,28 | 1,2 | 10,81 | 0,54 | 5,8 | 7,0 |
| C | Serrone Pizzuto | **315** | 8,01 | 3,25 | 0,28 | 0,9 | 4,76 | 0,54 | 2,6 | 3,5 |
| C | Il Casone | **316** | 2,32 | 2,17 | 0,28 | 0,6 | 0,15 | 0,54 | 0,1 | 0,7 |
| Pascoli | I Morti | **27b** | 7,44 | | | 0,0 | 7,44 | 1,02 | 7,6 | 7,6 |
| Pascoli | Valle dei Morti | **29b** | 6,55 | | | 0,0 | 6,55 | 1,02 | 6,7 | 6,7 |
| Pascoli | Acero | **32b** | 0,94 | | | 0,0 | 0,94 | 1,02 | 1,0 | 1,0 |
| Pascoli | Valle dei Sauci | **45b** | 2,44 | | | 0,0 | 2,44 | 1,02 | 2,5 | 2,5 |
| Pascoli | Terrate | **47b** | 8,30 | | | 0,0 | 8,30 | 1,02 | 8,5 | 8,5 |
| Pascoli | Valle Foce di Caposele | **79b** | 3,38 | | | 0,0 | 3,38 | 1,02 | 3,4 | 3,4 |
| Pascoli | Salve Regina | **83b** | 2,98 | | | 0,0 | 2,98 | 1,02 | 3,0 | 3,0 |
| Pascoli | Vado dell'Asta | **84b** | 1,28 | | | 0,0 | 1,28 | 1,02 | 1,3 | 1,3 |
| Pascoli | Vado dell'Asta | **86b** | 8,15 | | | 0,0 | 8,15 | 1,02 | 8,3 | 8,3 |

| PARTICELLE PASCOLABILI E NUMERO U.B.A. AMMISSIBILI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESA | LOCALITA' | Particella forestale | Superficie totale Ha | Aree boscate | | | Pascoli e aree nude | | | UBA Pascolabili Totali |
| | | | | Superficie pascolabile Ha (*) | UBA/Ha | UBA pascolabili | Superficie Ha | UBA/Ha | UBA pascolabili | |
| Pascoli | Monte Calvello | **137b** | 3,89 | | | 0,0 | 3,89 | 1,02 | 4,0 | 4,0 |
| Pascoli | Tronola | **147a** | 167,41 | | | 0,0 | 167,41 | 1,02 | 170,8 | 170,8 |
| Pascoli | Tronola | **147b** | 8,86 | | | 0,0 | 8,86 | 1,02 | 9,0 | 9,0 |
| Pascoli | Tronola | **147c** | 5,24 | | | 0,0 | 5,24 | 1,02 | 5,3 | 5,3 |
| Pascoli | Tronola | **147d** | 1,83 | | | 0,0 | 1,83 | 1,02 | 1,9 | 1,9 |
| Pascoli | Cervarolo di Sazzano | **175** | 17,92 | | | 0,0 | 17,92 | 1,02 | 18,3 | 18,3 |
| Pascoli | Coste di Cervialto | **232b** | 15,20 | | | 0,0 | 15,20 | 1,02 | 15,5 | 15,5 |
| Pascoli | Valle d'Acera | **249** | 2,71 | | | 0,0 | 2,71 | 1,02 | 2,8 | 2,8 |
| Pascoli | Valle d'Acera | **255c** | 0,39 | | | 0,0 | 0,39 | 1,02 | 0,4 | 0,4 |
| Pascoli | Piano dei Vaccari | **260b** | 3,07 | | | 0,0 | 3,07 | 1,02 | 3,1 | 3,1 |
| Pascoli | Vallebona | **273b** | 1,22 | | | 0,0 | 1,22 | 1,02 | 1,2 | 1,2 |
| Pascoli | Sierro della Zà Popa | **291b** | 1,72 | | | 0,0 | 1,72 | 1,02 | 1,8 | 1,8 |
| Pascoli | Colle del Leone | **292b** | 4,56 | | | 0,0 | 4,56 | 1,02 | 4,7 | 4,7 |
| Inclusi | F.lo cat. n. 18 part. 11 | **In** | 4,05 | | | 0,0 | 4,05 | 0,54 | 2,2 | 2,2 |
| Inclusi | F.lo cat. n. 18 part. 8 | **In** | 0,86 | | | 0,0 | 0,86 | 0,54 | 0,5 | 0,5 |
| Inclusi | F.lo cat. n. 19 part. 43 | **In** | 0,57 | | | 0,0 | 0,57 | 0,54 | 0,3 | 0,3 |
| Inclusi | F.lo cat. n. 23 part. 29 | **In** | 1,26 | | | 0,0 | 1,26 | 0,54 | 0,7 | 0,7 |
| Inclusi | F.lo cat. n. 23 part. 33 | **In** | 0,49 | | | 0,0 | 0,49 | 0,54 | 0,3 | 0,3 |
| Inclusi | F.lo cat. n. 24 part. 330 | **In** | 2,83 | | | 0,0 | 2,83 | 0,54 | 1,5 | 1,5 |
| Inclusi | F.lo cat. n. 25 part. 12 | **In** | 16,89 | | | 0,0 | 16,89 | 0,54 | 9,1 | 9,1 |
| Inclusi | F.lo cat. n. 25 part. 13 | **In** | 0,54 | | | 0,0 | 0,54 | 0,54 | 0,3 | 0,3 |
| Inclusi | F.lo cat. n. 26 part. 1 | **In** | 12,32 | | | 0,0 | 12,32 | 0,54 | 6,7 | 6,7 |
| Inclusi | F.lo cat. n. 26 part. 2 | **In** | 6,39 | | | 0,0 | 6,39 | 0,54 | 3,5 | 3,5 |
| Inclusi | F.lo cat. n. 27 part. 151 | **In** | 23,97 | | | 0,0 | 23,97 | 0,54 | 12,9 | 12,9 |
| Inclusi | F.lo cat. n. 27 part. 158 | **In** | 0,13 | | | 0,0 | 0,13 | 0,54 | 0,1 | 0,1 |
| Inclusi | F.lo cat. n. 27 part. 160 | **In** | 0,07 | | | 0,0 | 0,07 | 0,54 | 0,0 | 0,0 |
| Inclusi | F.lo cat. n. 27 part. 161 | **In** | 0,54 | | | 0,0 | 0,54 | 0,54 | 0,3 | 0,3 |
| Inclusi | F.lo cat. n. 27 part. 3 | **In** | 0,63 | | | 0,0 | 0,63 | 0,54 | 0,3 | 0,3 |
| Inclusi | F.lo cat. n. 28 part. 1 | **In** | 3,28 | | | 0,0 | 3,28 | 0,54 | 1,8 | 1,8 |
| | | **TOTALI** | **3513,15** | **2745,34** | | **768,7** | **767,81** | | **546,8** | **1315,5** |

## Modalità e periodo di utilizzazione

L'attività pastorale a Bagnoli è tradizionalmente ben sviluppata, con una popolazione di bestiame costituita principalmente da bovini di razza Podolica pugliese e ovini di razza Bagnolese, noti per la loro rusticità e adattabilità all'ambiente. Nonostante la mancanza di regolamentazione comunale che disciplini il carico di bestiame o le modalità di utilizzo del pascolo, negli ultimi anni si è osservata una ripresa significativa dell'allevamento bovino, mentre l'allevamento ovino, pur in calo, mantiene una certa importanza.

Il pascolo si estende su tutto il demanio comunale, senza limitazioni di carico o periodi di utilizzo prestabiliti. Il decreto sul riconoscimento degli usi civici garantisce il diritto di pascolo senza restrizioni, e il comune non dispone di registri aggiornati per monitorare l'uso del pascolo. Questa situazione ha portato a un sovraccarico delle superfici pascolive, con un numero di capi che spesso eccede la capacità di supporto del territorio. Il pascolamento libero, disorganizzato e incontrollato ha creato situazioni di sovraccarico estremo nei pascoli di facile accesso (ove è più semplice andare a controllare il bestiame) e meglio serviti dai punti d'acqua, e situazioni di sottocarico nei pascoli più scomodi, male o per nulla serviti da abbeverate. In entrambi i casi si ha un progressivo degrado della qualità del pascolo, indicato dalla eccessiva presenza delle specie infestanti e di quelle con sviluppo "a rosetta". Nelle stazioni sovraccaricate, come accennato, sono inoltre frequenti i "sentieramenti" provocati dai movimenti del bestiame, causa di profonde incisioni del cotico e di erosioni con riduzione di fertilità del suolo. Questo sovraccarico ha contribuito alla diffusione di specie infestanti e alla degradazione del cotico erboso.

Specie foraggere di alta qualità sono in declino, mentre specie meno appetibili e invasive, come i cardi e la felce, si stanno diffondendo sempre di più. Il pascolo precoce degli ovini nel piano Laceno, combinato con condizioni climatiche avverse e la presenza di ristagni idrici, ha portato a un degrado progressivo della qualità del pascolo. Inoltre, la diffusione della ginestra e di altre specie arbustive nei terreni degradati è facilitata dal ritiro del bestiame dalle aree meno produttive.

Le pratiche di gestione attuali non sono sufficienti a garantire la sostenibilità del pascolo e la conservazione del territorio. Non esiste una regolamentazione chiara sull'uso del pascolo, e le attività pastorali spesso si svolgono in modo anarchico, con carichi di bestiame non controllati e sconfinamenti nei territori comunali limitrofi.

Per migliorare la situazione, sarebbe necessario implementare un piano di gestione più razionale, che preveda la regolamentazione del carico di bestiame, l'introduzione di periodi di riposo per il cotico erboso, e interventi di miglioramento della qualità del pascolo attraverso pratiche agronomiche e la protezione delle aree più vulnerabili. Inoltre, sarebbe opportuno promuovere la diversificazione delle pratiche agricole e l'uso sostenibile delle risorse pastorali per garantire la conservazione a lungo termine dell'ecosistema montano.

Il problema del miglioramento dei pascoli di Bagnoli si pone innanzitutto in termini di regolamentazione, sia del carico che delle date di alpeggio ed è quindi, in primo luogo, un problema di natura normativa.

L'intervento che appare più urgente, da realizzarsi dunque a brevissimo termine, è l'imposizione di un razionale calendario di utilizzazione, da fare rispettare tassativamente. Già è stato detto che le date di ingresso e di uscita nei pascoli di montagna sono a totale discrezione dei pastori e che questo comporta rischi gravissimi per la buona conservazione del cotico.

Sarebbe quanto mai opportuno adottare un periodo di pascolo di 135 giorni, indicativamente dal 15 giugno al 31 ottobre. Tuttavia, l'entrata degli animali non dovrebbe essere anticipata al piano Laceno (anche in relazione all'andamento climatico degli ultimi anni che vede un prolungarsi della stagione invernale), nonostante la sua quota inferiore rispetto ad altri pascoli, a causa delle specifiche

condizioni climatiche della zona. In un'ipotesi di gestione più flessibile, si potrebbe anticipare l'ingresso di una settimana al piano di Sazzano, che gode di temperature più favorevoli. Tuttavia, questo anticipo dovrebbe essere compensato con una partenza altrettanto anticipata per permettere al cotico erboso di rigenerarsi.

Il rispetto di tali date potrebbe rappresentare una forma di miglioramento indiretto altamente efficace, portando a un arricchimento della composizione floristica e a un incremento della produttività dei pascoli. Sebbene la produttività potenziale sia notevolmente superiore a quella attuale, questa è compromessa da pratiche di sfruttamento irrazionali. L'applicazione rigorosa di queste regole potrebbe quindi, nel breve termine, migliorare significativamente le condizioni del pascolo, analogamente a quanto osservato in comuni limitrofi. Più ardua da realizzare, ma indispensabile per una razionale gestione dell'ambiente, è la progressiva riduzione del carico fino ai livelli stabiliti dal presente piano.

Si è consapevoli che si tratta di un provvedimento molto difficile da prendere e ancor più da fare applicare, ma che deve essere necessariamente stabilito come meta da raggiungere a medio termine, ovvero entro il periodo di validità del piano. Perché questo non si ripercuota in maniera traumatica sull'attività zootecnica della zona è opportuno inserire gli interventi che saranno presi per la zootecnia di montagna in un più ampio programma di sviluppo che preveda l'impianto di prati ed erbai nelle zone collinari.

In conformità al Regolamento n. 3/2017 è disposto quanto segue:

a) Il pascolo vagante o brado, cioè senza idoneo custode, può esercitarsi solo nei terreni appartenenti al proprietario degli animali pascolanti. Le proprietà contermini ed i terreni, anche dello stesso possessore, in cui il pascolo è vietato devono essere garantiti dallo sconfinamento degli animali, con chiudende o altri mezzi. Ove non siano presenti adeguati sistemi atti ad impedire sconfinamenti e danni, il bestiame deve essere controllato da un custode di età non inferiore a 18 anni. Ad ogni custode non possono essere affidati più di cinquanta capi di bestiame grosso o più di cento capi di bestiame minuto.

b) il pascolo tra i 400 e gli 800 metri s.l.m. può esercitarsi nel periodo dal 1° ottobre al 15 maggio;

c) al di sopra degli 800 metri s.l.m., fino ad un massimo di sei mesi il pascolo nei terreni sottoposto a vincolo idrogeologico può esercitarsi nel periodo dal 16 maggio al 30 settembre;

d) il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, nei pascoli e negli altri saldi pascolivi percorsi da incendio, è vietato per un anno dall'incendio;

e) nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di anni quattro dopo il taglio e, quello del bestiame bovino ed equino, per un periodo di sei anni dopo il taglio;

f) nelle fustaie e nei cedui in conversione, il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 1,50 metri e, quello degli animali bovini ed equini, prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 3 metri;

g) nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, il pascolo è vietato per 10 anni e, comunque, fino a quando l'Ente delegato territorialmente competente non abbia adottato uno specifico provvedimento di rimozione del divieto;

h) nei boschi chiusi al pascolo è vietato immettere animali, tuttavia, è consentito il solo transito del bestiame da avviare al pascolo, purché effettuato, senza soste, lungo strade, piste, tratturi e mulattiere;

i) nelle fustaie disetanee il pascolo è sempre vietato;

j) Il pascolo è altresì vietato nelle aree interessate dai tagli boschivi per i cinque anni successivi;

k) il pascolo delle capre nei boschi è sempre vietato.

Si ricorda che nelle particelle forestali (come da piano dei miglioramenti) ove venissero effettuati interventi di infoltimento e/o riforestazione il pascolo va vietato per tutta la durata del PGF, a partire dall'anno di attuazione dell'intervento sulle singole particelle forestali, o su aree delimitate e recintate all'interno delle particelle stesse.

## Cap. 10 - Misure di tutela delle aree sensibili e di tutela idrogeologica (art. 102)

La compartimentazione del complesso silvo-pastorale è stata effettuata tenendo conto delle aree che presentano caratteri morfologici critici, quali versanti molto accentuati, crinali, boschi ripariali, etc. escludendoli dagli interventi di utilizzazione ed inserendoli nelle comprese dei **boschi di protezione**.

Al P.G.F. sono state accluse le tavole di sovrapposizione del particellare con le carte del Rischio/Pericolo da Frana e del Rischio idraulico del PSAI dell'Autorità di Bacino dalle quali si evincono le tipologie di rischio a cui sono assoggettate le singole particelle.

Al Piano sarà accluso uno studio di compatibilità idrogeologica, redatto da un geologo abilitato, per l'esame del Piano medesimo da parte della competente Autorità di Bacino per il parere di competenza.

Per tali aree si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al Titolo V del *Regolamento*.

## Cap. 11 - Misure di salvaguardia della biodiversità (artt. 79 e 101)

Si considerano **sporadiche** le specie forestali che si presentano nel bosco allo stato isolato o in piccolissimi gruppi e non superano complessivamente il 10% del numero delle piante presenti. Le seguenti specie, quando presenti in bosco al disotto di tale soglia, vanno salvaguardate dagli interventi di taglio: abete bianco, tasso, betulla, olmo montano, farnia, aceri, frassino maggiore, frassino meridionale, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerro-sughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio, albero di giuda, corbezzolo, filliree, alloro, ginepri, nonché le particolarità botaniche, gli esemplari di pregio, gli endemismi ed i relitti vegetazionali. Tuttavia, a carico delle stesse possono prevedersi interventi selvicolturali calibrati sulla base delle caratteristiche auto-ecologiche e mirati a favorirne la conservazione, la rinnovazione e, qualora ne ricorrano le condizioni, una maggiore frequenza. Allorquando le specie di cui sopra superano la soglia del 10 per cento del numero delle piante presenti sulla superficie boscata considerata e assumono carattere invasivo è permesso il loro controllo mediante tagli sia durante le utilizzazioni boschive che con specifici interventi all'uopo previsti.

Ai sensi dell'articolo 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, e del Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014, dovranno essere censiti e segnalati gli **alberi monumentali** ivi presenti, così come definiti dalla Legge Regionale 5 aprile 2016, n. 6.

I **biotopi forestali caratteristici**, sia che si tratti di fitocenosi particolari che di aree con la presenza di specie rare, stagni e zone umide, saranno sottoposti a misure di gestione che ne preservino lo stato attuale.

Potranno essere rilasciati ad evoluzione naturale dei corridoi tra le particelle interessate dagli interventi di taglio boschivo, tali da costituire una superficie, accorpata, pari al 3 per cento della superficie forestale interessata dal piano di taglio.

In tutte le tipologie di bosco, deve essere **rilasciato ad invecchiamento indefinito** almeno un albero per ettaro, scelto tra quelli di maggior diametro o sviluppo. L'albero scelto deve essere segnato con vernice di colore rosso indelebile.

In ogni caso, devono essere rilasciati gli **alberi che presentino cavità** utilizzate come sito di

nidificazione.

È vietato distruggere o danneggiare i **nidi di formiche** del gruppo *Formica rufa*. In particolare, è vietata la raccolta dello strame dei nidi in qualsiasi stagione, anche quando detti nidi (acervi) appaiono spopolati, a causa di temporanee migrazioni delle formiche, per il loro rifugiarsi nel terreno durante il letargo o, comunque, nei periodi freddi. È, altresì, vietata la distruzione delle popolazioni di formiche che abitano tali nidi, costituite da operaie, regine, maschi, larve e uova.

Vanno, altresì rispettate tutte le **ulteriori disposizioni** di cui agli artt. 79 e 101 del Regolamento Regionale 3/2017 e ss.mm. e ii.

## Cap. 12 - Misure di tutela paesaggistica

I boschi **di Bagnoli Irpino**, oggetto del presente piano, ad eccezione del Piano Laceno e dei tracciati delle piste da sci presenti sul Monte Rajamagra**, rientrano** nelle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del D. lgs n. 42/2004 e pertanto sono assoggettati a detta norma. Si evidenzia, comunque che gli interventi di natura selvicolturale non necessitano di autorizzazione paesaggistica secondo la normativa vigente.

## Cap. 13 - Misure di tutela per la gestione dei rischi naturali e l'adattamento ai cambiamenti climatici

Nella fase di compartimentazione del complesso silvo-pastorale, sono ste adottate misure nel periodo di validità del Piano, in coerenza con gli strumenti territoriali vigenti, per la prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

## Cap. 14 - Modalità di godimento e stato dei diritti di Uso civico *(Art. 104)*

### 1- Individuazione

a. I comprensori demaniali gravati da usi civici sono quelli attribuiti al Comune in esecuzione delle Ordinanze Commissariali del 27/11/1873 e del 28/01/1885, approvate con RR. DD. 07/05/1874 e 18/06/1885.

b. I predetti comprensori sono analiticamente individuati e descritti nell'allegato Decreto del Regio Commissario per la liquidazione degli Usi Civici in Napoli del 23/10/1935 con il quale vengono assegnati alla categoria di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (di seguito indicata più semplicemente come "categoria di cui alla lettera a)"), ovvero: terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente.

### 2- Disciplina di riferimento

a. La disciplina del diritto di uso civico deve essere regolamentata con apposito Regolamento comunale degli usi civici e si iscrive nella normativa sancita dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal Regolamento di Esecuzione approvato con R. D. 26 febbraio 1928, n. 332, dalle Leggi Regionali 17 marzo 1981, n. 11, e 7 maggio 1996, n. 11, dal Regolamento regionale n. 3/2017, dalla Delibera di Giunta Regionale 19/12/2017, n. 795, nonché dalle Linee di indirizzo per l'esercizio delle funzioni in materia di Usi Civici approvate con Delibera di Giunta Regionale 23 febbraio 2015, n. 61.

b. Il Regolamento degli usi civici è approvato dalla Regione Campania ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 61/2015.

### 3- Competenza territoriale

a. I soggetti di cui al successivo punto I-4, nel rispetto delle Leggi Nazionali e della Regione Campania, sono titolari esclusivi ed esercitano anche i diritti di uso civico sui terreni e le piante di castagno che ne sono gravati, così come individuati nel richiamato Decreto del Regio Commissario di assegnazione relativi alla "categoria di cui alla lettera a)".

### 4- Titolarità del diritto di uso civico

a. All'esercizio dell'uso civico, nelle sue differenti configurazioni territoriali, hanno diritto, esclusivamente, i cittadini del Comune.

b. Sono fatte salve le relative posizioni, e sono equiparati ai cittadini del Comune (purché in regola dal punto di vista tecnico-fiscale e del pagamento dei canoni pregressi ed attuali, entro due anni dall'approvazione del Regolamento comunale degli usi civici da parte della Regione Campania ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 61/2015) esclusivamente coloro che risultano assegnatari di aree gravate da uso civico del pascolo e/o affitto e/o di diritto di livello precedentemente all'entrata in vigore del predetto regolamento comunale e per un periodo non inferiore a due anni dall'entrata in vigore dello stesso.

c. Coloro, d'ambo i sessi, che abbiano contratto matrimonio con cittadini del Comune.

d. L'Amministrazione comunale, tramite Delibera del Consiglio comunale, può aumentare i canoni dei cittadini di altri Comuni che risultano essere assegnatari e/o occupatori di terreni e/o castagneti gravati da uso civico e/o affitto, fino ad un massimo del 25% della tariffa base.

## 5- Tipologia degli usi civici esercitabili

a. Gli usi civici che possono esercitarsi, per le finalità del presente Piano di Gestione Forestale, alla luce dei Decreti di assegnazione a categoria sono esclusivamente quelli relativi alla "categoria di cui alla lettera a)" ovvero:

   i. il legnatico (raccolta della legna per uso domestico o di personale lavoro);

   ii. il pascolo permanente;

   iii. il castagnatico e la raccolta di tutti i prodotti secondari spontanei non protette da speciali leggi;

   iv. l'uso delle acque per abbeverare animali;

   v. la semina.

b. L'esercizio del diritto di uso civico del castagnatico, facendo seguito alla nuova classificazione assegnata al castagneto da frutto dalla L. R. 31 marzo 2017, n. 10, è regolato dal Regolamento regionale 12 novembre 2018, n. 11 (Regolamento di tutela e gestione sostenibile dei castagneti da frutto in attualità di coltura), fatta salva la raccolta delle castagne nell'ambito dei boschi di castagno destinati alla produzione legnosa ed assegnati alla "categoria di cui alla lettera a)".

c. Quando le rendite delle terre non sono sufficienti al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro Amministrazione e sorveglianza, l'Amministrazione comunale, previa delibera dell'organo competente, può imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

d. I proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita dei prodotti dei terreni degli usi civici, ivi comprese le erbe e la legna eccedente gli usi, alla luce dell'art. 8 della L. R. n. 11/1981 e dell'art. 46 del R. D. n. 332/1928, devono essere destinati al miglioramento ed alle trasformazioni fondiarie, nonché al sostegno delle attività agro-silvo-pastorali e industriali delle imprese cooperative eventualmente costituite.

## 6- Nuove forme di gestione degli usi civici

a. Gli usi civici potranno essere esercitati, oltre che dai singoli cittadini, anche da associazioni di abitanti residenti provvisti di requisiti di professionalità (coltivatori, mezzadri, affittuari, contadini limitrofi nel numero determinato di volta in volta dal Sindaco, braccianti, pastori, giovani naturali interessati allo sviluppo dell'agricoltura, anche alla luce dei programmi europei, ecc.), costituiti in cooperative legalmente riconosciute, che saranno subordinate alle disposizioni vigenti (Leggi Regionali n. 11/1981, n. 11/1996), previa autorizzazione regionale al mutamento di destinazione per concessione in uso temporaneo. Ove sussistano terre accorpate e si è costituita la cooperativa di cui all'art. 6 o all'art. 14 della L. R. n. 11/1981, il Comune, quale socio che concede le terre, richiede un progetto d'impresa per attività plurime integrate di piena valorizzazione delle risorse sulla scorta delle indicazioni del Piano di Gestione Forestale, di cui all'articolo 5 della predetta Norma, redatto per l'assieme delle terre pubbliche.

b. L'autorizzazione regionale al mutamento di destinazione per concessione in uso temporaneo è concessa laddove ricorrono le condizioni e fatte salve le disposizioni del titolo V del Regolamento regionale n. 3/2017 e di altri vincoli esistenti.

## 7- Vincolo per scopi idrogeologici (Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)

a. I boschi demaniali, che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni, strade o fabbricati dalla caduta di frane, dal rotolamento di sassi, dallo scorrimento delle acque, dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali, possono, su richiesta della Provincia o di altri Enti e privati interessati, essere sottoposti a limitazione nella loro utilizzazione.

b. I mutamenti di destinazione d'uso afferenti al vincolo idrogeologico devono essere eseguiti in conformità alle disposizioni di cui al Titolo V del Regolamento regionale n. 3/2017.

## 8- Procedure per la trasformazione dei boschi, dei terreni saldi e dei pascoli permanenti

a. Le trasformazioni dei boschi in altre qualità di coltura e dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione dell'Ente delegato competente in relazione al Regolamento regionale n. 3/2017 (Titolo V) ed alle modalità da essa prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire danni per la stabilità o turbare il regime delle acque.

b. È sempre vietata la trasformazione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi.

## 9- Difesa dei boschi dagli incendi

a. È vietato a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi o a distanza inferiore a 100 metri dai medesimi. Nel periodo di massima pericolosità vigono le disposizioni impartite annualmente con il Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente.

b. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli.

c. Il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi può, comunque, variare di anno in anno e viene individuato con apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

d. L'accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento ed alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti, preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo.

e. Le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro i quali soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati ad utilizzare le aree pic-nic all'uopo attrezzate.

f. L'abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto previsto dall'articolo 25 della L. R. 9 agosto 2012, n. 26, è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a quella indicata nel comma 1, purché il terreno su cui si effettua l'abbruciamento, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata (precesa o fascia protettiva) della larghezza minima di metri cinque. In ogni caso, non si deve procedere all'abbruciamento in presenza di vento. È fatto obbligo di presiedere a tutte le operazioni di bruciatura.

g. Nel periodo di massima pericolosità è vietato fumare nei boschi, nelle strade e sentieri che li attraversano.

h. Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentramento ed abbruciamento. L'abbruciamento è consentito

al di fuori del periodo di massima pericolosità come definito dal Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente e dovrà essere effettuato dall'alba alle ore 9:00 ed in assenza di vento. Il materiale raccolto in piccoli mucchi è bruciato con le opportune cautele, in apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto.

i. L'abbruciamento delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente denunciati al Sindaco ed ai Carabinieri Forestali.

j. È consentito l'uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, viene attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa intesa con tutte le autorità coordinate nell'intervento.

k. È consentito l'uso della tecnica del fuoco prescritto, da attuarsi in ottemperanza alla L. R. 13 giugno 2016, n. 20, negli ambiti di cui all'articolo 75, comma 11, del Regolamento regionale n. 3/2017.

l. Sono considerati interventi colturali di prevenzione degli incendi, quelli progettati, approvati e finalizzati ad assecondare i fenomeni di rinaturalizzazione in atto in rimboschimenti di conifere, le sotto piantagioni, i rinfoltimenti ed i nuovi rimboschimenti, con l'impiego di latifoglie autoctone maggiormente resistenti al fuoco. Sono altresì considerati strumenti di selvicoltura preventiva gli sfolli ed i diradamenti, il taglio fitosanitario, le spalcature dei rami morti ed il taglio della vegetazione arbustiva, qualora efficace ad interrompere la continuità verticale del combustibile.

m. Sono considerati interventi di prevenzione e lotta degli incendi quelli finalizzati alla realizzazione di fasce tagliafuoco.

n. Nelle fasce perimetrali dei boschi e dei rimboschimenti, nonché nelle fasce laterali alla viabilità di servizio forestale, per una profondità massima di 30 metri, oltre al controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva, anche mediante il pascolo, sono consentiti diradamenti di intensità tale da creare un'interruzione permanente nella copertura delle chiome.

o. Gli Enti gestori delle linee ferroviarie, delle autostrade e delle strade statali, provinciali e comunali, i frontisti delle strade vicinali ed interpoderali, sono tenuti a mantenere sgombre da vegetazione e da rifiuti, le banchine e le scarpate delle vie di loro competenza, confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse. Tale operazione deve essere eseguita senza ricorrere all'uso del fuoco.

p. I proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, sono tenuti a mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza.

q. È fatto obbligo ai proprietari di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi, produttivi e/o ricreativi, eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendi e di effettuare la ripulitura dell'area circostante l'insediamento, per un raggio di almeno 20 metri, mediante il taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva, nelle aree libere ed in quelle boscate.

r. È vietato gettare dai finestrini delle automobili mozziconi di sigaretta lungo le strade confinanti con aree boscate, all'interno delle stesse o in aree comunque ricoperte da vegetazione erbacea ed arbustiva. Durante il periodo di massima pericolosità, è vietata l'organizzazione di qualsiasi manifestazione lungo le strade che attraversano i boschi.

s. È demandata alla competenza del Sindaco l'emanazione di specifiche ordinanze, preordinate all'osservanza dell'articolo 182, comma 6 bis, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in

cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione del divieto sarà punita a norma dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

t. Chiunque avvisti un incendio, che interessi o minacci un'area boscata, è tenuto a dare l'allarme al numero verde della Regione Campania 800449911 o a quello della sua sede territorialmente più vicina, al numero 115 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al numero 112 o 1515 dei Carabinieri Forestali, all'Ente delegato competente per territorio, oppure agli altri organi di polizia.

## 10- Divieti

a. È severamente vietato:

   i. il transito con qualsiasi automezzo sulle piste d'esbosco, sulle strade di servizio forestale e nell'interno di zone boscate e su qualunque altro percorso se non preventivamente autorizzato;

   ii. praticare motocross;

   iii. il parcheggio in aree erbose;

   iv. lavare in prossimità di laghi, nell'alveo e in adiacenza di fiumi e di ogni altro corso d'acqua automobili e altri mezzi di trasporto;

   v. fare il bucato attraverso l'uso di saponi, detersivi ed altro;

   vi. la raccolta di fogliame, di terriccio, di rarità botaniche, di semi e di muschio;

   vii. il danneggiamento di alberi, arbusti e fiori;

   viii. nell'interno dei boschi o a meno di metri 100 da essi, l'impianto di fornaci, depositi e/o fabbriche di qualsiasi genere, che possano innescare incendio ed esplosioni.

b. Sono altresì vietate le seguenti attività:

   i. far brillare mine;

   ii. usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;

   iii. usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace;

   iv. compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio.

## 11- Autorizzazione installazione tende e roulotte

a. È consentita l'installazione, previa autorizzazione scritta del Sindaco, di tende e roulotte nei posti fissi individuati dall'Amministrazione comunale.

b. Ogni violazione alla presente disposizione comporta la confisca del prodotto, il ripristino dei luoghi e verranno applicate le disposizioni degli artt. 624 e 626 del Codice Penale, delle leggi Forestali e di Polizia Forestale.

## 12- Divieto di scarico e deposito

a. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione in materia, è vietato lo scarico ed il deposito, anche temporaneo, di rifiuti e detriti lungo e dentro i corsi d'acqua nei boschi, pascoli e prati, lungo le strade e in ogni altro luogo pubblico, salvo i luoghi allo scopo designati con apposito cartello indicatore del Comune.

**13- Divieto di abbandono (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 192)**

a. È vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo.

b. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

**14- Misure di conservazione della rete Natura 2000 della Regione Campania della ZSC IT8040010 "Monte Cervialto - Montagnone di Nusco" e della ZPS IT8040021 "Monte Monti Picentini", integrati con gli obblighi e divieti stabiliti dai Piani di Gestione approvati con la D.G.R. 617/2024, pertinenti con il presente Regolamento e contemplati nella Valutazione d'Incidenza approvata.**

a. Le misure di conservazione generali o sito specifiche:

   i. si aggiungono alle disposizioni nazionali, regionali e locali e, se più restrittive, prevalgono sulle stesse;

   ii. per le misure di tutela delle specie faunistiche e vegetali si rimanda a quanto disposto dal D.P.R. n. 357/1997 agli artt. 8, 9, 10 e 11;

b. in tutti i SIC della Regione Campania sono vigenti, tra le altre, le seguenti misure minime di conservazione indicate nel Decreto MATTM del 17/10/2007 riguardanti i beni silvo-pastorali, di seguito elencate:

   i. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati;

   ii. divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi;

   iii. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;

c. per le aree ricadenti nel perimetro della Rete Natura 2000, il Regolamento comunale degli usi civici, da adottare dopo la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione), deve tener conto delle misure di conservazione generali e sito specifiche e di quelle indicate dai piani di gestione dei SIC;

d. nel SIC/ZSC IT8040010 "Monte Cervialto - Montagnone di Nusco" è fatto divieto di svolgere gare sportive a motore al di fuori delle strade asfaltate;

e. in tutto il territorio del SIC/ZSC IT8040010 "Monte Cervialto - Montagnone di Nusco", per i beni silvo-pastorali oggetto del P.G.F., si applicano, tra gli altri, i seguenti obblighi e divieti generali per i diversi habitat, di cui alla tabella allegata (Allegato A):

*f. Nel territorio del SIC ricadente nel Parco Regionale dei Monti Picentini sono in vigore le "Norme Generali di Salvaguardia" di cui alla Delibera di Giunta Regionale della Campania N. 1539 del 24 aprile 2003.*

*g. Inoltre, in tutto il territorio della ZSC si applicano i seguenti obblighi e divieti:*

***i. è fatto divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti;***

*ii. è fatto divieto di accesso con veicoli motorizzati al di fuori dei tracciati carrabili, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di emergenza, di gestione, vigilanza e ricerca per attività autorizzate o svolte per conto del soggetto gestore, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio, dei proprietari dei fondi privati per l'accesso agli stessi, degli aventi diritto in quanto titolari di attività autorizzate dal soggetto gestore e/o impiegati in attività dei fondi privati e pubblici (6210, 6210p, 6220);*

*iii. è fatto divieto di alterare, distruggere, calpestare, prelevare e danneggiare anche parzialmente le piante per una fascia di rispetto di 200 metri dall'ingresso delle grotte naturali (8310);*

*iv. negli habitat 6210, 6210pf, 9210, 9220, è fatto divieto di apertura di nuove piste da sci e impianti di risalita ad eccezione delle piste da sci di fondo (6210, 6210p, 9210, 9220);*

***v. è fatto divieto di utilizzo delle pareti rocciose per attività sportive e turistico-ricreative;***

***vi. è fatto divieto di accesso e di sfruttamento turistico delle grotte;***

*vii. è fatto divieto nelle grotte naturali di asportazione, danneggiamento e distruzione anche parziale di concrezioni, animali e piante vive o morte reperti fossili, antropologici, archeologici, paleontologici, ad eccezione delle attività svolte a fini di ricerca scientifica, autorizzate dal soggetto gestore (8310);*

*viii. negli habitat 6210, 6210pf, 6220, è fatto divieto di coltivazione, bruciatura, irrigazione, ed uso di prodotti fitosanitari, ammendanti, diserbanti, concimi chimici (6210, 6210pf, 6220);*

*ix. nell'habitat 9260, è fatto divieto di eradicazione di individui arborei adulti o senescenti e/o ceppaie vive o morte salvo che negli interventi di lotta e/o eradicazione di specie alloctone invasive (9260);*

*x. negli habitat 6210, 6210pf, 6220, è fatto divieto di forestazione (6210, 6210pf, 6220);*

*xi. è fatto divieto di ingresso nelle grotte non ancora sfruttate a fini turistici; il soggetto gestore può autorizzare l'accesso per scopo esplorativo, di ricerca e di formazione (8310, chirotteri);*

*xii. negli habitat 6210, 6210pf 6220) è fatto divieto di installazione di nuovi impianti fotovoltaici montati sul suolo (6210, 6210pf, 6220);*

*xiii. negli habitat 6210, 6210pf, 6220, è fatto divieto di miglioramento del pascolo attraverso l'uso di specie foraggere a scopo produttivo (6210, 6210pf, 6220);*

*xiv. negli habitat 6210, 6210pf, 6220, è fatto divieto di modifica della destinazione d'uso (6210, 6210pf, 6220);*

*xv. è fatto divieto di ostruzione e/o occlusione delle cavità e grotte naturali (8310);*

*xvi. negli habitat 6210, 6210pf, è fatto divieto di pascolo di equini (6210, 6210pf);*

***xvii. è fatto divieto di pascolo per ridurre la predazione delle plantule delle specie arboree ed arbustive negli habitat 9210, dal divieto sono esclusi i cedui e le faggete coetanee;***

*xviii. è fatto divieto di pulizia dei fontanili al di fuori del periodo compreso tra il 1 agosto e il 30 settembre (Triturus carnifex, Bombina pachypus);*

*xix. negli habitat 6210pf, 6220, è fatto divieto di raccolta e di danneggiamento di tutte le specie vegetali caratteristiche di questo habitat con particolare riferimento a tutte le specie appartenenti alla famiglia delle Orchidacee (6210pf, 6220) e riportate in allegati 2 e 3;*

*xx. è fatto divieto sulle pareti rocciose di raccolta e di danneggiamento di tutte le specie vegetali riportate in allegato 5 (8210);*

*xxi. è fatto divieto di realizzazione di interventi atti allo sfruttamento turistico o per altro scopo delle grotte non ancora sfruttate a fini turistici (passerelle, impianti di illuminazione, etc); il divieto vale anche per i rami ancora non sfruttati all'interno di grotte già utilizzate a questo scopo (8310, Chirotteri);*

*xxii. negli habitat 6210, 6210pf, 6220, è fatto divieto di realizzazione di strutture permanenti per il ricovero degli animali ad eccezione dei ricoveri per la difesa dalla predazione del Lupo e delle piccole strutture permanenti per la lavorazione del latte e la vendita diretta dei prodotti agricoli autorizzate dal soggetto gestore (6210, 6210pf, 6220);*

*xxiii. negli habitat 9210, 9220, 9260, è fatto obbligo di conversione ad alto fusto dei cedui invecchiati (età media pari almeno al doppio del turno di taglio) di proprietà pubblica, fatte salve esigenze di difesa idrogeologica e le condizioni stazionarie (9210, 9220, 9260);*

*xxiv. é vietata la rimozione dei fontanili e la loro ristrutturazione in modalità diverse da quelle indicate dal piano di gestione; nelle more di redazione del Piano di Gestione sono consentiti solo interventi che prevedano l'utilizzo di muri in pietra previo Valutazione di Incidenza (Triturus carnifex, Bombina pachypus);*

*xxv. in caso di abbattimento di individui arborei nei pressi di esemplari di* Taxus baccata, Abies alba *o di individui con diametro altezza petto di 30 cm appartenenti a specie diverse da* Fagus sylvatica*, è fatto obbligo di procedere attraverso il diradamento delle branche laterali e depezzatura del fusto principale in maniera da ridurre o eliminare del tutto il rischio di danneggiamento dovuto alla caduta (9210, 9220);*

*xxvi. in caso di pulizia di fontanili è fatto obbligo di intervenire esclusivamente con strumenti a mano e lasciando la vegetazione rimossa nei pressi del fontanile (Triturus carnifex, Bombina pachypus);*

*xxvii. per il bestiame oggetto di monticazione e/o transumanza è fatto divieto di effettuare i trattamenti antiparassitari meno di 20 giorni prima della data di movimentazione verso le zone montane 6210, 6210pf, 6220);*

*xxviii. nell'habitat 9210, è fatto divieto di taglio, danneggiamento ed estirpazione degli esemplari di* Taxus baccata, Ilex aquifolium, Abies alba *(9210, 9220);*

*xxix. negli interventi di taglio boschivo, qualora sia necessario l'impiego di mezzi meccanici (forwarder, trattori, ecc.), è fatto obbligo dell'uso di mezzi a basso impatto dotati di pneumatici a sezione larga, bassa pressione e profilo inciso (9210, 9220).*

## I. Legnatico

### 1- Raccolta della legna

a. L'uso civico del legnatico, in generale, si intende esteso a quella parte del territorio demaniale del Comune gravato da usi civici, assegnati alla "categoria di cui alla lettera a)" dai decreti già richiamati, in virtù dell'art. 11 della Legge n. 1766/1927.

b. La raccolta della legna secca e del morto giacente a terra ritraibile dalle ramaglie, dal frascame, dai residui dei tagli e dalla chioma degli alberi abbattuti da intemperie ed idonea solo a legna, è libera a tutti i cittadini naturali aventi diritto di uso civico, nei limiti dei bisogni delle rispettive famiglie e nei terreni privi di assegnazione.

c. S'intende per morto il legname giacente a terra privo di qualsiasi legame con la ceppaia e le radici.

d. L'utilizzo della chioma di alberi abbattuti da intemperie e la raccolta di qualsiasi altro legname giacente a terra ma verde nonché dei tronchi degli alberi morti, deve essere autorizzata dall'Amministrazione comunale previo accertamento e marchiatura dell'ente.

e. È vietato lo sradicamento di ceppaie, anche se sono secche e marcite, e l'utilizzo di alberi e legname abbattuti dolosamente o cercinati anche quando tale materiale fosse secco o addirittura in fase di decomposizione, fatta eccezione per piccoli quantitativi autorizzati dall'Amministrazione.

f. Il legname prelevato sulla base delle autorizzazioni previste dalle presenti disposizioni, andrà quantificato a cura del comando di polizia municipale del Comune o da altro personale appositamente individuato dall'Amministrazione comunale.

g. È vietato il commercio, nonché l'esportazione fuori dal Comune della legna raccolta ed ottenuta sulla base del diritto di uso civico.

### 2- Deroga nella raccolta della legna

a. In deroga al precedente punto II-1, l'Amministrazione comunale può autorizzare i cittadini di cui al punto I-4, che non abbiano un reddito sufficiente al sostentamento delle proprie famiglie e prive di qualsiasi lavoro o attività individuale, a raccogliere legna in misura maggiore del bisogno e a venderla ai cittadini del Comune.

b. Nel concedere le autorizzazioni previste dal presente punto l'Amministrazione stabilisce anche la quantità massima e le modalità del prelievo.

### 3- Legna da lavoro

a. Ai cittadini aventi diritto di legnatico può autorizzarsi gratuitamente, nei limiti degli effettivi bisogni e previo parere della Struttura Regionale Territoriale competente in ambito di politiche forestali, la concessione di legname per attrezzi agricoli artigianali nonché il legname occorrente alla costruzione di piccole capanne e alla chiusura di mandrie ad allevatori.

### 4- Norma di rinvio specifica per le piante di castagno

a. Per il taglio delle piante di castagno e la trasformazione in castagneti da frutto si applicano le disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 3/2017 e successive Norme e Regolamenti.

### 5- 5 - Misure di conservazione sito specifiche del SIC/ZSC IT8040010 "Monte Cervialto - Montagnone di Nusco"

a. **Le misure di conservazione pertinenti, integrate con quelle stabilite dai Piani di Gestione approvati con la D.G.R. 617/2024 e contemplati nella Valutazione d'Incidenza approvata, pertinenti con il presente Regolamento sono**:

   i. ***è fatto divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti;***

   ii. *è fatto divieto di accesso con veicoli motorizzati al di fuori dei tracciati carrabili, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di emergenza, di gestione, vigilanza e ricerca per attività autorizzate o svolte per conto del soggetto gestore, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio, dei proprietari dei fondi privati per l'accesso agli stessi, degli aventi diritto in quanto titolari di attività autorizzate dal soggetto gestore e/o impiegati in attività dei fondi privati e pubblici (6210, 6210pf, 6220);*

   iii. *è fatto divieto di alterare, distruggere, calpestare, prelevare e danneggiare anche parzialmente le piante per una fascia di rispetto di 200 metri dall'ingresso delle grotte naturali (8310);*

   iv. *nell'habitat 9260, è fatto divieto di eradicazione di individui arborei adulti o senescenti e/o ceppaie vive o morte salvo che negli interventi di lotta e/o eradicazione di specie alloctone invasive (9260);*

   v. *negli habitat 6210pf, 6220, è fatto divieto di raccolta e di danneggiamento di tutte le specie vegetali caratteristiche di questo habitat con particolare riferimento a tutte le specie appartenenti alla famiglia delle Orchidacee (6210pf, 6220) e riportate in allegati 2 e 3;*

## II. Castagnatico

### 6- Titolarità del diritto di raccolta

a. All'esercizio della raccolta delle castagne nei boschi di castagno destinati alla produzione legnosa sul territorio del Comune gravato da diritto di uso civico assegnato alla "categoria di cui alla lettera a)" hanno diritto i cittadini così come individuati nel precedente punto 4.

b. Ogni altra persona diversa da quella di cui alla precedente lettera "a", che intenda procedere alla raccolta delle castagne deve chiedere all'Amministrazione comunale il rilascio di un'autorizzazione in cui siano indicati: il soggetto abilitato alla raccolta, la data di raccolta, la zona o le zone di raccolta ed i quantitativi ammessi.

## III. Pascolo

### 7- Uso civico del pascolo

a. L'uso civico del pascolo è disciplinato dal Regolamento del pascolo, redatto ed approvato ai sensi e per gli effetti del R.D. n. 3267/1923, della L. R. n. 11/96 e delle disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 3/2017.

b. Per le misure di conservazione generali o sito specifiche si rimanda all'allegato Regolamento del pascolo.

## IV. Uso delle acque per abbeverare animali

### 8- Titolarità del diritto

a. All'abbeveraggio del bestiame sul territorio del Comune gravato da diritto di uso civico assegnato alla "categoria di cui alla lettera a)" hanno diritto:

   i. i cittadini del Comune;

   ii. coloro che, fatte salve le relative posizioni, sono equiparati ai cittadini del Comune, sono in regola dal punto di vista tecnico-fiscale e con il pagamento dei canoni pregressi ed attuali di fida pascolo, e risultano assegnatari di aree pascolabili (artt. 100, 126 e 127 del Regolamento regionale n. 3/2017) gravate da uso civico precedentemente, per un periodo non inferiore a due anni, all'entrata in vigore del regolamento degli usi civici di cui al precedente punto I-4-lettera b).

### 9- Misure di conservazione sito specifiche del SIC/ZSC IT8040010 "Monte Cervialto - Montagnone di Nusco"

a. **Le misure di conservazione pertinenti, integrate con quelle stabilite dai Piani di Gestione approvati con la D.G.R. 617/2024 e contemplati nella Valutazione d'Incidenza approvata, pertinenti con il presente Regolamento sono**:

   *i. è fatto divieto di pulizia dei fontanili al di fuori del periodo compreso tra il 1 agosto e il 30 settembre (Triturus carnifex, Bombina pachypus);*

   *ii. è vietata la rimozione dei fontanili e la loro ristrutturazione in modalità diverse da quelle indicate dal piano di gestione; nelle more di redazione del Piano di Gestione sono consentiti solo interventi che prevedano l'utilizzo di muri in pietra previo Valutazione di Incidenza (Triturus carnifex, Bombina pachypus);*

   *iii. in caso di pulizia di fontanili è fatto obbligo di intervenire esclusivamente con strumenti a mano e lasciando la vegetazione rimossa nei pressi del fontanile* (*Triturus carnifex, Bombina pachypus).*

## V. Raccolta dei prodotti secondari spontanei

### 10- Disposizioni

a. Il Comune, in accordo con le indicazioni contenute nel capitolo n. 15 rubricato *"Norme per la raccolta dei prodotti secondari"* (redatto ai sensi dell'art. 105 del Regolamento regionale n. 3/2017) del presente Piano di Gestione Forestale, con apposito regolamento di cui al precedente punto I-4, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge quadro 6/12/1991, n. 394, nonché dalle norme dettate dalle Leggi Regionali 1/9/1993, n. 33, 25/11/1994, n. 40, 20/6/2006, n. 13, 24/7/2007, n. 8, e del Regolamento regionale n. 3/2017, disciplina sul proprio territorio in uso civico assegnato alla *"categoria di cui alla lettera a)"* la raccolta dei prodotti secondari allo scopo di salvaguardare l'ambiente naturale e per tutelare gli interessi della popolazione locale.

b. Restano salve le discipline dettate dalla legislazione della Regione Campania in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei spontanei, purché compatibili con le norme di cui al precedente punto, a fini di tutela della conservazione della natura.

c. Per le misure di conservazione generali o sito specifiche si rimanda al capitolo *"Norme per la raccolta dei prodotti secondari"*.

## Allegato A: Descrizione degli habitat

| Codice Habitat | Tipo di habitat |
|---|---|
| 6210 | Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) |
| 6210pf | Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (* stupenda fioritura di orchidee) |
| 6220 | * Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea* |
| 6510 | Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*) |
| 8210 | Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica |
| 8310 | Grotte non ancora sfruttate a livello turistico |
| 9210 | * Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex* |
| 9220 | * Faggeti degli Appennini con *Abies alba* e faggeti con *Abies nebrodensis* |
| 9260 | Foreste di *Castanea sativa* |

# Cap. 15 - Norme per la raccolta dei prodotti secondari (Articolo 105 del Regolamento regionale n. 3/2017)

## I. Generalità

### 1- Classificazione dei prodotti secondari

d. Sono considerati prodotti secondari le seguenti tipologie di prodotti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | alloro | 13 | mirtilli (bacche) |
| 2 | asparagi selvatici | 14 | mirto |
| 3 | campioni di roccia e fossili. | 15 | more di rovo |
| 4 | cardi | 16 | muschi |
| 5 | corniolo (bacche) | 17 | origano |
| 6 | erica | 18 | piante da fiore (bulbose e non) e parti di esse |
| 7 | felci | 19 | pungitopo |
| 8 | fragole | 20 | rosmarino |
| 9 | funghi epigei, commestibili o meno | 21 | strame |
| 10 | funghi ipogei (tartufi) | 22 | timo |
| 11 | ginepro (galbulo) | 23 | vischio |
| 12 | lamponi | 24 | vitalbe (cime) |

### 2- Disciplina della raccolta – autorizzazioni ([4])

a. Nel territorio demaniale del Comune l'estrazione e la raccolta dei prodotti di cui al precedente punto 1, può essere effettuato liberamente, tutti i giorni della settimana.

b. Ogni altra persona non residente che intenda procedere alla raccolta dei prodotti del sottobosco deve chiedere all'Amministrazione comunale il rilascio di un'autorizzazione in cui

[4] Per i beni silvo-pastorali ricadenti nel perimetro delle Aree protette (parchi e riserve) devono essere rispettate le disposizioni di cui ai Piani ed ai Regolamenti ivi vigenti

siano indicati: il soggetto abilitato alla raccolta, la data di raccolta, la zona o le zone di raccolta, gli strumenti utilizzati per la raccolta, i quantitativi ammessi. Dette disposizioni non si applicano alla ricerca e raccolta di funghi e tartufi in quanto prodotti del sottobosco soggetti a specifica normativa nazionale e regionale sempre che non rientrino in aree demaniali soggette a uso civico regolamentato e, per i soli tartufi, siano riconosciute quali tartufaie naturali o controllate ai sensi della normativa suddetta.

c. La Giunta Comunale può fissare il pagamento di una determinata somma di danaro, a fronte del rilascio della scheda di autorizzazione di cui al comma precedente, da destinarsi a finanziare azioni di salvaguardia e conservazione della natura e delle suddette specie protette. Il limite massimo di raccolta è fissato dal successivo comma.

d. Le quantità giornaliere di prodotti del sottobosco che è possibile raccogliere, previo rilascio della scheda di autorizzazione di cui alla precedente lettera "c", sono le seguenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| alloro | n. 25 rami | mirto | Kg 0,3 |
| asparagi selvatici | Kg 0,75 | more di rovo | Kg 0,5 |
| cardi | Kg 0,25 | muschi | Kg 0,2 |
| corniolo (bacche) | Kg 0,75 | origano | nr. 50 aste floreali |
| erica | nr. 50 rami | pungitopo | nr. 25 rami |
| fragole | Kg 0,3 | rosmarino | nr. 25 rami |
| funghi epigei, commestibili o meno | Kg 3,0 | strame e terriccio | articolo 134, Regolamento regionale n. 3/2017 |
| funghi ipogei (tartufi) | Kg 2,0 | timo | Kg 0,2 |
| ginepro (galbulo) | Kg 0,5 | vischio | nr. 1 ramo fruttifero |
| lamponi | Kg 0,5 | vitalbe (cime) | Kg 0,25 |
| mirtilli (bacche) | Kg 0,75 | | |

e. Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un unico cespo di funghi concresciuti, detto limite può essere superato.

## 3 - Prodotti del sottobosco - Condizioni di raccolta – Divieti

a. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del territorio demaniale è necessario praticare la raccolta dei prodotti del sottobosco e delle piante officinali ed aromatiche nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.

b. È vietata la raccolta di esemplari appartenenti alla flora spontanea, in qualsiasi stadio di vegetazione, e nella loro integrità (radici, fusti fiori, frutti, e semi).

c. La raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche, con i limiti e le modalità previste dalle presenti indicazioni, è comunque vietata durante la notte, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

d. È vietato estirpare, o comunque, danneggiare i prodotti del sottobosco in genere. È vietata, altresì, la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nelle zone rimboschite o soggette ad interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine) per la durata di cinque anni dalla fine dei lavori.

e. Nel caso particolare dei funghi e tartufi (Punti II e III), durante le operazioni di ricerca e di raccolta dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a non danneggiare i miceli fungini, lo strato umifero del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie fungine e per non compromettere i favorevoli rapporti di simbiosi mutualistiche che si instaurano tra gli organi radicali delle piante forestali ed i funghi.

f. Per limitare i danni derivanti da una continua e progressiva degradazione delle aree boscate demaniali il Comune può, con apposita ordinanza sindacale, stabilire opportune rotazioni per la raccolta dei prodotti considerati nelle presenti indicazioni.

g. Il Sindaco, con propria ordinanza potrà vietarne temporaneamente (fermo biologico) la raccolta in quelle zone boscate o nei prati e pascoli permanenti la cui produttività risulta compromessa da avverse condizioni dell'andamento stagionale, biologiche o fisico-chimiche, sulla base di apposite segnalazioni di cittadini, utenti o Autorità preposte ad attività di controllo territoriale.

## II. Funghi Epigei

### 3- Funghi - Condizioni di raccolta – Obblighi e divieti

a. La raccolta dei funghi epigei è regolata dalla L. R. del 24 luglio 2007, n. 8.

b. Nel caso particolare dei funghi, nell'ambito del territorio demaniale del Comune la raccolta dei funghi spontanei, commestibili e non, è ammessa in quantità non superiore a quelle stabilite dall'articolo 6 della L. R. n. 8/2007 (3 chilogrammi al giorno a persona elevabili a 10 chilogrammi per i cercatori professionali).

c. In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni di produzione dei funghi, l'Amministrazione Comunale, in accordo con le strutture regionali, può disporre che la norma di cui al precedente comma non si applichi in determinati ambiti del territorio comunale (fermo biologico).

d. I funghi, durante la ricerca e la raccolta (quantitativo massimo per raccolta 3 chilogrammi per persona) dovranno essere contenuti in cestelli di vimini o altro, tali da consentire, durante la ricerca stessa, la caduta sul suolo delle spore, per facilitarne la diffusione delle spore e la riproduzione;

e. La raccolta dei funghi epigei è consentita solo per le specie commestibili.

f. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati rigidi;

g. Durante la raccolta dei funghi, è fatto divieto assoluto:

   i. strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo; essi devono essere separati dal micelio mediante leggera torsione o taglio alla base del gambo;

   ii. utilizzare falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi che possano provocare il danneggiamento dello strato umifero del suolo;

   iii. raccogliere o danneggiare i funghi non ritenuti commestibili;

   iv. porre i funghi raccolti in sacchetti di plastica o recipienti ermeticamente chiusi, i quali impediscono la disseminazione;

   v. raccogliere o distruggere funghi commestibili in avanzato stato di maturazione perché inutili per la propagazione della specie fungina;

   vi. calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta lo stato umifero o la cotica erbosa del terreno.

h. È vietato, effettuare la raccolta dei funghi un'ora dopo il tramonto e un'ora prima dell'alba.

i. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui alla L. R. n. 8/2007.

### 4- Segnaletica

a. II Comune provvederà all'apposizione, nei punti principali di accesso alle zone demaniali, di tabelle indicanti le norme di raccolta previste per le suddette aree.

### 5- Autorizzazioni speciali

b. Come previsto dalla L. R. n. 8/2007, articolo 4, comma 12, le autorità competenti possono autorizzare la raccolta di funghi per scopi didattici o scientifici.

## III. - Funghi ipogei (tartufi)

### 6- Disciplina di riferimento

a. L'esercizio per la raccolta dei tartufi si esercita in conformità alla Legge del 16 dicembre 1985, n. 752, alla L. R. del 20 maggio 2006, n. 13, e ss.mm.ii., al Regolamento regionale di attuazione del 24 luglio 2007, n. 3, ed a quanto riportato nel Piano di Assestamento Forestale del Comune nonché nei limiti e modalità previste dalle presenti indicazioni.

### 7- Accorgimenti

a. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agrosilvopastorale del territorio demaniale del Comune è necessario praticare la raccolta dei tartufi nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.

b. Durante le operazioni di ricerca e raccolta vengono adottati gli accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie.

### 8- Modalità di ricerca e raccolta

a. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.

b. La ricerca dei tartufi è effettuata solo con l'ausilio del cane a ciò addestrato. Ogni raccoglitore, detto anche cercatore, non può utilizzare contemporaneamente più di due cani e un cucciolo di età non superiore a dieci mesi.

c. Per la raccolta dei tartufi è impiegato esclusivamente il vanghetto.

d. Il prelievo del tartufo è effettuato solo dopo la localizzazione del tartufo da parte del cane ed è limitato al punto in cui il cane lo ha iniziato.

e. La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di 2 chilogrammi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 3, comma 5, della L. R. n. 13/2006 e dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. R. 27 giugno 2011, n. 9.

## 9- Calendario e orario di raccolta

a. Il calendario di raccolta dei tartufi5, di cui all'articolo 7, comma 2, della L. R. n. 13/2006, è il seguente:

   i. *Tuber mesentericum Vitt.* (Tartufo nero ordinario o Tartufo nero di Bagnoli Irpino): dal 1° settembre al 15 aprile;

   ii. *Tuber magnatum Pico* (Tartufo bianco pregiato): dal 1° ottobre al 31 dicembre;

   iii. *Tuber aestivum Vitt.* (Tartufo estivo o scorzone): dal 1° maggio al 30 novembre;

   iv. *Tuber uncinatum Chatin* (Tartufo uncinato): dal 1° ottobre al 31 dicembre;

   v. *Tuber borchii Vitt. o T. albidum Pico* (Tartufo bianchetto o marzuolo): dal 1° gennaio al 30 aprile;

   vi. *Tuber melanosporum Vitt.* (Tartufo nero pregiato o Tartufo nero di Norcia): dal 15 novembre al 15 marzo;

   vii. *Tuber macrosporum Vitt.* (Tartufo nero liscio): dal 1° settembre al 31 dicembre;

   viii. *Tuber brumale Vitt.* (Tartufo nero d'inverno o Trifola nera): dal 1° gennaio al 15 marzo;

   ix. *Tuber brumale var. moschatum De Ferry* (Tartufo moscato): dal 1° novembre al 15 marzo.

b. La ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto ed è limitata ai periodi dell'anno stabiliti dal calendario di raccolta.

## 10- Obblighi

a. Le buche aperte nel terreno dai cani o da appositi attrezzi per la ricerca dovranno essere subito riempite con la stessa terra rimossa.

b. Possesso, da parte dei cercatori, del tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi.

## 11- Divieti

a. È vietata la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine) per la durata di 5 anni dalla fine dei lavori.

b. Sono in ogni caso vietati:

   i. la ricerca e la raccolta in periodi ed in orari difformi da quelli previsti dal precedente articolo 4;

   ii. la ricerca e la raccolta senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o senza gli attrezzi consentiti di al precedente articolo 9;

   iii. la lavorazione andante (zappatura) delle tartufaie;

   iv. la ricerca e la raccolta senza il tesserino di cui al precedente punto 11;

   v. la raccolta dei tartufi immaturi od avariati;

   vi. l'apertura di buche nel terreno in soprannumero e la non riempitura delle buche aperte nella raccolta;

   vii. il commercio di tartufi freschi 15 giorni dopo il termine dal periodo di raccolta;

   viii. la raccolta, il consumo ed il commercio da freschi di tartufi appartenenti a specie diverse da quelle previste dall'articolo 2 della Legge n.752/85 e ss.mm.ii.;

   ix. la vendita abusiva o comunque senza documento di provenienza ai mercati pubblici di tartufi freschi e conservati.

## IV. Origano

### 12- Raccolta

a. Nell'ambito del territorio demaniale del Comune la raccolta dell'origano è consentita in quantità non superiore a 50 aste fiorali al giorno per persona prevista di idonea tessera di autorizzazione.

### 13- Accorgimenti per la conservazione della specie

a. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agrosilvopastorale del territorio demaniale del Comune è necessario praticare la raccolta della pianta aromatica nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.

b. Nel caso particolare dell'origano, durante le operazioni di raccolta vengono adottati i seguenti accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie.

### 14- Limite di raccolta

La raccolta dell'origano dovrà essere effettuata con i limiti e le modalità previste dalle presenti indicazioni.

### 15- Periodo di raccolta

La raccolta dell'origano deve avvenire a partire dalla data del 1° agosto o comunque quando la pianta è in uno stato maturo.

### 16- Divieti

a. È vietato:

   i. estirpare l'origano dall'apparato radicale;

   ii. la raccolta dell'origano a partire dalle ore 21.00 fino alle ore 9.00;

   iii. danneggiare o distruggere le piante di origano sul terreno e usare nella raccolta, falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;

   iv. il commercio dell'origano;

b. al fine della conservazione e della propagazione della specie, a raccolta nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine).

c. L'origano, durante la raccolta non dovrà essere assolutamente portato in contenitori di qualunque specie e tipo, in modo da consentire, durante la raccolta stessa, la caduta sul suolo dei semi, per facilitarne la diffusione e la riproduzione.

### 17- Deroghe

In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni di produzione dell'origano, l'Amministrazione Comunale, può disporre che le disposizioni di sopra non si applichino in determinati ambiti del territorio demaniale.

## V. Asparagi

### 18- Accorgimenti per la conservazione della specie

a. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del territorio demaniale del Comune è necessario praticare la raccolta della pianta aromatica nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.

b. Nel caso particolare degli asparagi, durante le operazioni dì raccolta vengono adottati i seguenti accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie.

### 19- Limite di raccolta

La raccolta degli asparagi deve essere effettuata con le modalità previste dalle presenti indicazioni.

### 20- Giorni di raccolta

Nell'ambito del territorio demaniale del Comune la raccolta degli asparagi è consentita in quantità non superiore a 0,75 Chilogrammi al giorno per persona prevista di idonea tessera di autorizzazione.

### 21- Inizio periodo di raccolta

La raccolta degli asparagi deve avvenire a partire dalla data del 1° aprile.

### 22- Modalità di raccolta

L'asparago va raccolto mediante spezzamento alla base dello stelo oppure con taglio con mezzi idonei.

### 23- Divieti

É vietato:

i. estirpare gli asparagi dall'apparato radicale (zampa);

ii. raccogliere gli asparagi a partire dalle ore 21,00 fino alle ore 9,00;

iii. raccogliere gli asparagi nei mesi di settembre, ottobre e novembre;

iv. danneggiare o distruggere le piante di asparagi sul terreno e usare nella raccolta, falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;

v. calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero del terreno;

vi. il commercio degli asparagi;

vii. per la conservazione e la propagazione della specie, raccogliere gli asparagi nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine);

viii. raccogliere gli asparagi nelle aree percorse dal fuoco per un anno.

### 24- Deroghe

In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni di produzione degli asparagi, l'Amministrazione Comunale, può disporre che le disposizioni di sopra non si applichino in determinati ambiti del territorio comunale.

## VI. Fragole

### 25- Accorgimenti per la conservazione della specie

a. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agrosilvopastorale del territorio demaniale del Comune è necessario praticare la raccolta delle fragole nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.

b. Durante le operazioni dì raccolta vengono adottati i seguenti accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo e gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie.

### 26- Limiti di raccolta

La raccolta delle fragole dovrà essere effettuata con i limiti e le modalità previste dalle presenti indicazioni.

### 27- Giorni di raccolta

Nell'ambito del territorio comunale, la raccolta delle fragole è consentita in quantità non superiore a 3 chilogrammi al giorno per persona provvista di idonea tessera di autorizzazione.

**28- Inizio periodo di raccolta**

La raccolta delle fragole deve avvenire a partire dalla data del 1° giugno.

**29- Modalità di raccolta**

La fragola va raccolta a mano con o senza le brattee facendo attenzione a non strappare il picciolo.

**30- 31 - Divieti**

a. È vietato:

   i. estirpare ed asportare le piantine;

   ii. danneggiare o distruggere le piantine;

   iii. calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero del terreno;

   iv. il commercio delle fragole;

   v. la raccolta delle fragole nelle aree percorse dal fuoco;

   vi. al fine della conservazione e della propagazione della specie, la raccolta delle fragole nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine).

**31- Deroghe**

In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni di produzione delle fragole, l'Amministrazione Comunale, può disporre che le disposizioni sopra enunciate non si applichino in determinati ambiti del territorio comunale.

# Cap. 16 - Regolamento del Pascolo (Articolo n. 18 della L. R. n. 11/96 e Articoli n. 106 e n. 129 del Regolamento regionale n. 3/2017)

## 1- Disciplina di riferimento

1. La disciplina del pascolo fa riferimento alla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, (Regolamento di esecuzione approvato con Regio decreto del 26 febbraio 1928, n. 332), alle L. R. del 17 marzo 1981, n. 11, alla L. R. 7 maggio 1996, n. 11, alla Delibera di Giunta Regionale 19/12/2017, n. 795, nonché soggiace all'osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale n. 3/2017 e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti in esso contenute ed a quanto prescritto dal Piano di Gestione Forestale.

## 2- Competenza territoriale

1. I soggetti di cui al successivo articolo 3, comma 1, nel rispetto delle Leggi nazionali e della Regione Campania, sono titolari esclusivi ed esercitano i diritti di uso civico sui terreni pascolivi in uso civico di cui all'articolo 11, comma1, lettera a), della legge 1766/1927 (di seguito indicata più semplicemente come "di categoria di cui alla lettera a)") che ne sono gravati così come individuati nel Decreto del Regio Commissario per la liquidazione degli Usi Civici in Napoli del 23/10/1935 di assegnazione a categoria.

2. I soggetti di cui al successivo articolo 3, comma 2, nel rispetto delle Leggi nazionali e della Regione Campania, esercitano il diritto pascolo in virtù di fida pascolo sui terreni pascolivi non gravati da diritti di uso civico.

## 3- Titolarità del diritto di Pascolo

1. All'esercizio del pascolo sul territorio del comune di Bagnoli Irpino, **gravato** da diritto di uso civico relativo alla "*categoria di cui alla lettera a)*", hanno diritto:

   a. i cittadini del Comune titolari di tale diritto;

   b. sono fatte salve le relative posizioni e sono equiparati ai cittadini del comune di Bagnoli Irpino, coloro che, in regola dal punto di vista tecnico-fiscale e con il pagamento dei canoni pregressi ed attuali di fida pascolo, risultano assegnatari di aree pascolabili (artt. 100, 126 e 127 del Regolamento regionale n. 3/2017) gravato da uso civico precedentemente, per un periodo non inferiore a due anni, all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. All'esercizio del pascolo sul territorio del comune di Bagnoli Irpino, **non gravato** da diritto di uso civico relativo alla "*categoria di cui alla lettera a)*", possono concorrere sia i cittadini del Comune che quelli di altri Comuni.

3. L'Amministrazione Comunale, tramite Delibera del Consiglio Comunale, può aumentare i canoni dei cittadini di altri Comuni che risultano essere assegnatari e/o occupatori di aree pascolabili gravate da uso civico e/o affitto, fino ad un massimo del 25% della tariffa base.

## 4- Esercizio del pascolo

1. L'estensione della superficie pascolabile del comune di Bagnoli Irpino è di complessivi ettari 3.513,15, così come di individuata nel Piano di Gestione Forestale del Comune, vigente per il decennio 2025/2034 e ripartita come di seguito:

| SUPERFICIE PASCOLABILE TOTALE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tipologia | | Superficie gravata da Uso civico Ettari | Superficie non gravata da Uso civico Ettari | Totale Ettari |
| Aree pascolive (articolo 126 del Regolamento regionale n. 3/2017) | Pascoli | 179,15 | 96,33 | 275,48 |
| | Altre aree pascolabili | 470,59 | 21,74 | 492,33 |
| Boschi pascolabili (articolo 126 del Regolamento regionale n. 3/2017) | Boschi pascolabili | 2.710,53 | 34,81 | 2.745,34 |
| **Totali** | | **3.360,27** | **152,88** | **3.513,15** |

2. L'esercizio del *pascolo permanente* s'intende esteso principalmente a quella parte del territorio comunale assegnata alla "*categoria di cui alla lettera a)*" degli Usi Civici dal richiamato Decreto Commissariale, in virtù dell'articolo 11 della Legge n. 1766/1927 e nel rispetto degli articoli 18 e 31 (comma 6) della L. R. 11/96.

3. L'esercizio del pascolo, tramite licenza, è soggetto all'osservanza delle disposizioni della L. R. n. 11/96, delle vigenti Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale del Regolamento regionale n. 3/2017 nonché del Piano di Gestione Forestale.

4. La fertilità, la produttività ed il ricoprimento delle aree a pascolo devono essere salvaguardate.

## 5- Divieto di pascolo e prescrizioni

1. Il pascolo è vietato:

   a. sulle aree eccezionalmente destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non siano da molto tempo incolte o non siano oggetto di validi progetti di produzione e sviluppo;

   b. sulle aree sdemanializzate o mutate di destinazione con Atto della Giunta Regionale;

   c. su tutte le aree attraversate in precedenza da incendi, ai sensi del Regolamento regionale n. 3/2017, per un periodo non inferiore ad un anno per le aree/terreni pascolivi (articolo 126) e per un periodo non inferiore a 10 anni per i boschi (articolo 127), salvo ulteriore divieto dell'autorità forestale;

   d. sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento per la durata indicata dall'autorità forestale;

   e. su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti stabiliti da leggi statali o regionali, salvo le nuove soluzioni tecnologiche di cui all'articolo 5 del presente regolamento, sempre che sia intervenuta apposita autorizzazione regionale ai sensi dell'articolo 12, della Legge 1766/1927, dell'articolo 41 del R. D. 332/1928, dell'articolo 10 della L. R. 11/96 nonché del Regolamento regionale n. 3/2017.

2. Il pascolo nei boschi è regolamentato come segue:

   a. il pascolo delle capre nei boschi è sempre vietato;

   b. nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di anni quattro dopo

il taglio e quello del bestiame bovino ed equino per il periodo di sei anni dopo il taglio;

c. nelle fustaie coetanee, il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di metri 1,50 e quello degli animali bovini ed equini prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di metri 3;

d. nelle fustaie laddove sono previsti tagli di preparazione e di sementazione;

e. nelle particelle forestali dove è previsto l'intervento di utilizzazione nel decennio di validità del P.G.F.;

f. nei cedui misti, come individuati dal Piano di Gestione Forestale laddove vi siano state ceduazioni nei sei anni precedenti;

g. nelle fustaie disetanee e nei cedui a sterzo il pascolo è vietato;

h. nei boschi adulti troppo radi e deperenti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione degli stessi;

i. nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali.

*j.* Il pascolo nei terreni pascolivi è regolamentato come segue*:*

k. il pascolo vagante o brado, cioè senza idoneo custode, può esercitarsi solo sui terreni privati, appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché opportunamente recitanti a mezzo di chiudende;

l. è vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;

m. i caprini vanno immessi al pascolo nei siti indicati ed autorizzati.

3. **Devono essere rispettate le seguenti Misure di conservazione della rete Natura 2000 della Regione Campania della ZSC IT8040010 "Monte Cervialto - Montagnone di Nusco" e della ZPS IT8040021 "Monte Monti Picentini" integrati con gli obblighi e divieti stabiliti dai Piani di Gestione approvati con la D.G.R. 617/2024, pertinenti con il presente Regolamento e contemplati nella Valutazione d'Incidenza approvata.**

   *a. Nel territorio del SIC ricadente nel Parco Regionale dei Monti Picentini sono in vigore le "Norme Generali di Salvaguardia" di cui alla Delibera di Giunta Regionale della Campania N. 1539 del 24 aprile 2003.*

   *b. Inoltre, in tutto il territorio del SIC/ZSC si applicano i seguenti obblighi e divieti:*

   ***I. è fatto divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti;***

   *II. è fatto divieto di accesso con veicoli motorizzati al di fuori dei tracciati carrabili, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di emergenza, di gestione, vigilanza e ricerca per attività autorizzate o svolte per conto del soggetto gestore, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio, dei proprietari dei fondi privati per l'accesso agli stessi, degli aventi diritto in quanto titolari di attività autorizzate dal soggetto gestore e/o impiegati in attività dei fondi privati e pubblici (6210, 6210p, 6220);*

   *III. è fatto divieto di alterare, distruggere, calpestare, prelevare e danneggiare anche parzialmente le piante per una fascia di rispetto di 200 metri dall'ingresso delle grotte naturali (8310);*

***IV. è fatto divieto di utilizzo delle pareti rocciose per attività sportive e turistico-ricreative;***

***V. è fatto divieto di accesso e di sfruttamento turistico delle grotte;***

*VI. è fatto divieto nelle grotte naturali di asportazione, danneggiamento e distruzione anche parziale di concrezioni, animali e piante vive o morte reperti fossili, antropologici, archeologici, paleontologici, ad eccezione delle attività svolte a fini di ricerca scientifica, autorizzate dal soggetto gestore (8310);*

*VII. negli habitat 6210, 6210pf, 6220, è fatto divieto di coltivazione, bruciatura, irrigazione, ed uso di prodotti fitosanitari, ammendanti, diserbanti, concimi chimici (6210, 6210pf, 6220);*

*VIII. nell'habitat 9260, è fatto divieto di eradicazione di individui arborei adulti o senescenti e/o ceppaie vive o morte salvo che negli interventi di lotta e/o eradicazione di specie alloctone invasive (9260);*

*IX. negli habitat 6210, 6210pf, 6220, è fatto divieto di miglioramento del pascolo attraverso l'uso di specie foraggere a scopo produttivo (6210, 6210pf, 6220);*

*X. è fatto divieto di ostruzione e/o occlusione delle cavità e grotte naturali (8310);*

*XI. negli habitat 6210, 6210pf, è fatto divieto di pascolo di equini (6210, 6210pf);*

***XII. è fatto divieto di pascolo per ridurre la predazione delle plantule delle specie arboree ed arbustive negli habitat 9210, dal divieto sono esclusi i cedui e le faggete coetanee;***

*XIII. è fatto divieto di pulizia dei fontanili al di fuori del periodo compreso tra il 1 agosto e il 30 settembre (Triturus carnifex, Bombina pachypus);*

*XIV. negli habitat 6210pf, 6220, è fatto divieto di raccolta e di danneggiamento di tutte le specie vegetali caratteristiche di questo habitat con particolare riferimento a tutte le specie appartenenti alla famiglia delle Orchidacee (6210pf, 6220) e riportate in allegati 2 e 3;*

*XV. è fatto divieto sulle pareti rocciose di raccolta e di danneggiamento di tutte le specie vegetali riportate in allegato 5 (8210);*

*XVI. negli habitat 6210, 6210pf, 6220, è fatto divieto di realizzazione di strutture permanenti per il ricovero degli animali ad eccezione dei ricoveri per la difesa dalla predazione del Lupo e delle piccole strutture permanenti per la lavorazione del latte e la vendita diretta dei prodotti agricoli autorizzate dal soggetto gestore (6210, 6210pf, 6220);*

*XVII. é vietata la rimozione dei fontanili e la loro ristrutturazione in modalità diverse da quelle indicate dal piano di gestione; nelle more di redazione del Piano di Gestione sono consentiti solo interventi che prevedano l'utilizzo di muri in pietra previo Valutazione di Incidenza (Triturus carnifex, Bombina pachypus);*

*XVIII. in caso di pulizia di fontanili è fatto obbligo di intervenire esclusivamente con strumenti a mano e lasciando la vegetazione rimossa nei pressi del fontanile (Triturus carnifex, Bombina pachypus);*

*XIX. per il bestiame oggetto di monticazione e/o transumanza è fatto divieto di effettuare i trattamenti antiparassitari meno di 20 giorni prima della data di movimentazione verso le zone montane 6210, 6210pf, 6220);*

*XX. nell'habitat 9210, è fatto divieto di taglio, danneggiamento ed estirpazione degli esemplari di Taxus baccata, Ilex aquifolium, Abies alba (9210, 9220);*

### 6- Licenza di pascolo e fida pascolo

1. È ammesso l'uso dei pascoli in rapporto precario di fida.
2. I cittadini aventi diritto sono tenuti a pagare al Comune una tassa di fida per il pascolo degli animali nei demani comunali.
3. La fida è pagata dagli aventi diritto prima dell'immissione al pascolo entro il 31 marzo pena la decadenza dal diritto del loro uso.
4. Il Comune si riserva il diritto di revocare l'uso dei pascoli entro il 30 aprile.
5. La fida è stabilita dall'Amministrazione Comunale nel rispetto dell'articolo 46 del R. D. 332/1928 e deve essere considerata a solo titolo di anticipo.
6. Agli aventi diritto verrà riconosciuta la "*licenza di pascolo*" condizionata al pagamento della fida, nel rispetto delle determinazioni dell'Amministrazione comunale.
7. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva a titolo doloso, per incendi di boschi o di cespugliati a chiunque appartenenti.
8. A fine annata agraria, sulla scorta delle spese di gestione necessarie per l'amministrazione e la sorveglianza delle aree destinate a pascolo, si effettuerà il conguaglio che sarà pagato dagli allevatori in rapporto ai capi posseduti.

### 7- Pascolo abusivo

1. Per il pascolo abusivo nei boschi si deve considerare il danno arrecato all'ambiente boschivo commisurandolo all'alimento consumato dal bestiame pascolante e calcolato in fieno normale equivalente al prezzo corrente del più prossimo mercato di consumo. La quantità dell'alimento è computata per ciascun giorno e sua frazione di pascolo abusivo, come segue:
   a. da Kg. 10 a Kg. 20 di fieno normale per ogni capo bovino o cavallino adulto;
   b. da Kg. 5 a Kg. 10 di fieno normale per ogni giovenca, vitello o puledro;
   c. da Kg. 1,5 a Kg. 2 di fieno normale per ogni capo ovino o caprino.

### 8- Tipologia capi di bestiame

2. In accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Gestione Forestale gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono esclusivamente:
   a. i bovini in genere;
   b. gli equini in genere, in ottemperanza alle disposizioni della D.G.R. 19 dicembre 2017, n. 795;
   c. gli ovini ed i caprini in genere. Questi ultimi esclusivamente sulle aree dove il pascolo è possibile senza che gli stessi arrechino danno al patrimonio silvo-pastorale dell'Ente. Il pascolo dei caprini in bosco è comunque vietato.

### 9- Fida altrui

1. È proibito agli aventi diritto immettere nei propri allevamenti animali appartenenti a proprietari diversi da quelli di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

2. I cittadini che fidassero falsamente sotto il proprio nome pagheranno, a titolo di penale, il quadruplo della fida stabilita dalla Giunta comunale, salvo sempre l'immediata espulsione degli animali stessi dal terreno demaniale pascolabile ed il divieto di fida propria per anni due.

**10- Custodia del bestiame**

3. È vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il pascolo, essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare, così come asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna non secca.

4. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva per incendi di boschi o cespugliati.

5. La custodia del bestiame deve essere affidata a persone di età superiore a 18 anni nella proporzione di almeno un custode ogni 50 capi di bestiame grosso (bovino/equino) o 100 capi di bestiame minuto.

**11- Prescrizioni per la fida**

1. I cittadini che intendono condurre al pascolo i propri animali nei terreni di uso civico destinati a pascolo devono:

   a. dichiarare in forma scritta, in anticipo, all'ufficio addetto dell'amministrazione comunale le specie ed il numero di animali;

   b. esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna con data non antecedente a tre mesi;

   c. assicurare che gli animali siano identificati in conformità alle vigenti norme sanitarie;

   d. aver pagato la fida stabilita di volta in volta dalla Giunta comunale oltre che per l'anno in corso;

   e. dichiarare di pagare l'eventuale conguaglio della fida prima dell'inizio dell'esercizio dell'anno successivo.

   f. essere in regola con quanto previsto dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 201, n. 136*", e successive modifiche ed integrazioni.

**12- Produttività dei pascoli**

1. Allo scopo di tutelare la produttività dei pascoli, in accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Gestione Forestale, vigente per il periodo 2025/2034, l'ingresso su territori pascolivi, gravati o meno dà diritto di uso civico, è autorizzato in conformità alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti di cui al Regolamento regionale n. 3/2017.

2. Tali termini potranno, eccezionalmente, essere modificati dall'amministrazione comunale secondo l'andamento stagionale e della configurazione dei terreni.

**13- Carico di bestiame - durata e periodo del pascolo**

1. In accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Gestione Forestale, vigente per il periodo 2025/2034, nelle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti di cui al Regolamento regionale n. 3/2017, il carico massimo di bestiame su terreni comunali pascolabili, espresso in UBA e distinto per specie, è il seguente:

| Tipologia di area pascolabile | Superficie (Ettari) | Carico massimo di bestiame (UBA)* | |
|---|---|---|---|
| | | UBA/Ettaro/anno | UBA totali/anno |
| Pascoli | 275,48 | 1,02 | 281,0 |
| Altre aree pascolabili | 492,33 | 0,54 | 265,8 |
| Boschi pascolabili | 2.745,34 | 0,28 | 768,7 |
| **TOTALE** | **3.513,15** | | **1.315,5** |

*(*) Coefficienti di conversione capo/UBA ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 come modificato ed integrato dal regolamento n. 2016/669 della Commissione del 28 aprile2016: tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni = 1 UBA; equini di oltre 6 mesi = 1 UBA; bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 UBA; bovini ed equini di età inferiore a 6 mesi = 0,4 UBA; ovi – caprini = 0,15 UBA.*

2. Il pascolo tra i 400 e gli 800 mt s.l.m. può esercitarsi dal 1° ottobre al 15 maggio. Al di sopra degli 800 mt s.l.m. fino ad un massimo di sei mesi all'anno (articolo 1, comma 100, L. R. n. 16/2014) ovvero nel periodo dal 1° ottobre al 15 maggio

3. Oltre la data prestabilita per la fida gli allevatori hanno l'obbligo di portare fuori dei terreni pascolivi interessati, gravati o meno da diritto di uso civico, tutti gli animali.

4. I terreni interessati dal pascolo, salva diversa disposizione, sono lasciati a riposare per il periodo invernale.

5. Il Sindaco con motivata ordinanza potrà anticipare o ritardare tali date qualora si verifichino eccezionali eventi atmosferici o per altri gravi motivi particolari.

### 14- Territori di pascolo

1. Nell'individuazione ed indicazione delle aree pascolabili dovranno essere precisate precisare le aree interessate dalle *Pratiche Locali Tradizionali* – P.L.T. - legate al pascolo, ai fini dell'accesso degli allevatori interessati al sostegno previsto dalla politica agricola comune (D.G.R. 8 maggio 2015, n. 242, e ss.mm.ii., articolo 100 del Regolamento regionale n. 3/2017).

2. Il proprietario del bestiame è tenuto far pascolare il proprio bestiame solamente sui demani ai quali la fida si riferisce.

3. Il demanio comunale interessato dalla pratica dell'esercizio del pascolo è così individuato:

| PARTICELLE PASCOLABILI E NUMERO U.B.A. AMMISSIBILI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESA | LOCALITA' | Particella forestale | Superficie totale Ha | Aree boscate | | | Pascoli e aree nude | | | UBA pascolabili totali |
| | | | | Superficie pascolabile Ha (*) | UBA/Ha | UBA pascolabili | Superficie Ha | UBA/Ha | UBA pascolabili | |
| A | Peta di Piscacca | **6** | 16,15 | 16,15 | 0,28 | 4,5 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 4,5 |
| A | Piscacca | **7** | 12,96 | 11,39 | 0,28 | 3,2 | 1,57 | 0,54 | 0,8 | 4,0 |
| A | Peta di Piscacca | **14** | 14,89 | 14,71 | 0,28 | 4,1 | 0,18 | 0,54 | 0,1 | 4,2 |
| A | Piscacca | **15** | 10,71 | 9,52 | 0,28 | 2,7 | 1,19 | 0,54 | 0,6 | 3,3 |

| PARTICELLE PASCOLABILI E NUMERO U.B.A. AMMISSIBILI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESA | LOCALITA' | Particella forestale | Superficie totale Ha | Aree boscate | | | Pascoli e aree nude | | | UBA pascolabili totali |
| | | | | Superficie pascolabile Ha (*) | UBA/Ha | UBA pascolabili | Superficie Ha | UBA/Ha | UBA pascolabili | |
| A | Peta di Piscacca | **6** | 16,15 | 16,15 | 0,28 | 4,5 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 4,5 |
| A | Piscacca | **7** | 12,96 | 11,39 | 0,28 | 3,2 | 1,57 | 0,54 | 0,8 | 4,0 |
| A | Peta di Piscacca | **14** | 14,89 | 14,71 | 0,28 | 4,1 | 0,18 | 0,54 | 0,1 | 4,2 |
| A | Piscacca | **15** | 10,71 | 9,52 | 0,28 | 2,7 | 1,19 | 0,54 | 0,6 | 3,3 |
| A | Valle del Pero | **60** | 7,22 | 7,22 | 0,28 | 2,0 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 2,0 |
| A | Valle Foce di Caposele | **79** | 13,63 | 13,51 | 0,28 | 3,8 | 0,12 | 0,54 | 0,1 | 3,8 |
| A | Valle del Pero | **81** | 12,26 | 11,94 | 0,28 | 3,3 | 0,32 | 0,54 | 0,2 | 3,5 |
| A | Colle del Leone | **95a** | 17,06 | 17,02 | 0,28 | 4,8 | 0,04 | 0,54 | 0,0 | 4,8 |
| A | Felicecchia | **95b** | 11,31 | 11,15 | 0,28 | 3,1 | 0,16 | 0,54 | 0,1 | 3,2 |
| A | Corticella | **96** | 26,62 | 26,42 | 0,28 | 7,4 | 0,20 | 0,54 | 0,1 | 7,5 |
| A | Valle Grande | **109a** | 11,29 | 11,29 | 0,28 | 3,2 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 3,2 |
| A | Fossa della Neve | **109b** | 10,82 | 10,82 | 0,28 | 3,0 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 3,0 |
| A | Fossa della Neve | **110** | 26,99 | 26,56 | 0,28 | 7,4 | 0,43 | 0,54 | 0,2 | 7,7 |
| A | Scaffa | **111** | 15,84 | 15,60 | 0,28 | 4,4 | 0,24 | 0,54 | 0,1 | 4,5 |
| A | Lagarello | **115** | 17,52 | 15,78 | 0,28 | 4,4 | 1,74 | 0,54 | 0,9 | 5,4 |
| A | Lagarello | **117** | 12,32 | 11,99 | 0,28 | 3,4 | 0,33 | 0,54 | 0,2 | 3,5 |
| A | Lagarello | **118** | 18,58 | 15,43 | 0,28 | 4,3 | 3,15 | 0,54 | 1,7 | 6,0 |
| A | Raja di Calende | **127** | 11,81 | 11,81 | 0,28 | 3,3 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 3,3 |
| A | Valle Piana | **128** | 12,06 | 11,57 | 0,28 | 3,2 | 0,49 | 0,54 | 0,3 | 3,5 |
| A | Teatro | **129** | 12,85 | 12,76 | 0,28 | 3,6 | 0,09 | 0,54 | 0,0 | 3,6 |
| A | Lagarello | **133** | 9,66 | 8,90 | 0,28 | 2,5 | 0,76 | 0,54 | 0,4 | 2,9 |
| A | Corsa dei Cavalli | **134** | 17,27 | 17,17 | 0,28 | 4,8 | 0,10 | 0,54 | 0,1 | 4,9 |
| A | Valle Piana | **142** | 18,17 | 18,17 | 0,28 | 5,1 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 5,1 |
| A | Valle Piana | **144** | 12,71 | 12,66 | 0,28 | 3,5 | 0,05 | 0,54 | 0,0 | 3,6 |
| A | Valle Piana | **145** | 16,87 | 16,86 | 0,28 | 4,7 | 0,01 | 0,54 | 0,0 | 4,7 |
| A | Teatro | **146** | 18,85 | 18,80 | 0,28 | 5,3 | 0,05 | 0,54 | 0,0 | 5,3 |
| A | Cervarolo di Sazzano | **150** | 21,55 | 21,49 | 0,28 | 6,0 | 0,06 | 0,54 | 0,0 | 6,0 |
| A | Orno | **162** | 27,59 | 27,59 | 0,28 | 7,7 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 7,7 |
| A | Orno | **163** | 12,59 | 12,59 | 0,28 | 3,5 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 3,5 |
| A | Valle Piana | **164** | 26,74 | 26,74 | 0,28 | 7,5 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 7,5 |
| A | Valle Piana | **165** | 8,60 | 8,60 | 0,28 | 2,4 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 2,4 |
| A | Creta Rossa | **167** | 37,65 | 37,54 | 0,28 | 10,5 | 0,11 | 0,54 | 0,1 | 10,6 |
| A | Serroncelli | **169** | 17,92 | 17,89 | 0,28 | 5,0 | 0,03 | 0,54 | 0,0 | 5,0 |
| A | Serroncelli | **170** | 12,62 | 12,60 | 0,28 | 3,5 | 0,02 | 0,54 | 0,0 | 3,5 |
| A | Cervarolo di Sazzano | **173** | 9,95 | 9,10 | 0,28 | 2,5 | 0,85 | 0,54 | 0,5 | 3,0 |

| PARTICELLE PASCOLABILI E NUMERO U.B.A. AMMISSIBILI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESA | LOCALITA' | Particella forestale | Superficie totale Ha | Aree boscate | | | Pascoli e aree nude | | | UBA pascolabili totali |
| | | | | Superficie pascolabile Ha (*) | UBA/Ha | UBA pascolabili | Superficie Ha | UBA/Ha | UBA pascolabili | |
| A | Cervarolo di Sazzano | **174** | 24,88 | 24,67 | 0,28 | 6,9 | 0,21 | 0,54 | 0,1 | 7,0 |
| A | Apeticchia | **187** | 20,42 | 20,40 | 0,28 | 5,7 | 0,02 | 0,54 | 0,0 | 5,7 |
| A | Apeticchia | **188** | 15,60 | 15,55 | 0,28 | 4,4 | 0,05 | 0,54 | 0,0 | 4,4 |
| A | Montagna Grande | **189** | 24,37 | 24,36 | 0,28 | 6,8 | 0,01 | 0,54 | 0,0 | 6,8 |
| A | Ripa di Moggio | **190** | 12,93 | 12,93 | 0,28 | 3,6 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 3,6 |
| A | Filettone | **191** | 32,71 | 32,59 | 0,28 | 9,1 | 0,12 | 0,54 | 0,1 | 9,2 |
| A | Terremoto | **192** | 36,38 | 36,37 | 0,28 | 10,2 | 0,01 | 0,54 | 0,0 | 10,2 |
| A | Serra dei Fasci | **193** | 19,98 | 19,96 | 0,28 | 5,6 | 0,02 | 0,54 | 0,0 | 5,6 |
| A | Serroncelli Soprani | **194** | 11,99 | 11,98 | 0,28 | 3,4 | 0,01 | 0,54 | 0,0 | 3,4 |
| A | Serroncelli Soprani | **198** | 17,70 | 16,81 | 0,28 | 4,7 | 0,89 | 0,54 | 0,5 | 5,2 |
| A | Cervarolo di Sazzano | **199** | 14,12 | 14,12 | 0,28 | 4,0 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 4,0 |
| A | Cervarolo di Sazzano | **204** | 12,28 | 11,85 | 0,28 | 3,3 | 0,43 | 0,54 | 0,2 | 3,6 |
| A | Fossa della Neve | **205b** | 11,18 | 11,18 | 0,28 | 3,1 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 3,1 |
| A | Apeticchia | **208** | 35,41 | 35,39 | 0,28 | 9,9 | 0,02 | 0,54 | 0,0 | 9,9 |
| A | Stretta dell'Acernese | **209** | 31,70 | 31,52 | 0,28 | 8,8 | 0,18 | 0,54 | 0,1 | 8,9 |
| A | Coste di Cervialto | **211** | 21,59 | 21,59 | 0,28 | 6,0 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 6,0 |
| A | Coste di Cervialto | **212** | 29,47 | 29,38 | 0,28 | 8,2 | 0,09 | 0,54 | 0,0 | 8,3 |
| A | Valle Giamberardino | **215** | 3,49 | 3,49 | 0,28 | 1,0 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 1,0 |
| A | Impiccato | **220** | 22,81 | 22,80 | 0,28 | 6,4 | 0,01 | 0,54 | 0,0 | 6,4 |
| A | Apeticchia | **222a** | 16,56 | 16,56 | 0,28 | 4,6 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 4,6 |
| A | Apeticchia | **223a** | 10,58 | 10,58 | 0,28 | 3,0 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 3,0 |
| A | Terremoto | **224b** | 6,50 | 6,50 | 0,28 | 1,8 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 1,8 |
| A | Valle d'Acera | **225** | 16,29 | 16,29 | 0,28 | 4,6 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 4,6 |
| A | Valle d'Acera | **228** | 24,40 | 24,00 | 0,28 | 6,7 | 0,40 | 0,54 | 0,2 | 6,9 |
| A | Sette Valli | **229** | 34,06 | 33,85 | 0,28 | 9,5 | 0,21 | 0,54 | 0,1 | 9,6 |
| A | Sette Valli | **230** | 35,75 | 35,72 | 0,28 | 10,0 | 0,03 | 0,54 | 0,0 | 10,0 |
| A | Chiuvarelli | **232** | 40,81 | 40,72 | 0,28 | 11,4 | 0,09 | 0,54 | 0,0 | 11,5 |
| A | Vallone del Turco | **233** | 34,69 | 34,69 | 0,28 | 9,7 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 9,7 |
| A | Vallone del Turco | **235** | 13,14 | 13,14 | 0,28 | 3,7 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 3,7 |
| A | Coste di Cervialto | **236** | 11,10 | 11,10 | 0,28 | 3,1 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 3,1 |
| A | Coste di Cervialto | **240** | 7,36 | 6,75 | 0,28 | 1,9 | 0,61 | 0,54 | 0,3 | 2,2 |
| A | Coste di Cervialto | **247** | 14,20 | 13,78 | 0,28 | 3,9 | 0,42 | 0,54 | 0,2 | 4,1 |
| A | Coste di Cervialto | **248** | 12,92 | 12,92 | 0,28 | 3,6 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 3,6 |
| A | Impiccato | **250** | 22,87 | 22,86 | 0,28 | 6,4 | 0,01 | 0,54 | 0,0 | 6,4 |
| A | Scarrupata | **251** | 13,98 | 13,98 | 0,28 | 3,9 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 3,9 |
| A | Valle d'Acera | **253** | 11,59 | 11,59 | 0,28 | 3,2 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 3,2 |

| PARTICELLE PASCOLABILI E NUMERO U.B.A. AMMISSIBILI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESA | LOCALITA' | Particella forestale | Superficie totale Ha | Aree boscate | | | Pascoli e aree nude | | | UBA pascolabili totali |
| | | | | Superficie pascolabile Ha (*) | UBA/Ha | UBA pascolabili | Superficie Ha | UBA/Ha | UBA pascolabili | |
| A | Valle d'Acera | **254** | 15,01 | 15,01 | 0,28 | 4,2 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 4,2 |
| A | Valle d'Acera | **256** | 17,21 | 17,18 | 0,28 | 4,8 | 0,03 | 0,54 | 0,0 | 4,8 |
| A | Valle d'Acera | **257** | 8,93 | 8,87 | 0,28 | 2,5 | 0,06 | 0,54 | 0,0 | 2,5 |
| A | Valle d'Acera | **259** | 27,71 | 27,14 | 0,28 | 7,6 | 0,57 | 0,54 | 0,3 | 7,9 |
| A | Pagliarolo | **260** | 19,87 | 19,76 | 0,28 | 5,5 | 0,11 | 0,54 | 0,1 | 5,6 |
| A | Valle d'Acera | **261a** | 16,20 | 16,20 | 0,28 | 4,5 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 4,5 |
| A | Valle d'Acera | **261b** | 14,86 | 14,86 | 0,28 | 4,2 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 4,2 |
| A | Pagliarulo | **262** | 16,87 | 16,87 | 0,28 | 4,7 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 4,7 |
| A | Chiuvarelli | **263** | 24,81 | 24,81 | 0,28 | 6,9 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 6,9 |
| A | Vallebona | **273** | 0,93 | 0,93 | 0,28 | 0,3 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 0,3 |
| A | Vallebona | **274** | 25,84 | 25,82 | 0,28 | 7,2 | 0,02 | 0,54 | 0,0 | 7,2 |
| A | Raja della Scannella | **275** | 19,12 | 19,12 | 0,28 | 5,4 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 5,4 |
| A | Valle d'Acera | **276a** | 10,31 | 10,29 | 0,28 | 2,9 | 0,02 | 0,54 | 0,0 | 2,9 |
| A | Valle d'Acera | **276b** | 12,54 | 12,54 | 0,28 | 3,5 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 3,5 |
| A | Vallebona | **277** | 18,56 | 18,56 | 0,28 | 5,2 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 5,2 |
| A | Vallone dell'Acero | **284** | 17,45 | 17,45 | 0,28 | 4,9 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 4,9 |
| A | Conca di Marco | **291** | 28,65 | 28,62 | 0,28 | 8,0 | 0,03 | 0,54 | 0,0 | 8,0 |
| A | Sierro della Zà Popa | **292** | 24,83 | 24,79 | 0,28 | 6,9 | 0,04 | 0,54 | 0,0 | 7,0 |
| A | Piano Acernese | **295a** | 15,83 | 15,71 | 0,28 | 4,4 | 0,12 | 0,54 | 0,1 | 4,5 |
| A | Vallebona | **295b** | 19,28 | 19,18 | 0,28 | 5,4 | 0,10 | 0,54 | 0,1 | 5,4 |
| A | Colle del Leone | **296** | 8,95 | 8,94 | 0,28 | 2,5 | 0,01 | 0,54 | 0,0 | 2,5 |
| A | Colle del Leone | **297** | 23,48 | 19,47 | 0,28 | 5,5 | 4,01 | 0,54 | 2,2 | 7,6 |
| A | Vallone del Cupone | **298** | 10,72 | 10,72 | 0,28 | 3,0 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 3,0 |
| A | Vallone del Cupone | **300** | 23,92 | 23,90 | 0,28 | 6,7 | 0,02 | 0,54 | 0,0 | 6,7 |
| A | Felicecchia | **301** | 19,49 | 17,65 | 0,28 | 4,9 | 1,84 | 0,54 | 1,0 | 5,9 |
| A | Felicecchia | **302** | 20,89 | 20,86 | 0,28 | 5,8 | 0,03 | 0,54 | 0,0 | 5,9 |
| A | Coste di Cervialto | **304** | 22,47 | 21,85 | 0,28 | 6,1 | 0,62 | 0,54 | 0,3 | 6,5 |
| A | Colle delle Radici | **305** | 21,65 | 21,32 | 0,28 | 6,0 | 0,33 | 0,54 | 0,2 | 6,1 |
| A | Colle delle Radici | **306** | 18,48 | 18,47 | 0,28 | 5,2 | 0,01 | 0,54 | 0,0 | 5,2 |
| A | Piano Migliato | **307** | 19,18 | 19,00 | 0,28 | 5,3 | 0,18 | 0,54 | 0,1 | 5,4 |
| A | Vallebona | **308a** | 21,10 | 20,90 | 0,28 | 5,9 | 0,20 | 0,54 | 0,1 | 6,0 |
| A | Colle del Leone | **308b** | 7,44 | 7,39 | 0,28 | 2,1 | 0,05 | 0,54 | 0,0 | 2,1 |
| A | Piano Migliato | **309** | 16,88 | 16,85 | 0,28 | 4,7 | 0,03 | 0,54 | 0,0 | 4,7 |
| A | Colle delle Radici | **310** | 23,71 | 23,67 | 0,28 | 6,6 | 0,04 | 0,54 | 0,0 | 6,6 |
| A | Piano Migliato | **311** | 15,05 | 14,02 | 0,28 | 3,9 | 1,03 | 0,54 | 0,6 | 4,5 |
| C | Costa della Guadia | **3b** | 3,31 | 2,71 | 0,28 | 0,8 | 0,60 | 0,54 | 0,3 | 1,1 |

| PARTICELLE PASCOLABILI E NUMERO U.B.A. AMMISSIBILI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESA | LOCALITA' | Particella forestale | Superficie totale Ha | Aree boscate | | | Pascoli e aree nude | | | UBA pascolabili totali |
| | | | | Superficie pascolabile Ha (*) | UBA/Ha | UBA pascolabili | Superficie Ha | UBA/Ha | UBA pascolabili | |
| C | Fieste | **4b** | 10,01 | 1,70 | 0,28 | 0,5 | 8,31 | 0,54 | 4,5 | 5,0 |
| C | Varco di Marro | **8** | 7,38 | 7,27 | 0,28 | 2,0 | 0,11 | 0,54 | 0,1 | 2,1 |
| C | Valle Scura di Sopra | **16** | 16,36 | 10,63 | 0,28 | 3,0 | 5,73 | 0,54 | 3,1 | 6,1 |
| C | Colle del Pozzo | **17** | 14,66 | 13,89 | 0,28 | 3,9 | 0,77 | 0,54 | 0,4 | 4,3 |
| C | Il Montagnone | **18** | 10,84 | 7,89 | 0,28 | 2,2 | 2,95 | 0,54 | 1,6 | 3,8 |
| C | Cauciogliara | **20** | 28,61 | 10,98 | 0,28 | 3,1 | 17,63 | 0,54 | 9,5 | 12,6 |
| C | Belvedere | **21** | 10,70 | 7,26 | 0,28 | 2,0 | 3,44 | 0,54 | 1,9 | 3,9 |
| C | Castagna | **24** | 8,75 | 8,68 | 0,28 | 2,4 | 0,07 | 0,54 | 0,0 | 2,5 |
| C | La Chiusa | **25** | 13,12 | 10,13 | 0,28 | 2,8 | 2,99 | 0,54 | 1,6 | 4,5 |
| C | Pettinicchio | **26** | 38,89 | 10,84 | 0,28 | 3,0 | 28,05 | 0,54 | 15,1 | 18,2 |
| C | I Morti | **27a** | 20,07 | 7,21 | 0,28 | 2,0 | 12,86 | 0,54 | 6,9 | 9,0 |
| C | I Morti | **28** | 2,30 | 1,57 | 0,28 | 0,4 | 0,73 | 0,54 | 0,4 | 0,8 |
| C | Valle dei Morti | **29a** | 8,29 | 7,57 | 0,28 | 2,1 | 0,72 | 0,54 | 0,4 | 2,5 |
| C | Valle dei Lupi | **30** | 6,84 | 5,00 | 0,28 | 1,4 | 1,84 | 0,54 | 1,0 | 2,4 |
| C | Valle dei Lupi | **31** | 17,68 | 17,41 | 0,28 | 4,9 | 0,27 | 0,54 | 0,1 | 5,0 |
| C | Acero | **32a** | 5,72 | 5,68 | 0,28 | 1,6 | 0,04 | 0,54 | 0,0 | 1,6 |
| C | Acero | **33** | 10,84 | 10,61 | 0,28 | 3,0 | 0,23 | 0,54 | 0,1 | 3,1 |
| C | Filettone | **34** | 5,24 | 5,20 | 0,28 | 1,5 | 0,04 | 0,54 | 0,0 | 1,5 |
| C | Valle del Limo | **37a** | 8,72 | 7,16 | 0,28 | 2,0 | 1,56 | 0,54 | 0,8 | 2,8 |
| C | Valle del Limo | **37b** | 4,83 | 4,43 | 0,28 | 1,2 | 0,40 | 0,54 | 0,2 | 1,5 |
| C | Lo Stazzo | **38** | 14,31 | 10,05 | 0,28 | 2,8 | 4,26 | 0,54 | 2,3 | 5,1 |
| C | Lo Stazzo | **39** | 17,32 | 10,43 | 0,28 | 2,9 | 6,89 | 0,54 | 3,7 | 6,6 |
| C | Lo Stazzo | **40** | 11,15 | 5,26 | 0,28 | 1,5 | 5,89 | 0,54 | 3,2 | 4,7 |
| C | Vallone dello Stazzo | **41** | 9,26 | 8,93 | 0,28 | 2,5 | 0,33 | 0,54 | 0,2 | 2,7 |
| C | Valle dei Sauci | **42** | 28,53 | 13,87 | 0,28 | 3,9 | 14,66 | 0,54 | 7,9 | 11,8 |
| C | Valle dei Morti | **43** | 14,36 | 12,46 | 0,28 | 3,5 | 1,90 | 0,54 | 1,0 | 4,5 |
| C | Valle dei Sauci | **44a** | 7,99 | 7,70 | 0,28 | 2,2 | 0,29 | 0,54 | 0,2 | 2,3 |
| C | Valle dei Sauci | **44b** | 4,68 | 4,38 | 0,28 | 1,2 | 0,30 | 0,54 | 0,2 | 1,4 |
| C | Valle dei Sauci | **45a** | 19,12 | 18,68 | 0,28 | 5,2 | 0,44 | 0,54 | 0,2 | 5,5 |
| C | Terrate | **46** | 16,25 | 15,14 | 0,28 | 4,2 | 1,11 | 0,54 | 0,6 | 4,8 |
| C | Terrate | **47** | 4,99 | 4,94 | 0,28 | 1,4 | 0,05 | 0,54 | 0,0 | 1,4 |
| C | Filettone | **48** | 9,42 | 8,75 | 0,28 | 2,5 | 0,67 | 0,54 | 0,4 | 2,8 |
| C | Vallone della Vecchiarella | **50** | 9,13 | 7,88 | 0,28 | 2,2 | 1,25 | 0,54 | 0,7 | 2,9 |
| C | Orto di Calcio Lento | **51** | 21,56 | 3,53 | 0,28 | 1,0 | 18,03 | 0,54 | 9,7 | 10,7 |
| C | Valle del Limo | **52** | 31,14 | 5,37 | 0,28 | 1,5 | 25,77 | 0,54 | 13,9 | 15,4 |
| C | Conca | **53** | 6,87 | 6,61 | 0,28 | 1,9 | 0,26 | 0,54 | 0,1 | 2,0 |

| PARTICELLE PASCOLABILI E NUMERO U.B.A. AMMISSIBILI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESA | LOCALITA' | Particella forestale | Superficie totale Ha | Aree boscate | | | Pascoli e aree nude | | | UBA pascolabili totali |
| | | | | Superficie pascolabile Ha (*) | UBA/Ha | UBA pascolabili | Superficie Ha | UBA/Ha | UBA pascolabili | |
| C | Monte Caruso | **54** | 12,57 | 5,38 | 0,28 | 1,5 | 7,19 | 0,54 | 3,9 | 5,4 |
| C | Valle dei Sauci | **55** | 14,89 | 13,88 | 0,28 | 3,9 | 1,01 | 0,54 | 0,5 | 4,4 |
| C | Monte Caruso | **56** | 13,22 | 7,29 | 0,28 | 2,0 | 5,93 | 0,54 | 3,2 | 5,2 |
| C | Valle Matauro | **57** | 35,36 | 23,27 | 0,28 | 6,5 | 12,09 | 0,54 | 6,5 | 13,0 |
| C | Colle Matauro | **59** | 12,88 | 10,18 | 0,28 | 2,9 | 2,70 | 0,54 | 1,5 | 4,3 |
| C | Valle del Pero | **61** | 11,88 | 10,52 | 0,28 | 2,9 | 1,36 | 0,54 | 0,7 | 3,7 |
| C | Raia dell'Acera | **62** | 12,88 | 10,43 | 0,28 | 2,9 | 2,45 | 0,54 | 1,3 | 4,2 |
| C | Terrate | **63** | 12,05 | 10,68 | 0,28 | 3,0 | 1,37 | 0,54 | 0,7 | 3,7 |
| C | Terrate | **64** | 8,25 | 8,12 | 0,28 | 2,3 | 0,13 | 0,54 | 0,1 | 2,3 |
| C | Filettone | **65** | 8,08 | 7,94 | 0,28 | 2,2 | 0,14 | 0,54 | 0,1 | 2,3 |
| C | La Peta | **66** | 13,89 | 8,74 | 0,28 | 2,4 | 5,15 | 0,54 | 2,8 | 5,2 |
| C | Filettone | **67** | 13,70 | 11,11 | 0,28 | 3,1 | 2,59 | 0,54 | 1,4 | 4,5 |
| C | Costa dell'Angelo | **68** | 8,44 | 6,67 | 0,28 | 1,9 | 1,77 | 0,54 | 1,0 | 2,8 |
| C | Valle Nova | **70** | 33,18 | 23,39 | 0,28 | 6,5 | 9,79 | 0,54 | 5,3 | 11,8 |
| C | S. Maria | **72** | 17,41 | 11,71 | 0,28 | 3,3 | 5,70 | 0,54 | 3,1 | 6,4 |
| C | S. Maria | **73** | 11,99 | 7,49 | 0,28 | 2,1 | 4,50 | 0,54 | 2,4 | 4,5 |
| C | S. Maria | **74** | 6,36 | 5,05 | 0,28 | 1,4 | 1,31 | 0,54 | 0,7 | 2,1 |
| C | Monte Caruso | **76** | 16,92 | 11,23 | 0,28 | 3,1 | 5,69 | 0,54 | 3,1 | 6,2 |
| C | Raia della Spina | **78** | 21,15 | 13,63 | 0,28 | 3,8 | 7,52 | 0,54 | 4,1 | 7,9 |
| C | Valle Piana | **80** | 5,05 | 4,30 | 0,28 | 1,2 | 0,75 | 0,54 | 0,4 | 1,6 |
| C | Vado dell'Asta | **82** | 16,15 | 9,39 | 0,28 | 2,6 | 6,76 | 0,54 | 3,7 | 6,3 |
| C | Salve Regina | **83a** | 9,84 | 6,54 | 0,28 | 1,8 | 3,30 | 0,54 | 1,8 | 3,6 |
| C | Vado dell'Asta | **84** | 13,47 | 10,04 | 0,28 | 2,8 | 3,43 | 0,54 | 1,9 | 4,7 |
| C | Valle Coscia | **85** | 10,45 | 9,81 | 0,28 | 2,7 | 0,64 | 0,54 | 0,3 | 3,1 |
| C | Vado dell'Asta | **86** | 8,36 | 8,32 | 0,28 | 2,3 | 0,04 | 0,54 | 0,0 | 2,4 |
| C | Vado dell'Asta | **87** | 9,30 | 9,18 | 0,28 | 2,6 | 0,12 | 0,54 | 0,1 | 2,6 |
| C | La Peta | **88** | 3,12 | 3,00 | 0,28 | 0,8 | 0,12 | 0,54 | 0,1 | 0,9 |
| C | Vallone di Ciccociangia | **89** | 10,38 | 4,81 | 0,28 | 1,3 | 5,57 | 0,54 | 3,0 | 4,4 |
| C | Vallone di Ciccociangia | **90** | 8,38 | 4,74 | 0,28 | 1,3 | 3,64 | 0,54 | 2,0 | 3,3 |
| C | Costa dell'Angelo | **92** | 7,84 | 4,23 | 0,28 | 1,2 | 3,61 | 0,54 | 1,9 | 3,1 |
| C | Raia della Spina | **97** | 9,33 | 5,40 | 0,28 | 1,5 | 3,93 | 0,54 | 2,1 | 3,6 |
| C | Serro Tondo | **98a** | 6,44 | 2,83 | 0,28 | 0,8 | 3,61 | 0,54 | 1,9 | 2,7 |
| C | Serro Tondo | **98b** | 2,66 | 2,36 | 0,28 | 0,7 | 0,30 | 0,54 | 0,2 | 0,8 |
| C | Serro Tondo | **99** | 6,78 | 6,38 | 0,28 | 1,8 | 0,40 | 0,54 | 0,2 | 2,0 |
| C | Serrone Pizzuto | **100** | 14,02 | 13,40 | 0,28 | 3,8 | 0,62 | 0,54 | 0,3 | 4,1 |
| C | Serrone Pizzuto | **101** | 17,58 | 16,29 | 0,28 | 4,6 | 1,29 | 0,54 | 0,7 | 5,3 |

| PARTICELLE PASCOLABILI E NUMERO U.B.A. AMMISSIBILI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESA | LOCALITA' | Particella forestale | Superficie totale Ha | Aree boscate | | | Pascoli e aree nude | | | UBA pascolabili totali |
| | | | | Superficie pascolabile Ha (*) | UBA/Ha | UBA pascolabili | Superficie Ha | UBA/Ha | UBA pascolabili | |
| C | Vado dell'Asta | **102** | 11,66 | 10,68 | 0,28 | 3,0 | 0,98 | 0,54 | 0,5 | 3,5 |
| C | Valle di Liero | **103** | 14,73 | 14,72 | 0,28 | 4,1 | 0,01 | 0,54 | 0,0 | 4,1 |
| C | Serro della Falasca | **104** | 5,17 | 5,14 | 0,28 | 1,4 | 0,03 | 0,54 | 0,0 | 1,5 |
| C | Serro della Falasca | **105** | 13,94 | 13,10 | 0,28 | 3,7 | 0,84 | 0,54 | 0,5 | 4,1 |
| C | Calvelluzzo | **106** | 3,04 | 3,04 | 0,28 | 0,9 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 0,9 |
| C | Tronola | **113b** | 11,20 | 8,04 | 0,28 | 2,3 | 3,16 | 0,54 | 1,7 | 4,0 |
| C | Tronola | **114** | 16,61 | 12,41 | 0,28 | 3,5 | 4,20 | 0,54 | 2,3 | 5,7 |
| C | Lagarello | **116** | 5,06 | 5,04 | 0,28 | 1,4 | 0,02 | 0,54 | 0,0 | 1,4 |
| C | Corsa dei Cavalli | **119** | 11,22 | 10,00 | 0,28 | 2,8 | 1,22 | 0,54 | 0,7 | 3,5 |
| C | Corsa dei Cavalli | **120** | 15,81 | 14,65 | 0,28 | 4,1 | 1,16 | 0,54 | 0,6 | 4,7 |
| C | Valle del Ghiro | **121** | 9,15 | 9,14 | 0,28 | 2,6 | 0,01 | 0,54 | 0,0 | 2,6 |
| C | Coste del Calvello | **122** | 10,92 | 10,50 | 0,28 | 2,9 | 0,42 | 0,54 | 0,2 | 3,2 |
| C | Orno | **124** | 9,53 | 9,53 | 0,28 | 2,7 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 2,7 |
| C | Pietra di Alessio | **130** | 11,27 | 2,62 | 0,28 | 0,7 | 8,65 | 0,54 | 4,7 | 5,4 |
| C | Fontana di Sazzano | **132** | 18,37 | 13,41 | 0,28 | 3,8 | 4,96 | 0,54 | 2,7 | 6,4 |
| C | Corsa dei Cavalli | **136** | 9,47 | 9,46 | 0,28 | 2,6 | 0,01 | 0,54 | 0,0 | 2,7 |
| C | Monte Calvello | **137a** | 9,80 | 9,62 | 0,28 | 2,7 | 0,18 | 0,54 | 0,1 | 2,8 |
| C | Monte Calvello | **138** | 9,58 | 0,54 | 0,28 | 0,2 | 9,04 | 0,54 | 4,9 | 5,0 |
| C | Aria della Preda | **153** | 42,34 | 18,19 | 0,28 | 5,1 | 24,15 | 0,54 | 13,0 | 18,1 |
| C | Sazzano | **154** | 41,14 | 13,92 | 0,28 | 3,9 | 27,22 | 0,54 | 14,7 | 18,6 |
| C | Piano di Sazzano | **176** | 14,85 | 12,91 | 0,28 | 3,6 | 1,94 | 0,54 | 1,0 | 4,7 |
| C | Gioco dei Colombi | **312** | 3,45 | 3,45 | 0,28 | 1,0 | 0,00 | 0,54 | 0,0 | 1,0 |
| C | Valle dell'Ulivo | **314** | 15,06 | 4,25 | 0,28 | 1,2 | 10,81 | 0,54 | 5,8 | 7,0 |
| C | Serrone Pizzuto | **315** | 8,01 | 3,25 | 0,28 | 0,9 | 4,76 | 0,54 | 2,6 | 3,5 |
| C | Il Casone | **316** | 2,32 | 2,17 | 0,28 | 0,6 | 0,15 | 0,54 | 0,1 | 0,7 |
| Pascoli | I Morti | **27b** | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 7,44 | 1,02 | 7,6 | 7,6 |
| Pascoli | Valle dei Morti | **29b** | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 6,55 | 1,02 | 6,7 | 6,7 |
| Pascoli | Acero | **32b** | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,94 | 1,02 | 1,0 | 1,0 |
| Pascoli | Valle dei Sauci | **45b** | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2,44 | 1,02 | 2,5 | 2,5 |
| Pascoli | Terrate | **47b** | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 8,30 | 1,02 | 8,5 | 8,5 |
| Pascoli | Valle Foce di Caposele | **79b** | 3,38 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3,38 | 1,02 | 3,4 | 3,4 |

| PARTICELLE PASCOLABILI E NUMERO U.B.A. AMMISSIBILI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESA | LOCALITA' | Particella forestale | Superficie totale Ha | Aree boscate | | | Pascoli e aree nude | | | UBA pascolabili totali |
| | | | | Superficie pascolabile Ha (*) | UBA/Ha | UBA pascolabili | Superficie Ha | UBA/Ha | UBA pascolabili | |
| Pascoli | Salve Regina | **83b** | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2,98 | 1,02 | 3,0 | 3,0 |
| Pascoli | Vado dell'Asta | **84b** | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,28 | 1,02 | 1,3 | 1,3 |
| Pascoli | Vado dell'Asta | **86b** | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 8,15 | 1,02 | 8,3 | 8,3 |
| Pascoli | Monte Calvello | **137b** | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3,89 | 1,02 | 4,0 | 4,0 |
| Pascoli | Tronola | **147a** | 167,41 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 167,41 | 1,02 | 170,8 | 170,8 |
| Pascoli | Tronola | **147b** | 8,86 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 8,86 | 1,02 | 9,0 | 9,0 |
| Pascoli | Tronola | **147c** | 5,24 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5,24 | 1,02 | 5,3 | 5,3 |
| Pascoli | Tronola | **147d** | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,83 | 1,02 | 1,9 | 1,9 |
| Pascoli | Cervarolo di Sazzano | **175** | 17,92 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 17,92 | 1,02 | 18,3 | 18,3 |
| Pascoli | Coste di Cervialto | **232b** | 15,20 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 15,20 | 1,02 | 15,5 | 15,5 |
| Pascoli | Valle d'Acera | **249** | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2,71 | 1,02 | 2,8 | 2,8 |
| Pascoli | Valle d'Acera | **255c** | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,39 | 1,02 | 0,4 | 0,4 |
| Pascoli | Piano dei Vaccari | **260b** | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3,07 | 1,02 | 3,1 | 3,1 |
| Pascoli | Vallebona | **273b** | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,22 | 1,02 | 1,2 | 1,2 |
| Pascoli | Sierro della Zà Popa | **291b** | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,72 | 1,02 | 1,8 | 1,8 |
| Pascoli | Colle del Leone | **292b** | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4,56 | 1,02 | 4,7 | 4,7 |
| Inclusi | F.lo cat. n. 18 part. 11 | **In** | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4,05 | 0,54 | 2,2 | 2,2 |
| Inclusi | F.lo cat. n. 18 part. 8 | **In** | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,86 | 0,54 | 0,5 | 0,5 |
| Inclusi | F.lo cat. n. 19 part. 43 | **In** | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,57 | 0,54 | 0,3 | 0,3 |
| Inclusi | F.lo cat. n. 23 part. 29 | **In** | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,26 | 0,54 | 0,7 | 0,7 |
| Inclusi | F.lo cat. n. 23 part. 33 | **In** | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,49 | 0,54 | 0,3 | 0,3 |
| Inclusi | F.lo cat. n. 24 part. 330 | **In** | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2,83 | 0,54 | 1,5 | 1,5 |
| Inclusi | F.lo cat. n. 25 part. 12 | **In** | 16,89 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 16,89 | 0,54 | 9,1 | 9,1 |
| Inclusi | F.lo cat. n. 25 part. 13 | **In** | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,54 | 0,54 | 0,3 | 0,3 |
| Inclusi | F.lo cat. n. 26 part. 1 | **In** | 12,32 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 12,32 | 0,54 | 6,7 | 6,7 |
| Inclusi | F.lo cat. n. 26 part. 2 | **In** | 6,39 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 6,39 | 0,54 | 3,5 | 3,5 |

| PARTICELLE PASCOLABILI E NUMERO U.B.A. AMMISSIBILI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESA | LOCALITA' | Particella forestale | Superficie totale Ha | Aree boscate | | | Pascoli e aree nude | | | UBA pascolabili totali |
| | | | | Superficie pascolabile Ha (*) | UBA/Ha | UBA pascolabili | Superficie Ha | UBA/Ha | UBA pascolabili | |
| Inclusi | F.lo cat. n. 27 part. 151 | In | 23,97 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 23,97 | 0,54 | 12,9 | 12,9 |
| Inclusi | F.lo cat. n. 27 part. 158 | In | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,13 | 0,54 | 0,1 | 0,1 |
| Inclusi | F.lo cat. n. 27 part. 160 | In | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,07 | 0,54 | 0,0 | 0,0 |
| Inclusi | F.lo cat. n. 27 part. 161 | In | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,54 | 0,54 | 0,3 | 0,3 |
| Inclusi | F.lo cat. n. 27 part. 3 | In | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,63 | 0,54 | 0,3 | 0,3 |
| Inclusi | F.lo cat. n. 28 part. 1 | In | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3,28 | 0,54 | 1,8 | 1,8 |
| | **TOTALI** | | **3513,15** | **2745,34** | | **768,7** | **767,81** | | **546,8** | **1315,5** |

(*) In caso di presenza di Piano di Gestione Forestale, indicare anche la particella forestale interessata.
(**) P.L.T. = *Pratiche Locali Tradizionali* legate al pascolo (D.G.R. 8/5/2015, n. 242, e ss.mm.ii.).

### 15- Controllo sanitario del bestiame ammesso al pascolo

1. Il bestiame per essere ammesso al pascolo dovrà essere sottoposto a preventiva visita veterinaria.

2. Il bestiame non ritenuto sano ed idoneo potrà essere sostituito da altro della stessa specie.

3. L'interessato dovrà, ad ogni opportuna richiesta, esibire il relativo certificato veterinario.

### 16- Certificato di licenza di pascolo

1. Ogni conducente di bestiame ammesso alla fida dovrà essere munito di un certificato, di cui al precedente articolo 6, comma 6, rilasciato dal comune di Bagnoli Irpino (AV) indicante le sue generalità, il nome del proprietario degli animali, la specie ed il numero degli animali fidati nonché il marchio di distinzione dichiarato in domanda. Detto certificato dovrà essere esibito a qualsiasi richiesta degli agenti forestali e comunali.

### 17- Miglioramento colturale

2. L'esercizio del pascolo nelle zone che saranno assoggettate al miglioramento colturale sarà regolato dal soggetto di programma (Ente Delegato o Comune). Per le limitazioni e i divieti dovuti le specifiche disposizioni della DGR n. 795/2017 (Misure di conservazione delle aree SIC) vedasi quanto riportato nel precedente art. 5.

### 18- Sanzione per pascolo non autorizzato

1. Qualunque titolare di licenza di pascolo, cittadino o meno, del comune di Bagnoli Irpino che denunciasse del bestiame forestiero come di sua proprietà, o comunque non avente diritto al pascolo, verrà immediatamente escluso da tutti i pascoli demaniali con la perdita della tassa di fida già versata al Comune.

2. Chiunque fidasse falsamente sotto il proprio nome pagherà, a titolo di penale, il quadruplo della fida totale stabilita per ogni capo, salvo sempre la immediata espulsione degli animali stessi dal demanio.

### 19- Adempimenti

1. Quei cittadini che intendono condurre a pascolo i propri animali nei terreni demaniali destinati a pascolo devono:

   a. anticipatamente dichiarare all'ufficio comunale addetto le specie ed il numero di animali;

   b. esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;

   c. aver dotato il proprio bestiame di marca auricolare;

   d. aver indicato quale sezione del demanio intende utilizzare come pascolo, comunque individuato nel Piano di Gestione Forestale;

   e. aver pagato la fida stabilita per l'anno in corso;

   f. dichiarare di pagare l'eventuale conguaglio della fida prima dell'inizio dell'esercizio dell'anno successivo.

### 20- Tassa di fida pascolo

1. La fida è fissata dall'amministrazione comunale almeno sei mesi prima dell'immissione del bestiame nelle aree di pascolo e si provvede all'aggiornamento, entro gli stessi termini, sulla base dei dati inflattivi ISTAT dell'anno precedente e sulla scorta di ordinaria e straordinaria amministrazione effettivamente sostenute sulle aree di pascolo nel rispetto dei richiamati limiti previsti dall'articolo 46 del R. D. n. 332/1928. Essa sarà pagata anticipatamente e in ogni caso prima dell'ingresso sui luoghi di pascolo, come previsto dall'articolo 14 del presente Regolamento.

2. Detratte le spese necessarie per la gestione e sorveglianza delle aree di pascolo, le eventuali somme ricevute dalla fida pascolo saranno reinvestite dall'amministrazione comunale per il miglioramento dei beni di uso civico.

3. L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l'anno in corso, non ha diritto all'ingresso nelle terre di uso civico per gli anni successivi. Saranno applicati, inoltre, gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati prima dell'immissione al pascolo ovvero entro il termine del 31 marzo.

4. L'amministrazione comunale, tramite delibera del Consiglio comunale, può aumentare i canoni dei cittadini non residenti nel Comune che risultano essere assegnatari e/o occupatori di terreni e/o pascolivi gravati da uso civico, fino ad un massimo del 25% della tariffa base.

### 21- Domanda di fida pascolo

1. Gli aventi diritto che intendono immettere del bestiame sui pascoli demaniali dovranno far pervenire, almeno 60 giorni prima dell'inizio del periodo di pascolamento, richiesta scritta all'Ufficio preposto, indicando numero e specie dei capi.

2. L'Ufficio preposto iscriverà successivamente nell'apposito registro di fida, le richieste che saranno pervenute.

### 22- Pubblicazione dell'elenco dei richiedenti la fida pascolo

1. L'elenco dei richiedenti la fida pascolo formato sarà pubblicato nell'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

2. Per le superficie concesse in fida pascolo il carico di bestiame complessivo, distinto per tipologia di soprassuolo, non potrà eccedere il carico massimo indicato nel precedente articolo 13.

### 23- Eventuale graduatoria fida

1. Nella necessità di una graduatoria per l'assegnazione della fida costituiranno titoli preferenziali:
   a. la residenza anagrafica nel comune di Bagnoli Irpino ;
   b. la localizzazione dell'azienda nel comune di Bagnoli Irpino;
   c. essere capi famiglia ai sensi dell'art. 51 del RD 332/1928;
   d. la titolarità di azienda agricola;
   e. essere allevatore a titolo principale;
   f. non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio;
   g. essere giovane agricoltore come definiti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia;
   h. essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe alle aree richieste in affidamento;
   i. aver utilizzato il comparto nell'anno precedente (criterio valido solo per un massimo di due anni consecutivi)
2. A ciascun criterio è attribuito un punteggio (pari a 100 in totale) con maggior peso all'essere giovane agricoltore.
3. I non residenti che presenteranno eventualmente richiesta per la licenza di pascolo saranno ammessi in via eccezionale con riserva ed accodati in graduatoria con apposito atto dell'amministrazione comunale. Essi, comunque, nel caso dei demani gravati da uso civico, saranno eventualmente ammessi ad usufruire del pascolo temporaneamente e solo dopo che saranno soddisfatte le esigenze dei cittadini residenti e/o loro eredi. La fida pascolo che saranno obbligati a versare al Comune potrà essere determinata dall'amministrazione comunale in un importo diverso dai cittadini residenti e/o loro eredi.

### 24- Pagamento della Tassa di fida pascolo

1. La tassa di fida è considerata annuale con riferimento al periodo solare di fida. Potrà essere versata in una sola o in due rate di cui la prima entro il primo mese dalla data di approvazione del "ruolo tassa fida", la seconda entro il 31 agosto.
2. La quietanza dell'avvenuto pagamento vale anche quale licenza di pascolo per il periodo di versamento indicato e lo stesso dovrà essere esibito a richiesta degli organi di controllo.
3. Eventualmente si dovesse verificare una modifica del numero dei capi fidati l'interessato dovrà comunicare la variazione e potrà, in detrazione o in aggiunta, previo riconoscimento dell'Amministrazione Comunale, modificare l'importo del secondo versamento o conguagliando il primo.

### 25- Norma di rinvio

1. Per tutte le norme relative al pascolo non espressamente citate nel presente regolamento si intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia

Forestale vigenti contenute nel Regolamento regionale n. 3/2017 e quanto previsto dalla vigente normativa di settore;

**26- Divieti**

1. È assolutamente vietato il pascolo agli animali vaganti.
2. È vietato asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna verde per portarli sui beni privati.
3. È vietata nel modo più assoluto la delimitazione dei pascoli o del territorio comunale salve diverse esigenze dell'ente. È fatto obbligo a tutti coloro che senza alcun titolo hanno delimitato in tal senso la proprietà comunale, di eliminare immediatamente le recinzioni abusive.
4. È categoricamente vietata la sosta, il pernottamento, l'impianto di ovili e di mandrie nelle aree demaniali adibite a pascolo.
5. È vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il loro giro sui luoghi di pascolo, di essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare. È vietato far pascolare qualsivoglia specie animale nelle aree escluse dal pascolo di cui al precedente articolo 14, comma 2, e sulle quali sono previsti, o sono in atto, interventi finalizzati al mantenimento o protezione della biodiversità.
6. È vietato il pascolo nel raggio di 300 m dalle sponde del lago e nel raggio di 50 nei pressi del villaggio Laceno.

**27- Accertamenti**

1. L'Amministrazione comunale farà accertare alla polizia municipale o altro agente che il numero dei capi denunciati corrisponda a quanto versato per la fida pascolo.
2. È fatto obbligo a tutti gli interessati di indicare, nella domanda di fida pascolo, il marchio auricolare o altro segno di individuazione che dovrà essere applicato su ciascun capo di bestiame.
3. Periodicamente l'Ente verificherà la conformità di quanto sopra e provvederà alla requisizione di tutti i capi di bestiame che, eventualmente, siano trovati sprovvisti di marchio o di altro di individuazione denunciati dall'interessato.
4. Eventuale cambio di bestiame dovrà essere immediatamente comunicato all'Ente ed immediatamente si dovrà provvedere ad apporre il segno di distinzione sui capi nuovi. Nel caso in cui se pur contraddistinti con il segno particolare l'interessato immetta al pascolo un numero di capi superiore a quello autorizzato, a titolo di penale sarà tenuto al pagamento della somma corrispondente alla fida per quel singolo capo di bestiame moltiplicata per 4 (quattro).

**28- Graduatoria criteri di demerito**

1. Nella necessità di stilare una graduatoria, costituiranno elemento di giudizio negativo:
   a. l'aver usufruito dei pascoli per il maggior numero di anni consecutivi;
   b. la cattiva condotta morale e civile;
   c. non essere capo di famiglia;

d. non essere allevatore a titolo principale;

e. l'essere stato sanzionato per l'introduzione di animali non aventi diritto alla fida pascolo.

**29- Pascolo anticipato o posticipato**

1. L'ingresso arbitrato nelle sezioni di pascolo prima delle date fissate all'articolo 13, comma 2, del presente Regolamento o l'uscita dopo la data fissata dal predetto articolo, nonché la mancata denuncia preventiva di ingresso previsti all'articolo 21 e la mancata marchiatura del bestiame comporta il pagamento del quadruplo della fida stabilita per ogni singolo capo e l'espulsione dal territorio demaniale. Qualora l'infrazione interessi la parte sanitaria, si procede con denuncia all'Autorità Giudiziaria.

**30- Sanzioni**

1. L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l'anno in corso non ha diritto all'ingresso nelle terre demaniali per gli anni successivi.

2. Saranno applicati gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati entro i termini stabili dal precedente articolo 20.

3. Per le violazioni delle norme vigenti in merito all'esercizio del pascolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 25, commi 7 e 8, e all'allegato C, tabella B. bis, della L.R. n. 11/1996.

**31- Tariffe di fida pascolo**

1. Si precisa che sono tassabili soltanto i capi bovini che abbiano compiuto l'anno e gli ovini che abbiano compiuto i sei mesi.

2. Ai fini della determinazione del carico e delle relative penalità, dovrà farsi riferimento alle seguenti equivalenze per cui II prezzo previsto per la fida pascolo per ogni capo di bestiame quali gli ovini, caprini, bovini ed equini è il seguente:

   - Vacca, bove, cavallo, asino € 32,00;

   - Ovino, caprino € 5,00

Come stabilito con Delibera di Giunta Comunale n. 114 del 12/11/2025.

3. Per fatti eccezionali e per eventuale carico l'Amministrazione comunale ha la facoltà di assegnare una particolare zona per il pascolo degli equini, sempre per fatti eccezionali e per eventuale eccessivo carico potrà ridurre in percentuale i capi, di qualsiasi natura, da immettere al pascolo.

**32- Destinazione dei proventi di fida**

1. Le entrate della fida pascolo verranno depositate su apposito capitolo del bilancio comunale e saranno destinate esclusivamente al miglioramento dei pascoli ed alle condizioni di vita degli allevatori, nonché alla manutenzione/miglioramento delle infrastrutture propedeutiche e dedicate all'esercizio delle attività silvo-pastorali (manutenzione viabilità e sentieristica di accesso e servizio alle aree pascolive, manutenzione ai fontanili, abbeveratoi, cisterne).

**33- Controlli**

2. Il controllo dei terreni soggetti a pascolo è esercitato dai Carabinieri Forestali e dal Comando di

Polizia Municipale.

3. Il controllo igienico-sanitario del bestiame ammesso al pascolo sarà attuato dal personale delle strutture del Servizio Sanitario Veterinario competenti per territorio.

### 34- Modifiche

1. Per la modifica del Regolamento ne rispetto delle leggi vigenti, è richiesta specifica deliberazione del Consiglio comunale.

### 35- Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme europee, statali e regionali vigenti in materia.
2. La mancata osservanza da parte degli attuali occupatori, del secondo comma dell'articolo 3 del Regolamento oltre al recupero delle somme dovute a titolo di canone determina l'attivazione delle procedure statali e regionali di reintegro sulla scorta del Capo IV del R. D. 332/1928.

## Cap. 17 - Registro di tassazione

Compresa A

- Riepilogo schema 2 – art- 90 comma 2;
- Piano dei Tagli - schema 3 - Art. 91, comma 2, e art. 97;
- Schema 4/a- art 107;

Compresa BV

- Riepilogo schema 2 – art- 90 comma 2;
- Schema 4/a- art 107;

Compresa C

- Riepilogo schema 2 – art- 90 comma 2;
- Piano dei Tagli - schema 3 - Art. 91, comma 2, e art. 97;
- Schema 4/a - art 107;

Compresa FD

- Riepilogo schema 2 – art- 90 comma 2;
- Piano dei Tagli - schema 3 - Art. 91, comma 2, e art. 97;
- Schema 4/a - art 107;

Compresa P
- Riepilogo schema 2 – art- 90 comma 2;
- Schema 4/a - art 107;

Compresa Pascoli

- Riepilogo schema 2 – art- 90 comma 2;
- Piano degli interventi - schema 3 Art. 91, comma 2, e art. 97;
- Schema 4/a – art 107;

Compresa V

- Riepilogo schema 2 – art- 90 comma 2;
- Schema 4/a - art 107;

Riepilogo generale comprese – art. 108;

Riepilogo generale Piano dei tagli – art. 108.

## Allegati

- Alberi modello
- Riepilogo generale delle particelle forestali
- Riepilogo generale del piano dei tagli
- Libro economico
- Pareri, nulla osta ed autorizzazioni degli Enti competenti
- Dichiarazione del tecnico assestatore incaricato

## Cartografia

- Inquadramento generale – su base IGM – scala 1:25.000;
- Carta Silografica su base CTR – scala di stampa 1:10.000;
- Carta Silografica su base Catastale - scala di stampa 1:10.000;
- Carta geologica – su base C.G. N. in scala 1:100000 – scala di stampa 1:25.000;
- Carta dei miglioramenti su base CTR - scala 1:10.000;
- Carta dei tipi strutturali su base CTR - scala 1:10.000;
- Carta degli interventi selvicolturali su base CTR - scala 1:10.000;
- Carta dei vincoli su base CTR - scala 1:10.000;
- Carta del rischio da Frana in scala – PSAI – scala 1:10.000;
- Carta della Pericolosità da Frana in scala – PSAI – scala 1:10.000;
- Carta del rischio Idraulico - PSAI – scala 1:25.000;
- Carta degli usi civici su base Catastale - scala 1:10.000.

SCHEMA 2

# PARTICELLE FORESTALI DELLA CLASSE ECONOMICA/COMPRESA "A"

**Art. 90, comma 2, del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Particella forestale | | | | | | Dati catastali | | Area protetta - zonizzazione | | | Aree percorse dal Fuoco | | *Vincoli | Dati Dendrometrici | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località | n° | Superficie in Ha | | | | Foglio | Particella | A | B | C | | | | Densità | | Pr unitaria mc/Ha | Pr totale mc | ***Pp unitaria mc/Ha | ***Pp totale mc | Incremento (medio) mc | Età all'anno di redazione del PGF |
| | | Totale | Bosco | Pascolo - prati - radure | Altro | | | Ha | Ha | Ha | Anno | Ha | | A.B. unitaria mq/Ha | **Soggetti n°/Ha | | | | | | |
| Peta di Piscacca | 6 | 16,15 | 16,15 | 0,00 | | 7 | 23-24-26-30p | | 16,15 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 37,51 | 640 | 411,1 | 6.639,82 | | | 4,11 | 90-110 |
| Piscacca | 7 | 12,96 | 11,39 | 1,57 | | 7 | 22p-30p | | 12,96 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 44,91 | 653 | 504,9 | 5.750,98 | | | 6,31 | 70-90 |
| Peta di Piscacca | 14 | 14,89 | 14,71 | 0,18 | | 7 | 22p-30p | | 14,89 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 43,70 | 714 | 507,1 | 7.459,36 | | | 5,07 | 90-110 |
| Piscacca | 15 | 10,71 | 9,52 | 1,19 | | 7 | 22p-30p | | 10,71 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 42,49 | 686 | 455,1 | 4.334,71 | | | 4,55 | 90-110 |
| Valle del Pero | 60 | 7,22 | 7,22 | 0,00 | | 13 | 15p-16p | | 7,22 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 42,29 | 901 | 454,0 | 3.276,24 | | | 4,54 | 90-110 |
| Valle Foce di Capo Sele | 79 | 13,63 | 13,51 | 0,12 | | 12 | 1p-48p-176-177 | | 13,21 | 0,42 | | | a/b/c/d/g/i/m | 39,93 | 1534 | 355,2 | 4.799,51 | | | 4,44 | 70-90 |
| | | | | | | 13 | 9p-11p-70p-71p-72p-73p-74p-75p-76p-77p | | | | | | | | | | | | | | |
| Valle del Pero | 81 | 12,26 | 11,94 | 0,32 | | 13 | 9p-15p-16p-127p | | 12,26 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,03 | 650 | 456,1 | 5.445,39 | | | 4,56 | 90-110 |
| Colle del Leone | 95a | 17,06 | 17,02 | 0,04 | | 11 | 29p | | 13,04 | 4,01 | | | a/b/c/d/g/i/m | 37,14 | 762 | 420,5 | 7.157,06 | | | 4,20 | 90-110 |
| | | | | | | 18 | 11p | | | | | | | | | | | | | | |
| Felicecchia | 95b | 11,31 | 11,15 | 0,16 | | 18 | 11p | | 11,11 | 0,20 | | | a/b/c/d/g/i/m | 42,13 | 1144 | 423,3 | 4.720,85 | | | 4,23 | 90-110 |
| Corticella | 96 | 26,62 | 26,42 | 0,20 | | 18 | 8p-11p | | 21,85 | 4,77 | | | a/b/c/d/g/i/m | 48,60 | 1161 | 548,6 | 14.492,60 | | | 5,49 | 90-110 |
| Valle Grande | 109a | 11,29 | 11,29 | 0,00 | | 18 | 11p | | 9,80 | 1,49 | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,39 | 1323 | 554,3 | 5.755,18 | | | 4,62 | 110-130 |
| Fossa della Neve | 109b | 10,82 | 10,82 | 0,00 | | 18 | 11p | | 10,75 | 0,07 | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,40 | 1358 | 574,1 | 5.997,30 | | | 4,10 | 130-150 |
| Fossa della Neve | 110 | 26,99 | 26,56 | 0,43 | | 18 | 11p | | 26,81 | 0,18 | | | a/b/c/d/g/i/m | 44,73 | 1089 | 523,3 | 13.895,83 | | | 4,36 | 110-130 |
| Scaffa | 111 | 15,84 | 15,60 | 0,24 | | 18 | 11p | | 13,54 | 2,30 | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,67 | 593 | 649,5 | 10.129,42 | | | 5,41 | 110-130 |
| | | | | | | 19 | 43 | | | | | | | | | | | | | | |
| Lagarello | 115 | 17,52 | 15,78 | 1,74 | | 20 | 1p-2-12p-17-23-24-25-41-42 | | 17,50 | 0,02 | | | a/b/c/d/g/i/m | 38,67 | 608 | 443,4 | 6.995,86 | | | 4,43 | 90-110 |
| | | | | | | 25 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| Lagarello | 117 | 12,32 | 11,99 | 0,33 | | 20 | 12p-13p | | 12,32 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 30,94 | 721 | 340,7 | 4.085,95 | | | 3,41 | 90-110 |
| Lagarello | 118 | 18,58 | 15,43 | 3,15 | | 20 | 5p-7-12p-29-30-33p | | 18,58 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,55 | 470 | 645,6 | 9.960,98 | | | 7,17 | 70-90 |
| Raja di Calende | 127 | 11,81 | 11,81 | 0,00 | | 18 | 11p | | 10,37 | 1,44 | | | a/b/c/d/g/i/m | 43,15 | 828 | 550,8 | 6.503,17 | | | 4,59 | 110-130 |
| Valle Piana | 128 | 12,06 | 11,57 | 0,49 | | 18 | 11p | | 11,41 | 0,65 | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,86 | 1391 | 468,8 | 5.422,42 | | | 5,21 | 70-90 |
| Teatro | 129 | 12,85 | 12,76 | 0,09 | | 18 | 11p | | 8,16 | 4,69 | | | a/b/c/d/g/i/m | 54,17 | 871 | 687,3 | 8.770,15 | | | 5,29 | 110-130 |
| | | | | | | 29 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| Lagarello | 133 | 9,66 | 8,90 | 0,76 | | 20 | 12p-13p | | 9,66 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 40,16 | 498 | 523,5 | 4.659,68 | | | 4,76 | 90-110 |
| Corsa dei Cavalli | 134 | 17,27 | 17,17 | 0,10 | | 20 | 12p-13p | | 17,27 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 48,99 | 671 | 576,4 | 9.897,83 | | | 4,80 | 110-130 |
| Valle Piana | 142 | 18,17 | 18,17 | 0,00 | | 18 | 11p | | 18,17 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,10 | 1004 | 625,8 | 11.371,23 | | | 5,21 | 110-130 |
| | | | | | | 23 | 29p-33p | | | | | | | | | | | | | | |
| Valle Piana | 143 | 23,06 | 22,99 | 0,07 | | 18 | 11p | | 23,03 | 0,03 | | | a/b/c/d/g/i/m | 42,47 | 667 | 624,5 | 14.353,13 | | | 4,46 | 130-150 |
| Valle Piana | 144 | 12,71 | 12,66 | 0,05 | | 18 | 11p | | 9,99 | 2,72 | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,87 | 1053 | 588,9 | 7.456,22 | | | 4,91 | 110-130 |
| Valle Piana | 145 | 16,87 | 16,86 | 0,01 | | 18 | 11p | | 13,01 | 3,86 | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,57 | 1053 | 650,6 | 10.966,35 | | | 5,42 | 110-130 |
| Teatro | 146 | 18,85 | 18,80 | 0,05 | | 18 | 11p | | 14,26 | 4,59 | | | a/b/c/d/g/i/m | 40,72 | 770 | 490,8 | 9.226,09 | | | 4,09 | 110-130 |
| | | | | | | 24 | 330p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 29 | 1p-5p | | | | | | | | | | | | | | |
| Cervarolo di Sazzano | 150 | 21,55 | 21,49 | 0,06 | | 20 | 11p-12p-13p | | 21,55 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 39,76 | 549 | 524,1 | 11.261,31 | | | 4,37 | 110-130 |
| | | | | | | 25 | 12p | | | | | | | | | | | | | | |
| Cervarolo di Sazzano | 151 | 19,82 | 17,33 | 2,49 | | 20 | 13p | | 19,66 | 0,16 | | | a/b/c/d/g/i/m | 31,81 | 364 | 395,5 | 6.854,78 | | | 13,18 | 10-30 |
| | | | | | | 25 | 10p-12p-21p-23p-24p-31p-33p | | | | | | | | | | | | | | |
| Cervarolo di Sazzano | 152 | 15,90 | 15,87 | 0,03 | | 25 | 12p | | 15,90 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 38,38 | 489 | 471,5 | 7.481,12 | | | 15,72 | 10-30 |
| Orno | 162 | 27,59 | 27,59 | 0,00 | | 23 | 29p-33p | | 27,59 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 51,09 | 1044 | 660,4 | 18.221,50 | | | 5,50 | 130-150 |
| Orno | 163 | 12,59 | 12,59 | 0,00 | | 18 | 23 | | 12,59 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 41,16 | 532 | 623,8 | 7.854,42 | | | 5,20 | 130-150 |
| | | | | | | 23 | 29p | | | | | | | | | | | | | | |
| Valle Piana | 164 | 26,74 | 26,74 | 0,00 | | 18 | 11p | | 26,74 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 50,45 | 779 | 717,7 | 19.195,34 | | | 5,98 | 130-150 |
| Valle Piana | 165 | 8,60 | 8,60 | 0,00 | | 18 | 11p | | 8,60 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 42,39 | 602 | 610,0 | 5.248,35 | | | 5,08 | 130-150 |
| Vallone Scurillo | 166 | 32,90 | 32,70 | 0,20 | | 18 | 11p | | 25,84 | 7,06 | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,05 | 841 | 700,0 | 22.893,66 | | | 5,83 | 130-150 |
| | | | | | | 24 | 330p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 29 | 1p-5p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 30 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creta Rossa | 167 | 37,65 | 37,54 | 0,11 | | 18<br>24<br>30<br>33 | 11p<br>330p<br>1p<br>1p | | 34,00 | 3,65 | | | a/b/c/d/g/i/m | 53,68 | 986 | 706,0 | 26.502,45 | | | 5,88 | 130-150 |
| Serroncelli | 169 | 17,92 | 17,89 | 0,03 | | 24<br>30<br>31<br>33 | 330p<br>1p<br>17p-Y901p<br>1p | | | 17,92 | | | a/b/c/d/g/i/m | 63,07 | 674 | 859,3 | 15.373,90 | | | 7,16 | 130-150 |
| Serroncelli | 170 | 12,62 | 12,60 | 0,02 | | 24<br>30<br>31 | 330p<br>1p<br>7-11-17p-49-Y901p | | | 12,62 | | | a/b/c/d/g/i/m | 58,26 | 878 | 813,4 | 10.249,18 | | | 6,78 | 130-150 |
| Cervarolo di Sazzano | 173 | 9,95 | 9,10 | 0,85 | | 25 | 12p-32-33p-34p-40p-41p-42p | | 9,95 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 48,00 | 539 | 641,8 | 5.842,88 | | | 5,35 | 110-130 |
| Cervarolo di Sazzano | 174 | 24,88 | 24,67 | 0,21 | | 25 | 12p | | 24,88 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 51,44 | 1042 | 624,5 | 15.407,51 | | | 6,24 | 90-110 |
| Apeticchia | 187 | 20,42 | 20,40 | 0,02 | | 23 | 29p | | 20,37 | 0,05 | | | a/b/c/d/g/i/m | 53,85 | 2064 | 492,4 | 10.042,54 | | | 4,92 | 90-110 |
| Apeticchia | 188 | 15,60 | 15,55 | 0,05 | | 18<br>23 | 11p<br>29p | | 15,60 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 51,79 | 769 | 726,4 | 11.298,37 | | | 6,05 | 110-130 |
| Montagna Grande | 189 | 24,37 | 24,36 | 0,01 | | 18<br>23 | 11p<br>29p | | 24,37 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 44,40 | 739 | 586,6 | 14.290,68 | | | 4,89 | 130-150 |
| Ripa di Moggio | 190 | 12,93 | 12,93 | 0,00 | | 18 | 11p | | 12,93 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 38,67 | 877 | 454,8 | 5.882,28 | | | 3,79 | 110-130 |
| Filettone | 191 | 32,71 | 32,59 | 0,12 | | 18<br>23<br>24 | 11p<br>29p<br>330p | | 23,00 | 9,71 | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,55 | 934 | 545,9 | 17.789,46 | | | 4,55 | 110-130 |
| Terremoto | 192 | 36,38 | 36,37 | 0,01 | | 18<br>24<br>24<br>33 | 11p<br>311p<br>330p<br>1p | | 6,28 | 30,10 | | | a/b/c/d/g/i/m | 52,28 | 986 | 708,9 | 25.779,80 | | | 5,91 | 130-150 |
| Serra dei Frasci | 193 | 19,98 | 19,96 | 0,02 | | 24<br>31 | 278-279-280-281-297p-298p-299p-300p-328-330p-X1p<br>17p-Y901p | | | 19,98 | | | a/b/c/d/g/i/m | 44,80 | 620 | 644,2 | 12.858,01 | | | 5,37 | 130-150 |
| Serroncelli Soprani | 194 | 11,99 | 11,98 | 0,01 | | 24<br>30<br>33 | 275-286-291-295-296-297p-298p-299p-300p-330p-X1p<br>1p<br>1p | | | 11,99 | | | a/b/c/d/g/i/m | 48,95 | 1063 | 640,7 | 7.673,12 | | | 5,34 | 130-150 |
| Serroncelli Soprani | 198 | 17,70 | 16,81 | 0,89 | | 25 | 12p-42p | | 17,69 | 0,01 | | | a/b/c/d/g/i/m | 29,43 | 330 | 426,2 | 7.164,28 | | | 21,31 | 10-30 |
| Cervarolo di Sazzano | 199 | 14,12 | 14,12 | 0,00 | | 25 | 12p | 9,58 | 4,54 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 50,92 | 605 | 700,6 | 9.892,12 | | | 5,84 | 130-150 |
| Cervarolo di Sazzano | 204 | 12,28 | 11,85 | 0,43 | | 23 | 29p-33p | | 12,28 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 54,30 | 1244 | 647,7 | 7.673,03 | | | 8,10 | 70-90 |
| Fossa della Neve | 205b | 11,18 | 11,18 | 0,00 | | 23 | 29p | | 11,19 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,40 | 1358 | 574,1 | 6.416,66 | | | 4,78 | 130-150 |
| Apeticchia | 208 | 35,41 | 35,39 | 0,02 | | 24<br>25 | 330p<br>12p | | 26,82 | 8,59 | | | a/b/c/d/g/i/m | 53,85 | 803 | 731,1 | 25.871,89 | | | 6,09 | 130-150 |
| Stretta dell'Acernese | 209 | 31,70 | 31,52 | 0,18 | | 24<br>25<br>31 | 330p<br>12p<br>17p-18p | | 29,26 | 2,44 | | | a/b/c/d/g/i/m | 54,69 | 1286 | 674,9 | 21.270,91 | | | 5,62 | 110-130 |
| Coste di Cervialto | 211 | 21,59 | 21,59 | 0,00 | | 25 | 12p | 0,38 | 20,19 | 1,02 | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,14 | 986 | 624,3 | 13.481,29 | | | 4,16 | 130-150 |
| Coste di Cervialto | 212 | 29,47 | 29,38 | 0,09 | | 25 | 12p | 28,38 | 1,09 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,43 | 855 | 584,8 | 17.184,32 | | | 4,50 | 110-130 |
| Valle Giamberardino | 215 | 3,49 | 3,49 | 0,00 | | 25 | 12p | 2,57 | 0,92 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 50,02 | 156 | 882,2 | 3.075,08 | | | 5,88 | 130-150 |
| Impiccato | 220 | 22,81 | 22,80 | 0,01 | | 27 | 3p-151p | | 22,81 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 50,70 | 452 | 718,9 | 16.394,23 | | | 4,79 | 130-150 |
| Valle d'Acero | 221 | 8,36 | 8,33 | 0,03 | | 27 | 3p-151p | | 8,36 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 48,32 | 490 | 731,5 | 6.096,84 | | | 6,10 | 110-130 |
| Apeticchia | 222a | 16,56 | 16,56 | 0,00 | | 27 | 151p | | 16,56 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 43,32 | 473 | 550,5 | 9.115,62 | | | 4,59 | 110-130 |
| Apeticchia | 223a | 10,58 | 10,58 | 0,00 | | 27 | 151p | | 10,58 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 43,97 | 517 | 578,0 | 6.113,21 | | | 4,13 | 130-150 |
| Terremoto | 224b | 6,50 | 6,50 | 0,00 | | 27<br>28 | 151p<br>1p | | 6,50 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 53,33 | 397 | 782,0 | 5.080,22 | | | 5,59 | 130-150 |
| | | | | | | 24 | 330p | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle d'Acero | 225 | 16,29 | 16,29 | 0,00 | | 27 | 151p-162 | | 15,92 | 0,37 | | | a/b/c/d/g/i/m | 62,70 | 1056 | 715,1 | 11.646,51 | | | 5,96 | 110-130 |
| | | | | | | 28 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| Valle d'Acero | 228 | 24,40 | 24,00 | 0,40 | | 24 | 3p-330p | | 23,79 | 0,61 | | | a/b/c/d/g/i/m | 50,50 | 936 | 655,9 | 15.740,71 | | | 5,47 | 110-130 |
| Sette Valli | 229 | 34,06 | 33,85 | 0,21 | | 24 | 3p-46-47-48-49-330p-332p | | 24,34 | 9,72 | | | a/b/c/d/g/i/m | 50,27 | 1052 | 656,5 | 22.221,33 | | | 5,05 | 110-130 |
| Sette Valli | 230 | 35,75 | 35,72 | 0,03 | | 24 | 330p | | 30,71 | 5,04 | | | a/b/c/d/g/i/m | 56,74 | 1272 | 694,5 | 24.812,18 | | | 5,34 | 110-130 |
| | | | | | | 25 | 12p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 26 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| Chiuvarelli | 232 | 40,81 | 40,72 | 0,09 | | 24 | 3p-4p-330p | | 40,73 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,86 | 814 | 684,9 | 27.884,35 | | | 4,565745865 | 130-150 |
| | | | | | | 25 | 12p | 0,08 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 26 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallone del Turco | 233 | 34,69 | 34,69 | 0,00 | | 24 | 330p | | 34,57 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 58,66 | 1369 | 759,5 | 26.344,30 | | | 6,33 | 110-130 |
| | | | | | | 25 | 12p | 0,12 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 26 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallone del Turco | 235 | 13,14 | 13,14 | 0,00 | | 25 | 12p | | 0,45 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 43,73 | 627 | 550,6 | 7.234,29 | | | 5,23 | 110-130 |
| | | | | | | 26 | 1p | 12,69 | | | | | | | | | | | | | |
| Coste di Cervialto | 236 | 11,10 | 11,10 | 0,00 | | 25 | 12p | 11,02 | 0,08 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 38,43 | 1564 | 376,3 | 4.178,65 | | | 3,76 | 90-110 |
| Coste di Cervialto | 240 | 7,36 | 6,75 | 0,61 | | 25 | 12p | 7,36 | | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 653,6 | 4.409,75 | | | 5,45 | 110-130 |
| Coste di Cervialto | 247 | 14,20 | 13,78 | 0,42 | | 27 | 3p-151p | | 14,20 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 54,60 | 806 | 629,6 | 8.676,71 | | | 6,30 | 90-110 |
| Coste di Cervialto | 248 | 12,92 | 12,92 | 0,00 | | 27 | 151p | | 12,92 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 56,38 | 509 | 782,8 | 10.115,12 | | | 5,22 | 130-150 |
| Impiccato | 250 | 22,87 | 22,86 | 0,01 | | 27 | 151p | | 22,87 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 51,26 | 522 | 719,4 | 16.445,48 | | | 4,80 | 130-150 |
| Scarrupata | 251 | 13,98 | 13,98 | 0,00 | | 27 | 151p | | 13,98 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 51,54 | 586 | 736,6 | 10.295,25 | | | 5,26 | 130-150 |
| Valle d'Acero | 253 | 11,59 | 11,59 | 0,00 | | 27 | 151p | | 11,59 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 52,67 | 556 | 795,6 | 9.223,16 | | | 6,12 | 130-150 |
| | | | | | | 28 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| Valle d'Acero | 254 | 15,01 | 15,01 | 0,00 | | 28 | 1p | | 15,01 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 57,23 | 647 | 889,3 | 13.347,26 | | | 7,41 | 130-150 |
| Terremoto | 255a | 9,19 | 9,18 | 0,01 | | 27 | 151p | | 9,19 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 55,51 | 563 | 845,6 | 7.765,07 | | | 7,05 | 130-150 |
| | | | | | | 28 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| Terremoto | 255b | 12,00 | 12,00 | 0,00 | | 27 | 151p | | 12,00 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,65 | 457 | 776,6 | 9.315,82 | | | 6,47 | 130-150 |
| | | | | | | 28 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| Valle d'Acero | 256 | 17,21 | 17,18 | 0,03 | | 24 | 330p | | 17,21 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 55,25 | 763 | 720,0 | 12.369,50 | | | 6,00 | 110-130 |
| | | | | | | 27 | 151p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 28 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| Valle d'Acero | 257 | 8,93 | 8,87 | 0,06 | | 24 | 330p | | 8,93 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 41,48 | 399 | 631,5 | 5.601,97 | | | 5,26 | 110-130 |
| | | | | | | 28 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| Valle d'Acero | 258 | 32,27 | 32,21 | 0,06 | | 24 | 330p | | 32,27 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 46,30 | 484 | 574,4 | 18.502,59 | | | 5,74 | 90-110 |
| | | | | | | 28 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| Valle d'Acero | 259 | 27,71 | 27,14 | 0,57 | | 24 | 3p-330p | | 27,71 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 51,36 | 1077 | 610,7 | 16.576,11 | | | 5,09 | 110-130 |
| | | | | | | 28 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| Pagliarolo | 260 | 19,87 | 19,76 | 0,11 | | 24 | 3p-4p | | 19,87 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,90 | 777 | 688,5 | 13.603,31 | | | 6,88 | 90-110 |
| | | | | | | 26 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 28 | 1p-2p-3p-4p | | | | | | | | | | | | | | |
| Valle d'Acero | 261a | 16,20 | 16,20 | 0,00 | | 26 | 1p | | 16,20 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,85 | 1028 | 658,7 | 10.672,27 | | | 5,49 | 110-130 |
| Valle d'Acero | 261b | 14,86 | 14,86 | 0,00 | | 26 | 1p | 0,76 | 14,10 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 40,93 | 1688 | 420,8 | 6.253,58 | | | 4,21 | 90-110 |
| Pagliarolo | 262 | 16,87 | 16,87 | 0,00 | | 26 | 1p | | 16,87 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 40,89 | 1042 | 483,5 | 8.154,82 | | | 4,03 | 110-130 |
| Chiuvarelli | 263 | 24,81 | 24,81 | 0,00 | | 26 | 1p | 22,30 | 2,51 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,84 | 960 | 585,3 | 14.523,02 | | | | indeterminata |
| Piano dei Vaccari | 271 | 9,54 | 9,54 | 0,00 | | 27 | 151p | | 9,54 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 50,00 | 406 | 791,2 | 7.543,93 | | | 6,59 | 130-150 |
| Piano Acernese | 272 | 24,79 | 24,77 | 0,02 | | 27 | 151p | | 24,79 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 605,7 | 15.004,61 | | | 20,19 | 10-30 |
| Vallebona | 273 | 0,93 | 0,93 | 0,00 | | 27 | 151p | | 0,93 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,00 | | | | indeterminata |
| Vallebona | 274 | 25,84 | 25,82 | 0,02 | | 27 | 151p | | 25,84 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 57,01 | 817 | 678,8 | 17.525,37 | | | 5,22 | 110-130 |
| Raia della Scannella | 275 | 19,12 | 19,12 | 0,00 | | 27 | 151p | | 19,12 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 46,19 | 546 | 621,8 | 11.887,55 | | | 4,78 | 110-130 |
| Valle d'Acero | 276a | 10,31 | 10,29 | 0,02 | | 27 | 151p | | 10,31 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 56,26 | 653 | 662,6 | 6.818,63 | | | 5,93 | 90-110 |
| Valle d'Acero | 276b | 12,54 | 12,54 | 0,00 | | 27 | 151p | | 12,54 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 54,44 | 809 | 669,6 | 8.398,84 | | | 7,36 | 90-110 |
| Vallebona | 277 | 18,56 | 18,56 | 0,00 | | 27 | 151p | | 13,48 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,76 | 565 | 587,0 | 10.891,96 | | | 4,89 | 130-150 |
| | | | | | | 28 | 1p | 5,08 | | | | | | | | | | | | | |
| Vallebona | 278 | 9,10 | 8,83 | 0,27 | | 27 | 151p | | 9,10 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 38,46 | 507 | 449,7 | 3.968,63 | | | 14,99 | 10-30 |
| | | | | | | 28 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vallebona | 279 | 11,41 | 11,41 | 0,00 | | 27<br>28 | 151p<br>1p | 2,28 | 9,13 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 40,14 | 364 | 706,6 | 8.059,76 | | | 5,89 | 130-150 |
| Vallebona | 280 | 12,50 | 12,50 | 0,00 | | 28 | 1p | | 12,50 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 42,88 | 437 | 995,4 | 12.445,64 | | | 6,64 | 130-150 |
| Vallone dell'Acero | 282 | 22,04 | 21,54 | 0,50 | | 28 | 1p | | 22,04 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 29,76 | 295 | 602,4 | 12.975,58 | | | 20,08 | 10-30 |
| Vallone dell'Acero | 284 | 17,45 | 17,45 | 0,00 | | 28 | 1p | | 17,45 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 43,24 | 416 | 642,4 | 11.206,95 | | | 4,28 | 130-150 |
| Conca di Marco | 285 | 17,05 | 16,87 | 0,18 | | 28 | 1p-5p | 0,21 | 16,84 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 30,03 | 316 | 578,7 | 9.760,98 | | | 19,29 | 10-30 |
| Conca di Marco | 286 | 18,28 | 18,22 | 0,06 | | 28 | 1p | | 18,28 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 43,93 | 567 | 641,1 | 11.678,64 | | | 21,37 | 10-30 |
| Valle d'Acero | 288a | 20,22 | 20,01 | 0,21 | | 28<br>28 | 1p<br>5p | | 20,22 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 37,19 | 584 | 598,7 | 11.978,22 | | | 19,96 | 10-30 |
| Piano Acernese | 288b | 21,68 | 21,57 | 0,11 | | 28 | 1p | | 21,68 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,35 | 489 | 787,0 | 16.976,21 | | | 5,25 | 130-150 |
| Conca di Marco | 291 | 28,65 | 28,62 | 0,03 | | 26<br>28 | 1p-3p-4p<br>1p-5p-6p-7p-8 | | 28,65 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 54,53 | 1274 | 699,5 | 20.016,97 | | | 5,38 | 110-130 |
| Sierro della Zà Popa | 292 | 24,83 | 24,79 | 0,04 | | 26<br>28 | 1p<br>1p-4p-5p | | 24,83 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 53,20 | 948 | 684,1 | 16.962,28 | | | 6,22 | 90-110 |
| Colle del Leone | 294 | 27,74 | 27,72 | 0,02 | | 26<br>28 | 1p<br>1p-4p-5p-7p | | 27,74 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 44,74 | 630 | 642,1 | 17.801,05 | | | 4,28 | 130-150 |
| Piano Acernese | 295a | 15,83 | 15,71 | 0,12 | | 26<br>28 | 1p<br>1p-4p | | 15,83 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 43,75 | 897 | 480,2 | 7.545,81 | | | 4,37 | 90-110 |
| Vallebona | 295b | 19,28 | 19,18 | 0,10 | | 26 | 1p | | 19,28 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 34,99 | 1529 | 297,4 | 5.704,78 | | | 3,30 | 70-90 |
| Colle del Leone | 296 | 8,95 | 8,94 | 0,01 | | 26<br>28 | 1p<br>4p | | 8,95 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 39,91 | 1395 | 359,0 | 3.211,39 | | | 3,26 | 90-110 |
| Colle del Leone | 297 | 23,48 | 19,47 | 4,01 | | 26<br>28 | 1p<br>4p | | 23,48 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 41,68 | 1406 | 386,2 | 7.521,63 | | | 4,29 | 70-90 |
| Vallone del Cupone | 298 | 10,72 | 10,72 | 0,00 | | 26<br>28 | 1p-4p<br>4p-7p | | 10,72 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 48,46 | 1876 | 505,6 | 5.421,38 | | | 3,89 | 110-130 |
| Vallone del Cupone | 300 | 23,92 | 23,90 | 0,02 | | 26 | 1p | 20,81 | 3,10 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,75 | 1097 | 502,0 | 11.998,93 | | | 7,17 | 50-70 |
| Felicecchia | 301 | 19,49 | 17,65 | 1,84 | | 26 | 1p | | 19,49 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 33,49 | 1224 | 290,8 | 5.131,88 | | | 3,23 | 70-90 |
| Felicecchia | 302 | 20,89 | 20,86 | 0,03 | | 26 | 1p | 20,00 | 0,89 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,78 | 674 | 589,8 | 12.300,73 | | | 4,91 | 110-130 |
| Coste di Cervialto | 304 | 22,47 | 21,85 | 0,62 | | 26 | 1p | | 22,47 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 35,98 | 1193 | 341,4 | 7.457,74 | | | 4,27 | 70-90 |
| Colle delle Radici | 305 | 21,65 | 21,32 | 0,33 | | 26 | 1p-5p-8p | | 21,65 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 42,17 | 1588 | 393,4 | 8.387,27 | | | 4,92 | 70-90 |
| Colle delle Radici | 306 | 18,48 | 18,47 | 0,01 | | 26 | 1p | | 18,48 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 46,14 | 761 | 531,3 | 9.811,10 | | | 5,31 | 90-110 |
| Piano Migliato | 307 | 19,18 | 19,00 | 0,18 | | 26 | 1p | 11,47 | 7,71 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 52,49 | 1214 | 480,9 | 9.135,17 | | | 6,01 | 70-90 |
| Vallebona | 308a | 21,10 | 20,90 | 0,20 | | 26 | 1p-8p | 5,25 | 15,85 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 43,02 | 906 | 480,0 | 10.030,67 | | | 2,53 | 190-210 |
| Colle del Leone | 308b | 7,44 | 7,39 | 0,05 | | 26 | 1p | 6,99 | 0,45 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 64,25 | 1050 | 657,1 | 4.857,05 | | | 6,57 | 90-110 |
| Piano Migliato | 309 | 16,88 | 16,85 | 0,03 | | 26 | 1p-5p-8p | | 16,88 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 39,77 | 1094 | 441,1 | 7.434,22 | | | 3,68 | 110-130 |
| Colle delle Radici | 310 | 23,71 | 23,67 | 0,04 | | 26 | 1p-5p-6-7p-8p | | 23,71 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 43,54 | 842 | 487,4 | 11.537,81 | | | 4,87 | 90-110 |
| Piano Migliato | 311 | 15,05 | 14,02 | 1,03 | | 26 | 1p-5p-7p-8p | | 15,05 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 44,56 | 1040 | 518,0 | 7.261,11 | | | 4,71 | 90-110 |
| **TOTALI** | | **2263,51** | **2233,59** | **29,93** | **0,00** | | | **167,33** | **1930,19** | **172,48** | | | | | | | **1.344.917,26** | | **-** | | |

* = Vincoli:

| | |
|---|---|
| a | Idrogeologico (L. 3267/1923) |
| b | Autorità di Bacino (L. 18 maggio 1989, n. 183 – L. R. 07/02/1994, n. 8) |
| c | Uso civico (L. 1766/1927 – L. R. 11/1981) |
| d | Bellezze naturali (L. 1497/1939 transitata nel D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) |
| e | Piani territoriali paesaggistici (ai sensi dell'art. 149 del D.lgs. 29/10/99, n. 490) |
| f | Parco Nazionale (L. 6 dicembre 1991, n. 394) |
| g | Parco Regionale (L. R. 1 settembre 1993, n. 33) |
| h | Riserva, altro (L. 6 dicembre 1991, n. 394) |
| i | Legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 21 novembre 2000, n. 353) |
| l | Conflitti di proprietà e/o di confinazione tra le aree oggetto di pianificazione ed altri Soggetti privati e/o pubblici |
| m | Rete Natura 2000 |
| n | Altro - specificare |

** = Fustaie e fustaie transitorie - *n° soggetti/Ha* ; ceduo - *n° polloni/Ha e n° matricine/Ha*

Pr = Provvigione reale

*** = Se impossibilitati a calcolare la Provvigione potenziale/normale fornire motivazione

Pp = Provvigione potenziale

SCHEMA 3

# PIANO DEI TAGLI - CLASSE ECONOMICA/COMPRESA A

**Art. 91, comma 2, e art. 97 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno di intervento | Particella forestale | | | | | Area protetta - zonizzazione | | | *Vincoli | Provvigione | | | Alto Fusto - Cedui in conversione | | Descrizione Intervento | Saggio di Utilizzazione % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A | B | C | | | | | | | | |
| | n° | | Superficie totale Ha | Superficie utile boscata Ha | Età al taglio | Ha | Ha | Ha | | Provvigione unitaria mc | Provvigione totale mc | Provvigione totale post intervento mc | Ripresa unitaria mc | Ripresa totale mc | | |
| 2026-2028 | 109a | 109a | 11,29 | 11,29 | 110-130 | | 9,80 | 1,49 | a/b/c/d/g/i/m | 554,28 | 5.755,18 | 4.605,18 | 101,86 | 1.150 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 19,98 |
| 2026-2028 | 109b | 109b | 10,82 | 10,82 | 130-150 | | 10,75 | 0,07 | a/b/c/d/g/i/m | 574,11 | 5.997,30 | 4.797,30 | 110,91 | 1.200 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,01 |
| 2026-2028 | 110 | 110 | 26,99 | 25,56 | 110-130 | | 26,81 | 0,18 | a/b/c/d/g/i/m | 523,28 | 13.895,83 | 11.075,83 | 110,33 | 2.820 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 21,08 |
| 2026-2028 | 127 | 127 | 11,81 | 11,81 | 110-130 | | 10,37 | 1,44 | a/b/c/d/g/i/m | 550,80 | 6.503,17 | 5.393,17 | 93,99 | 1.110 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 17,06 |
| 2026-2028 | 143 | 143 | 23,06 | 22,99 | 130-150 | | 23,03 | 0,03 | a/b/c/d/g/i/m | 624,45 | 14.353,13 | 10.033,13 | 187,91 | 4.320 | Taglio di sementazione che preservi gli alberi del vecchio ciclo colturale rappresentati da grandi soggetti dalla chioma espansa in grado di garantire un'abbondante fruttificazione. Al taglio dovranno cadere i soggetti delle dimensioni minori, sottoposti o dalla chioma filata. | 30,09 |
| 2026-2028 | 144 | 144 | 12,71 | 12,66 | 110-130 | | 9,99 | 2,72 | a/b/c/d/g/i/m | 588,90 | 7.456,22 | 6.186,22 | 100,32 | 1.270 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 17,03 |
| 2026-2028 | 145 | 145 | 16,87 | 16,86 | 110-130 | | 13,01 | 3,86 | a/b/c/d/g/i/m | 650,57 | 10.966,35 | 8.766,35 | 130,49 | 2.200 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,06 |
| 2026-2028 | 165 | 165 | 8,60 | 8,60 | 130-150 | | 8,60 | | a/b/c/d/g/i/m | 609,98 | 5.248,35 | 4.198,35 | 122,09 | 1.050 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,02 |
| 2026-2028 | 209 | 209 | 31,70 | 31,52 | 110-130 | | 29,26 | 2,44 | a/b/c/d/g/i/m | 674,93 | 21.270,91 | 16.990,91 | 135,79 | 4.280 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,12 |
| 2026-2028 | 211 | 211 | 21,59 | 21,59 | 130-150 | 0,38 | 20,19 | 1,02 | a/b/c/d/g/i/m | 624,32 | 13.481,29 | 10.781,29 | 125,06 | 2.700 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,03 |
| 2026-2028 | 220 | 220 | 22,81 | 22,80 | 130-150 | | 22,81 | | a/b/c/d/g/i/m | 718,89 | 16.394,23 | 13.114,23 | 143,86 | 3.280 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,01 |

SCHEMA 3

# PIANO DEI TAGLI - CLASSE ECONOMICA/COMPRESA A

**Art. 91, comma 2, e art. 97 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno di intervento | Particella forestale | | | | | Area protetta - zonizzazione | | | *Vincoli | Provvigione | | | Alto Fusto - Cedui in conversione | | Descrizione Intervento | Saggio di Utilizzazione % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A | B | C | | | | | | | | |
| | n° | | Superficie totale Ha | Superficie utile boscata Ha | Età al taglio | Ha | Ha | Ha | | Provvigione unitaria mc | Provvigione totale mc | Provvigione totale post intervento mc | Ripresa unitaria mc | Ripresa totale mc | | |
| 2026-2028 | 222a | 222a | 16,56 | 16,56 | 110-130 | | 16,56 | | a/b/c/d/g/i/m | 550,54 | 9.115,62 | 7.655,62 | 88,16 | 1.460 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 16,01 |
| 2026-2028 | 223a | 223a | 10,58 | 10,58 | 130-150 | | 10,58 | | a/b/c/d/g/i/m | 578,04 | 6.113,21 | 4.893,21 | 115,31 | 1.220 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 19,95 |
| 2026-2028 | 224b | 224b | 6,50 | 6,50 | 130-150 | | 6,50 | | a/b/c/d/g/i/m | 781,97 | 5.080,22 | 4.060,22 | 156,92 | 1.020 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,07 |
| 2026-2028 | 233 | 233 | 34,69 | 34,69 | 110-130 | 0,12 | 34,57 | | a/b/c/d/g/i/m | 759,47 | 26.344,30 | 21.074,30 | 151,92 | 5.270 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,00 |
| 2026-2028 | 248 | 248 | 12,92 | 12,92 | 130-150 | | 12,92 | | a/b/c/d/g/i/m | 782,79 | 10.115,12 | 8.095,12 | 156,35 | 2.020 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 19,97 |
| 2026-2028 | 250 | 250 | 22,87 | 22,86 | 130-150 | | 22,87 | | a/b/c/d/g/i/m | 719,39 | 16.445,48 | 13.155,48 | 143,92 | 3.290 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,01 |
| 2026-2028 | 255a | 255a | 9,19 | 9,18 | 130-150 | | 9,19 | | a/b/c/d/g/i/m | 845,57 | 7.765,07 | 5.435,07 | 253,81 | 2.330 | Taglio di sementazione che asporti il 30% del volume totale per circa un 50% del numero degli alberi. Andranno eliminati gli alberi di minori dimensioni, lasciando quelli più grandi, dalla chioma più espansa in grado di disseminare abbondantemente. | 30,02 |
| 2026-2028 | 258 | 258 | 32,27 | 32,21 | 90-110 | | 32,27 | | a/b/c/d/g/i/m | 574,41 | 18.502,59 | 13.032,59 | 169,82 | 5.470 | Taglio di sementazione nelle zone di fustaia matura e adulta che asporti il 30% del volume totale per circa un 50% del numero degli alberi. Andranno eliminati gli alberi di minori dimensioni, lasciando a disseminare quelli più grandi, dalla chioma più espansa. Andranno rilasciati alcuni esemplari di ontano e tutti quelli di acero di Lobel, con l'eccezione di quelli dalla chioma compromessa. | 29,56 |
| 2026-2028 | 278 | 278 | 9,10 | 8,83 | 10-30 | | 9,10 | | a/b/c/d/g/i/m | 449,67 | 3.968,63 | 1.568,63 | 271,80 | 2.400 | Taglio di sgombero su circa il 70% della particella, dove il novellame è già affermato. Tagli secondari e di sementazione nel restante 30% della superficie. | 60,44 |
| 2026-2028 | 282 | 282 | 22,04 | 21,54 | 10-30 | | 22,04 | | a/b/c/d/g/i/m | 602,38 | 12.975,58 | 9.425,58 | 164,81 | 3.550 | Taglio secondario modulato sull'andamento della rinnovazione, assumendo a tratti il carattere di uno sgombero, dove il novellame è già affermato. Dove il novellame va insediandosi ma è ancora di dimensioni ridotte, taglio secondario. | 27,36 |
| 2026-2028 | 285 | 285 | 17,05 | 16,87 | 10-30 | 0,21 | 16,84 | | a/b/c/d/g/i/m | 578,75 | 9.760,98 | 6.240,98 | 208,65 | 3.520 | Taglio secondario che in alcuni tratti, dove il novellame è già alto e affermato, dovrà assumere il carattere di uno sgombero. Nel resto della superficie, taglio secondario che asporti circa il 50% della massa. | 36,05 |

SCHEMA 3

# PIANO DEI TAGLI - CLASSE ECONOMICA/COMPRESA A

**Art. 91, comma 2, e art. 97 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno di intervento | Particella forestale | | | | | Area protetta - zonizzazione | | | *Vincoli | Provvigione | | | Alto Fusto - Cedui in conversione | | Descrizione Intervento | Saggio di Utilizzazione % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A | B | C | | | | | | | | |
| | n° | | Superficie totale Ha | Superficie utile boscata Ha | Età al taglio | Ha | Ha | Ha | | Provvigione unitaria mc | Provvigione totale mc | Provvigione totale post intervento mc | Ripresa unitaria mc | Ripresa totale mc | | |
| 2029-2031 | 166 | 166 | 32,90 | 32,70 | 130-150 | | 25,84 | 7,06 | a/b/c/d/g/i/m | 700,02 | 22.893,66 | 15.983,66 | 211,31 | 6.910 | Taglio di sementazione a carico degli alberi di minori dimensioni per circa un 50% del loro numero e del 30% del volume. Nella zona centrale della particella interessata da un sentiero protetto da una staccionata, l'intervento dovrà limitarsi ad un diradamento moderato dal basso che asporti gli alberi sottomessi e quelli che potrebbero risultare pericolosi per chi percorre il sentiero.<br>Quest'ultimo intervento dovrà riguardare anche la zona più a valle prossima alla chiesetta di Santa Nesta. | 30,19 |
| 2029-2031 | 167 | 167 | 37,65 | 37,54 | 130-150 | | 34,00 | 3,65 | a/b/c/d/g/i/m | 705,98 | 26.502,45 | 21.182,45 | 141,72 | 5.320 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,07 |
| 2029-2031 | 191 | 191 | 32,71 | 32,59 | 110-130 | | 23,00 | 9,71 | a/b/c/d/g/i/m | 545,93 | 17.789,46 | 14.579,46 | 98,50 | 3.210 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 18,04 |
| 2029-2031 | 192 | 192 | 36,38 | 32,37 | 130-150 | | 6,28 | 30,10 | a/b/c/d/g/i/m | 708,85 | 25.779,80 | 20.619,80 | 159,41 | 5.160 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 22,49 |
| 2029-2031 | 198 | 198 | 17,70 | 16,81 | 10-30 | | 17,69 | 0,01 | a/b/c/d/g/i/m | 426,20 | 7.164,28 | 4.144,28 | 179,65 | 3.020 | Taglio secondario differenziato secondo l'insediamento della rinnovazione. In alcuni piccoli tratti, in presenza di novellame già insediato, si potrà procedere con un taglio di luce che asporti circa il 50% del volume. In altri, dove non si è intervenuti con il taglio precedente, taglio di rinnovazione che asporti non più del 50% del numero degli alberi scelti tra quelli di minori dimensioni. | 42,15 |
| 2029-2031 | 199 | 199 | 14,12 | 14,12 | 130-150 | 9,58 | 4,54 | | a/b/c/d/g/i/m | 700,58 | 9.892,12 | 8.002,12 | 133,85 | 1.890 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 19,11 |
| 2029-2031 | 208 | 208 | 35,41 | 35,39 | 110-130 | | 26,82 | 8,59 | a/b/c/d/g/i/m | 731,15 | 25.871,89 | 20.691,89 | 146,37 | 5.180 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,02 |
| 2029-2031 | 212 | 212 | 29,47 | 29,38 | 110-130 | 28,38 | 1,09 | | a/b/c/d/g/i/m | 584,80 | 17.184,32 | 14.254,32 | 99,73 | 2.930 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 17,05 |
| 2029-2031 | 215 | 215 | 3,49 | 3,49 | 130-150 | 2,57 | 0,92 | | a/b/c/d/g/i/m | 882,19 | 3.075,08 | 2.455,08 | 177,65 | 620 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,14 |
| 2029-2031 | 228 | 228 | 24,40 | 24,00 | 110-130 | | 23,79 | 0,61 | a/b/c/d/g/i/m | 655,90 | 15.740,71 | 12.540,71 | 133,33 | 3.200 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,33 |

SCHEMA 3

# PIANO DEI TAGLI - CLASSE ECONOMICA/COMPRESA A

**Art. 91, comma 2, e art. 97 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno di intervento | Particella forestale | | | | | Area protetta - zonizzazione | | | *Vincoli | Provvigione | | | Alto Fusto - Cedui in conversione | | Descrizione Intervento | Saggio di Utilizzazione % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A | B | C | | | | | | | | |
| | n° | | Superficie totale Ha | Superficie utile boscata Ha | Età al taglio | Ha | Ha | Ha | | Provvigione unitaria mc | Provvigione totale mc | Provvigione totale post intervento mc | Ripresa unitaria mc | Ripresa totale mc | | |
| 2029-2031 | 229 | 229 | 34,06 | 33,85 | 110-130 | | 24,34 | 9,72 | a/b/c/d/g/i/m | 656,47 | 22.221,33 | 17.751,33 | 132,05 | 4.470 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,12 |
| 2029-2031 | 230 | 230 | 35,75 | 35,75 | 110-130 | | 30,71 | 5,04 | a/b/c/d/g/i/m | 694,55 | 24.812,18 | 19.842,18 | 139,02 | 4.970 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,02 |
| 2029-2031 | 271 | 271 | 9,54 | 9,54 | 130-150 | | 9,54 | | a/b/c/d/g/i/m | 791,16 | 7.543,93 | 5.653,93 | 198,11 | 1.890 | Taglio di sementazione che asporti il 25/30% del volume totale per circa un 40/50% del numero degli alberi. Andranno eliminati gli alberi di minori dimensioni, lasciando a disseminare quelli più grandi. Il taglio dovrà essere particolarmente cauto nelle zone di gramineto ed in quelle dove è più sviluppato il rovo. | 25,04 |
| 2029-2031 | 280 | 280 | 12,50 | 12,50 | 130-150 | | 12,50 | | a/b/c/d/g/i/m | 995,39 | 12.445,64 | 10.325,64 | 169,60 | 2.120 | Taglio di sementazione che asporti il 30% del volume totale per circa un 50% del numero degli alberi. Andranno eliminati gli alberi di minori dimensioni, lasciando a disseminare quelli più grandi. Il taglio dovrà essere particolarmente cauto nelle zone di gramineto ed in quelle dove è più sviluppato il rovo. | 17,04 |
| 2029-2031 | 286 | 286 | 18,28 | 18,28 | 10-30 | | 18,28 | | a/b/c/d/g/i/m | 641,11 | 11.678,64 | 7.458,64 | 230,85 | 4.220 | Taglio secondario modulato sull'andamento della rinnovazione, assumendo a tratti il carattere di uno sgombero e a tratti il taglio di sementazione. In quest'ultimo caso, andranno eliminati gli alberi di minori dimensioni per circa un 50% del loro numero. | 36,01 |
| 2029-2031 | 288a | 288a | 20,22 | 20,01 | 10-30 | | 20,22 | | a/b/c/d/g/i/m | 598,70 | 11.978,22 | 8.068,22 | 195,40 | 3.910 | Taglio secondario modulato sull'andamento della rinnovazione, assumendo a tratti il carattere di uno sgombero, dove il novellame è già affermato, nella zona a nord interessata marginalmente dall'intervento precedente. Taglio di sementazione eliminando gli alberi di minori dimensioni per circa un 50% del numero. | 32,64 |
| 2032-2035 | 96 | 96 | 26,62 | 26,42 | 90-110 | | 21,85 | 4,77 | a/b/c/d/g/i/m | 548,63 | 14.492,60 | 11.862,60 | 99,55 | 2.630 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 18,14 |
| 2032-2035 | 111 | 111 | 15,84 | 15,50 | 110-130 | | 13,54 | 2,30 | a/b/c/d/g/i/m | 649,50 | 10.129,42 | 8.379,42 | 112,90 | 1.750 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 17,38 |
| 2032-2035 | 142 | 142 | 18,17 | 18,17 | 110-130 | | 18,17 | | a/b/c/d/g/i/m | 625,77 | 11.371,23 | 9.441,23 | 106,22 | 1.930 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 16,97 |
| 2032-2035 | 151 | 151 | 19,82 | 17,33 | 10-30 | | 19,66 | 0,16 | a/b/c/d/g/i/m | 395,48 | 6.854,78 | 4.504,78 | 135,60 | 2.350 | Taglio secondario per favorire l'affermazione della rinnovazione insediata. Nei tratti migliori andrà eseguito lo sgombero, mentre in alcuni si dovrà procedere con la sementazione. Rinfoltimento con selvaggioni di faggio nelle zone rimaste scoperte dal taglio precedente, eccessivamente intenso. La particella dovrà essere chiusa al pascolo. | 34,29 |

SCHEMA 3

# PIANO DEI TAGLI - CLASSE ECONOMICA/COMPRESA A

**Art. 91, comma 2, e art. 97 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno di intervento | Particella forestale | | | | | Area protetta - zonizzazione | | | *Vincoli | Provvigione | | | Alto Fusto - Cedui in conversione | | Descrizione Intervento | Saggio di Utilizzazione % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A | B | C | | | | | | | | |
| | n° | | Superficie totale Ha | Superficie utile boscata Ha | Età al taglio | Ha | Ha | Ha | | Provvigione unitaria mc | Provvigione totale mc | Provvigione totale post intervento mc | Ripresa unitaria mc | Ripresa totale mc | | |
| 2032-2035 | 152 | 152 | 15,90 | 15,87 | 10-30 | | 15,90 | | a/b/c/d/g/i/m | 471,55 | 7.481,12 | 4.861,12 | 165,09 | 2.620 | Taglio secondario modulato sull'andamento della rinnovazione: ove il novellame va insediandosi ma è ancora di dimensioni ridotte, taglio di luce asportando gli alberi di maggiori dimensioni per circa il 50% del volume. Taglio di sementazione nella zona non interessata dall'intervento precedente, eliminando gli alberi di minori dimensioni per circa un 50% del loro numero e un 30% del volume. | 35,01 |
| 2032-2035 | 162 | 162 | 27,59 | 27,59 | 130-150 | | 27,59 | | a/b/c/d/g/i/m | 660,40 | 18.221,50 | 14.581,50 | 131,93 | 3.640 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 19,98 |
| 2032-2035 | 163 | 163 | 12,59 | 12,59 | 130-150 | | 12,59 | | a/b/c/d/g/i/m | 623,77 | 7.854,42 | 6.284,42 | 124,70 | 1.570 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 19,99 |
| 2032-2035 | 164 | 164 | 26,74 | 26,74 | 130-150 | | 26,74 | | a/b/c/d/g/i/m | 717,75 | 19.195,34 | 15.355,34 | 143,61 | 3.840 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,01 |
| 2032-2035 | 169 | 169 | 17,92 | 17,89 | 130-150 | | | 17,92 | a/b/c/d/g/i/m | 859,32 | 15.373,90 | 12.293,90 | 172,16 | 3.080 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,03 |
| 2032-2035 | 170 | 170 | 12,62 | 12,60 | 130-150 | | | 12,62 | a/b/c/d/g/i/m | 813,44 | 10.249,18 | 8.199,18 | 162,70 | 2.050 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,00 |
| 2032-2035 | 188 | 188 | 15,60 | 15,55 | 110-130 | | 15,60 | | a/b/c/d/g/i/m | 726,38 | 11.298,37 | 9.028,37 | 145,98 | 2.270 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,10 |
| 2032-2035 | 189 | 189 | 24,37 | 24,36 | 130-150 | | 24,37 | | a/b/c/d/g/i/m | 586,58 | 14.290,68 | 11.430,68 | 117,41 | 2.860 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,02 |
| 2032-2035 | 193 | 193 | 19,98 | 19,96 | 130-150 | | | 19,98 | a/b/c/d/g/i/m | 644,23 | 12.858,01 | 10.288,01 | 128,76 | 2.570 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 19,99 |
| 2032-2035 | 194 | 194 | 11,99 | 11,98 | 130-150 | | | 11,99 | a/b/c/d/g/i/m | 640,71 | 7.673,12 | 6.133,12 | 128,55 | 1.540 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,06 |
| 2032-2035 | 204 | 204 | 12,28 | 11,85 | 70-90 | | 12,28 | | a/b/c/d/g/i/m | 647,65 | 7.673,03 | 6.483,03 | 100,42 | 1.190 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 15,51 |
| 2032-2035 | 205b | 205b | 11,18 | 11,18 | 130-150 | | 11,19 | | a/b/c/d/g/i/m | 574,11 | 6.416,66 | 5.136,66 | 114,49 | 1.280 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 19,94 |

SCHEMA 3

# PIANO DEI TAGLI - CLASSE ECONOMICA/COMPRESA A

**Art. 91, comma 2, e art. 97 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno di intervento | Particella forestale | | | | | Area protetta - zonizzazione | | | *Vincoli | Provvigione | | | Alto Fusto - Cedui in conversione | | Descrizione Intervento | Saggio di Utilizzazione % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A | B | C | | | | | | | | |
| | n° | | Superficie totale Ha | Superficie utile boscata Ha | Età al taglio | Ha | Ha | Ha | | Provvigione unitaria mc | Provvigione totale mc | Provvigione totale post intervento mc | Ripresa unitaria mc | Ripresa totale mc | | |
| 2032-2035 | 221 | 221 | 8,36 | 8,33 | 110-130 | | 8,36 | | a/b/c/d/g/i/m | 731,54 | 6.096,84 | 3.646,84 | 294,12 | 2.450 | Taglio secondario differenziato secondo l'insediamento della rinnovazione. In alcuni piccoli tratti, in presenza di novellame già insediato, si potrà procedere con un taglio di luce che asporti circa il 50% del volume. Nella zona centrale, dove non si è intervenuti con il taglio precedente, o dove è stato molto debole e la copertura arborea è ancora chiusa, taglio di rinnovazione che asporti non più del 50% del numero degli alberi scelti tra quelli di minori dimensioni. | 40,21 |
| 2032-2035 | 232 | 232 | 40,81 | 40,72 | 130-150 | 0,08 | 40,73 | | a/b/c/d/g/i/m | 684,86 | 27.884,35 | 22.294,35 | 137,28 | 5.590 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,04 |
| 2032-2035 | 255b | 255b | 12,00 | 12,00 | 70-90 | | 12,00 | | a/b/c/d/g/i/m | 776,62 | 9.315,82 | 5.585,82 | 310,83 | 3.730 | Taglio secondario differenziato secondo l'insediamento della rinnovazione. In alcuni piccoli tratti, in presenza di novellame già insediato, si potrà procedere con un taglio di luce che asporti circa il 50% del volume. Nella zona a valle, dove non si è intervenuti con il taglio precedente, o dove è stato molto debole e la copertura arborea è ancora chiusa, taglio di rinnovazione che asporti non più del 50% del numero degli alberi scelti tra quelli di minori dimensioni. | 40,02 |
| 2032-2035 | 259 | 259 | 27,71 | 27,14 | 110-130 | | 27,71 | | a/b/c/d/g/i/m | 610,71 | 16.576,11 | 13.196,11 | 124,54 | 3.380 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,39 |
| 2032-2035 | 260 | 260 | 19,87 | 19,76 | 90-110 | | 19,87 | | a/b/c/d/g/i/m | 688,46 | 13.603,31 | 10.863,31 | 138,66 | 2.740 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,14 |
| 2032-2035 | 261a | 261a | 16,20 | 16,20 | 110-130 | | 16,20 | | a/b/c/d/g/i/m | 658,75 | 10.672,27 | 8.542,27 | 131,48 | 2.130 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 19,96 |
| 2032-2035 | 262 | 262 | 16,87 | 16,87 | 110-130 | | 16,87 | | a/b/c/d/g/i/m | 483,49 | 8.154,82 | 6.524,82 | 96,62 | 1.630 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 19,98 |
| 2032-2035 | 272 | 272 | 24,79 | 24,77 | 10-30 | | 24,79 | | a/b/c/d/g/i/m | 605,70 | 15.004,61 | 10.844,61 | 167,95 | 4.160 | Taglio secondario differenziato secondo l'insediamento della rinnovazione. In alcuni piccoli tratti, in presenza di novellame già insediato, si potrà procedere con lo sgombero. In altri, dove non si è intervenuti con il taglio precedente, taglio di rinnovazione che asporti non più del 50% del numero degli alberi scelti tra quelli di minori dimensioni. | 27,73 |
| 2032-2035 | 279 | 279 | 11,41 | 11,41 | 130-150 | 2,28 | 9,13 | | a/b/c/d/g/i/m | 706,57 | 8.059,76 | 6.349,76 | 149,87 | 1.710 | Taglio di sementazione nei tratti di fustaia adulta e matura, con l'asportazione di circa il 50% del numero degli alberi scelti tra quelli di dimensioni minori. In alcuni tratti, dove l'intervento novellame è già insediato, potrà assumere il carattere di un taglio secondario. | 21,21 |

SCHEMA 3

# PIANO DEI TAGLI - CLASSE ECONOMICA/COMPRESA A

**Art. 91, comma 2, e art. 97 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno di intervento | Particella forestale | | | | | Area protetta - zonizzazione | | | *Vincoli | Provvigione | | | Alto Fusto - Cedui in conversione | | Descrizione Intervento | Saggio di Utilizzazione % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A | B | C | | | | | | | | |
| | n° | | Superficie totale Ha | Superficie utile boscata Ha | Età al taglio | Ha | Ha | Ha | | Provvigione unitaria mc | Provvigione totale mc | Provvigione totale post intervento mc | Ripresa unitaria mc | Ripresa totale mc | | |
| 2032-2035 | 288b | 288b | 21,68 | 21,57 | 130-150 | | 21,68 | | a/b/c/d/g/i/m | 787,00 | 16.976,21 | 12.646,21 | 200,74 | 4.330 | Taglio di sementazione che asporti il 30% del volume totale per circa un 50% del numero degli alberi. Andranno eliminati gli alberi di minori dimensioni, lasciando a disseminare quelli più grandi. Andranno rilasciati alcuni esemplari di ontano e tutti quelli di acero di Lobel, con l'eccezione di quelli dalla chioma compromessa. | 25,51 |
| 2032-2035 | 294 | 294 | 27,74 | 24,72 | | | 27,74 | 157,48 | a/b/c/d/g/i/m | 642,07 | 17.801,05 | 11.401,05 | 258,90 | 6.400 | Taglio secondario. | 40,32 |
| **TOTALI** | | | **1.303,25** | **1.286,63** | | | | | | | **841.661,01** | **650.291,01** | | **191.370** | | |

* = Vincoli:

| | |
|---|---|
| a | Idrogeologico (L. 3267/1923) |
| b | Autorità di Bacino (L. 18 maggio 1989 n. 183 – L. R. n. 8 del 07/02/1994) |
| c | Uso civico (L. 1766/1927 – L. R. 11/1981) |
| d | Bellezze naturali (L. 1497/1939 transitata nel d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004) |
| e | Piani territoriali paesaggistici (ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 29/10/99 n. 490) |
| f | Parco Nazionale (L. 6 dicembre 1991 n. 394) |
| g | Parco Regionale (L. R. 1 settembre 1993 n. 33) |
| h | Riserva, altro (L. 6 dicembre 1991 n. 394) |
| i | Legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 21 novembre 2000, n. 353) |
| l | Conflitti di proprietà e/o di confinazione tra le aree oggetto di pianificazione ed altri Soggetti privati e/o pubblici |
| m | Rete natura 2000 |
| n | Altro - specificare |

**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Faggio* | *44%* | *Acero opalo* | *18%* |
| | | *Carpino nero* | *38%* |

Descrizione:

La fustaia matura è predominante nella particella 6, occupando il 44% della superficie. La fustaia giovane rappresenta il 25%, la fustaia adulta il 28%, la perticaia adulta il 2% e la perticaia giovane l'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,07 | 0,42 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,20 | 1,25 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,34 | 2,12 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 4,02 | 24,86 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 7,07 | 43,80 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 3,59 | 22,22 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,72 | 4,47 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,14 | 0,85 |
| **Totale** | 16,15 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 16,15 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Rovo e ginestra, con poco agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Abbondante |
| Specie prevalenti: | Ortica, felci, digitalis lutea, elleboro, sambuco, ranuncolo e asperula |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **7** | **Denominazione località** | **Piscacca** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 12,96 |
| Utile Ha | 11,39 |
| Altro-tare Ha | 1,57 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 7 |
| Particella | 22p-30p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Ovest | |
| Pendenza % | 35,82 | |
| Altitudine mt slm | min. 1143 | max 1324 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 80 |
| Classe cronologica o diametrica | 70-90 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 428,52 |
| Provvigione reale totale | 11,39 | 4880,88 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 8 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Agrifoglio* | *5%* | *Acero opalo* | *4%* | *Abete bian* | *1%* |
| *Faggio* | *90%* | | | | |
| *Ontano napoletano* | *1%* | | | | |

Descrizione:

Nella particella 7, la spessina copre il 31% della superficie, seguita dal novelleto all'1%, la perticaia giovane al 4%, la fustaia giovane al 20%, la fustaia adulta al 25% e la fustaia matura al 19%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,10 | 0,86 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,50 | 4,43 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,31 | 20,27 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,83 | 24,85 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,16 | 19,00 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 2,46 | 21,63 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 1,02 | 8,92 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,04 |
| **Totale** | 11,39 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 11,39 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Abbondante |
| Specie prevalenti: | Cardi, graminacee e felce soprattutto nelle chiare |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **14** | **Denominazione località** | **Peta di Piscacca** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 14,89 |
| Utile Ha | 14,71 |
| Altro-tare Ha | 0,18 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 7 |
| Particella | 22p-30p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Est |
| Pendenza % | 39,68 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1235 | 1446 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| **Sottosuolo** |
|---|
| **Calcareo** |

| **Suolo** |
|---|
| **MAP 4.4** |

| **Viabilità** |
|---|
| **Ben servita** |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 100 |
| Classe cronologica o diametrica | 90-110 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 530,64 |
| Provvigione reale totale | 14,71 | 7806,23 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 11 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *0%* | *Acero opalo* | *2%* |
| *Faggio* | *75%* | *Carpino nero* | *19%* |
| *Ontano napoletano* | *4%* | | |

Descrizione:

Nella particella 14, le fustaie adulte coprono il 34% della superficie, seguite dalle fustaie giovani con il 25% e dalle fustaie mature con il 18%. Le perticaie giovani occupano l'11% e le perticaie adulte il 7%. Il resto della superficie è coperto da formazioni erbacee o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,02 | 0,13 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,96 | 6,55 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,64 | 11,13 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,67 | 18,18 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 4,96 | 33,71 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 3,67 | 24,91 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,79 | 5,39 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 14,71 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 14,71 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Rovo e ginestra, in minor misura dafne e agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, felce, vinca, asperula, sambuco e digitalis |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **15** | **Denominazione località** | **Piscacca** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 10,71 |
| Utile Ha | 9,52 |
| Altro-tare Ha | 1,19 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 7 |
| Particella | 22p-30p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord | |
| Pendenza % | 36,48 | |
| Altitudine mt slm | min. 1167 | max 1329 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 100 |
| Classe cronologica o diametrica | 90-110 |

| | | |
|---|---|---|
| Anno di taglio | | **0** |
| Età media all'anno di taglio | | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 459,66 |
| Provvigione reale totale | 9,52 | 4377,92 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 5 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Agrifoglio* | *2%* | *Acero opalo* | *5%* |
| *Faggio* | *80%* | | |
| *Ontano napoletano* | *14%* | | |

Descrizione:

Le fustaie adulte coprono il 20% della superficie, seguite dalle fustaie giovani con il 17% e dalle fustaie mature con il 19%. Le perticaie giovani occupano il 4% e le perticaie adulte il 22%. Il resto sono formazioni erbacce o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,03 | 0,27 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,37 | 3,94 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,11 | 22,13 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,73 | 18,18 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,62 | 17,05 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 1,91 | 20,06 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 1,75 | 18,38 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 9,52 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 9,52 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Abbondante |
| Specie prevalenti: | Graminacee e cardo, nelle radure |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **60** | **Denominazione località** | **Valle del Pero** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 7,22 |
| Utile Ha | 7,22 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 13 |
| Particella | 15p-16p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest | |
| Pendenza % | 36,15 | |
| Altitudine mt slm | min. 1246 | max 1347 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 100 |
| Classe cronologica o diametrica | 90-110 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 487,12 |
| Provvigione reale totale | 7,22 | 3515,02 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 6 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Acero montano* | *2%* |
| *Agrifoglio* | *32%* |
| *Faggio* | *58%* |
| *Ontano napoletano* | *8%* |

Descrizione:

Nella particella 60, la fustaia giovane copre il 44% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 24%, la fustaia matura al 16% e le formazioni erbacee o arbustive al 16%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,06 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,10 | 15,22 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,15 | 43,62 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,77 | 24,57 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,92 | 12,76 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,27 | 3,76 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 7,22 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 7,22 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Abbondante |
| Specie prevalenti: | Graminacee, ortiche, sambuco e felce |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **79** | **Denominazione località** | **Valle Foce di Capo Sele** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 13,63 |
| Utile Ha | 13,51 |
| Altro-tare Ha | 0,12 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 12;13 |
| Particella | 1p-48p-176-177 ; 9p-11p-70p-71p-72p-73p-74p-75p-76p-77p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord | |
| Pendenza % | 39,13 | |
| Altitudine mt slm | min. 1082 | max 1207 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 80 |
| Classe cronologica o diametrica | 70-90 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 393,66 |
| Provvigione reale totale | 13,51 | 5319,20 |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 8 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *0%* | *Acero opalo* | *3%* |
| *Agrifoglio* | *34%* | *Cerro* | *2%* |
| *Faggio* | *57%* | *Pino nero* | *1%* |
| *Ontano napoletano* | *4%* | | |

Descrizione:

Nella particella 79, la fustaia giovane copre il 46% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 29%. La perticaia giovane occupa un 2%, mentre la fustaia matura rappresenta il 23%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,06 | 0,41 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,28 | 2,06 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 3,87 | 28,61 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 6,26 | 46,33 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 3,05 | 22,59 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 13,51 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 13,51 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, felce, rovo, dactilis e ciclamino |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **81** | **Denominazione località** | **Valle del Pero** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 12,26 |
| Utile Ha | 11,94 |
| Altro-tare Ha | 0,32 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 13 |
| Particella | 9p-15p-16p-127p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest | |
| Pendenza % | 39,05 | |
| Altitudine mt slm | min. 1177 | max 1303 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.7** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 100 |
| Classe cronologica o diametrica | 90-110 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 426,72 |
| Provvigione reale totale | 11,94 | 5094,25 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | |
|---|---|
| Rilievo tassatorio | |
| AdS - n | 6 |
| Cavallettamento - Ha | |
| Alberi modello - n | 0 |
| Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Agrifoglio* | *39%* | *Acero opalo* | *2%* |
| *Faggio* | *36%* | *Pino nero* | *1%* |
| *Ontano napoletano* | *22%* | | |

Descrizione:

La fustaia giovane rappresenta il 34% della superficie della particella 81. La fustaia adulta e la perticaia giovane coprono entrambe il 26%, mentre la fustaia matura occupa il 5%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,24 | 2,01 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 3,10 | 26,01 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,99 | 33,38 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 4,00 | 33,47 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,61 | 5,12 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 11,94 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 11,94 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, felce aquilina, ortiche e lamponi |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **95a** | **Denominazione località** | **Valle Grande** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 17,06 |
| Utile Ha | 17,02 |
| Altro-tare Ha | 0,04 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 13;20 |
| Particella | 18p ; 5p-12p-32p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord | |
| Pendenza % | 35,58 | |
| Altitudine mt slm | min. 988 | max 1095 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

| **Sottosuolo** |
|---|
| **Calcareo** |

| **Suolo** |
|---|
| **MAP 4.4** |

| **Viabilità** |
|---|
| **Ben servita** |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 100 |
| Classe cronologica o diametrica | 90-110 |

| | | |
|---|---|---|
| | Ha: | mc: |
| Provvigione reale unitaria | 1 | 519,18 |
| Provvigione reale totale | 17,02 | 8837,46 |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 10 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Anno di taglio | | **0** |
| Età media all'anno di taglio | | **0** |
| | Ha: | mc: |
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Faggio* | *65%* | *Acero opalo* | *6%* | *Leccio* | *5%* |
| *Ontano napoletano* | *0%* | *Carpino nero* | *16%* | *Orniello* | *1%* |
| | | *Cerro* | *6%* | | |

Descrizione:

La perticaia giovane rappresenta il 38% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 19%, dalla fustaia giovane al 17%, dalla perticaia adulta al 18% e dalla spessina all'8%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,07 | 0,38 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,38 | 8,11 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 3,02 | 17,76 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,31 | 19,47 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,83 | 16,62 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 4,89 | 28,71 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 1,52 | 8,94 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 17,02 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 17,02 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai e agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Felce aquilina e graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **95b** | **Denominazione località** | **Molilla** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 11,31 |
| Utile Ha | 11,15 |
| Altro-tare Ha | 0,16 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 20 |
| Particella | 12p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest |
| Pendenza % | 36,39 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1090 | 1271 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 100 |
| Classe cronologica o diametrica | 90-110 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 538,79 |
| Provvigione reale totale | 11,15 | 6008,43 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 7 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Agrifoglio* | *2%* | *Acero opalo* | *9%* | *altre latifo* | *0%* |
| *Faggio* | *85%* | *Cerro* | *2%* | | |
| *Ontano napoletano* | *0%* | | | | |

Descrizione:

La fustaia adulta copre il 29%, seguita dalla fustaia giovane al 26%, dalla perticaia giovane al 25%, dalla spessina al 17% e dalla perticaia adulta al 4%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,47 | 4,22 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,86 | 16,69 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,87 | 25,76 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,77 | 24,87 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 1,93 | 17,33 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 1,24 | 11,13 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 11,15 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 11,15 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Ciclamino e graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **96** | **Denominazione località** | **Corticella** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 26,62 |
| Utile Ha | 26,42 |
| Altro-tare Ha | 0,20 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 18 |
| Particella | 8p -11p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Est |
| Pendenza % | 38,95 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1039 | 1271 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| **Sottosuolo** |
|---|
| **Calcareo** |

| **Suolo** |
|---|
| **MAP 4.4** |

| **Viabilità** |
|---|
| **Scarsamente servita** |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 100 |
| Classe cronologica o diametrica | 90-110 |

| | | |
|---|---|---|
| Anno di taglio | | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | | **90-110** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 535,29 |
| Provvigione reale totale | 26,42 | 14140,27 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **99,5** |
| Ripresa totale | | **2630** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 20 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Agrifoglio* | *0%* | *Acero opalo* | *3%* | *Nocciolo* | *7%* |
| *Faggio* | *83%* | *Cerro* | *4%* | | |
| *Ontano napoletano* | *3%* | | | | |

Descrizione:

La fustaia matura rappresenta il 48%, seguita dalla fustaia adulta al 19%, dalla fustaia giovane al 18%, dalla spessina al 7% e dalla perticaia giovane al 6%. Le formazioni erbacee o arbustive coprono il 2%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,04 | 0,15 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,50 | 5,67 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,84 | 6,97 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 4,80 | 18,17 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 5,34 | 20,20 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 10,22 | 38,70 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 2,45 | 9,26 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,23 | 0,88 |
| **Totale** | 26,42 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 26,42 | 99,5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 2629,6 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Ciclamino, graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **109a** | **Denominazione località** | **Valle Grande** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 11,29 |
| Utile Ha | 11,29 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 18 |
| Particella | 11p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest |
| Pendenza % | 33,17 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1032 | 1121 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| **Sottosuolo** |
|---|
| **Calcareo** |

| **Suolo** |
|---|
| **MAP 4.4** |

| **Viabilità** |
|---|
| **Ben servita** |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 120 |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2025-2027** |
| Età media all'anno di taglio | **110-130** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 622,06 |
| Provvigione reale totale | 11,29 | 7023,29 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **101,9** |
| Ripresa totale | | **1150** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 8 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Agrifoglio* | *1%* | *Acero opalo* | *8%* | *Leccio* | *14%* |
| *Faggio* | *44%* | *Carpino nero* | *22%* | *Orniello* | *5%* |
| | | *Cerro* | *6%* | | |

Descrizione:

La copertura forestale è dominata dalla fustaia matura con il 54%. La fustaia adulta copre il 23%, mentre la fustaia giovane rappresenta l'11%. Le perticaie adulte e giovani sono entrambe al 10% e 1% rispettivamente. La presenza di spessina è minima all'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,06 | 0,52 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,14 | 1,28 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,03 | 9,08 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,18 | 10,49 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,44 | 21,64 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 3,88 | 34,37 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 2,55 | 22,63 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 11,29 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2025-2027 | 11,29 | 101,9 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 1150,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, felce aquilina |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **109b** | **Denominazione località** | **Fossa della Neve** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 10,82 |
| Utile Ha | 10,82 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 20 |
| Particella | 12p-13p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest | |
| Pendenza % | 36,84 | |
| Altitudine mt slm | min. 1076 | max 1222 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 120 |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 627,28 |
| Provvigione reale totale | 10,82 | 6786,54 |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 9 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2025-2027** |
| Età media all'anno di taglio | **130-150** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **110,9** |
| Ripresa totale | | **1200** |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Agrifoglio* | *2%* |
| *Faggio* | *97%* |
| *Ontano napoletano* | *0%* |

Descrizione:

Il soprassuolo è prevalentemente composto da fustaie mature al 48% e fustaie adulte al 22%. Le fustaie giovani sono al 24% e le perticaie giovani al 6%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,61 | 5,59 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,42 | 22,33 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,52 | 23,28 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 3,28 | 30,33 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 2,00 | 18,47 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 10,82 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2025-2027 | 10,82 | 110,9 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 1200,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **110** | **Denominazione località** | **Fossa della Neve** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 26,99 |
| Utile Ha | 26,56 |
| Altro-tare Ha | 0,43 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 18 |
| Particella | 11p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord | |
| Pendenza % | 34,70 | |
| Altitudine mt slm | min. 1096 | max 1273 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 120 |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 588,65 |
| Provvigione reale totale | 26,56 | 15631,69 |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 15 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 3 |
| | Relascopio | |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2025-2027** |
| Età media all'anno di taglio | **110-130** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **110,3** |
| Ripresa totale | | **2820** |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Agrifoglio* | *3%* | *Acero opalo* | *1%* |
| *Faggio* | *93%* | *Carpino nero* | *0%* |
| *Maggiociondolo* | *2%* | *Cerro* | *1%* |
| *Ontano napoletano* | *0%* | | |

Descrizione:

La fustaia matura domina con il 41%, seguita dalla fustaia adulta al 38%. La fustaia giovane è al 14% e le perticaie adulte e giovani sono al 6% e 2% rispettivamente.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,01 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,52 | 1,97 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,58 | 5,95 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 4,07 | 15,33 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 9,84 | 37,07 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 9,52 | 35,85 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 1,01 | 3,82 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 26,56 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2025-2027 | 26,56 | 110,3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 2929,8 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, asperula, digitalis |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **111** | **Denominazione località** | **Scaffa** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 15,84 |
| Utile Ha | 15,60 |
| Altro-tare Ha | 0,24 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 18;19 |
| Particella | 11p ; 43 |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Est |
| Pendenza % | 39,57 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1043 | 1272 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 120 |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **110-130** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 585,63 |
| Provvigione reale totale | 15,60 | 9133,40 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **112,9** |
| Ripresa totale | | **1750** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 10 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 2 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Agrifoglio* | *4%* | *Acero opalo* | *6%* |
| *Faggio* | *78%* | *Carpino nero* | *9%* |
| *Ontano napoletano* | *2%* | *Cerro* | *1%* |

Descrizione:

Nella particella 111, la fustaia matura domina con una copertura del 52%. Seguono la fustaia adulta al 20% e la fustaia giovane al 12%. Le perticaie adulte e giovani sono entrambe all'8%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,28 | 8,21 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,31 | 8,38 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,81 | 11,59 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 3,08 | 19,78 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 3,93 | 25,19 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 3,93 | 25,22 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,25 | 1,62 |
| **Totale** | 15,60 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 15,60 | 112,9 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 1760,8 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, ciclamino e felce aquilina |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **115** | **Denominazione località** | **Lagarello** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 17,52 |
| Utile Ha | 15,78 |
| Altro-tare Ha | 1,74 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 20;25 |
| Particella | 1p-2-12p-17-23-24-25-41-42 ; 1p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord | |
| Pendenza % | 36,47 | |
| Altitudine mt slm | min. 1182 | max 1391 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 100 |
| Classe cronologica o diametrica | 90-110 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 457,03 |
| Provvigione reale totale | 15,78 | 7210,69 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 13 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 2 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Agrifoglio* | *8%* |
| *Faggio* | *73%* |
| *Ontano napoletano* | *18%* |

Descrizione:

La fustaia adulta copre il 31% della superficie nella particella 115, seguita dalle fustaie mature al 27% e dalle fustaie giovani al 24%. Le perticaie adulte e giovani sono al 15% e al 3% rispettivamente.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,49 | 3,10 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,30 | 14,55 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 4,89 | 30,96 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 3,82 | 24,24 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 3,15 | 19,96 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 1,13 | 7,18 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 15,78 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 15,78 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, rovo, sambuco ed ortica |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **117** | **Denominazione località** | **Lagarello** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 12,32 |
| Utile Ha | 11,99 |
| Altro-tare Ha | 0,33 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 20 |
| Particella | 12p-13p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord |
| Pendenza % | 37,14 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1218 | 1394 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 100 |
| Classe cronologica o diametrica | 90-110 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 531,59 |
| Provvigione reale totale | 11,99 | 6375,96 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 7 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

*Faggio* *89%* *Acero opalo* *1%*

*Ontano napoletano* *10%*

Descrizione:

Nella particella 117, la fustaia giovane rappresenta il 39% della copertura, seguita dalle fustaie adulte e mature, entrambe al 31%. Le perticaie adulte sono all'11% e le perticaie giovani al 3%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,39 | 3,24 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,31 | 10,95 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,90 | 15,85 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 4,71 | 39,25 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 3,37 | 28,08 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,32 | 2,63 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 11,99 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 11,99 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Assente |
| Specie prevalenti: | Sporadica la dafne |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Rovo e graminacee, diviene abbondante, di graminacee, nella zona di crinale |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **118** | **Denominazione località** | **Lagarello** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 18,58 |
| Utile Ha | 15,43 |
| Altro-tare Ha | 3,15 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 20 |
| Particella | 5p-7-12p-29-30-33p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest | |
| Pendenza % | 36,74 | |
| Altitudine mt slm | min. 1187 | max 1474 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 80 |
| Classe cronologica o diametrica | 70-90 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 434,73 |
| Provvigione reale totale | 15,43 | 6707,77 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 12 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

*Faggio* 66% *Acero opalo* 3%
*Ontano napoletano* 31%

Descrizione:

Le fustaie mature coprono il 36% della superficie nella particella 118, seguite dalle fustaie adulte al 24% e dalle fustaie giovani al 18%. Le perticaie adulte e giovani sono al 18% e al 5% rispettivamente.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,70 | 4,56 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,75 | 17,80 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,73 | 17,71 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 3,63 | 23,50 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 2,92 | 18,93 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 2,55 | 16,51 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,15 | 0,99 |
| **Totale** | 15,43 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 15,43 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Rovo e dafne |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **127** | **Denominazione località** | **Raia di Calende** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 11,81 |
| Utile Ha | 11,81 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 18 |
| Particella | 11p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Ovest | |
| Pendenza % | 39,11 | |
| Altitudine mt slm | min. 979 | max 1139 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 120 |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 641,94 |
| Provvigione reale totale | 11,81 | 7579,24 |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 7 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 2 |
| | Relascopio | |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2025-2027** |
| Età media all'anno di taglio | **110-130** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **94,0** |
| Ripresa totale | | **1110** |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | |
|---|---|
| *Agrifoglio* | *14%* |
| *Faggio* | *86%* |

Descrizione:

Le fustaie mature rappresentano il 53% della copertura nella particella 127, seguite dalle fustaie adulte al 34% e dalle perticaie giovani all'11%. Le perticaie adulte coprono il 3% della superficie.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,35 | 2,96 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,24 | 10,49 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 3,89 | 32,94 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 3,97 | 33,59 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 1,26 | 10,68 |
| Fustaie mature h >32 m | 1,10 | 9,34 |
| **Totale** | 11,81 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2025-2027 | 11,81 | 94,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 1109,7 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Frequente |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **128** | **Denominazione località** | **Valle Piana** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 12,06 |
| Utile Ha | 11,57 |
| Altro-tare Ha | 0,49 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 18 |
| Particella | 11p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud | |
| Pendenza % | 36,02 | |
| Altitudine mt slm | min. 1120 | max 1249 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 80 |
| Classe cronologica o diametrica | 70-90 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 396,39 |
| Provvigione reale totale | 11,57 | 4584,98 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 8 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Agrifoglio* | *6%* | *Acero opalo* | *1%* | *Orniello* | *0%* |
| *Faggio* | *78%* | *Carpino nero* | *13%* | *Roverella* | *1%* |

Descrizione:

Le fustaie giovani coprono il 30% della superficie nella particella 128, seguite dalle fustaie adulte e dalle perticaie giovani entrambe al 17%. Le spessine rappresentano il 4% della copertura, con le perticaie adulte al 23% e le fustaie mature al 10%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,43 | 3,74 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 2,66 | 22,96 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,95 | 16,88 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,46 | 29,92 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,95 | 16,86 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,97 | 8,37 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,15 | 1,26 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 11,57 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 11,57 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, soprattutto nella zona cacuminale e sul crinale che scende verso ovest |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **129** | **Denominazione località** | **Teatro** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 12,85 |
| Utile Ha | 12,76 |
| Altro-tare Ha | 0,09 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 18;29 |
| Particella | 11p ; 1p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud | |
| Pendenza % | 39,10 | |
| Altitudine mt slm | min. 1058 | max 1246 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 120 |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 671,95 |
| Provvigione reale totale | 12,76 | 8574,20 |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 10 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Agrifoglio* | *21%* | *Acero opalo* | *0%* |
| *Faggio* | *73%* | *Carpino nero* | *5%* |
| | | *Cerro* | *1%* |

Descrizione:

La fustaia matura rappresenta il 65% della copertura nella particella 129, seguita dalle fustaie giovani all'11% e dalle fustaie adulte al 10%. Le perticaie giovani coprono il 6% e le perticaie adulte all'8%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,02 | 8,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,71 | 5,58 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,32 | 10,33 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,23 | 9,64 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 2,04 | 15,99 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 3,62 | 28,34 |
| Fustaie mature h >32 m | 2,82 | 22,12 |
| **Totale** | 12,76 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 12,76 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, luzula e vinca |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **133** | **Denominazione località** | **Lagarello** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 9,66 |
| Utile Ha | 8,90 |
| Altro-tare Ha | 0,76 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 20 |
| Particella | 12p-13p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord | |
| Pendenza % | 37,25 | |
| Altitudine mt slm | min. 1306 | max 1464 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 100 |
| Classe cronologica o diametrica | 90-110 |

| | | |
|---|---|---|
| Anno di taglio | | **0** |
| Età media all'anno di taglio | | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 504,79 |
| Provvigione reale totale | 8,90 | 4493,15 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 7 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

*Faggio* *90%* *Salicone* *3%* *Salice grigio* *6%*
*Ontano napoletano* *1%*

Descrizione:

La perticaia adulta copre il 24% della superficie, seguita dalle fustaie giovani con il 26% e dalle fustaie adulte con il 34%. Le perticaie giovani occupano il 9%. Il resto sono formazioni erbacce o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,80 | 9,03 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,12 | 23,84 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,29 | 25,74 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 3,04 | 34,19 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,64 | 7,21 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 8,90 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 8,90 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Assente |
| Specie prevalenti: | Sporadico agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Frequente |
| Specie prevalenti: | Graminacee, cardo e cerastium nelle radure; rovo e dafne sotto copertura |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **134** | **Denominazione località** | **Corsa dei Cavalli** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 17,27 |
| Utile Ha | 17,17 |
| Altro-tare Ha | 0,10 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 20 |
| Particella | 12p-13p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord | |
| Pendenza % | 35,30 | |
| Altitudine mt slm | min. 1345 | max 1472 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 120 |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 589,72 |
| Provvigione reale totale | 17,17 | 10126,78 |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 11 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

*Faggio* 97% *Pino nero* 2%
*Ontano napoletano* 1%

Descrizione:

Le fustaie adulte rappresentano il 37% della superficie, seguite dalle fustaie giovani con il 34% e dalle fustaie mature con il 13%. Le perticaie giovani occupano l'8% e le perticaie adulte l'1%. Il resto sono formazioni erbacce o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,10 | 0,57 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,36 | 7,90 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,31 | 13,46 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 6,30 | 36,69 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 5,77 | 33,63 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 1,33 | 7,75 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 17,17 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 17,17 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Frequente |
| Specie prevalenti: | Rovo |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Frequente |
| Specie prevalenti: | Graminacee, soprattutto nelle radure |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **142** | **Denominazione località** | **Valle Piana** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 18,17 |
| Utile Ha | 18,17 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 18;23 |
| Particella | 11p ; 29p-33p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Ovest | |
| Pendenza % | 32,49 | |
| Altitudine mt slm | min. 1006 | max 1225 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 120 |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 608,82 |
| Provvigione reale totale | 18,17 | 11063,27 |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 13 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 2 |
| | Relascopio | |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **110-130** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **106,2** |
| Ripresa totale | | **1930** |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Agrifoglio* | *0%* | *Acero opalo* | *16%* | *Leccio* | *1%* |
| *Faggio* | *48%* | *Carpino nero* | *21%* | *Orniello* | *11%* |
| | | *Salicone* | *1%* | *Roverella* | *3%* |

Descrizione:

Le fustaie adulte coprono il 32% della superficie, seguite dalle fustaie giovani con il 18% e dalle fustaie mature con il 20%. Le perticaie giovani occupano il 12% e le perticaie adulte il 6%. Il resto sono formazioni erbacce o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,17 | 6,45 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,31 | 12,69 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,38 | 13,10 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 3,37 | 18,55 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 6,10 | 33,56 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 2,31 | 12,69 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,54 | 2,96 |
| **Totale** | 18,17 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 18,17 | 106,2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 1930,2 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, ciclamino e vinca |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **143** | **Denominazione località** | **Valle Piana** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 23,06 |
| Utile Ha | 22,99 |
| Altro-tare Ha | 0,07 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 18 |
| Particella | 11p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord-Est | |
| Pendenza % | 34,85 | |
| Altitudine mt slm | min. 1013 | max 1180 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.4** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Età media attuale | 140 | | Anno di taglio | **2025-2027** |
| Classe cronologica o diametrica | 130-150 | | Età media all'anno di taglio | **130-150** |

| | Ha: | mc: | | Ha: | mc: |
|---|---|---|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 742,78 | Ripresa unitaria | | **187,9** |
| Provvigione reale totale | 22,99 | 17072,79 | Ripresa totale | | **4320** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 17 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 6 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Agrifoglio* | *2%* | *Carpino nero* | *1%* |
| *Faggio* | *97%* | | |

Descrizione:

Le fustaie adulte coprono il 25% della superficie, seguite dalle fustaie giovani con l'11% e dalle fustaie mature con il 59%. Le perticaie giovani occupano il 1% e le perticaie adulte il 1%. Il resto sono formazioni erbacce o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,09 | 0,39 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,14 | 0,60 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,35 | 1,50 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,78 | 3,40 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,43 | 10,58 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 5,65 | 24,57 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 10,18 | 44,27 |
| Fustaie mature h >32 m | 3,38 | 14,69 |
| **Totale** | 22,99 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglio di sementazione che preservi gli alberi del vecchio ciclo colturale rappresentati da grandi soggetti dalla chioma espansa in grado di garantire un'abbondante fruttificazione. Al taglio dovranno cadere i soggetti delle dimensioni minori, sottoposti o dalla chioma filata. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2025-2027 | 22,99 | 187,9 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 4319,1 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | asperula,acetosella,graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **144** | **Denominazione località** | **Valle Piana** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 12,71 |
| Utile Ha | 12,66 |
| Altro-tare Ha | 0,05 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 18 |
| Particella | 11p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest |
| Pendenza % | 32,69 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1121 | 1219 |

| **Sottosuolo** |
|---|
| **Calcareo** |

| **Suolo** |
|---|
| **MAP 4.4** |

| **Viabilità** |
|---|
| **Ben servita** |

| Giacitura | |
|---|---|
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 120 |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2025-2027** |
| Età media all'anno di taglio | **110-130** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 623,41 |
| Provvigione reale totale | 12,66 | 7893,17 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **100,3** |
| Ripresa totale | | **1270** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 8 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 2 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Agrifoglio* | *7%* | *Carpino nero* | *12%* |
| *Faggio* | *81%* | | |
| *Ontano napoletano* | *0%* | | |

Descrizione:

Le fustaie giovani coprono il 17% della superficie, seguite dalle fustaie adulte con il 37% e dalle fustaie mature con il 21%. Le perticaie giovani occupano l'11% e le perticaie adulte il 12%. Il resto sono formazioni erbacce o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,55 | 12,26 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,63 | 12,86 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,18 | 17,19 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 4,60 | 36,33 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 2,71 | 21,37 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 12,66 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2025-2027 | 12,66 | 100,3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 1270,1 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | vinca,asperula,graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **145** | **Denominazione località** | **Valle Piana** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 16,87 |
| Utile Ha | 16,86 |
| Altro-tare Ha | 0,01 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 18 |
| Particella | 11p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest |
| Pendenza % | 28,56 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1122 | 1222 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 120 |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2025-2027** |
| Età media all'anno di taglio | **110-130** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 647,01 |
| Provvigione reale totale | 16,86 | 10906,41 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **130,5** |
| Ripresa totale | | **2200** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 8 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Agrifoglio* | *19%* | *Cerro* | *0%* |
| *Faggio* | *80%* | | |
| *Maggiociondolo* | *0%* | | |
| *Sorbo degli Ucc.* | *0%* | | |

Descrizione:

Le fustaie giovani coprono il 32% della superficie, seguite dalle fustaie adulte con il 48% e dalle fustaie mature con il 12%. Le perticaie adulte occupano il 5% e le perticaie giovani il 3%. Il resto sono formazioni erbacce o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,49 | 2,91 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,75 | 4,46 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 5,25 | 31,15 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 8,10 | 48,03 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 2,27 | 13,45 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 16,86 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2025-2027 | 16,86 | 130,5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 2199,5 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | vinca,asperula,graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **146** | **Denominazione località** | **Teatro** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 18,85 |
| Utile Ha | 18,80 |
| Altro-tare Ha | 0,05 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 18;24;29 |
| Particella | 11p ; 330p ; 1p-5p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Est | |
| Pendenza % | 39,18 | |
| Altitudine mt slm | min. 1056 | max 1222 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 120 |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 634,99 |
| Provvigione reale totale | 18,80 | 11936,53 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 15 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 2 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Agrifoglio* | *4%* |
| *Faggio* | *95%* |
| *Ontano napoletano* | *1%* |

Descrizione:

Le fustaie adulte coprono il 24% della superficie, seguite dalle fustaie giovani con il 25% e dalle fustaie mature con il 35%. Le perticaie giovani occupano l'11% e le perticaie adulte il 5%. Il resto sono formazioni erbacce o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,05 | 0,25 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,07 | 0,35 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,13 | 6,00 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,16 | 11,48 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 4,39 | 23,36 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 4,65 | 24,75 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 3,72 | 19,80 |
| Fustaie mature h >32 m | 2,63 | 14,01 |
| **Totale** | 18,80 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 18,80 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | rovo |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **150** | **Denominazione località** | **Cervarolo di Sazzano** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 21,55 |
| Utile Ha | 21,49 |
| Altro-tare Ha | 0,06 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 20;25 |
| Particella | 11p-12p-13p ; 12p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord-Est | |
| Pendenza % | 35,40 | |
| Altitudine mt slm | min. 1346 | max 1491 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 120 |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 619,08 |
| Provvigione reale totale | 21,49 | 13302,53 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 15 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

*Faggio* *100%*

Descrizione:

La fustaia matura copre il 55% della superficie, seguita dalla fustaia adulta con il 28%, dalla fustaia giovane con il 10%, dalla perticaia adulta con il 6% e dalla perticaia giovane con l'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,24 | 1,09 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,30 | 6,04 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,09 | 9,73 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 6,07 | 28,26 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 9,13 | 42,49 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 2,66 | 12,38 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 21,49 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 21,49 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Assente |
| Specie prevalenti: | agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | rovo,felce |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **151** | **Denominazione località** | **Cervarolo di Sazzano** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 19,82 |
| Utile Ha | 17,33 |
| Altro-tare Ha | 2,49 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 20;25 |
| Particella | 13p ; 10p-12p-21p-23p-24p-31p-33p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord | |
| Pendenza % | 33,84 | |
| Altitudine mt slm | min. 1264 | max 1363 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 20 |
| Classe cronologica o diametrica | 10-30 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **10-30** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 442,81 |
| Provvigione reale totale | 17,33 | 7675,22 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **135,6** |
| Ripresa totale | | **2350** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 13 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Faggio* | *69%* |
| *Ontano napoletano* | *31%* |

Descrizione:

Le fustaie mature coprono il 40% della superficie, seguite dalle fustaie adulte con il 30% e dalle fustaie giovani con il 25%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,01 | 0,04 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,92 | 5,30 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 4,23 | 24,42 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 5,13 | 29,59 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 4,33 | 24,96 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 2,69 | 15,54 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,03 | 0,16 |
| **Totale** | 17,33 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglio secondario per favorire l'affermazione della rinnovazione insediata. Nei tratti migliori andrà eseguito lo sgombero, mentre in alcuni si dovrà procedere con la sementazione. Rinfoltimento con selvaggioni di faggio nelle zone rimaste scoperte dal taglio precedente, eccessivamente intenso. La particella dovrà essere chiusa al pascolo. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 17,33 | 135,6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 2350,4 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| Copertura: | Frequente |
|---|---|
| Specie prevalenti: | rovo |

**STRATO ERBACEO**

| Copertura: | difusa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | graminacee,ortiche,sambuco |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **152** | **Denominazione località** | **Cervarolo di Sazzano** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 15,90 |
| Utile Ha | 15,87 |
| Altro-tare Ha | 0,03 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 25 |
| Particella | 12p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Est |
| Pendenza % | 36,76 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1351 | 1516 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| **Sottosuolo** |
|---|
| **Calcareo** |

| **Suolo** |
|---|
| **MAP 4.4** |

| **Viabilità** |
|---|
| **Scarsamente servita** |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 20 |
| Classe cronologica o diametrica | 10-30 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **10-30** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 597,57 |
| Provvigione reale totale | 15,87 | 9480,47 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **165,1** |
| Ripresa totale | | **2620** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 10 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Acero montano* | *1%* |
| *Agrifoglio* | *1%* |
| *Faggio* | *97%* |
| *Sorbo degli Ucc.* | *1%* |

Descrizione:

La fustaia matura rappresenta il 58% della superficie, seguita dalle fustaie adulte con il 23%, dalle fustaie giovani con il 10%, dalla perticaia adulta con il 5% e dalla perticaia giovane con il 4%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,50 | 3,14 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,79 | 4,95 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,61 | 10,16 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 3,71 | 23,39 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 6,38 | 40,18 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 2,88 | 18,17 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 15,87 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglio secondario modulato sull'andamento della rinnovazione: ove il novellame va insediandosi ma è ancora di dimensioni ridotte, taglio di luce asportando gli alberi di maggiori dimensioni per circa il 50% del volume. Taglio di sementazione nella zona non interessata dall'intervento precedente, eliminando gli alberi di minori dimensioni per circa un 50% del loro numero e un 30% del volume. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 15,87 | 165,1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 2619,2 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| Copertura: | Diffusa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| Copertura: | Diffusa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | Rovo, felce, asperula, oxalis, dafne, viola, graminacee, sanicule e prenantes |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar

SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **162** | **Denominazione località** | **Orno** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 27,59 |
| Utile Ha | 27,59 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 23 |
| Particella | 29p-33p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Est |
| Pendenza % | 38,72 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1048 | 1334 |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.4** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | 140 | |
| Classe cronologica o diametrica | 130-150 | |
| Anno di taglio | | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | | **130-150** |

| | Ha: | mc: | | Ha: | mc: |
|---|---|---|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 755,81 | Ripresa unitaria | | **131,9** |
| Provvigione reale totale | 27,59 | 20854,24 | Ripresa totale | | **3640** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 18 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *1%* | *Acero opalo* | *2%* | *Carpino bianco* | *7%* |
| *Faggio* | *84%* | *Betulla* | *2%* | | |
| *Maggiociondolo* | *0%* | | | | |
| *Ontano napoletano* | *4%* | | | | |

Descrizione:

La fustaia matura domina la particella 162, coprendo l'85% della superficie, seguita dalle fustaie adulte con l'8%, le fustaie giovani con il 3%, le perticaie adulte con il 2% e le perticaie giovani con l'1%. Il resto della superficie è occupato da formazioni erbacee o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,01 | 0,04 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,25 | 0,91 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,71 | 2,56 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,99 | 3,58 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,41 | 8,72 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 8,44 | 30,59 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 12,90 | 46,77 |
| Fustaie mature h >32 m | 1,89 | 6,83 |
| **Totale** | 27,59 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 27,59 | 131,9 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 3640,2 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Assente |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Assente |
| Specie prevalenti: | 0 |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **163** | **Denominazione località** | **Orno** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 12,59 |
| Utile Ha | 12,59 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 18;23 |
| Particella | 23 ; 29p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest | |
| Pendenza % | 32,66 | |
| Altitudine mt slm | min. 1141 | max 1275 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.4** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 140 |
| Classe cronologica o diametrica | 130-150 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **130-150** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 762,81 |
| Provvigione reale totale | 12,59 | 9605,10 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **124,7** |
| Ripresa totale | | **1570** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 9 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 1 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Acero montano* | *1%* |
| *Agrifoglio* | *3%* |
| *Faggio* | *95%* |
| *Sorbo degli Ucc.* | *1%* |

Descrizione:

La fustaia matura rappresenta il 78% della superficie della particella 163, seguita dalle fustaie adulte con il 13% e le fustaie giovani con l'8%. Le perticaie giovani occupano l'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,12 | 0,98 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,94 | 7,45 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,33 | 10,53 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 2,43 | 19,26 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 4,53 | 36,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 3,25 | 25,78 |
| **Totale** | 12,59 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 12,59 | 124,7 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 1570,2 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Rovo e dafne |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **164** | **Denominazione località** | **Valle Piana** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 26,74 |
| Utile Ha | 26,74 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 18 |
| Particella | 11p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Est |
| Pendenza % | 32,94 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1139 | 1264 |

| **Sottosuolo** |
|---|
| **Calcareo** |

| **Suolo** |
|---|
| **MAP 4.4** |

| **Viabilità** |
|---|
| **Ben servita** |

| Giacitura | |
|---|---|
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 140 |
| Classe cronologica o diametrica | 130-150 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **130-150** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 740,14 |
| Provvigione reale totale | 26,74 | 19794,24 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **143,6** |
| Ripresa totale | | **3840** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 21 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 2 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Agrifoglio* | *2%* | *Acero opalo* | *3%* |
| *Faggio* | *95%* | | |
| *Sorbo degli Ucc.* | *0%* | | |

Descrizione:

Nella particella 164, la fustaia matura copre l'83% della superficie, seguita dalle fustaie adulte con il 9% e le fustaie giovani con il 6%. Le perticaie giovani occupano il 2%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,50 | 1,85 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,67 | 6,26 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,62 | 9,80 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 6,59 | 24,65 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 15,36 | 57,43 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 26,74 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 26,74 | 143,6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 3840,6 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Ciclamino, pervinca e dafne |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **165** | **Denominazione località** | **Valle Piana** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 8,60 |
| Utile Ha | 8,60 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 18 |
| Particella | 11p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest | |
| Pendenza % | 31,94 | |
| Altitudine mt slm | min. 1136 | max 1242 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 140 |
| Classe cronologica o diametrica | 130-150 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 711,78 |
| Provvigione reale totale | 8,60 | 6124,23 |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 7 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2025-2027** |
| Età media all'anno di taglio | **130-150** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **122,1** |
| Ripresa totale | | **1050** |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

*Agrifoglio* 1% *Acero opalo* 1%
*Faggio* 98%

Descrizione:

La fustaia matura domina la particella 165, coprendo l'83% della superficie, seguita dalle fustaie adulte con il 12% e le fustaie giovani con il 3%. Le perticaie giovani occupano l'1%. Il resto della superficie è occupato da formazioni erbacee o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,13 | 1,49 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,23 | 2,67 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,05 | 12,17 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 3,37 | 39,14 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 3,83 | 44,52 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 8,60 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2025-2027 | 8,60 | 122,1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 1050,5 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Pervinca e ciclamino |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **166** | **Denominazione località** | **Vallone Scurillo** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 32,90 |
| Utile Ha | 32,70 |
| Altro-tare Ha | 0,20 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 18;24;29;30 |
| Particella | 11p ; 330p ; 1p-5p ; 1p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord-Est | |
| Pendenza % | 37,12 | |
| Altitudine mt slm | min. 1052 | max 1312 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

| **Sottosuolo** |
|---|
| **Calcareo** |

| **Suolo** |
|---|
| **MAP 4.4** |

| **Viabilità** |
|---|
| **Scarsamente servita** |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 140 |
| Classe cronologica o diametrica | 130-150 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 802,45 |
| Provvigione reale totale | 32,70 | 26243,44 |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 20 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 2 |
| | Relascopio | |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2028-2030** |
| Età media all'anno di taglio | **130-150** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **211,3** |
| Ripresa totale | | **6910** |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *1%* | *Cerro* | *4%* |
| *Agrifoglio* | *12%* | | |
| *Faggio* | *83%* | | |
| *Sorbo degli Ucc.* | *0%* | | |

Descrizione:

La fustaia matura copre l'87% della superficie della particella 166, seguita dalle fustaie adulte con il 9% e le fustaie giovani con il 2%. Le perticaie giovani occupano il 2%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,64 | 1,94 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,61 | 1,86 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,97 | 9,07 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 7,37 | 22,54 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 10,95 | 33,47 |
| Fustaie mature h >32 m | 10,17 | 31,10 |
| **Totale** | 32,70 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglio di sementazione a carico degli alberi di minori dimensioni per circa un 50% del loro numero e del 30% del volume. Nella zona centrale della particella interessata da un sentiero protetto da una staccionata, l'intervento dovrà limitarsi ad un diradamento moderato dal basso che asporti gli alberi sottomessi e quelli che potrebbero risultare pericolosi per chi percorre il sentiero. Quest'ultimo intervento dovrà riguardare anche la zona più a valle prossima alla chiesetta di Santa Nesta. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2028-2030 | 32,70 | 211,3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 6910,9 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Rovo, viola e oxalis |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **167** | **Denominazione località** | **Creta Rossa** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 37,65 |
| Utile Ha | 37,54 |
| Altro-tare Ha | 0,11 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 18;24;30;33 |
| Particella | 11p ; 330p ; 1p ; 1p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord-Est | |
| Pendenza % | 35,15 | |
| Altitudine mt slm | min. 1055 | max 1320 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 140 |
| Classe cronologica o diametrica | 130-150 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2028-2030** |
| Età media all'anno di taglio | **130-150** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 772,31 |
| Provvigione reale totale | 37,54 | 28992,75 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **141,7** |
| Ripresa totale | | **5320** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 21 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 1 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Agrifoglio* | *21%* | *Acero opalo* | *1%* |
| *Faggio* | *77%* | *Carpino nero* | *1%* |
| *Maggiociondolo* | *1%* | *Cerro* | *0%* |

Descrizione:

Nella particella 167, la fustaia matura rappresenta l'82% della superficie, seguita dalle fustaie adulte con il 13% e le fustaie giovani con il 4%. Le perticaie giovani occupano l'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,02 | 0,05 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,03 | 0,09 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,33 | 0,89 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,64 | 4,37 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 4,94 | 13,16 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 8,24 | 21,95 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 14,72 | 39,21 |
| Fustaie mature h >32 m | 7,62 | 20,29 |
| **Totale** | 37,54 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2028-2030 | 37,54 | 141,7 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 5320,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Vinca ed edera |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **169** | **Denominazione località** | **Serroncelli** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 17,92 |
| Utile Ha | 17,89 |
| Altro-tare Ha | 0,03 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 24;30;31;33 |
| Particella | 330p ; 1p ; 17p-Y901p ; 1p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud | |
| Pendenza % | 29,48 | |
| Altitudine mt slm | min. 1062 | max 1145 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 140 |
| Classe cronologica o diametrica | 130-150 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **130-150** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 744,31 |
| Provvigione reale totale | 17,89 | 13316,18 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **172,2** |
| Ripresa totale | | **3080** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 14 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 3 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Acero montano* | *0%* |
| *Agrifoglio* | *4%* |
| *Faggio* | *95%* |

Descrizione:

La fustaia matura copre l'89% della superficie della particella 169, mentre le fustaie giovani occupano l'11%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,90 | 10,63 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 7,24 | 40,45 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 7,76 | 43,38 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,99 | 5,54 |
| **Totale** | 17,89 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 17,89 | 172,2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 3080,1 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Vinca ed edera |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **170** | **Denominazione località** | **Serroncelli** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 12,62 |
| Utile Ha | 12,60 |
| Altro-tare Ha | 0,02 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 24;30;31 |
| Particella | 330p ; 1p ; 7-11-17p-49-Y901p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord | |
| Pendenza % | 35,92 | |
| Altitudine mt slm | min. 1063 | max 1147 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 140 |
| Classe cronologica o diametrica | 130-150 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 778,67 |
| Provvigione reale totale | 12,60 | 9811,13 |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 8 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 2 |
| | Relascopio | |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **130-150** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **162,7** |
| Ripresa totale | | **2050** |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Agrifoglio* | *2%* |
| *Faggio* | *98%* |

Descrizione:

Nella particella 170, la fustaia matura copre il 92% della superficie, mentre le fustaie giovani rappresentano l'8%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,04 | 8,21 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 4,02 | 31,92 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 5,75 | 45,62 |
| Fustaie mature h >32 m | 1,80 | 14,25 |
| **Totale** | 12,60 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 12,60 | 162,7 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 2050,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | 0 |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **173** | **Denominazione località** | **Cervarolo di Sazzano** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 9,95 |
| Utile Ha | 9,10 |
| Altro-tare Ha | 0,85 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 25 |
| Particella | 12p-32-33p-34p-40p-41p-42p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Est |
| Pendenza % | 34,37 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1264 | 1368 |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

Giacitura

Manufatti

Risorse idriche

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 120 |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 575,52 |
| Provvigione reale totale | 9,10 | 5239,50 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 7 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Agrifoglio* | *1%* |
| *Faggio* | *95%* |
| *Ontano napoletano* | *4%* |

Descrizione:

Nella particella 173, la fustaia matura copre il 61% della superficie, con la fustaia adulta al 25%, la fustaia giovane al 12% e la perticaia adulta al 2%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,20 | 2,16 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,06 | 11,59 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,27 | 24,99 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 3,02 | 33,18 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 2,56 | 28,08 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 9,10 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 9,10 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| Copertura: | Diffusa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| Copertura: | Diffusa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | Rovo, graminacee, viola e felce |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **174** | **Denominazione località** | **Cervarolo di Sazzano** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 24,88 |
| Utile Ha | 24,67 |
| Altro-tare Ha | 0,21 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 25 |
| Particella | 12p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Est |
| Pendenza % | 38,93 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1346 | 1548 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 100 |
| Classe cronologica o diametrica | 90-110 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 602,78 |
| Provvigione reale totale | 24,67 | 14871,76 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 16 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Acero montano* | *0%* |
| *Agrifoglio* | *0%* |
| *Faggio* | *97%* |
| *Maggiociondolo* | *0%* |
| *Ontano napoletano* | *2%* |

Descrizione:

La fustaia matura copre il 50% della superficie della particella 174, seguita dalla fustaia adulta con il 25%, la fustaia giovane con il 12%, la perticaia adulta con il 9% e la perticaia giovane con il 4%. Il resto della superficie è occupato da formazioni erbacee o arbustive (13%).

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,07 | 4,32 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,24 | 9,06 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,98 | 12,08 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 6,06 | 24,56 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 7,25 | 29,40 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 5,07 | 20,57 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 24,67 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 24,67 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| Copertura: | Diffusa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| Copertura: | Assente |
|---|---|
| Specie prevalenti: | 0 |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **187** | **Denominazione località** | **Apeticchia** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 20,42 |
| Utile Ha | 20,40 |
| Altro-tare Ha | 0,02 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 23 |
| Particella | 29p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Ovest | |
| Pendenza % | 31,95 | |
| Altitudine mt slm | min. 1304 | max 1505 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

| |
|---|
| **Sottosuolo** |
| **Calcareo** |
| **Suolo** |
| **MAP 4.4** |
| **Viabilità** |
| **Ben servita** |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 100 |
| Classe cronologica o diametrica | 90-110 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 508,36 |
| Provvigione reale totale | 20,40 | 10368,06 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | |
|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n 13 |
| | Cavallettamento - Ha |
| | Alberi modello - n 0 |
| | Relascopio |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *#ESPANSIONE!* | *Acero opalo* | *0%* | *Orniello* | *0%* |

Descrizione:

Nella particella 187, la fustaia matura occupa il 22% della superficie. La fustaia adulta è presente con il 27%, la fustaia giovane con il 19%, la perticaia adulta con il 22% e la perticaia giovane con il 10%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 2,04 | 10,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 4,33 | 21,21 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,99 | 19,58 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 5,57 | 27,32 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 3,94 | 19,32 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,53 | 2,57 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 20,40 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 20,40 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Assente |
| Specie prevalenti: | 0 |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **188** | **Denominazione località** | **Montagna Grande** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 15,60 |
| Utile Ha | 15,55 |
| Altro-tare Ha | 0,05 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 18;23 |
| Particella | 11p ; 29p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord |
| Pendenza % | 39,42 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1250 | 1510 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| **Sottosuolo** |
|---|
| **Calcareo** |

| **Suolo** |
|---|
| **MAP 4.4** |

| **Viabilità** |
|---|
| **Ben servita** |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 120 |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 |

| | | |
|---|---|---|
| Anno di taglio | | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | | **110-130** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 640,47 |
| Provvigione reale totale | 15,55 | 9962,10 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **146,0** |
| Ripresa totale | | **2270** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 7 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *1%* | *Acero opalo* | *3%* | *Orniello* | *1%* |
| *Faggio* | *94%* | | | | |
| *Ontano napoletano* | *1%* | | | | |
| *Sorbo degli Ucc.* | *1%* | | | | |

Descrizione:

La fustaia matura è prevalente nella particella 188, coprendo il 58% della superficie. La fustaia adulta segue con il 19%, la fustaia giovane con il 12% e la perticaia adulta con l'8%. Le formazioni erbacee o arbustive coprono l'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,29 | 1,87 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,15 | 7,40 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,57 | 10,07 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,69 | 17,32 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 5,18 | 33,27 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 4,61 | 29,63 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,07 | 0,44 |
| **Totale** | 15,55 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 15,55 | 146,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 2270,6 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | diffusa |
| Specie prevalenti: | oxalis,rovo,asperula,felce maschio,viola |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **189** | **Denominazione località** | **Ripa di Moggio** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 24,37 |
| Utile Ha | 24,36 |
| Altro-tare Ha | 0,01 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 18;23 |
| Particella | 11p ; 29p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord |
| Pendenza % | 41,28 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1242 | 1510 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 140 |
| Classe cronologica o diametrica | 130-150 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **130-150** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 710,60 |
| Provvigione reale totale | 24,36 | 17311,95 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **117,4** |
| Ripresa totale | | **2860** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 17 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *2%* | *Acero opalo* | *1%* | *Olmo campestre* | *1%* |
| *Agrifoglio* | *0%* | *Salicone* | *0%* | | |
| *Faggio* | *96%* | | | | |

Descrizione:

La fustaia matura è dominante nella particella 189, coprendo il 75% della superficie. La fustaia adulta rappresenta il 13%, la fustaia giovane il 7% e la perticaia adulta il 4%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,23 | 0,95 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,92 | 3,79 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,91 | 7,84 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 3,16 | 12,98 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 6,69 | 27,47 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 10,54 | 43,28 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,90 | 3,68 |
| **Totale** | 24,36 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 24,36 | 117,4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 2860,3 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | diffusa |
| Specie prevalenti: | vinca,luzula,festuca ovina |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **190** | **Denominazione località** | **Filettone** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 12,93 |
| Utile Ha | 12,93 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 18 |
| Particella | 11p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Ovest | |
| Pendenza % | 35,73 | |
| Altitudine mt slm | min. 929 | max 1326 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 120 |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 |

| | | |
|---|---|---|
| Anno di taglio | | **0** |
| Età media all'anno di taglio | | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 618,20 |
| Provvigione reale totale | 12,93 | 7996,41 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 7 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Agrifoglio* | *8%* | *Acero opalo* | *1%* |
| *Faggio* | *86%* | | |
| *Maggiociondolo* | *5%* | | |

Descrizione:

La fustaia matura copre il 49% della superficie nella particella 190. La fustaia adulta segue con il 32%, la fustaia giovane con il 14% e la perticaia adulta con il 4%. Le formazioni erbacee o arbustive coprono l'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,46 | 3,57 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,79 | 13,87 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 3,96 | 30,63 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 5,93 | 45,84 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,79 | 6,08 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 12,93 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 12,93 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | diffusa |
| Specie prevalenti: | vinca,luzula,festuca ovina |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **191** | **Denominazione località** | **Terremoto** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 32,71 |
| Utile Ha | 32,59 |
| Altro-tare Ha | 0,12 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 18;23;24 |
| Particella | 11p ; 29p ; 330p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Est |
| Pendenza % | 37,83 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1192 | 1510 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| **Sottosuolo** |
|---|
| **Calcareo** |

| **Suolo** |
|---|
| **MAP 4.4** |

| **Viabilità** |
|---|
| **Ben servita** |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 120 |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2028-2030** |
| Età media all'anno di taglio | **110-130** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 622,90 |
| Provvigione reale totale | 32,59 | 20297,48 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **98,5** |
| Ripresa totale | | **3210** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 21 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Acero montano* | *4%* |
| *Agrifoglio* | *2%* |
| *Faggio* | *93%* |
| *Maggiociondolo* | *1%* |
| *Sorbo degli Ucc.* | *0%* |

Descrizione:

Nella particella 191, la fustaia matura rappresenta il 57% della superficie. La fustaia adulta copre il 26%, la fustaia giovane il 7% e la perticaia giovane il 4%. Le formazioni erbacee o arbustive coprono l'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,18 | 3,62 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,98 | 6,06 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,22 | 6,81 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 8,54 | 26,19 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 15,13 | 46,42 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 3,55 | 10,89 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 32,59 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2028-2030 | 32,59 | 98,5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 3209,6 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | diffusa |
| Specie prevalenti: | graminacee,asperula,geranio |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **192** | **Denominazione località** | **Serra dei Frasci** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 36,38 |
| Utile Ha | 36,37 |
| Altro-tare Ha | 0,01 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 18;24;33 |
| Particella | 11p ; 311p-330p ; 1p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud-Est | |
| Pendenza % | 37,14 | |
| Altitudine mt slm | min. 1081 | max 1349 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 140 |
| Classe cronologica o diametrica | 130-150 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2028-2030** |
| Età media all'anno di taglio | **130-150** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 787,28 |
| Provvigione reale totale | 36,37 | 28632,02 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **159,4** |
| Ripresa totale | | **5160** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 27 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *2%* | *Betulla* | *0%* |
| *Agrifoglio* | *27%* | | |
| *Faggio* | *70%* | | |
| *Ontano napoletano* | *1%* | | |

Descrizione:

La fustaia matura domina la particella 192, coprendo l'80% della superficie. La fustaia adulta segue con l'11%, la fustaia giovane con il 5%, la perticaia adulta con il 2% e la perticaia giovane con l'1%. Le formazioni erbacee o arbustive coprono l'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,21 | 0,58 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,80 | 2,20 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,91 | 5,24 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 4,01 | 11,03 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 5,78 | 15,90 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 12,29 | 33,78 |
| Fustaie mature h >32 m | 11,38 | 31,28 |
| **Totale** | 36,37 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2028-2030 | 36,37 | 159,4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 5797,4 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | asperula,vinca,ruscus spp. |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **193** | **Denominazione località** | **Serroncelli Soprani** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 19,98 |
| Utile Ha | 19,96 |
| Altro-tare Ha | 0,02 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 24;31 |
| Particella | 278-279-280-281-297p-298p-299p-300p-328-330p-X1p ; 17p-Y901p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord | |
| Pendenza % | 32,03 | |
| Altitudine mt slm | min. 1083 | max 1173 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 140 |
| Classe cronologica o diametrica | 130-150 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 777,09 |
| Provvigione reale totale | 19,96 | 15509,66 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **130-150** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **128,8** |
| Ripresa totale | | **2570** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 13 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | |
|---|---|
| *Agrifoglio* | *8%* |
| *Faggio* | *92%* |

Descrizione:

In questa particella, la fustaia matura domina la scena coprendo ben il 92% della superficie. Il restante 8% è occupato dalla fustaia adulta.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,84 | 9,21 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 5,92 | 29,66 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 11,73 | 58,77 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,47 | 2,36 |
| **Totale** | 19,96 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 19,96 | 128,8 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 2569,8 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | geranio,asperula,oxalis,vinca |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **194** | **Denominazione località** | **Serroncelli Soprani** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 11,99 |
| Utile Ha | 11,98 |
| Altro-tare Ha | 0,01 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 24;30;33 |
| Particella | 275-286-291-295-296-297p-298p-299p-300p-330p-X1p ; 1p ; 1p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord-Est | |
| Pendenza % | 29,78 | |
| Altitudine mt slm | min. 1079 | max 1132 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 140 |
| Classe cronologica o diametrica | 130-150 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 719,07 |
| Provvigione reale totale | 11,98 | 8611,51 |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 9 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 6 |
| | Relascopio | |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **130-150** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **128,5** |
| Ripresa totale | | **1540** |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | |
|---|---|
| *Agrifoglio* | *1%* |
| *Faggio* | *99%* |

Descrizione:

La fustaia matura si estende sull'80% della superficie, mentre la fustaia adulta copre il 18%. Una piccola porzione del 2% è rappresentata dalla fustaia giovane.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,25 | 2,08 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,10 | 17,51 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 4,73 | 39,53 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 4,67 | 39,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,22 | 1,88 |
| **Totale** | 11,98 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 11,98 | 128,5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 1539,5 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Assente |
| Specie prevalenti: | 0 |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **198** | **Denominazione località** | **Cervarolo di Sazzano** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 17,70 |
| Utile Ha | 16,81 |
| Altro-tare Ha | 0,89 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 25 |
| Particella | 12p-42p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Est | |
| Pendenza % | 30,92 | |
| Altitudine mt slm | min. 989 | max 1377 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 20 |
| Classe cronologica o diametrica | 10-30 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 522,11 |
| Provvigione reale totale | 16,81 | 8776,59 |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 10 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2028-2030** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **179,7** |
| Ripresa totale | | **3020** |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Agrifoglio* | *4%* |
| *Faggio* | *93%* |
| *Ontano napoletano* | *4%* |

Descrizione:

La fustaia matura rappresenta il 71% della superficie. La fustaia adulta copre il 26% e la fustaia giovane il 2%. Le formazioni erbacee o arbustive completano il restante 1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,01 | 0,06 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,07 | 0,41 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,32 | 1,90 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 4,43 | 26,33 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 7,69 | 45,76 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 4,29 | 25,54 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 16,81 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglio secondario differenziato secondo l'insediamento della rinnovazione. In alcuni piccoli tratti, in presenza di novellame già insediato, si potrà procedere con un taglio di luce che asporti circa il 50% del volume. In altri, dove non si è intervenuti con il taglio precedente, taglio di rinnovazione che asporti non più del 50% del numero degli alberi scelti tra quelli di minori dimensioni. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2028-2030 | 16,81 | 179,7 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 3020,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| Copertura: | Diffusa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| Copertura: | Diffusa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | felce,dafne |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **199** | **Denominazione località** | **Cervarolo di Sazzano** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 14,12 |
| Utile Ha | 14,12 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 25 |
| Particella | 12 |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Est |
| Pendenza % | 32 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1304 | 1393 |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

Giacitura

Manufatti

Risorse idriche

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | | 140 |
| Classe cronologica o diametrica | | 130-150 |
| | Ha: | mc: |
| Provvigione reale unitaria | 1 | 671,46 |
| Provvigione reale totale | 14,12 | 9480,88 |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | CAV |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Anno di taglio | | **1986** |
| Età media all'anno di taglio | | |
| | Ha: | mc: |
| Ripresa unitaria | | |
| Ripresa totale | | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | Parco Regionale Picentini | |
| Autorità di Bacino | | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO




### STRATO ARBOREO

Specie presenti:

*Faggio, ontano napoletano, aceri spp., altre latifoglie*

Descrizione:

In questa particella, la fustaia matura copre il 75% della superficie. La fustaia adulta occupa il 23% e la fustaia giovane il 3%.

| Tipologie strutturali | | | |
|---|---|---|---|
| | | Ha | % |
| Novelleti h 2-4 m | | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | | 0,42 | 3,01 |
| Fustaie mature h 20-24 m | | 3,30 | 23,36 |
| Fustaie mature h 24-28 m | | 4,11 | 29,12 |
| Fustaie mature h 28-32 m | | 5,21 | 36,90 |
| Fustaie mature h >32 m | | 1,08 | 7,61 |
| | **Totale** | 14,12 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |

**Interventi gestionali**

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Anno | Superficie - Ha | Superficie - % |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **Totale** | | |

**Ripresa**

| Intervento | Sistema di esbosco previsto | Anno | Ripresa planimetrica (Cedui) -Ha | Ripresa volumetrica - mc |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **Totale** | | |

| **STRATO ARBUSTIVO** | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | rovo |

| **STRATO ERBACEO** | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | dafne,viola,acetosella,asperula,sanicula,digitalis |

**PRESCRIZIONI**

Diradamento moderato dal basso

SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **204** | **Denominazione località** | **Apeticchia** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 12,28 |
| Utile Ha | 11,85 |
| Altro-tare Ha | 0,43 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 23 |
| Particella | 29p-33p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest |
| Pendenza % | 39,34 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1213 | 1435 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 80 |
| Classe cronologica o diametrica | 70-90 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **70-90** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 444,47 |
| Provvigione reale totale | 11,85 | 5265,86 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **100,4** |
| Ripresa totale | | **1190** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 6 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

*#ESPANSIONE!* *Acero opalo* *0%*

Descrizione:

La fustaia matura copre il 27% della superficie, con la fustaia adulta al 26%, la fustaia giovane al 15%, la perticaia adulta al 18%, la perticaia giovane al 12% e il novelleto al 2%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,26 | 2,16 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,25 | 10,53 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,14 | 18,04 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,81 | 15,28 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 3,11 | 26,27 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 2,95 | 24,92 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,33 | 2,81 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 11,85 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 11,85 | 100,4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 1189,7 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | graminacee,vinca,dafne |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **205b** | **Denominazione località** | **Apeticchia** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 11,18 |
| Utile Ha | 11,18 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 23 |
| Particella | 29p-4-5-6-7-151-157 |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord-Est | |
| Pendenza % | 32,25 | |
| Altitudine mt slm | min. 1305 | max 1426 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.4** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 140 |
| Classe cronologica o diametrica | 130-150 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **130-150** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 728,42 |
| Provvigione reale totale | 11,18 | 8141,30 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **114,5** |
| Ripresa totale | | **1280** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 9 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | | | |
|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *1%* | *Salicone* | *0%* |
| *Faggio* | *95%* | | |
| *Maggiociondolo* | *4%* | | |
| *Sorbo degli Ucc.* | *1%* | | |

Descrizione:

La fustaia matura copre l'86% della superficie. La fustaia adulta, la fustaia giovane e la perticaia adulta coprono rispettivamente il 6%, il 4% e il 3%. Le formazioni erbacee o arbustive completano l'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,03 | 0,25 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,38 | 3,43 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,40 | 3,59 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,72 | 6,42 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 5,80 | 51,86 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 3,85 | 34,45 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 11,18 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 11,18 | 114,5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 1279,7 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | assente |
| Specie prevalenti: | 0 |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Assente |
| Specie prevalenti: | 0 |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **208** | **Denominazione località** | **Stretta dell'Acernese** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 35,41 |
| Utile Ha | 35,39 |
| Altro-tare Ha | 0,02 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 24;25 |
| Particella | 330p ; 12p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord-Est | |
| Pendenza % | 35,09 | |
| Altitudine mt slm | min. 1094 | max 1337 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.4** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | 140 | |
| Classe cronologica o diametrica | 130-150 | |
| Anno di taglio | | **2028-2030** |
| Età media all'anno di taglio | | **110-130** |

| | Ha: | mc: | | Ha: | mc: |
|---|---|---|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 745,12 | Ripresa unitaria | | **146,4** |
| Provvigione reale totale | 35,39 | 26366,36 | Ripresa totale | | **5180** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 19 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 6 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Acero montano* | *0%* |
| *Faggio* | *100%* |
| *Ontano napoletano* | *0%* |

Descrizione:

La fustaia matura copre l'81% della superficie, con la fustaia adulta al 16% e la fustaia giovane al 3%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,88 | 2,49 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 5,73 | 16,18 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 12,51 | 35,36 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 12,88 | 36,40 |
| Fustaie mature h >32 m | 3,39 | 9,57 |
| **Totale** | 35,39 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2028-2030 | 35,39 | 146,4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 5179,3 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| Copertura: | Scarsa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | rovo |

**STRATO ERBACEO**

| Copertura: | Diffusa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | agrifoglio,oxalis,vinca,asperula |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **209** | **Denominazione località** | **Coste di Cervialto** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 31,70 |
| Utile Ha | 31,52 |
| Altro-tare Ha | 0,18 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 24;25;31 |
| Particella | 330p ; 12p ; 17p-18p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Ovest | |
| Pendenza % | 29,16 | |
| Altitudine mt slm | min. 1106 | max 1283 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 120 |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2025-2027** |
| Età media all'anno di taglio | **110-130** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 728,14 |
| Provvigione reale totale | 31,52 | 22947,79 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **135,8** |
| Ripresa totale | | **4280** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 20 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Acero montano* | *0%* |
| *Agrifoglio* | *2%* |
| *Faggio* | *98%* |
| *Ontano napoletano* | *0%* |
| *Sorbo degli Ucc.* | *0%* |

Descrizione:

La fustaia matura rappresenta il 78% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 20% e dalla fustaia giovane al 2%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,17 | 0,55 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,26 | 3,98 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 8,11 | 25,72 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 11,91 | 37,80 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 10,07 | 31,94 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 31,52 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2025-2027 | 31,52 | 135,8 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 4279,4 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| Copertura: | Diffusa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| Copertura: | Diffusa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | vinca,felce maschio,graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **211** | **Denominazione località** | **Coste di Cervialto** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 21,59 |
| Utile Ha | 21,59 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 25 |
| Particella | 12p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest |
| Pendenza % | 34,05 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1099 | 1388 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 140 |
| Classe cronologica o diametrica | 130-150 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2025-2027** |
| Età media all'anno di taglio | **130-150** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 768,07 |
| Provvigione reale totale | 21,59 | 16585,16 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **125,1** |
| Ripresa totale | | **2700** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 15 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | | | |
|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *0%* | *Acero opalo* | *0%* |
| *Faggio* | *98%* | | |
| *Maggiociondolo* | *1%* | | |
| *Sorbo degli Ucc.* | *0%* | | |

Descrizione:

La fustaia matura rappresenta l'85% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 12%, e la fustaia giovane al 3%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,74 | 3,45 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,93 | 13,58 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 5,38 | 24,89 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 11,91 | 55,15 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,63 | 2,93 |
| **Totale** | 21,59 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2025-2027 | 21,59 | 125,1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 2700,4 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | rovo |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | dafne,agrifoglio,vinca,geranio,felce maschio |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **212** | **Denominazione località** | **Valle Giamberardino** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 29,47 |
| Utile Ha | 29,38 |
| Altro-tare Ha | 0,09 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 25 |
| Particella | 12p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Est | |
| Pendenza % | 33,97 | |
| Altitudine mt slm | min. 1360 | max 1509 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 120 |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 637,82 |
| Provvigione reale totale | 29,38 | 18742,10 |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 20 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2028-2030** |
| Età media all'anno di taglio | **110-130** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **99,7** |
| Ripresa totale | | **2930** |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Agrifoglio* | *0%* |
| *Faggio* | *99%* |
| *Maggiociondolo* | *0%* |
| *Ontano napoletano* | *1%* |
| *Sorbo degli Ucc.* | *0%* |

Descrizione:

La fustaia matura copre il 61% della superficie, con la fustaia adulta al 19%, la fustaia giovane all'11%, e la perticaia giovane al 6%. La spessina è presente al 3%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,89 | 3,04 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,82 | 6,18 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,11 | 10,57 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 5,68 | 19,34 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 9,44 | 32,13 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 7,27 | 24,74 |
| Fustaie mature h >32 m | 1,17 | 3,99 |
| **Totale** | 29,38 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2028-2030 | 29,38 | 99,7 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 2930,5 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | dafne,agrifoglio,tasso,acetosella,asperula,digitalis,viola |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **215** | **Denominazione località** | **Impiccato** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 3,49 |
| Utile Ha | 3,49 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 25 |
| Particella | 12p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest |
| Pendenza % | 23,49 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 969 | 1359 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.4** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 140 |
| Classe cronologica o diametrica | 130-150 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 698,82 |
| Provvigione reale totale | 3,49 | 2435,89 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2028-2030** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **177,7** |
| Ripresa totale | | **620** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 1 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia matura rappresenta l'85% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 14%, e la fustaia giovane all'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,09 | 2,58 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,40 | 11,44 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 1,59 | 45,68 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 1,40 | 40,30 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 3,49 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2028-2030 | 3,49 | 177,7 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 619,2 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Assente |
| Specie prevalenti: | 0 |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | rovo,dafne,graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **220** | **Denominazione località** | **Valle d'Acero** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 22,81 |
| Utile Ha | 22,80 |
| Altro-tare Ha | 0,01 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 27 |
| Particella | 3p-151p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord-Est | |
| Pendenza % | 36,75 | |
| Altitudine mt slm | min. 1245 | max 1522 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 140 |
| Classe cronologica o diametrica | 130-150 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 731,63 |
| Provvigione reale totale | 22,80 | 16684,75 |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 13 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2025-2027** |
| Età media all'anno di taglio | **130-150** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **143,9** |
| Ripresa totale | | **3280** |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

*Faggio* *100%*

Descrizione:

La fustaia matura copre l'81% della superficie, con la fustaia adulta al 14%, e la fustaia giovane al 3%, e la perticaia giovane al 2%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,08 | 0,33 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,42 | 1,83 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,68 | 2,96 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 3,10 | 13,61 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 8,54 | 37,44 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 9,44 | 41,41 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,55 | 2,41 |
| **Totale** | 22,80 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2025-2027 | 22,80 | 143,9 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 3280,7 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Assente |
| Specie prevalenti: | 0 |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | rovo,asperula,acetosella,viola silvestre |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **221** | **Denominazione località** | **Valle d'Acero** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 8,36 |
| Utile Ha | 8,33 |
| Altro-tare Ha | 0,03 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 27 |
| Particella | 3p-151p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest | |
| Pendenza % | 32,99 | |
| Altitudine mt slm | min. 1246 | max 1402 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.4** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | 120 | |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 | |
| Anno di taglio | | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | | **110-130** |

| | Ha: | mc: | | Ha: | mc: |
|---|---|---|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 688,79 | Ripresa unitaria | | **294,1** |
| Provvigione reale totale | 8,33 | 5740,54 | Ripresa totale | | **2450** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 7 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

*Faggio* *100%*

Descrizione:

La fustaia matura rappresenta l'84% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 6%, e la fustaia giovane all'1%. Le formazioni erbacee o arbustive coprono l'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,03 | 0,32 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,08 | 0,99 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,64 | 7,68 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,46 | 5,54 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 1,71 | 20,52 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 5,01 | 60,12 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,40 | 4,84 |
| **Totale** | 8,33 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglio secondario differenziato secondo l'insediamento della rinnovazione. In alcuni piccoli tratti, in presenza di novellame già insediato, si potrà procedere con un taglio di luce che asporti circa il 50% del volume. Nella zona centrale, dove non si è intervenuti con il taglio precedente, o dove è stato molto debole e la copertura arborea è ancora chiusa, taglio di rinnovazione che asporti non più del 50% del numero degli alberi scelti tra quelli di minori dimensioni. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 8,33 | 294,1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 2451,3 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | rovo |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | dafne,viola,graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **222a** | **Denominazione località** | **Valle d'Acero** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 16,56 |
| Utile Ha | 16,56 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 27 |
| Particella | 151p |

| **Generalità** | | | |
|---|---|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest | | |
| Pendenza % | 37,58 | | |
| Altitudine mt slm | min. 1322 | max 1502 | |
| Giacitura | | | |
| Manufatti | | | |
| Risorse idriche | | | |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.4** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Età media attuale | 120 | | Anno di taglio | | **2025-2027** |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 | | Età media all'anno di taglio | | **110-130** |
| | Ha: | mc: | | Ha: | mc: |
| Provvigione reale unitaria | 1 | 613,12 | Ripresa unitaria | | **88,2** |
| Provvigione reale totale | 16,56 | 10151,84 | Ripresa totale | | **1460** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 5 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | |
|---|---|
| *Acero montano* | *2%* |
| *Faggio* | *98%* |

Descrizione:

La fustaia matura copre il 49% della superficie, con la fustaia adulta al 19%, la fustaia giovane al 15%, la perticaia adulta al 16%, e la perticaia giovane all'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,08 | 0,49 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,64 | 15,97 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,44 | 14,74 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 3,09 | 18,69 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 4,04 | 24,41 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 4,26 | 25,70 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 16,56 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2025-2027 | 16,56 | 88,2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 1459,7 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Assente |
| Specie prevalenti: | ginestra dei carbonai |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | viola silvestre,dafne,geranio,allium,asperula,dentaria |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **223a** | **Denominazione località** | **Valle d'Acero** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 10,58 |
| Utile Ha | 10,58 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 27 |
| Particella | 151p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest |
| Pendenza % | 37,44 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1319 | 1494 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| **Sottosuolo** |
|---|
| **Calcareo** |

| **Suolo** |
|---|
| **MAP 4.4** |

| **Viabilità** |
|---|
| **Ben servita** |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 140 |
| Classe cronologica o diametrica | 130-150 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2025-2027** |
| Età media all'anno di taglio | **130-150** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 735,53 |
| Provvigione reale totale | 10,58 | 7778,81 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **115,3** |
| Ripresa totale | | **1220** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 8 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Agrifoglio* | *1%* |
| *Faggio* | *93%* |
| *Maggiociondolo* | *3%* |
| *Ontano napoletano* | *2%* |

Descrizione:

La fustaia matura copre il 73% della superficie, con la fustaia adulta al 18%, e la fustaia giovane al 9%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,93 | 8,80 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,92 | 18,20 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 1,76 | 16,68 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 5,96 | 56,32 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 10,58 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2025-2027 | 10,58 | 115,3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 1219,5 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | graminacee,asperula,viola |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **224b** | **Denominazione località** | **Valle d'Acero** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 6,50 |
| Utile Ha | 6,50 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 27;28 |
| Particella | 151p ; 1p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud |
| Pendenza % | 39,10 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1296 | 1415 |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.4** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | 140 | |
| Classe cronologica o diametrica | 130-150 | |
| Anno di taglio | | **2025-2027** |
| Età media all'anno di taglio | | **130-150** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 787,20 |
| Provvigione reale totale | 6,50 | 5114,23 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **156,9** |
| Ripresa totale | | **1020** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 4 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

*Faggio* *100%*

Descrizione:

La fustaia matura rappresenta il 93% della superficie, e la fustaia adulta al 7%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,01 | 0,12 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,46 | 7,01 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 1,55 | 23,80 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 4,05 | 62,36 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,44 | 6,72 |
| **Totale** | 6,50 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2025-2027 | 6,50 | 156,9 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 1019,5 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | rovo |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | dafne,viola,sanicula,allium,vinca,asperula,geranio,dentaria |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **225** | **Denominazione località** | **Valle d'Acero** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 16,29 |
| Utile Ha | 16,29 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 24;27;28 |
| Particella | 330p ; 151p-162 ; 1p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest | |
| Pendenza % | 39,25 | |
| Altitudine mt slm | min. 1296 | max 1651 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 120 |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 620,28 |
| Provvigione reale totale | 16,29 | 10102,14 |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 13 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Faggio* | *100%* |
| *Ontano napoletano* | *0%* |

Descrizione:

La fustaia matura copre il 53% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 21%, la fustaia giovane al 18%, e la perticaia giovane al 7%. La spessina è presente all'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,20 | 1,21 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,94 | 5,78 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,95 | 18,14 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 3,52 | 21,60 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 5,98 | 36,69 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 2,66 | 16,36 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,04 | 0,23 |
| **Totale** | 16,29 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 16,29 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | rovo, agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | dafne,graminacee,viola,dentaria,ranuncolo,vinca |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **228** | **Denominazione località** | **Chiuvarelli** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 24,40 |
| Utile Ha | 24,00 |
| Altro-tare Ha | 0,40 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 24 |
| Particella | 3p-330p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Est |
| Pendenza % | 36,93 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1167 | 1573 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 120 |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2028-2030** |
| Età media all'anno di taglio | **110-130** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 597,16 |
| Provvigione reale totale | 24,00 | 14331,03 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **133,3** |
| Ripresa totale | | **3200** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 14 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Faggio* | *100%* |
| *Maggiociondolo* | *0%* |

Descrizione:

La fustaia matura rappresenta il 47% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 31%, la fustaia giovane al 15%, e la perticaia giovane al 7%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,01 | 0,02 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,55 | 6,47 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,70 | 15,43 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 7,47 | 31,14 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 8,60 | 35,82 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 2,67 | 11,12 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 24,00 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2028-2030 | 24,00 | 133,3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 3199,8 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | graminacee,ciclamino,asperula |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **229** | **Denominazione località** | **Vallone del Turco** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 34,06 |
| Utile Ha | 33,85 |
| Altro-tare Ha | 0,21 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 24 |
| Particella | 3p-46-47-48-49-330p-332p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Est | |
| Pendenza % | 36,86 | |
| Altitudine mt slm | min. 1163 | max 1509 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 120 |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2028-2030** |
| Età media all'anno di taglio | **110-130** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 669,32 |
| Provvigione reale totale | 33,85 | 22656,22 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **132,1** |
| Ripresa totale | | **4470** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 23 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Acero montano* | *0%* |
| *Faggio* | *99%* |
| *Maggiociondolo* | *0%* |

Descrizione:

La fustaia matura copre il 60% della superficie, con la fustaia adulta al 30%, e la fustaia giovane al 9%. Le formazioni erbacee o arbustive coprono l'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,15 | 0,44 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,20 | 9,46 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 10,07 | 29,74 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 11,36 | 33,55 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 9,08 | 26,81 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 33,85 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2028-2030 | 33,85 | 132,1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 4470,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| Copertura: | scarsa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | rovo, agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| Copertura: | scarsa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | felce maschio, asperula, acetosella, geranio, vinca |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **230** | **Denominazione località** | **Vallone del Turco** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 35,75 |
| Utile Ha | 35,72 |
| Altro-tare Ha | 0,03 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 24;25;26 |
| Particella | 330p ; 12p ; 1p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud |
| Pendenza % | 36,81 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1115 | 1392 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 120 |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2028-2030** |
| Età media all'anno di taglio | **110-130** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 658,74 |
| Provvigione reale totale | 35,72 | 23532,96 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **139,0** |
| Ripresa totale | | **4970** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 24 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 6 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Acero montano* | *0%* |
| *Agrifoglio* | *10%* |
| *Faggio* | *89%* |
| *Maggiociondolo* | *0%* |
| *Ontano napoletano* | *0%* |

Descrizione:

La fustaia matura copre il 58% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 29%, la fustaia giovane al 10%, e la perticaia giovane al 3%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,14 | 3,19 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,69 | 10,34 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 10,18 | 28,51 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 12,56 | 35,15 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 7,27 | 20,36 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,88 | 2,45 |
| **Totale** | 35,72 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2028-2030 | 35,72 | 139,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 4966,4 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| Copertura: | Diffusa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| Copertura: | diffusa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | felce maschio, acetosella, asperula, pervinca, luzula, festuca ovina |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **232** | **Denominazione località** | **Coste di Cervialto** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 40,81 |
| Utile Ha | 40,72 |
| Altro-tare Ha | 0,09 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 24;25;26 |
| Particella | 3p-4p-330p ; 12p ; 1p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest |
| Pendenza % | 24,95 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1149 | 1339 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 140 |
| Classe cronologica o diametrica | 130-150 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **130-150** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 734,79 |
| Provvigione reale totale | 40,72 | 29917,37 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **137,3** |
| Ripresa totale | | **5590** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 26 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 3 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

*Faggio* *100%*

Descrizione:

La fustaia matura rappresenta il 160% della superficie, con la fustaia adulta al 17%, e la fustaia giovane all'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,01 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,04 | 0,09 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,93 | 2,29 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 4,54 | 11,16 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 20,55 | 50,47 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 14,65 | 35,98 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 40,72 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 40,72 | 137,3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 5589,4 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | rovo |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **233** | **Denominazione località** | **Coste di Cervialto** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 34,69 |
| Utile Ha | 34,69 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 24;25;26 |
| Particella | 330p ; 12p ; 1p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest | |
| Pendenza % | 32,15 | |
| Altitudine mt slm | min. 1129 | max 1359 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 120 |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 707,66 |
| Provvigione reale totale | 34,69 | 24547,16 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2025-2027** |
| Età media all'anno di taglio | **110-130** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **151,9** |
| Ripresa totale | | **5270** |

| Rilievo tassatorio | |
|---|---|
| AdS - n | 20 |
| Cavallettamento - Ha | |
| Alberi modello - n | 0 |
| Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

*#ESPANSIONE!*

Descrizione:

La fustaia matura copre il 90% della superficie, con la fustaia adulta al 20%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,00 | 0,01 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,54 | 1,55 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 7,43 | 21,43 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 21,67 | 62,47 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 5,04 | 14,53 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 34,69 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2025-2027 | 34,69 | 151,9 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 5269,6 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **235** | **Denominazione località** | **Coste di Cervialto** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 13,14 |
| Utile Ha | 13,14 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 25;26 |
| Particella | 12p ; 1p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Ovest | |
| Pendenza % | 46,21 | |
| Altitudine mt slm | min. 1337 | max 1500 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 120 |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 631,94 |
| Provvigione reale totale | 13,14 | 8302,37 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 8 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Acero montano* | *1%* |
| *Agrifoglio* | *2%* |
| *Faggio* | *93%* |
| *Maggiociondolo* | *4%* |

Descrizione:

La fustaia matura copre il 91% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 67%, e la fustaia giovane al 14%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,07 | 8,16 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 5,12 | 39,00 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 4,69 | 35,71 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 2,25 | 17,13 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 13,14 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 13,14 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | diffusa |
| Specie prevalenti: | graminacee, vinca |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **236** | **Denominazione località** | **Coste di Cervialto** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 11,10 |
| Utile Ha | 11,10 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 25 |
| Particella | 12p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest |
| Pendenza % | 42,11 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1349 | 1492 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 100 |
| Classe cronologica o diametrica | 90-110 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 523,78 |
| Provvigione reale totale | 11,10 | 5815,85 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 6 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *0%* | *Salicone* | *1%* |
| *Faggio* | *88%* | | |
| *Maggiociondolo* | *11%* | | |

Descrizione:

La fustaia matura copre il 31% della superficie, seguita dalla fustaia giovane al 21%, la fustaia adulta al 16%, la perticaia giovane al 12%, e il resto sono formazioni erbacee o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,90 | 17,07 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,31 | 29,82 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,57 | 23,14 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 2,95 | 26,56 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,33 | 2,95 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,05 | 0,46 |
| **Totale** | 11,10 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 11,10 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | diffusa |
| Specie prevalenti: | rovo, agrifoglio, dafne, tasso |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | diffusa |
| Specie prevalenti: | graminacee, geranio, asperula |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **240** | **Denominazione località** | **Impiccato** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 7,36 |
| Utile Ha | 6,75 |
| Altro-tare Ha | 0,61 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 25 |
| Particella | 12p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest | |
| Pendenza % | 34,73 | |
| Altitudine mt slm | min. 1345 | max 1511 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.4** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Età media attuale | 120 | | Anno di taglio | | **0** |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 | | Età media all'anno di taglio | | **0** |
| | Ha: | mc: | | Ha: | mc: |
| Provvigione reale unitaria | 1 | 653,60 | Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Provvigione reale totale | 6,75 | 4409,75 | Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia matura copre l'86% della superficie, seguita dalla fustaia giovane al 27%, e la perticaia giovane al 6%, con il novelleto all'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,21 | 3,06 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,02 | 0,37 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,37 | 5,42 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,01 | 29,81 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 2,88 | 42,68 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 1,26 | 18,67 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 6,75 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 6,75 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | rovo |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | dafne, asperula, graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **247** | **Denominazione località** | **Scarrupata** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 14,20 |
| Utile Ha | 13,78 |
| Altro-tare Ha | 0,42 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 27 |
| Particella | 151p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Ovest |
| Pendenza % | 39,04 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1208 | 1524 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 100 |
| Classe cronologica o diametrica | 90-110 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 520,68 |
| Provvigione reale totale | 13,78 | 7175,38 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 8 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

*Acero montano* 1% *Carpino nero* 1%

*Faggio* 99%

Descrizione:

La fustaia matura rappresenta il 71% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 47%, la fustaia giovane al 42%, la perticaia giovane al 35%, e il novelleto al 17%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,10 | 8,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,30 | 16,67 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,03 | 21,96 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,73 | 19,82 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 2,78 | 20,15 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 1,85 | 13,40 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 13,78 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 13,78 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | rovo |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **248** | **Denominazione località** | **Valle d'Acero** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 12,92 |
| Utile Ha | 12,92 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 27 |
| Particella | 151 |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Est |
| Pendenza % | 36,60 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1325 | 1524 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| **Sottosuolo** |
|---|
| **Calcareo** |

| **Suolo** |
|---|
| **MAP 4.4** |

| **Viabilità** |
|---|
| **Ben servita** |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 140 |
| Classe cronologica o diametrica | 130-150 |

| | **Ha:** | **mc:** |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 743,49 |
| Provvigione reale totale | 12,92 | 9607,27 |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 7 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2025-2027** |
| Età media all'anno di taglio | **130-150** |

| | **Ha:** | **mc:** |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **156,4** |
| Ripresa totale | | **2020** |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

*Faggio* *100%*

Descrizione:

La fustaia matura copre il 53% della superficie, seguita dalla fustaia giovane al 9%, la fustaia adulta al 2%, e la perticaia giovane all'1%, con il resto formazioni erbacee o arbustive (35%).

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,13 | 1,03 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,41 | 3,21 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,58 | 12,21 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 3,20 | 24,79 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 7,59 | 58,76 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 12,92 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2025-2027 | 12,92 | 156,4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 2020,3 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | rovo, dafne |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | diffusa |
| Specie prevalenti: | dentaria, asperula, viola silvestre, graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **250** | **Denominazione località** | **Valle d'Acero** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 22,87 |
| Utile Ha | 22,86 |
| Altro-tare Ha | 0,01 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 27 |
| Particella | 151p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Est |
| Pendenza % | 33,97 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1323 | 1526 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| **Sottosuolo** |
|---|
| **Calcareo** |

| **Suolo** |
|---|
| **MAP 4.4** |

| **Viabilità** |
|---|
| **Ben servita** |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 140 |
| Classe cronologica o diametrica | 130-150 |

| | | Ha: | mc: |
|---|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | | 1 | 713,89 |
| Provvigione reale totale | | 22,86 | 16319,84 |
| Rilievo tassatorio | AdS - n | | 15 |
| | Cavallettamento - Ha | | |
| | Alberi modello - n | | 0 |
| | Relascopio | | |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2025-2027** |
| Età media all'anno di taglio | **130-150** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **143,9** |
| Ripresa totale | | **3290** |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

*Faggio* *100%*

Descrizione:

La fustaia matura rappresenta l'80% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 17%, e la fustaia giovane al 2%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,41 | 1,79 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,24 | 5,43 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 3,97 | 17,37 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 9,23 | 40,36 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 8,01 | 35,05 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 22,86 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2025-2027 | 22,86 | 143,9 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 3290,1 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | diffusa |
| Specie prevalenti: | rovo, agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | diffusa |
| Specie prevalenti: | acetosella, asperula, viola silvestre, sanicula |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **251** | **Denominazione località** | **Valle d'Acero** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 13,98 |
| Utile Ha | 13,98 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 27;28 |
| Particella | 151p ; 1p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord-Est | |
| Pendenza % | 33,85 | |
| Altitudine mt slm | min. 1299 | max 1450 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.4** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 140 |
| Classe cronologica o diametrica | 130-150 |

| | | |
|---|---|---|
| | Ha: | mc: |
| Provvigione reale unitaria | 1 | 746,98 |
| Provvigione reale totale | 13,98 | 10440,29 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| | Ha: | mc: |
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 9 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Faggio* | *99%* |
| *Ontano napoletano* | *1%* |

Descrizione:

La fustaia matura copre il 60% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 32%, e la fustaia giovane all'8%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,01 | 0,07 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,09 | 0,67 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,64 | 18,86 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 4,42 | 31,65 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 6,45 | 46,16 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,36 | 2,59 |
| **Totale** | 13,98 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 13,98 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | rovo |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | acetosella, asperula |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **253** | **Denominazione località** | **Valle d'Acero** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 11,59 |
| Utile Ha | 11,59 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 28 |
| Particella | 1p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Est |
| Pendenza % | 36,33 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1287 | 1447 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| **Sottosuolo** |
|---|
| **Calcareo** |

| **Suolo** |
|---|
| **MAP 4.4** |

| **Viabilità** |
|---|
| **Ben servita** |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 140 |
| Classe cronologica o diametrica | 130-150 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 804,33 |
| Provvigione reale totale | 11,59 | 9324,32 |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 8 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

*Faggio* *100%*

Descrizione:

La fustaia matura rappresenta il 64% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 32%, e la fustaia giovane all'3%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,02 | 0,14 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,17 | 1,50 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,56 | 4,85 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 2,62 | 22,60 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 5,20 | 44,84 |
| Fustaie mature h >32 m | 3,02 | 26,06 |
| **Totale** | 11,59 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 11,59 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | diffusa |
| Specie prevalenti: | rovo, dafne |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | diffusa |
| Specie prevalenti: | graminacee, asperula, acetosella, viola |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **254** | **Denominazione località** | **Valle d'Acero** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 15,01 |
| Utile Ha | 15,01 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 24;27;28 |
| Particella | 330p ; 151p ; 1p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Est | |
| Pendenza % | 39,77 | |
| Altitudine mt slm | min. 1168 | max 1386 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 140 |
| Classe cronologica o diametrica | 130-150 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 836,76 |
| Provvigione reale totale | 15,01 | 12558,50 |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 10 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *1%* | *Acero opalo* | *1%* |
| *Agrifoglio* | *6%* | | |
| *Faggio* | *89%* | | |
| *Ontano napoletano* | *4%* | | |

Descrizione:

La fustaia matura copre il 90% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 9%, con il resto come formazioni erbacee o arbustive (1%).

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,07 | 0,47 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,37 | 9,15 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 2,55 | 16,97 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 5,28 | 35,17 |
| Fustaie mature h >32 m | 5,74 | 38,25 |
| **Totale** | 15,01 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 15,01 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | graminacee, viola, sanicula, asperula, vinca, dentaria, ciclamino, felce |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **255a** | **Denominazione località** | **Valle d'Acero** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 9,19 |
| Utile Ha | 9,18 |
| Altro-tare Ha | 0,01 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 27;28 |
| Particella | 151p ; 1p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud |
| Pendenza % | 26,07 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1266 | 1328 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 140 |
| Classe cronologica o diametrica | 130-150 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2025-2027** |
| Età media all'anno di taglio | **130-150** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 778,15 |
| Provvigione reale totale | 9,18 | 7145,92 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **253,8** |
| Ripresa totale | | **2330** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 6 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | |
|---|---|
| *Acero montano* | *1%* |
| *Faggio* | *93%* |
| *Ontano napoletano* | *5%* |

Descrizione:

La fustaia matura rappresenta il 94% della superficie, con la fustaia adulta al 6%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,02 | 0,20 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,40 | 4,39 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,52 | 5,67 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 7,18 | 78,18 |
| Fustaie mature h >32 m | 1,06 | 11,55 |
| **Totale** | 9,18 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglio di sementazione che asporti il 30% del volume totale per circa un 50% del numero degli alberi. Andranno eliminati gli alberi di minori dimensioni, lasciando quelli più grandi, dalla chioma più espansa in grado di disseminare abbondantemente. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2025-2027 | 9,18 | 253,8 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 2330,8 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | rovo, dafne |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | dentaria, viola, asperula, allium, geranio, sambuco |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **255b** | **Denominazione località** | **Valle d'Acero** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 12,00 |
| Utile Ha | 12,00 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 27 |
| Particella | 151 |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest |
| Pendenza % | 35,68 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1195 | 1338 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| **Sottosuolo** |
|---|
| **Calcareo** |

| **Suolo** |
|---|
| **MAP 4.4** |

| **Viabilità** |
|---|
| **Ben servita** |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 140 |
| Classe cronologica o diametrica | 130-150 |

| | **Anno di taglio** | **2031-2034** |
|---|---|---|
| | **Età media all'anno di taglio** | **110-130** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 810,06 |
| Provvigione reale totale | 12,00 | 9717,01 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **310,8** |
| Ripresa totale | | **3730** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 7 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Faggio* | *97%* |
| *Ontano napoletano* | *3%* |

Descrizione:

La fustaia matura copre il 100% della superficie.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,02 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,01 | 0,06 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,01 | 0,08 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,02 | 0,17 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 1,43 | 11,96 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 5,86 | 48,87 |
| Fustaie mature h >32 m | 4,66 | 38,84 |
| **Totale** | 12,00 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglio secondario differenziato secondo l'insediamento della rinnovazione. In alcuni piccoli tratti, in presenza di novellame già insediato, si potrà procedere con un taglio di luce che asporti circa il 50% del volume. Nella zona a valle, dove non si è intervenuti con il taglio precedente, o dove è stato molto debole e la copertura arborea è ancora chiusa, taglio di rinnovazione che asporti non più del 50% del numero degli alberi scelti tra quelli di minori dimensioni. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 12,00 | 310,8 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 3728,5 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| Copertura: | scarsa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | rovo, tasso |

**STRATO ERBACEO**

| Copertura: | scarsa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | graminacee, viola, dentaria, asperula, sanicula |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **256** | **Denominazione località** | **Valle d'Acero** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 17,21 |
| Utile Ha | 17,18 |
| Altro-tare Ha | 0,03 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 24;28 |
| Particella | 330p ; 1p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest | |
| Pendenza % | 38,50 | |
| Altitudine mt slm | min. 1266 | max 1502 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 120 |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 729,20 |
| Provvigione reale totale | 17,18 | 12527,42 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 11 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 3 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | |
|---|---|
| *Agrifoglio* | *1%* |
| *Faggio* | *91%* |
| *Maggiociondolo* | *1%* |
| *Ontano napoletano* | *7%* |

Descrizione:

La fustaia matura rappresenta il 70% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 12%, la perticaia giovane al 13%, e la spessina al 6%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,01 | 0,04 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,01 | 0,03 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,01 | 5,91 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,18 | 12,70 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,02 | 11,75 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 2,72 | 15,83 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 4,19 | 24,41 |
| Fustaie mature h >32 m | 5,04 | 29,33 |
| **Totale** | 17,18 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 17,18 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | graminacee, felce, viola |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **257** | **Denominazione località** | **Pagliarolo** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 8,93 |
| Utile Ha | 8,87 |
| Altro-tare Ha | 0,06 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 24;28 |
| Particella | 330p ; 1p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Est | |
| Pendenza % | 38,65 | |
| Altitudine mt slm | min. 1246 | max 1492 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 120 |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 686,84 |
| Provvigione reale totale | 8,87 | 6092,70 |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 3 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Anno di taglio | | **0** |
| Età media all'anno di taglio | | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | |
|---|---|
| *Faggio* | *95%* |
| *Ontano napoletano* | *5%* |

Descrizione:

La fustaia matura copre il 65% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 15%, la perticaia giovane al 13%, e la spessina al 7%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,62 | 6,94 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,14 | 12,80 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,34 | 15,12 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 1,82 | 20,50 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 2,41 | 27,15 |
| Fustaie mature h >32 m | 1,55 | 17,49 |
| **Totale** | 8,87 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 8,87 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Assente, raro rovo |
| Specie prevalenti: | Rovo |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Assente, pochi cuscinetti di graminacee e asperula |
| Specie prevalenti: | Graminacee, Asperula |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **258** | **Denominazione località** | **Pagliarolo** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 32,27 |
| Utile Ha | 32,21 |
| Altro-tare Ha | 0,06 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 24;28 |
| Particella | 330 & 1 |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud |
| Pendenza % | 39 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1206 | 1606 |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

Giacitura

Manufatti

Risorse idriche

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | | 100 |
| Classe cronologica o diametrica | | 90-110 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 604,60 |
| Provvigione reale totale | 32,21 | 19475,07 |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | CAV |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Anno di taglio | | |
| Età media all'anno di taglio | | |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | |
| Ripresa totale | | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | Parco Regionale Picentini | |
| Autorità di Bacino | | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO




### STRATO ARBOREO

Specie presenti:

*Faggio, ontano napoletano, aceri spp., altre latifoglie*

Descrizione:

La fustaia matura rappresenta il 43% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 23%, la perticaia giovane al 18%, la spessina all'11%, e il novelleto al 5%.

| Tipologie strutturali | | | |
|---|---|---|---|
| | | Ha | % |
| Novelleti h 2-4 m | | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | | 0,85 | 2,64 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | | 3,29 | 10,22 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | | 5,95 | 18,47 |
| Fustaie mature h 20-24 m | | 7,81 | 24,26 |
| Fustaie mature h 24-28 m | | 6,10 | 18,94 |
| Fustaie mature h 28-32 m | | 4,57 | 14,20 |
| Fustaie mature h >32 m | | 3,63 | 11,27 |
| | **Totale** | 32,21 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |

**Interventi gestionali**

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Anno | Superficie - Ha | Superficie - % |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **Totale** | | |

**Ripresa**

| Intervento | Sistema di esbosco previsto | Anno | Ripresa planimetrica (Cedui) -Ha | Ripresa volumetrica - mc |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **Totale** | | |

| **STRATO ARBUSTIVO** | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | rovo |

| **STRATO ERBACEO** | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | dafne,viola,acetosella,asperula,sanicula,digitalis |

## PRESCRIZIONI

Taglio di sementazione nelle zone di fustaia matura e adulta che asporti il 30% del volume totale per circa un 50% del numero degli alberi. Andranno eliminati gli alberi di minori dimensioni, lasciando a disseminare quelli più grandi, dalla chioma più espansa. Andranno rilasciati alcuni esemplari di ontano e tutti quelli di acero di Lobel, con l'eccezione di quelli dalla chioma compromessa.

SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **259** | **Denominazione località** | **Chiuvarelli** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 27,71 |
| Utile Ha | 27,14 |
| Altro-tare Ha | 0,57 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 24;26;28 |
| Particella | 3p-4p ; 1p ; 1p-2p-3p-4p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Est | |
| Pendenza % | 35,04 | |
| Altitudine mt slm | min. 1173 | max 1573 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 120 |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 576,77 |
| Provvigione reale totale | 27,14 | 15654,90 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **110-130** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **124,5** |
| Ripresa totale | | **3380** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 16 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 3 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | |
|---|---|
| *Agrifoglio* | *1%* |
| *Faggio* | *99%* |

Descrizione:

La fustaia adulta copre il 41% della superficie, seguita dalla fustaia matura al 37%, la fustaia giovane al 17%, e la perticaia giovane al 5%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,01 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,01 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,07 | 0,26 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,28 | 4,71 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 4,69 | 17,27 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 11,18 | 41,19 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 8,07 | 29,75 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 1,85 | 6,81 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 27,14 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 27,14 | 124,5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 3380,3 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa, graminacee |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **260** | **Denominazione località** | **Piano dei Vaccari** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 19,87 |
| Utile Ha | 19,76 |
| Altro-tare Ha | 0,11 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 28 |
| Particella | 2;3 |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord | |
| Pendenza % | 25,96 | |
| Altitudine mt slm | min. 1173 | max 1274 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 100 |
| Classe cronologica o diametrica | 90-110 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **90-110** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 563,30 |
| Provvigione reale totale | 19,76 | 11130,33 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **138,7** |
| Ripresa totale | | **2740** |

| | |
|---|---|
| Rilievo tassatorio | |
| AdS - n | 17 |
| Cavallettamento - Ha | |
| Alberi modello - n | 3 |
| Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Faggio* | *99%* |
| *Ontano napoletano* | *1%* |

Descrizione:

La fustaia matura copre il 61% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 33%, e la perticaia giovane al 5%, con il novelleto all'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,24 | 1,23 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,93 | 4,72 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 6,20 | 31,40 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 9,67 | 48,94 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 2,71 | 13,72 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 19,76 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 19,76 | 138,7 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 2739,8 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| Copertura: | Scarsa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | Rovo, Dafne |

**STRATO ERBACEO**

| Copertura: | Diffusa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | Sambuco, Fragola, Trifoglio, Acetosella |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **261a** | **Denominazione località** | **Piano Acernese** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 16,20 |
| Utile Ha | 16,20 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 26 |
| Particella | 1p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest | |
| Pendenza % | 35,41 | |
| Altitudine mt slm | min. 1188 | max 1421 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.4** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Età media attuale | 120 | | Anno di taglio | **2031-2034** |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 | | Età media all'anno di taglio | **10-30** |

| | Ha: | mc: | | Ha: | mc: |
|---|---|---|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 705,92 | Ripresa unitaria | | **131,5** |
| Provvigione reale totale | 16,20 | 11436,53 | Ripresa totale | | **2130** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 9 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | |
|---|---|
| *Faggio* | *99%* |
| *Ontano napoletano* | *1%* |

Descrizione:

Nella particella 261a, la fustaia matura domina il paesaggio con una copertura del 74%, seguita dalla fustaia adulta che occupa il 23%. Solo il 3% della superficie è costituito da perticaia giovane.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,50 | 3,11 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 3,68 | 22,70 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 8,32 | 51,38 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 3,69 | 22,80 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 16,20 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 16,20 | 131,5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 2130,1 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Assente, raro agrifoglio |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa, graminacee |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **261b** | **Denominazione località** | **Piano Acernese** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 14,86 |
| Utile Ha | 14,86 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 27 |
| Particella | 151p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Est |
| Pendenza % | 39,78 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1270 | 1475 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| **Sottosuolo** |
|---|
| **Calcareo** |

| **Suolo** |
|---|
| **MAP 4.4** |

| **Viabilità** |
|---|
| **Ben servita** |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 100 |
| Classe cronologica o diametrica | 90-110 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 565,02 |
| Provvigione reale totale | 14,86 | 8397,48 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 11 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Agrifoglio* | *0%* |
| *Faggio* | *99%* |
| *Maggiociondolo* | *1%* |

Descrizione:

Qui, la fustaia adulta ricopre il 39% della superficie, mentre la perticaia giovane è presente sul 35%. La fustaia matura occupa il 24%, e la spessina copre il 3%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,49 | 3,30 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 5,35 | 36,01 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 5,82 | 39,14 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 3,09 | 20,81 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,11 | 0,74 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 14,86 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 14,86 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **262** | **Denominazione località** | **Piano Acernese** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 16,87 |
| Utile Ha | 16,87 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 26 |
| Particella | 1p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord |
| Pendenza % | 37,49 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1190 | 1477 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| **Sottosuolo** |
|---|
| **Calcareo** |

| **Suolo** |
|---|
| **MAP 4.4** |

| **Viabilità** |
|---|
| **Ben servita** |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 120 |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 618,72 |
| Provvigione reale totale | 16,87 | 10435,53 |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 13 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **110-130** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **96,6** |
| Ripresa totale | | **1630** |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Acero montano* | *0%* |
| *Faggio* | *100%* |
| *Maggiociondolo* | *0%* |

Descrizione:

In questa particella, la fustaia matura copre il 44% del terreno, seguita dalla fustaia adulta al 40%. La perticaia giovane rappresenta il 14% e la spessina il 2%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,36 | 2,13 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,42 | 14,38 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 6,70 | 39,72 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 6,28 | 37,23 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 1,10 | 6,54 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 16,87 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 16,87 | 96,6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 1629,6 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| Copertura: | Scarsa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | Rovo, Dafne |

**STRATO ERBACEO**

| Copertura: | Diffusa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | Acetosella, Viola, Graminacee, Trifoglio, Fragola, Asperula |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **263** | **Denominazione località** | **Coste di Cervialto** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 24,81 |
| Utile Ha | 24,81 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 26 |
| Particella | 1p-2p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest | |
| Pendenza % | 43,37 | |
| Altitudine mt slm | min. 1260 | max 1564 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 632,56 |
| Provvigione reale totale | 24,81 | 15696,34 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 15 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | | | |
|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *1%* | *Orniello* | *0%* |
| *Agrifoglio* | *1%* | | |
| *Faggio* | *96%* | | |
| *Maggiociondolo* | *0%* | | |
| *Sorbo degli Ucc.* | *1%* | | |

Descrizione:

La fustaia matura è predominante con il 54%, seguita dalla fustaia adulta al 32% e dalla perticaia giovane al 13%, con una piccola presenza di spessina (1%).

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,02 | 0,07 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,37 | 1,47 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,13 | 12,61 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 7,96 | 32,07 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 8,33 | 33,57 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 4,99 | 20,12 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,02 | 0,08 |
| **Totale** | 24,81 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 24,81 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **271** | **Denominazione località** | **Vallebona** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 9,54 |
| Utile Ha | 9,54 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 27 |
| Particella | 151 |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud |
| Pendenza % | 32 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1243 | 1337 |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

Giacitura

Manufatti

Risorse idriche

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | | 140 |
| Classe cronologica o diametrica | | 130-150 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 661,64 |
| Provvigione reale totale | 9,54 | 6308,88 |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | CAV |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Anno di taglio | | |
| Età media all'anno di taglio | | |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | |
| Ripresa totale | | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | Parco Regionale Picentini | |
| Autorità di Bacino | | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO




## STRATO ARBOREO

Specie presenti:

*Faggio, ontano napoletano, aceri spp., altre latifoglie*

Descrizione:

Nella particella 271, la fustaia matura è prevalente con l'85%, seguita dalla fustaia adulta al 12% e dalla perticaia giovane al 4%.

| Tipologie strutturali | | | |
|---|---|---|---|
| | | Ha | % |
| Novelleti h 2-4 m | | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | | 0,37 | 3,88 |
| Fustaie mature h 20-24 m | | 1,10 | 11,56 |
| Fustaie mature h 24-28 m | | 1,79 | 18,78 |
| Fustaie mature h 28-32 m | | 3,42 | 35,81 |
| Fustaie mature h >32 m | | 2,86 | 29,96 |
| | **Totale** | 9,54 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |

**Interventi gestionali**

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Anno | Superficie - Ha | Superficie - % |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **Totale** | | |

**Ripresa**

| Intervento | Sistema di esbosco previsto | Anno | Ripresa planimetrica (Cedui) -Ha | Ripresa volumetrica - mc |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **Totale** | | |

| **STRATO ARBUSTIVO** | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | rovo |

| **STRATO ERBACEO** | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | dafne,viola,acetosella,asperula,sanicula,digitalis |

## PRESCRIZIONI

Taglio di sementazione che asporti il 25/30% del volume totale per circa un 40/50% del numero degli alberi. Andranno eliminati gli alberi di minori dimensioni, lasciando a disseminare quelli più grandi. Il taglio dovrà essere particolarmente cauto nelle zone di gramineto ed in quelle dove è più sviluppato il rovo.

SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **272** | **Denominazione località** | **Vallebona** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 24,79 |
| Utile Ha | 24,77 |
| Altro-tare Ha | 0,02 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 27 |
| Particella | 151 |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud |
| Pendenza % | 37,51 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1234 | 1496 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| **Sottosuolo** |
|---|
| **Calcareo** |

| **Suolo** |
|---|
| **MAP 4.4** |

| **Viabilità** |
|---|
| **Ben servita** |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 20 |
| Classe cronologica o diametrica | 10-30 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **10-30** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 605,70 |
| Provvigione reale totale | 24,77 | 15004,61 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **168,0** |
| Ripresa totale | | **4160** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia matura copre il 63%, seguita dalla fustaia adulta al 18%, la fustaia giovane al 10%, e la perticaia giovane al 7%, con il novelleto al 2%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,45 | 1,84 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,62 | 6,53 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,47 | 9,98 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 4,57 | 18,44 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 8,80 | 35,52 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 5,54 | 22,37 |
| Fustaie mature h >32 m | 1,32 | 5,32 |
| **Totale** | 24,77 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglio secondario differenziato secondo l'insediamento della rinnovazione. In alcuni piccoli tratti, in presenza di novellame già insediato, si potrà procedere con lo sgombero. In altri, dove non si è intervenuti con il taglio precedente, taglio di rinnovazione che asporti non più del 50% del numero degli alberi scelti tra quelli di minori dimensioni. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 24,77 | 168,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 4160,5 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Rovo, Dafne |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, Felce, Vinca |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **273** | **Denominazione località** | **Vallebona** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 0,00 |
| Utile Ha | 0,93 |
| Altro-tare Ha | -0,93 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 27 |
| Particella | 151p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud |
| Pendenza % | 21,48 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.4** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 0,00 |
| Provvigione reale totale | 0,93 | 0,00 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| | |

| Descrizione: |
|---|
| 0 |

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,21 | 22,23 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,25 | 26,44 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,23 | 24,38 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,17 | 17,92 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,08 | 9,03 |
| **Totale** | 0,93 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 0,93 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| Copertura: | #N/D |
|---|---|
| Specie prevalenti: | #N/D |

**STRATO ERBACEO**

| Copertura: | #N/D |
|---|---|
| Specie prevalenti: | #N/D |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **274** | **Denominazione località** | **Raia della Scannella** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 25,84 |
| Utile Ha | 25,82 |
| Altro-tare Ha | 0,02 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 27 |
| Particella | 151p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest | |
| Pendenza % | 31,05 | |
| Altitudine mt slm | min. 1365 | max 1526 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 120 |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 |

| | | |
|---|---|---|
| Anno di taglio | | **0** |
| Età media all'anno di taglio | | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 625,83 |
| Provvigione reale totale | 25,82 | 16158,88 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 16 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Faggio* | *100%* |
| *Sorbo degli Ucc.* | *0%* |

Descrizione:

Nella particella 274, la fustaia matura rappresenta il 48% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 29%, dalla fustaia giovane al 17%, e dalla perticaia giovane al 4%, con il novelleto all'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,22 | 0,86 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,06 | 4,11 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 4,52 | 17,50 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 7,58 | 29,35 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 7,69 | 29,78 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 4,55 | 17,61 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,20 | 0,79 |
| **Totale** | 25,82 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 25,82 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| Copertura: | Scarsa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | Rovo, Dafne |

**STRATO ERBACEO**

| Copertura: | Diffusa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | Asperula, Viola, Felce, Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **275** | **Denominazione località** | **Vallebona** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 19,12 |
| Utile Ha | 19,12 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 27;28 |
| Particella | 151p ; 1p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud | |
| Pendenza % | 38,52 | |
| Altitudine mt slm | min. 1186 | max 1459 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.4** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Età media attuale | 120 | | Anno di taglio | **0** |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 | | Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: | | Ha: | mc: |
|---|---|---|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 700,25 | Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Provvigione reale totale | 19,12 | 13388,22 | Ripresa totale | | **0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 11 | Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| | Cavallettamento - Ha | | Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| | Alberi modello - n | 5 | Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |
| | Relascopio | | | | |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

*Faggio* *99%* *Acero opalo* *1%*

Descrizione:

Qui, la fustaia matura copre il 70%, seguita dalla fustaia adulta al 17%, dalla fustaia giovane all'8%, e dalla perticaia giovane al 5%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,01 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,02 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,00 | 5,26 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,56 | 8,18 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 3,23 | 16,91 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 4,53 | 23,72 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 5,92 | 30,96 |
| Fustaie mature h >32 m | 2,86 | 14,96 |
| **Totale** | 19,12 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 19,12 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Rovo |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **276a** | **Denominazione località** | **Vallebona** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 10,31 |
| Utile Ha | 10,29 |
| Altro-tare Ha | 0,02 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 27 |
| Particella | 151p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud | |
| Pendenza % | 38,51 | |
| Altitudine mt slm | min. 1258 | max 1490 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 100 |
| Classe cronologica o diametrica | 90-110 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 564,02 |
| Provvigione reale totale | 10,29 | 5803,72 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 10 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *2%* | *Acero opalo* | *1%* |
| *Faggio* | *92%* | *Carpino nero* | *5%* |

Descrizione:

La fustaia matura occupa il 41%, seguita dalla fustaia adulta al 26%, dalla fustaia giovane al 15%, dalla perticaia giovane all'11%, e dalla spessina al 6%, con il resto come formazioni erbacee o arbustive (1%).

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,65 | 6,34 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,13 | 11,02 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,54 | 15,00 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,69 | 26,15 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 3,33 | 32,40 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,94 | 9,09 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 10,29 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 10,29 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Rovo, Dafne |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, Felce, Primula, Viola |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **276b** | **Denominazione località** | **Vallebona** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 12,54 |
| Utile Ha | 12,54 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 7;12;13 |
| Particella | 22p ; 1p ; 16p-23p-24p-28p-29p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud-Est | |
| Pendenza % | 38,86 | |
| Altitudine mt slm | min. 1272 | max 1503 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.4** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 120 |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 638,47 |
| Provvigione reale totale | 12,54 | 8008,71 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 8 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Agrifoglio* | *5%* | *Carpino nero* | *11%* |
| *Faggio* | *81%* | | |
| *Ontano napoletano* | *3%* | | |

Descrizione:

La fustaia matura è presente sul 56% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 20%, dalla fustaia giovane al 15%, e dalla perticaia giovane all'8%, con la spessina al 2%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,21 | 1,66 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,97 | 7,74 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,83 | 14,61 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,50 | 19,90 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 2,70 | 21,55 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 3,79 | 30,23 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,54 | 4,30 |
| **Totale** | 12,54 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 12,54 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **277** | **Denominazione località** | **Vallebona** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 18,56 |
| Utile Ha | 18,56 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 27;28 |
| Particella | 151p ; 1p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud-Est | |
| Pendenza % | 43,88 | |
| Altitudine mt slm | min. 1059 | max 1290 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 140 |
| Classe cronologica o diametrica | 130-150 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 722,33 |
| Provvigione reale totale | 18,56 | 13403,62 |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 11 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *1%* | *Acero opalo* | *9%* |
| *Agrifoglio* | *1%* | *Carpino nero* | *17%* |
| *Faggio* | *70%* | | |
| *Ontano napoletano* | *1%* | | |

Descrizione:

Nella particella 277, la fustaia matura rappresenta il 78%, seguita dalla fustaia adulta al 15%, dalla fustaia giovane al 4%, e dalla perticaia giovane al 2%, con il resto come formazioni erbacee o arbustive (1%).

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,06 | 0,34 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,32 | 1,74 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,77 | 4,15 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,85 | 15,34 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 6,45 | 34,74 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 4,64 | 25,03 |
| Fustaie mature h >32 m | 3,46 | 18,66 |
| **Totale** | 18,56 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 18,56 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, Felce |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **278** | **Denominazione località** | **Vallebona** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 9,10 |
| Utile Ha | 8,83 |
| Altro-tare Ha | 0,27 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 27;28 |
| Particella | 151 & 1 |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Est |
| Pendenza % | 38 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1275 | 1446 |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

Giacitura

Manufatti

Risorse idriche

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | 20 | |
| Classe cronologica o diametrica | 10-30 | |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 498,87 |
| Provvigione reale totale | 8,83 | 4402,85 |

| Rilievo tassatorio | AdS - n | CAV |
|---|---|---|
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Anno di taglio | | **2020** |
| Età media all'anno di taglio | | |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | |
| Ripresa totale | | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | Parco Regionale Picentini | |
| Autorità di Bacino | | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO




## STRATO ARBOREO

Specie presenti:

*Faggio, ontano napoletano, aceri spp., altre latifoglie*

Descrizione:

La fustaia matura copre il 46% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 25%, dalla fustaia giovane al 20%, dalla perticaia giovane al 7%, e il novelleto all'1%, con il resto come formazioni erbacee o arbustive (1%).

| Tipologie strutturali | | | |
|---|---|---|---|
| | | Ha | % |
| Novelleti h 2-4 m | | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | | 0,10 | 1,08 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | | 0,64 | 7,23 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | | 1,79 | 20,32 |
| Fustaie mature h 20-24 m | | 2,23 | 25,27 |
| Fustaie mature h 24-28 m | | 3,51 | 39,80 |
| Fustaie mature h 28-32 m | | 0,50 | 5,63 |
| Fustaie mature h >32 m | | 0,06 | 0,68 |
| | **Totale** | 8,83 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |

**Interventi gestionali**

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Anno | Superficie - Ha | Superficie - % |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **Totale** | | |

**Ripresa**

| Intervento | Sistema di esbosco previsto | Anno | Ripresa planimetrica (Cedui) -Ha | Ripresa volumetrica - mc |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **Totale** | | |

| **STRATO ARBUSTIVO** | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | rovo |

| **STRATO ERBACEO** | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | dafne,viola,acetosella,asperula,sanicula,digitalis |

**PRESCRIZIONI**

Taglio di sgombero su circa il 70% della particella, dove il novellame è già affermato. Tagli secondari e di sementazione nel restante 30% della superficie.

SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **279** | **Denominazione località** | **Vallebona** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 11,41 |
| Utile Ha | 11,41 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 27;28 |
| Particella | 151 & 1 |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Est |
| Pendenza % | 47 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1050 | 1296 |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

Giacitura

Manufatti

Risorse idriche

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | | 140 |
| Classe cronologica o diametrica | | 130-150 |
| | Ha: | mc: |
| Provvigione reale unitaria | 1 | 554,67 |
| Provvigione reale totale | 11,41 | 6327,04 |

| | | |
|---|---|---|
| Anno di taglio | | |
| Età media all'anno di taglio | | |
| | Ha: | mc: |
| Ripresa unitaria | | |
| Ripresa totale | | |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | CAV |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | Parco Regionale Picentini | |
| Autorità di Bacino | | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO




## STRATO ARBOREO

Specie presenti:

*Faggio, ontano napoletano, aceri spp., altre latifoglie*

Descrizione:

Nella particella 279, la fustaia matura rappresenta il 72%, seguita dalla fustaia adulta all'11%, dalla fustaia giovane al 15%, e dalla perticaia giovane al 2%.

| Tipologie strutturali | | | |
|---|---|---|---|
| | | Ha | % |
| Novelleti h 2-4 m | | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | | 0,00 | 0,02 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | | 0,00 | 0,02 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | | 0,25 | 2,21 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | | 1,74 | 15,26 |
| Fustaie mature h 20-24 m | | 1,23 | 10,80 |
| Fustaie mature h 24-28 m | | 2,51 | 22,02 |
| Fustaie mature h 28-32 m | | 2,54 | 22,25 |
| Fustaie mature h >32 m | | 3,13 | 27,41 |
| | **Totale** | 11,41 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |

| Interventi gestionali | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Anno | Superficie - Ha | Superficie - % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **Totale** | | |

| Ripresa | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Intervento | Sistema di esbosco previsto | Anno | Ripresa planimetrica (Cedui) -Ha | Ripresa volumetrica - mc |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **Totale** | | |

| **STRATO ARBUSTIVO** | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | rovo |

| **STRATO ERBACEO** | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | dafne,viola,acetosella,asperula,sanicula,digitalis |

## PRESCRIZIONI

Taglio di sementazione nei tratti di fustaia adulta e matura, con l'asportazione di circa il 50% del numero degli alberi scelti tra quelli di dimensioni minori. In alcuni tratti, dove l'intervento novellame è già insediato, potrà assumere il carattere di un taglio secondario.

SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **280** | **Denominazione località** | **Vallone dell'Acero** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| Superficie | |
|---|---|
| Totale Ha | 12,50 |
| Utile Ha | 12,50 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| Inquadramento Catastale | |
|---|---|
| Foglio | 28 |
| Particella | 1 |

| Generalità | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Est |
| Pendenza % | 45 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1070 | 1383 |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

Giacitura

Manufatti

Risorse idriche

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | | 140 |
| Classe cronologica o diametrica | | 130-150 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 564,24 |
| Provvigione reale totale | 12,50 | 7054,84 |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | CAV |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Anno di taglio | | |
| Età media all'anno di taglio | | |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | |
| Ripresa totale | | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | Parco Regionale Picentini | |
| Autorità di Bacino | | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO




## STRATO ARBOREO

Specie presenti:

*Faggio, ontano napoletano, aceri spp., altre latifoglie* *Acero opalo* *3%*

Descrizione:

Nella particella 280, la fustaia matura rappresenta il 77%, seguita dalla fustaia adulta al 10%, dalla fustaia giovane al 10%, e dalla perticaia giovane al 2%, con il resto come formazioni erbacee o arbustive (1%).

| Tipologie strutturali | | | |
|---|---|---|---|
| | | Ha | % |
| Novelleti h 2-4 m | | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | | 0,01 | 0,10 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | | 0,28 | 2,20 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | | 1,29 | 10,36 |
| Fustaie mature h 20-24 m | | 1,30 | 10,36 |
| Fustaie mature h 24-28 m | | 2,03 | 16,21 |
| Fustaie mature h 28-32 m | | 2,55 | 20,37 |
| Fustaie mature h >32 m | | 5,05 | 40,40 |
| | **Totale** | 12,50 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |

| Interventi gestionali | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Anno | Superficie - Ha | Superficie - % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **Totale** | | |

| Ripresa | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Intervento | Sistema di esbosco previsto | Anno | Ripresa planimetrica (Cedui) -Ha | Ripresa volumetrica - mc |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **Totale** | | |

| **STRATO ARBUSTIVO** | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | rovo |

| **STRATO ERBACEO** | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | dafne,viola,acetosella,asperula,sanicula,digitalis |

## PRESCRIZIONI

Taglio di sementazione che asporti il 30% del volume totale per circa un 50% del numero degli alberi. Andranno eliminati gli alberi di minori dimensioni, lasciando a disseminare quelli più grandi. Il taglio dovrà essere particolarmente cauto nelle zone di gramineto ed in quelle dove è più sviluppato il rovo.

SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **282** | **Denominazione località** | **Vallone dell'Acero** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 22,04 |
| Utile Ha | 21,54 |
| Altro-tare Ha | 0,50 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 28 |
| Particella | 1 |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest |
| Pendenza % | 42 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 870 | 1360 |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

Giacitura

Manufatti

Risorse idriche

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | | 20 |
| Classe cronologica o diametrica | | 10-30 |
| | Ha: | mc: |
| Provvigione reale unitaria | 1 | 402,72 |
| Provvigione reale totale | 21,54 | 8674,80 |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | CAV |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Anno di taglio | | **2017** |
| Età media all'anno di taglio | | |
| | Ha: | mc: |
| Ripresa unitaria | | |
| Ripresa totale | | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | Parco Regionale Picentini | |
| Autorità di Bacino | | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO




## STRATO ARBOREO

Specie presenti:

*Faggio, ontano napoletano, aceri spp., altre latifoglie*

Descrizione:

Nella particella 282, la fustaia matura rappresenta il 78%, seguita dalla fustaia adulta al 14%, e dalla fustaia giovane al 7%, con il resto come formazioni erbacee o arbustive (1%).

| Tipologie strutturali | | | |
|---|---|---|---|
| | | Ha | % |
| Novelleti h 2-4 m | | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | | 0,02 | 0,08 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | | 0,06 | 0,29 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | | 1,55 | 7,20 |
| Fustaie mature h 20-24 m | | 3,07 | 14,26 |
| Fustaie mature h 24-28 m | | 6,56 | 30,47 |
| Fustaie mature h 28-32 m | | 6,35 | 29,50 |
| Fustaie mature h >32 m | | 3,92 | 18,20 |
| | **Totale** | 21,54 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |

**Interventi gestionali**

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Anno | Superficie - Ha | Superficie - % |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **Totale** | | |

**Ripresa**

| Intervento | Sistema di esbosco previsto | Anno | Ripresa planimetrica (Cedui) -Ha | Ripresa volumetrica - mc |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **Totale** | | |

| **STRATO ARBUSTIVO** | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | rovo |

| **STRATO ERBACEO** | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | dafne,viola,acetosella,asperula,sanicula,digitalis |

**PRESCRIZIONI**

Taglio secondario modulato sull'andamento della rinnovazione, assumendo a tratti il carattere di uno sgombero, dove il novellame è già affermato. Dove il novellame va insediandosi ma è ancora di dimensioni ridotte, taglio secondario.

SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **284** | **Denominazione località** | **Conca di Marco** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 17,45 |
| Utile Ha | 17,45 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 28 |
| Particella | 1p-5p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud-Est | |
| Pendenza % | 37,30 | |
| Altitudine mt slm | min. 574 | max 1360 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 140 |
| Classe cronologica o diametrica | 130-150 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 834,66 |
| Provvigione reale totale | 17,45 | 14561,34 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 12 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Agrifoglio* | *9%* | *Acero opalo* | *17%* *Acero campestre* | *1%* |
| *Faggio* | *64%* | | | |
| *Ontano napoletano* | *9%* | | | |

Descrizione:

Nella particella 284, la fustaia matura rappresenta il 94%, seguita dalla fustaia adulta al 2%, dalla fustaia giovane al 3%, e dalla perticaia giovane all'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,15 | 0,83 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,49 | 2,79 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,36 | 2,07 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 1,28 | 7,33 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 7,02 | 40,23 |
| Fustaie mature h >32 m | 8,16 | 46,76 |
| **Totale** | 17,45 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 17,45 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, Felce |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **285** | **Denominazione località** | **Conca di Marco** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 17,05 |
| Utile Ha | 16,87 |
| Altro-tare Ha | 0,18 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 28 |
| Particella | 1;5 |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Est |
| Pendenza % | 34 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 979 | 1267 |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

Giacitura

Manufatti

Risorse idriche

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 20 |
| Classe cronologica o diametrica | 10-30 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 413,02 |
| Provvigione reale totale | 16,87 | 6965,87 |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | CAV |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2015** |
| Età media all'anno di taglio | |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | |
| Ripresa totale | | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | Parco Regionale Picentini | |
| Autorità di Bacino | | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO




### STRATO ARBOREO

Specie presenti:

*Faggio, ontano napoletano, aceri spp., altre latifoglie*

Descrizione:

La fustaia matura copre l'88%, seguita dalla fustaia adulta al 6%, e dalla fustaia giovane al 3%, con la perticaia giovane al 3%.

| Tipologie strutturali | | | |
|---|---|---|---|
| | | Ha | % |
| Novelleti h 2-4 m | | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | | 0,05 | 0,32 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | | 0,45 | 2,67 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | | 0,54 | 3,22 |
| Fustaie mature h 20-24 m | | 1,02 | 6,07 |
| Fustaie mature h 24-28 m | | 3,63 | 21,50 |
| Fustaie mature h 28-32 m | | 8,59 | 50,94 |
| Fustaie mature h >32 m | | 2,58 | 15,28 |
| | **Totale** | 16,87 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |

**Interventi gestionali**

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Anno | Superficie - Ha | Superficie - % |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **Totale** | | |

**Ripresa**

| Intervento | Sistema di esbosco previsto | Anno | Ripresa planimetrica (Cedui) -Ha | Ripresa volumetrica - mc |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **Totale** | | |

| **STRATO ARBUSTIVO** | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | rovo |

| **STRATO ERBACEO** | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | dafne,viola,acetosella,asperula,sanicula,digitalis |

**PRESCRIZIONI**

Taglio secondario che in alcuni tratti, dove il novellame è già alto e affermato, dovrà assumere il carattere di uno sgombero. Nel resto della superficie, taglio secondario che asporti circa il 50% della massa.

SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **286** | **Denominazione località** | **Conca di Marco** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 18,28 |
| Utile Ha | 18,22 |
| Altro-tare Ha | 0,06 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 28 |
| Particella | 1 |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest |
| Pendenza % | 36 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1059 | 1305 |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

Giacitura

Manufatti

Risorse idriche

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | | 20 |
| Classe cronologica o diametrica | | 10-30 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 576,83 |
| Provvigione reale totale | 18,22 | 10507,82 |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | CAV |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Anno di taglio | | **2017** |
| Età media all'anno di taglio | | |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | |
| Ripresa totale | | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | Parco Regionale Picentini | |
| Autorità di Bacino | | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO




## STRATO ARBOREO

Specie presenti:

*Faggio, ontano napoletano, aceri spp., altre latifoglie*

Descrizione:

Nella particella 286, la fustaia matura rappresenta l'85%, seguita dalla fustaia adulta al 12%, e dalla fustaia giovane al 3%, con la perticaia giovane all'1%.

| Tipologie strutturali | | | |
|---|---|---|---|
| | | Ha | % |
| Novelleti h 2-4 m | | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | | 0,20 | 1,11 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | | 0,47 | 2,55 |
| Fustaie mature h 20-24 m | | 2,10 | 11,51 |
| Fustaie mature h 24-28 m | | 5,12 | 28,13 |
| Fustaie mature h 28-32 m | | 7,50 | 41,15 |
| Fustaie mature h >32 m | | 2,83 | 15,55 |
| | **Totale** | 18,22 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |

**Interventi gestionali**

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Anno | Superficie - Ha | Superficie - % |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **Totale** | | |

**Ripresa**

| Intervento | Sistema di esbosco previsto | Anno | Ripresa planimetrica (Cedui) -Ha | Ripresa volumetrica - mc |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **Totale** | | |

| **STRATO ARBUSTIVO** | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | rovo |

| **STRATO ERBACEO** | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | dafne,viola,acetosella,asperula,sanicula,digitalis |

## PRESCRIZIONI

Taglio secondario modulato sull'andamento della rinnovazione, assumendo a tratti il carattere di uno sgombero e a tratti il taglio di sementazione. In quest'ultimo caso, andranno eliminati gli alberi di minori dimensioni per circa un 50% del loro numero.

SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **288a** | **Denominazione località** | **Colle del Leone** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| Superficie | |
|---|---|
| Totale Ha | 20,22 |
| Utile Ha | 20,01 |
| Altro-tare Ha | 0,21 |

| Inquadramento Catastale | |
|---|---|
| Foglio | 28 |
| Particella | 1;5 |

| Generalità | |
|---|---|
| Esposizione | Est |
| Pendenza % | 30 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1058 | 1225 |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

Giacitura

Manufatti

Risorse idriche

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | | 20 |
| Classe cronologica o diametrica | | 10-30 |
| | Ha: | mc: |
| Provvigione reale unitaria | 1 | 483,32 |
| Provvigione reale totale | 20,01 | 9669,72 |

| | | |
|---|---|---|
| Anno di taglio | | **2019** |
| Età media all'anno di taglio | | |
| | Ha: | mc: |
| Ripresa unitaria | | |
| Ripresa totale | | |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | CAV |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | Parco Regionale Picentini | |
| Autorità di Bacino | | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO




### STRATO ARBOREO

Specie presenti:

*Faggio, ontano napoletano, aceri spp., altre latifoglie*

Descrizione:

#N/D

| Tipologie strutturali | | | |
|---|---|---|---|
| | | Ha | % |
| Novelleti h 2-4 m | | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | | 0,01 | 0,03 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | | 1,71 | 8,57 |
| Fustaie mature h 20-24 m | | 5,64 | 28,17 |
| Fustaie mature h 24-28 m | | 7,16 | 35,79 |
| Fustaie mature h 28-32 m | | 5,01 | 25,02 |
| Fustaie mature h >32 m | | 0,49 | 2,43 |
| | **Totale** | 20,01 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |

| Interventi gestionali | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Anno | Superficie - Ha | Superficie - % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **Totale** | | |

| Ripresa | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Intervento | Sistema di esbosco previsto | Anno | Ripresa planimetrica (Cedui) -Ha | Ripresa volumetrica - mc |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **Totale** | | |

| **STRATO ARBUSTIVO** | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | rovo |

| **STRATO ERBACEO** | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | dafne,viola,acetosella,asperula,sanicula,digitalis |

## PRESCRIZIONI

Taglio secondario modulato sull'andamento della rinnovazione, assumendo a tratti il carattere di uno sgombero, dove il novellame è già affermato, nella zona a nord interessata marginalmente dall'intervento precedente.
Taglio di sementazione eliminando gli alberi di minori dimensioni per circa un 50% del numero.

SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **288b** | **Denominazione località** | **Colle del Leone** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 21,68 |
| Utile Ha | 21,57 |
| Altro-tare Ha | 0,11 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 28 |
| Particella | 1 |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Est |
| Pendenza % | 30 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1095 | 1266 |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

Giacitura

Manufatti

Risorse idriche

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | | 140 |
| Classe cronologica o diametrica | | 130-150 |
| | Ha: | mc: |
| Provvigione reale unitaria | 1 | 664,58 |
| Provvigione reale totale | 21,57 | 14335,51 |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | CAV |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Anno di taglio | | |
| Età media all'anno di taglio | | |
| | Ha: | mc: |
| Ripresa unitaria | | |
| Ripresa totale | | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | Parco Regionale Picentini | |
| Autorità di Bacino | | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO




## STRATO ARBOREO

Specie presenti:

*Faggio, ontano napoletano, aceri spp., altre latifoglie*

Descrizione:

#N/D

| Tipologie strutturali | | | |
|---|---|---|---|
| | | Ha | % |
| Novelleti h 2-4 m | | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | | 0,01 | 0,05 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | | 0,21 | 0,99 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | | 0,15 | 0,70 |
| Fustaie mature h 20-24 m | | 1,05 | 4,88 |
| Fustaie mature h 24-28 m | | 4,22 | 19,57 |
| Fustaie mature h 28-32 m | | 10,66 | 49,43 |
| Fustaie mature h >32 m | | 5,26 | 24,38 |
| | **Totale** | 21,57 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |

| Interventi gestionali | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Anno | Superficie - Ha | Superficie - % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **Totale** | | |

| Ripresa | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Intervento | Sistema di esbosco previsto | Anno | Ripresa planimetrica (Cedui) -Ha | Ripresa volumetrica - mc |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **Totale** | | |

| **STRATO ARBUSTIVO** | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | rovo |

| **STRATO ERBACEO** | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | dafne,viola,acetosella,asperula,sanicula,digitalis |

## PRESCRIZIONI

Taglio di sementazione che asporti il 30% del volume totale per circa un 50% del numero degli alberi. Andranno eliminati gli alberi di minori dimensioni, lasciando a disseminare quelli più grandi. Andranno rilasciati alcuni esemplari di ontano e tutti quelli di acero di Lobel, con l'eccezione di quelli dalla chioma compromessa.

SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **291** | **Denominazione località** | **Sierro della Zà Popa** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 28,65 |
| Utile Ha | 28,62 |
| Altro-tare Ha | 0,03 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 28 |
| Particella | 6 |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord |
| Pendenza % | 31,09 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1046 | 1216 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 120 |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 629,66 |
| Provvigione reale totale | 28,62 | 18018,03 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 19 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Agrifoglio* | *0%* |
| *Faggio* | *100%* |
| *Ontano napoletano* | *0%* |

Descrizione:

La fustaia matura copre il 61%, seguita dalla fustaia adulta al 24%, dalla fustaia giovane al 10%, con il novelleto al 3%, e la perticaia giovane al 2%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,01 | 0,05 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,50 | 1,76 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,64 | 9,24 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 7,10 | 24,82 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 14,51 | 50,69 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 3,85 | 13,44 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 28,62 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 28,62 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Asperula, Acetosella, Geranio, Stellaria |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **292** | **Denominazione località** | **Colle del Leone** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 24,83 |
| Utile Ha | 24,79 |
| Altro-tare Ha | 0,04 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 28 |
| Particella | 1 |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest | |
| Pendenza % | 31,06 | |
| Altitudine mt slm | min. 1076 | max 1227 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 100 |
| Classe cronologica o diametrica | 90-110 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 567,97 |
| Provvigione reale totale | 24,79 | 14081,95 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 19 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 6 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Agrifoglio* | *1%* |
| *Faggio* | *99%* |
| *Ontano napoletano* | *0%* |

Descrizione:

Nella particella 292, la fustaia matura rappresenta il 55% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 26%, e dalla perticaia giovane al 17%, con il resto coperto dalla fustaia giovane al 2%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,14 | 0,58 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,80 | 15,34 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 6,45 | 26,01 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 8,99 | 36,26 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 4,85 | 19,56 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,56 | 2,24 |
| **Totale** | 24,79 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 24,79 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| Copertura: | Diffusa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| Copertura: | Scarsa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | Rovo, Vinca, Dafne |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **294** | **Denominazione località** | **Colle del Leone** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 27,74 |
| Utile Ha | 27,72 |
| Altro-tare Ha | 0,02 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 26;28 |
| Particella | 1p ; 4p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Ovest |
| Pendenza % | 28,86 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1084 | 1219 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| **Sottosuolo** |
|---|
| **Calcareo** |

| **Suolo** |
|---|
| **MAP 4.4** |

| **Viabilità** |
|---|
| **Ben servita** |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 140 |
| Classe cronologica o diametrica | 130-150 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **130-150** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 726,33 |
| Provvigione reale totale | 27,72 | 20137,22 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **288,0** |
| Ripresa totale | | **7120** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 21 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Agrifoglio* | *1%* |
| *Faggio* | *97%* |
| *Ontano napoletano* | *1%* |
| *Sorbo degli Ucc.* | *0%* |

Descrizione:

La particella 294 è dominata dalla fustaia matura, che copre il 90% della superficie. La fustaia giovane segue con una copertura del 9%, mentre il restante 1% è costituito da formazioni erbacee o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,11 | 0,39 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,57 | 9,27 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 13,72 | 49,50 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 10,89 | 39,29 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,43 | 1,55 |
| **Totale** | 27,72 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglio secondario. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 27,72 | 288,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 7985,5 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, Vinca |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **295a** | **Denominazione località** | **Felicecchia** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 15,83 |
| Utile Ha | 15,71 |
| Altro-tare Ha | 0,12 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 26 |
| Particella | 1p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Ovest | |
| Pendenza % | 37,31 | |
| Altitudine mt slm | min. 1206 | max 1338 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 100 |
| Classe cronologica o diametrica | 90-110 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 534,65 |
| Provvigione reale totale | 15,71 | 8401,65 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 10 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 4 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

*#ESPANSIONE!*

Descrizione:

Nella particella 295a, la fustaia adulta rappresenta il 45% della superficie. La fustaia giovane copre il 26%, seguita dalla fustaia matura al 21% e dalla perticaia giovane all'8%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,29 | 8,18 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 4,15 | 26,39 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 7,06 | 44,91 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 3,22 | 20,51 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 15,71 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 15,71 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, vinca, felce, sambuco, viola |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **295b** | **Denominazione località** | **Felicecchia** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 19,28 |
| Utile Ha | 19,18 |
| Altro-tare Ha | 0,10 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 13 |
| Particella | 16p-33p-34p-42p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Ovest | |
| Pendenza % | 39,05 | |
| Altitudine mt slm | min. 1278 | max 1522 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.4** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 80 |
| Classe cronologica o diametrica | 70-90 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 404,13 |
| Provvigione reale totale | 19,18 | 7751,51 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 11 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | | | |
|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *0%* | *Salice grigio* | *0%* |
| *Agrifoglio* | *0%* | | |
| *Faggio* | *96%* | | |
| *Maggiociondolo* | *3%* | | |

Descrizione:

La fustaia giovane domina la particella 295b con il 36% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 43%. La perticaia giovane occupa il 10% e il novelleto l'1%, con il resto come formazioni erbacee o arbustive (1%).

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,96 | 10,20 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 7,00 | 36,48 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 8,21 | 42,82 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,35 | 7,01 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,67 | 3,48 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 19,18 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 19,18 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Sambuco, felci, ortica, graminacee, pervinca, asperula, acetosella, vinca, viola |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **296** | **Denominazione località** | **Colle del Leone** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 8,95 |
| Utile Ha | 8,94 |
| Altro-tare Ha | 0,01 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 26;28 |
| Particella | 1p ; 4p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Ovest | |
| Pendenza % | 41,98 | |
| Altitudine mt slm | min. 1212 | max 1462 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 100 |
| Classe cronologica o diametrica | 90-110 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 460,54 |
| Provvigione reale totale | 8,94 | 4119,28 |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 9 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | | | |
|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *0%* | *Salicone* | *0%* |
| *Faggio* | *96%* | | |
| *Maggiociondolo* | *3%* | | |
| *Sorbo degli Ucc.* | *0%* | | |

Descrizione:

Nella particella 296, la fustaia giovane copre il 45% della superficie. La fustaia adulta segue con il 29%, la perticaia adulta con il 22%, e la perticaia giovane con l'1%, con il resto come formazioni erbacee o arbustive (1%).

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,01 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,01 | 0,16 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,12 | 23,73 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,84 | 42,89 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,74 | 30,60 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,23 | 2,60 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 8,94 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 8,94 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Rovo, agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Viola, asperula, vinca, graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **297** | **Denominazione località** | **Vallone del Cupone** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 23,48 |
| Utile Ha | 19,47 |
| Altro-tare Ha | 4,01 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 26;28 |
| Particella | 1p-4p ; 4p-7p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest | |
| Pendenza % | 39,44 | |
| Altitudine mt slm | min. 1215 | max 1439 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 80 |
| Classe cronologica o diametrica | 70-90 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 355,25 |
| Provvigione reale totale | 19,47 | 6918,04 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 13 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Agrifoglio* | *0%* |
| *Faggio* | *99%* |
| *Ontano napoletano* | *0%* |
| *Sorbo degli Ucc.* | *1%* |

Descrizione:

La fustaia giovane rappresenta il 34% della superficie nella particella 297, seguita dalla fustaia adulta al 21%. La perticaia adulta copre il 26%, mentre la perticaia giovane occupa l'11%, con il resto come formazioni erbacee o arbustive (2%).

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 2,26 | 11,61 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 5,22 | 26,80 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 6,68 | 34,29 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 4,07 | 20,89 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 1,25 | 6,41 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 19,47 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 19,47 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Vinca, viola, graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **298** | **Denominazione località** | **Vallone del Cupone** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 10,72 |
| Utile Ha | 10,72 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 26 |
| Particella | 1p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest | |
| Pendenza % | 40,03 | |
| Altitudine mt slm | min. 1133 | max 1261 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

| **Sottosuolo** |
|---|
| **Calcareo** |

| **Suolo** |
|---|
| **MAP 4.4** |

| **Viabilità** |
|---|
| **Ben servita** |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 120 |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 632,46 |
| Provvigione reale totale | 10,72 | 6781,85 |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 6 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 9 |
| | Relascopio | |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Agrifoglio* | *2%* |
| *Faggio* | *98%* |
| *Ontano napoletano* | *0%* |

Descrizione:

La fustaia matura domina la particella 298 con una copertura del 46%, seguita dalla fustaia adulta al 27%, dalla fustaia giovane al 25%, e dalla perticaia adulta al 2%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,18 | 1,71 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,38 | 22,24 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,85 | 26,56 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 3,67 | 34,19 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 1,64 | 15,30 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 10,72 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 10,72 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Viola, pervinca, ciclamino, graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **300** | **Denominazione località** | **Felicecchia** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 23,92 |
| Utile Ha | 23,90 |
| Altro-tare Ha | 0,02 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 26 |
| Particella | 1p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Ovest | |
| Pendenza % | 34,24 | |
| Altitudine mt slm | min. 1461 | max 1612 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 60 |
| Classe cronologica o diametrica | 50-70 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 534,93 |
| Provvigione reale totale | 23,90 | 12786,94 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 16 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

*Faggio* *100%*

Descrizione:

La fustaia matura copre il 44% della superficie nella particella 300, seguita dalla fustaia giovane al 34%, dalla fustaia adulta al 17% e dalla spessina al 5%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,23 | 5,16 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 7,87 | 32,94 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 10,56 | 44,18 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 4,23 | 17,71 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 23,90 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 23,90 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Rovo |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, vinca, dafne, acetosella, asperula, sanicula |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **301** | **Denominazione località** | **Felicecchia** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 19,49 |
| Utile Ha | 17,65 |
| Altro-tare Ha | 1,84 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 26 |
| Particella | 1p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest |
| Pendenza % | 34,22 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1420 | 1538 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 80 |
| Classe cronologica o diametrica | 70-90 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 356,17 |
| Provvigione reale totale | 17,65 | 6286,32 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 11 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | | | |
|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *0%* | *Pioppo tremulo* | *0%* |
| *Faggio* | *98%* | | |
| *Ontano napoletano* | *1%* | | |
| *Sorbo degli Ucc.* | *1%* | | |

Descrizione:

Nella particella 301, la fustaia giovane rappresenta il 43% della superficie, seguita dalla perticaia adulta al 37% e dal novelleto al 10%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,69 | 9,58 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 6,45 | 36,54 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 7,64 | 43,30 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,87 | 10,57 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,01 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 17,65 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 17,65 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Rovo |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Pervinca, viola, asperula, graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **302** | **Denominazione località** | **Coste di Cervialto** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 20,89 |
| Utile Ha | 20,86 |
| Altro-tare Ha | 0,03 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 26 |
| Particella | 1p-2p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Ovest | |
| Pendenza % | 37,98 | |
| Altitudine mt slm | min. 1323 | max 1651 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 120 |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 |

| | | |
|---|---|---|
| Anno di taglio | | **0** |
| Età media all'anno di taglio | | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 508,34 |
| Provvigione reale totale | 20,86 | 10602,24 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 14 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Faggio* | *96%* | *Pioppo tremulo* | *0%* |
| *Maggiociondolo* | *3%* | | |

Descrizione:

La fustaia adulta copre il 38% della superficie della particella 302, seguita dalla perticaia giovane al 17%, dalla perticaia adulta al 13% e dalla fustaia giovane all'11%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 2,55 | 12,21 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 3,73 | 17,88 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,47 | 11,82 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 3,75 | 18,00 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 6,09 | 29,18 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 1,98 | 9,49 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,30 | 1,42 |
| **Totale** | 20,86 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 20,86 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa; abbondante sotto la strada |
| Specie prevalenti: | Rovo, lampone |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **304** | **Denominazione località** | **Colle delle Radici** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 22,47 |
| Utile Ha | 21,85 |
| Altro-tare Ha | 0,62 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 26 |
| Particella | 1p-5p-8p |

| **Generalità** | | | |
|---|---|---|---|
| Esposizione | Sud | | |
| Pendenza % | 36,46 | | |
| Altitudine mt slm | min. 1220 | max 1431 | |
| Giacitura | | | |
| Manufatti | | | |
| Risorse idriche | | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 80 |
| Classe cronologica o diametrica | 70-90 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 430,43 |
| Provvigione reale totale | 21,85 | 9402,91 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 17 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Faggio* | *98%* |
| *Maggiociondolo* | *0%* |
| *Ontano napoletano* | *1%* |
| *Sorbo degli Ucc.* | *1%* |

Descrizione:

Nella particella 304, la fustaia giovane copre il 36% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 33%, dalla perticaia giovane al 21% e dalla perticaia adulta al 5%. Il restante 6% è costituito da formazioni erbacee o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,18 | 5,39 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 7,11 | 32,55 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 7,87 | 36,02 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 4,84 | 22,15 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,85 | 3,90 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 21,85 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 21,85 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa, limitata alle aree non rinnovate |
| Specie prevalenti: | Rovo, ginestra, agrifoglio, dafne |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Felce, sambuco, graminacee, fragola, trifoglio |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **305** | **Denominazione località** | **Colle delle Radici** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 21,65 |
| Utile Ha | 21,32 |
| Altro-tare Ha | 0,33 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 26 |
| Particella | 1p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud | |
| Pendenza % | 36,86 | |
| Altitudine mt slm | min. 1243 | max 1437 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 80 |
| Classe cronologica o diametrica | 70-90 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 457,60 |
| Provvigione reale totale | 21,32 | 9755,43 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 14 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Acero montano* | *2%* |
| *Agrifoglio* | *1%* |
| *Faggio* | *90%* |
| *Maggiociondolo* | *5%* |
| *Ontano napoletano* | *2%* |

Descrizione:

La fustaia adulta rappresenta il 35% della superficie della particella 305, seguita dalla fustaia giovane al 31%, dalla perticaia giovane al 23% e dalla perticaia adulta al 6%. Il restante 1% è occupato da formazioni erbacee o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,25 | 5,87 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 5,06 | 23,72 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 6,90 | 32,36 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 7,38 | 34,63 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,73 | 3,42 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 21,32 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 21,32 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| Copertura: | Diffusa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| Copertura: | Diffusa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | Vinca, felce, graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **306** | **Denominazione località** | **Piano Migliato** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 18,48 |
| Utile Ha | 18,47 |
| Altro-tare Ha | 0,01 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 26 |
| Particella | 1p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud |
| Pendenza % | 37,12 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1422 | 1554 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 100 |
| Classe cronologica o diametrica | 90-110 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 446,76 |
| Provvigione reale totale | 18,47 | 8250,47 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 11 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | | | |
|---|---|---|---|
| *Agrifoglio* | *2%* | *Frassino maggiore* | *0%* |
| *Faggio* | *96%* | | |
| *Maggiociondolo* | *1%* | | |
| *Ontano napoletano* | *0%* | | |

Descrizione:

La fustaia adulta copre il 37% della superficie nella particella 306, seguita dalla fustaia giovane al 35%, dalla perticaia giovane al 24% e dalla perticaia adulta all'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,19 | 1,04 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 4,41 | 23,91 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 6,76 | 36,59 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 6,44 | 34,89 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,66 | 3,57 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 18,47 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 18,47 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, trifoglio, viola, asperula, senecio |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **307** | **Denominazione località** | **Piano Migliato** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 19,18 |
| Utile Ha | 19,00 |
| Altro-tare Ha | 0,18 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 26 |
| Particella | 1p-5p-8p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud-Est | |
| Pendenza % | 38,21 | |
| Altitudine mt slm | min. 1424 | max 1651 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 80 |
| Classe cronologica o diametrica | 70-90 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 457,79 |
| Provvigione reale totale | 19,00 | 8696,56 |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 10 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Faggio* | *98%* |
| *Ontano napoletano* | *1%* |
| *Sorbo degli Ucc.* | *1%* |

Descrizione:

Nella particella 307, la fustaia giovane rappresenta il 40% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 26%, dalla perticaia giovane al 24% e dalla perticaia adulta al 3%. Il restante 8% è costituito da formazioni erbacee o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,47 | 2,50 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 4,83 | 25,45 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 7,65 | 40,30 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 4,52 | 23,78 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 1,51 | 7,97 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 19,00 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 19,00 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| Copertura: | Scarsa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | - |

**STRATO ERBACEO**

| Copertura: | Diffusa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | - |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **308a** | **Denominazione località** | **Raia di Piano Migliato** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 21,10 |
| Utile Ha | 20,90 |
| Altro-tare Ha | 0,20 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 26 |
| Particella | 1p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Est |
| Pendenza % | 33,93 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1253 | 1705 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 200 |
| Classe cronologica o diametrica | 190-210 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 550,49 |
| Provvigione reale totale | 20,90 | 11502,57 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 12 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Acero montano* | *6%* |
| *Agrifoglio* | *7%* |
| *Faggio* | *83%* |
| *Maggiociondolo* | *3%* |
| *Ontano napoletano* | *1%* |

Descrizione:

La fustaia matura copre il 37% della superficie della particella 308a, seguita dalla fustaia adulta al 31% e dalla perticaia adulta al 5%. Il restante 27% è occupato da formazioni erbacee o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,02 | 0,10 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,05 | 5,03 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 6,61 | 31,65 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 9,65 | 46,16 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 3,52 | 16,85 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,04 | 0,21 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 20,90 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 20,90 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| Copertura: | Diffusa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| Copertura: | Diffusa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | Graminacee, felce, rovo, geranio |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **308b** | **Denominazione località** | **Raia di Piano Migliato** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 7,44 |
| Utile Ha | 7,39 |
| Altro-tare Ha | 0,05 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 13 |
| Particella | 16p-22p-51p-52p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud | |
| Pendenza % | 39,24 | |
| Altitudine mt slm | min. 1412 | max 1682 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 100 |
| Classe cronologica o diametrica | 90-110 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 495,92 |
| Provvigione reale totale | 7,39 | 3665,45 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 5 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Acero montano* | *6%* |
| *Faggio* | *92%* |
| *Ontano napoletano* | *1%* |

Descrizione:

Nella particella 308b, la fustaia giovane rappresenta il 33% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 30%, dalla perticaia giovane al 12% e dalla perticaia adulta al 2%. Il restante 23% è costituito da formazioni erbacee o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,13 | 1,73 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,90 | 12,17 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,22 | 30,05 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,41 | 32,67 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 1,73 | 23,39 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 7,39 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 7,39 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | - |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, rovo, felce |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **309** | **Denominazione località** | **Colle delle Radici** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 16,88 |
| Utile Ha | 16,85 |
| Altro-tare Ha | 0,03 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 26 |
| Particella | 1p-5p-6-7p-8p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud | |
| Pendenza % | 30,74 | |
| Altitudine mt slm | min. 1214 | max 1314 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 120 |
| Classe cronologica o diametrica | 110-130 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 586,37 |
| Provvigione reale totale | 16,85 | 9882,04 |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 11 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 2 |
| | Relascopio | |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | | | |
|---|---|---|---|
| *Agrifoglio* | *0%* | *Salicone* | *0%* |
| *Faggio* | *99%* | | |
| *Maggiociondolo* | *0%* | | |
| *Ontano napoletano* | *0%* | | |

Descrizione:

La fustaia giovane copre il 45% della superficie della particella 309, seguita dalla fustaia adulta al 32% e dalla perticaia adulta al 5%. Il restante 18% è occupato da formazioni erbacee o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,75 | 4,44 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,98 | 17,68 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 7,60 | 45,07 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 4,26 | 25,26 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 1,27 | 7,55 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 16,85 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 16,85 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Felce, vinca, graminacee, acetosella, asperula |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **310** | **Denominazione località** | **Piano Migliato** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 23,71 |
| Utile Ha | 23,67 |
| Altro-tare Ha | 0,04 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 26 |
| Particella | 1p-5p-7p-8p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud-Est | |
| Pendenza % | 37,01 | |
| Altitudine mt slm | min. 1241 | max 1472 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 100 |
| Classe cronologica o diametrica | 90-110 |

| | | |
|---|---|---|
| Anno di taglio | | **0** |
| Età media all'anno di taglio | | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 539,52 |
| Provvigione reale totale | 23,67 | 12771,88 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 15 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Acero montano* | *6%* |
| *Agrifoglio* | *6%* |
| *Faggio* | *86%* |
| *Maggiociondolo* | *1%* |
| *Ontano napoletano* | *2%* |

Descrizione:

La fustaia adulta copre il 53% della superficie della particella 310, seguita dalla fustaia giovane al 27% e dalla perticaia giovane al 4%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,01 | 0,03 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,01 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,88 | 3,72 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 6,92 | 29,23 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 11,72 | 49,49 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 4,15 | 17,53 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 23,67 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 23,67 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| Copertura: | Diffusa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| Copertura: | Diffusa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | Rovo, felce, dafne |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **A** |
|---|---|

| **Particella** | **311** | **Denominazione località** | **Piano Migliato** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 15,05 |
| Utile Ha | 14,02 |
| Altro-tare Ha | 1,03 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 16 |
| Particella | 2-3 |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Est |
| Pendenza % | 25,19 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1198 | 1258 |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **PIM 5.3** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 100 |
| Classe cronologica o diametrica | 90-110 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 517,68 |
| Provvigione reale totale | 14,02 | 7256,72 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 12 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

*#ESPANSIONE!* *Orniello* *1%*

Descrizione:

Nella particella 311, la fustaia adulta rappresenta il 47% della superficie, seguita dalla fustaia giovane al 28% e dalla perticaia giovane al 5%. Il restante 17% è occupato da formazioni erbacee o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,03 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,59 | 4,19 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,64 | 4,53 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,35 | 16,75 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 6,59 | 46,98 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 3,57 | 25,46 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,29 | 2,05 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 14,02 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 14,02 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, felce, sambuco, asperula, geranio |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



# PARTICELLE FORESTALI DELLA CLASSE ECONOMICA/COMPRESA "BV"

**Art. 90, comma 2, del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Particella forestale | | | | | | Dati catastali | | Area protetta - zonizzazione | | | Aree percorse dal Fuoco | | *Vincoli | Dati Dendrometrici | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località | n° | Superficie in Ha | | | | Foglio | Particella | A | B | C | | | | Densità | | Pr unitaria mc/Ha | Pr totale mc | ***Pp unitaria mc/Ha | ***Pp totale mc | Incremento (medio e/o corrente) mc | Età all'anno di redazione del PGF |
| | | Totale | Bosco | Pascolo - prati - radure | Altro | | | Ha | Ha | Ha | Anno | Ha | | A.B. unitaria mq/Ha | **Soggetti n°/Ha | | | | | | |
| Cervarolo di Laceno | 149 | 10,02 | 9,98 | 0,04 | | 20 | 11p-12p-13p | | 10,02 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 50,31 | 854 | 474,6 | 4.735,62 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 25 | 12p | | | | | | | | | | | | | | |
| Cervarolo di Laceno | 172 | 10,35 | 10,28 | 0,07 | | 25 | 12p | | 10,35 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 55,15 | 1002 | 569,6 | 5.857,28 | | | | indeterminata |
| Cervarolo di Laceno | 197 | 19,60 | 19,58 | 0,02 | | 25 | 12p | 0,57 | 19,03 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 51,89 | 604 | 612,6 | 11.996,13 | | | | indeterminata |
| **TOTALI** | | **39,97** | **39,84** | **0,13** | | | | | | | | | | | | | **22.589,03** | | **0,00** | | |

* = Vincoli:

| | |
|---|---|
| a | Idrogeologico (L. 3267/1923) |
| b | Autorità di Bacino (L. 18 maggio 1989, n. 183 – L. R. 07/02/1994, n. 8) |
| c | Uso civico (L. 1766/1927 – L. R. 11/1981) |
| d | Bellezze naturali (L. 1497/1939 transitata nel D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) |
| e | Piani territoriali paesaggistici (ai sensi dell'art. 149 del D.lgs. 29/10/99, n. 490) |
| f | Parco Nazionale (L. 6 dicembre 1991, n. 394) |
| g | Parco Regionale (L. R. 1 settembre 1993, n. 33) |
| h | Riserva, altro (L. 6 dicembre 1991, n. 394) |
| i | Legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 21 novembre 2000, n. 353) |
| l | Conflitti di proprietà e/o di confinazione tra le aree oggetto di pianificazione ed altri Soggetti privati e/o pubblici |
| m | Rete Natura 2000 |
| n | Altro - specificare |

** = Fustaie e fustaie transitorie - *n° soggetti/Ha* ; ceduo - *n° polloni/Ha e n° matricine/Ha*

Pr = Provvigione reale

*** = Se impossibilitati a calcolare la Provvigione potenziale/normale fornire motivazione

Pp = Provvigione potenziale

SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **BV** |
|---|---|

| **Particella** | **149** | **Denominazione località** | **Cervarolo di Laceno** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 10,02 |
| Utile Ha | 9,98 |
| Altro-tare Ha | 0,04 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 20;25 |
| Particella | 11p-12p-13p ; 12p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Ovest | |
| Pendenza % | 41,35 | |
| Altitudine mt slm | min. 1312 | max 1465 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | | |
|---|---|---|
| Anno di taglio | | **0** |
| Età media all'anno di taglio | | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 505,31 |
| Provvigione reale totale | 9,98 | 5041,84 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 6 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | | | |
|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *2%* | *Carpino bianco* | *3%* |
| *Agrifoglio* | *9%* | | |
| *Faggio* | *84%* | | |
| *Maggiociondolo* | *1%* | | |
| *Ontano napoletano* | *1%* | | |

Descrizione:

Le fustaie giovani coprono il 25% della superficie, seguite dalle fustaie adulte con il 28% e dalle fustaie mature con il 5%. Le perticaie giovani occupano il 15% e le perticaie adulte il 21%. Il resto sono formazioni erbacce o arbustive

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,59 | 5,96 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,13 | 21,31 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,53 | 15,30 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,49 | 24,94 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 2,78 | 27,89 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,46 | 4,60 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 9,98 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservazione della biodiversità | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 9,98 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, rovo e vinca |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **BV** |
|---|---|

| **Particella** | **172** | **Denominazione località** | **Cervarolo di Laceno** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 10,35 |
| Utile Ha | 10,28 |
| Altro-tare Ha | 0,07 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 25 |
| Particella | 12p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Ovest |
| Pendenza % | 44,23 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1314 | 1528 |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

Giacitura

Manufatti

Risorse idriche

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 498,44 |
| Provvigione reale totale | 10,28 | 5125,31 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 9 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Agrifoglio* | *1%* |
| *Faggio* | *91%* |
| *Maggiociondolo* | *8%* |
| *Ontano napoletano* | *0%* |

Descrizione:

La fustaia matura rappresenta il 25% della superficie nella particella 172, seguita dalla fustaia adulta con il 26%, la fustaia giovane con il 21%, la perticaia adulta con il 20% e la perticaia giovane con l'8%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,82 | 7,97 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,10 | 20,38 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,19 | 21,29 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,66 | 25,86 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 1,75 | 17,04 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,69 | 6,75 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,07 | 0,71 |
| **Totale** | 10,28 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservazione della biodiversità | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 10,28 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Graminacee e vinca |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **BV** |
|---|---|

| **Particella** | **197** | **Denominazione località** | **Cervarolo di Laceno** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 19,60 |
| Utile Ha | 19,58 |
| Altro-tare Ha | 0,02 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 25 |
| Particella | 12p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Ovest | |
| Pendenza % | 44,56 | |
| Altitudine mt slm | min. 1315 | max 1529 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 579,31 |
| Provvigione reale totale | 19,58 | 11345,03 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 14 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Agrifoglio* | *10%* | *Acero opalo* | *1%* |
| *Faggio* | *88%* | | |
| *Maggiociondolo* | *1%* | | |
| *Sorbo degli Ucc.* | *1%* | | |

Descrizione:

La distribuzione in questa particella vede la fustaia matura coprire il 40% della superficie. La fustaia adulta segue con il 28%, la fustaia giovane con il 18%, la perticaia adulta con l'11% e la perticaia giovane con il 3%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,64 | 3,29 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,10 | 10,71 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,38 | 17,28 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 5,66 | 28,91 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 4,79 | 24,47 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 2,43 | 12,42 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,57 | 2,91 |
| **Totale** | 19,58 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservazione della biodiversità | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 19,58 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Vinca, graminacee, ciclamino e asperula |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 2

# PARTICELLE FORESTALI DELLA CLASSE ECONOMICA/COMPRESA "C"

**Art. 90, comma 2, del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Particella forestale | | | | | | Dati catastali | | Area protetta - zonizzazione | | | Aree percorse dal Fuoco | | *Vincoli | Dati Dendrometrici | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località | n° | Superficie in Ha | | | | Foglio | Particella | A | B | C | | | | Densità | | Pr unitaria mc/Ha | Pr totale mc | ***Pp unitaria mc/Ha | ***Pp totale mc | Incremento (medio e/o corrente) mc | Età all'anno di redazione del PGF |
| | | Totale | Bosco | Pascolo - prati - radure | Altro | | | Ha | Ha | Ha | Anno | Ha | | A.B. unitaria mq/Ha | **Soggetti n°/Ha | | | | | | |
| Costa della Guradia | 3b | 3,31 | 2,71 | 0,60 | | 7 | 27-30p-46-47-48 | | 3,31 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 57,05 | 1248 | 498,02 | 1.351,13 | | | | indeterminata |
| Fieste | 4b | 10,01 | 1,70 | 8,31 | | 2 | 62 - 63 | | 2,48 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 64,19 | 109,29 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 3 | 40-41-57-58-94 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 6 | 48 | | | | | | | | | | | | | | |
| Varco di Marro | 8 | 7,38 | 7,27 | 0,11 | | 7 | 22p-30p | | 7,38 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 43,91 | 787 | 605,89 | 4.404,82 | | | | indeterminata |
| Valle Scura di Sopra | 16 | 16,36 | 10,63 | 5,73 | | 7 | 21-22p-41 | | 16,36 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 263,37 | 2.799,88 | | | | indeterminata |
| Colle del Pozzo | 17 | 14,66 | 13,89 | 0,77 | | 7 | 22p | | 14,66 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 58,68 | 451 | 851,45 | 11.823,07 | | | | indeterminata |
| Il Montagnone | 18 | 10,84 | 7,89 | 2,95 | | 7 | 22p | | 10,84 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 39,58 | 660 | 380,03 | 3.000,17 | | | | indeterminata |
| Cauciogliara | 20 | 28,61 | 10,98 | 17,63 | | 7 | 22p-30p-34p-39p-49-50-51-52-57 | | 28,61 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 105,94 | 1.162,84 | | | | indeterminata |
| Belvedere | 21 | 10,70 | 7,26 | 3,44 | | 7 | 22p-40-41-43-60-61 | | 10,70 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 264,61 | 1.920,89 | | | | indeterminata |
| Castagna | 24 | 8,75 | 8,68 | 0,07 | | 7 | 22p-37-44-49-53-54 | | 8,75 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 35,31 | 501 | 482,35 | 4.186,04 | | | | indeterminata |
| La Chiusa | 25 | 13,12 | 10,13 | 2,99 | | 7 | 22p-39p | | 13,12 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 12,04 | 312 | 116,70 | 1.182,34 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 12 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| Pettinicchio | 26 | 38,89 | 10,84 | 28,05 | | 7 | 22p | | 38,89 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 96,81 | 1.049,34 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 12 | 1p-2-9p-51-52-53-54-55-56-57 | | | | | | | | | | | | | | | |
| I Morti | 27a | 20,07 | 7,21 | 12,86 | | 7 | 22p | | 20,07 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 109,58 | 790,06 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 12 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 13 | 16p-23p-24p-28p-29p | | | | | | | | | | | | | | |
| I Morti | 28 | 2,30 | 1,57 | 0,73 | | 13 | 16p-30p-31p | | 2,30 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 180,43 | 284,08 | | | | indeterminata |
| Valle dei Morti | 29a | 8,29 | 7,57 | 0,72 | | 13 | 16p-33p-34p-42p | | 8,29 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 50,78 | 386 | 640,55 | 4.849,71 | | | | indeterminata |
| Valle dei Lupi | 30 | 6,84 | 5,00 | 1,84 | | 13 | 2p-16p-43p | | 6,84 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 69,00 | 533 | 911,73 | 4.555,53 | | | | indeterminata |
| Valle dei Lupi | 31 | 17,68 | 17,41 | 0,27 | | 13 | 16p-22p-42p | | 17,68 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 37,95 | 794 | 385,25 | 6.707,66 | | | | indeterminata |
| Acero | 32a | 5,72 | 5,68 | 0,04 | | 13 | 16p-22p-51p-52p | | 5,72 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,96 | 793 | 444,04 | 2.522,09 | | | | indeterminata |
| Acero | 33 | 10,84 | 10,61 | 0,23 | | 13 | 22p-52p | | 10,84 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 50,68 | 936 | 472,10 | 5.009,83 | | | | indeterminata |
| Filettone | 34 | 5,24 | 5,20 | 0,04 | | 13 | 22p | | 5,24 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 38,83 | 793 | 338,20 | 1.758,76 | | | | indeterminata |
| Valle del Limo | 37a | 8,72 | 7,16 | 1,56 | | 7 | 22p-34p-45p-55-56p-73p | | 8,72 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 207,70 | 1.486,55 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 11 | 20p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 12 | 1p-4-63p-64p-65-66-67-68-191 | | | | | | | | | | | | | | |
| Valle del Limo | 37b | 4,83 | 4,43 | 0,40 | | 7 | 22p-34 | | 4,83 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 214,43 | 950,32 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 11 | 20p | | | | | | | | | | | | | | |
| Lo Stazzo | 38 | 14,31 | 10,05 | 4,26 | | 7 | 22p | | 14,31 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 37,02 | 826 | 345,85 | 3.475,38 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 12 | 1p-11p-12p-63p-64p-69-74-75-76-77-79 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lo Stazzo | 39 | 17,32 | 10,43 | 6,89 | | 12 | 1p-6-7-12p-59-60-61-62 | | 17,32 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 175,49 | 1.830,88 | | | | indeterminata |
| Lo Stazzo | 40 | 11,15 | 5,26 | 5,89 | | 12 | 1p-8-9p-12p-13-58 | | 11,15 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 183,86 | 967,99 | | | | indeterminata |
| Vallone dello Stazzo | 41 | 9,26 | 8,93 | 0,33 | | 12 | 1p-12p | | 9,26 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 52,46 | 494 | 573,02 | 5.116,04 | | | | indeterminata |
| Valle dei Sauci | 42 | 28,53 | 13,87 | 14,66 | | 12 | 1p | | 28,53 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 173,45 | 2.405,92 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 13 | 16p | | | | | | | | | | 2.405,92 | | | | |
| Valle dei Morti | 43 | 14,36 | 12,46 | 1,90 | | 12 | 1p | | 14,36 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 48,51 | 616 | 488,78 | 6.087,99 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 13 | 16p | | | | | | | | | | | | | | |
| Valle dei Sauci | 44a | 7,99 | 7,70 | 0,29 | | 12 | 1p-3 | | 7,99 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,13 | 468 | 658,45 | 5.071,21 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 13 | 16p | | | | | | | | | | | | | | |
| Valle dei Sauci | 44b | 4,68 | 4,38 | 0,30 | | 12 | 1p | | 4,68 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 321,29 | 1.407,98 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 13 | 16p-44-45p-46p | | | | | | | | | | | | | | |
| Valle dei Sauci | 45a | 19,12 | 18,68 | 0,44 | | 13 | 2p-3p-15p-16p-43p-45p | | 19,12 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 44,57 | 533 | 536,08 | 10.012,45 | | | | indeterminata |
| Terrate | 46 | 16,25 | 15,14 | 1,11 | | 13 | 16p-22p-48-49-50-52p | | 16,25 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,41 | 650 | 465,43 | 7.045,61 | | | | indeterminata |
| Terrate | 47 | 4,99 | 4,94 | 0,05 | | 13 | 22p-160p | | 4,99 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 52,06 | 800 | 491,81 | 2.429,82 | | | | indeterminata |
| Filettone | 48 | 9,42 | 8,75 | 0,67 | | 13 | 8p-22p-167p-169-170-171p-172-173p | | 9,42 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 61,70 | 546 | 661,12 | 5.787,16 | | | | indeterminata |
| Vallone della Vecchiarella | 50 | 9,13 | 7,88 | 1,25 | | 11 | 20p-29p | | 9,13 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 282,57 | 2.226,58 | | | | indeterminata |
| Orto di Calcio Lento | 51 | 21,56 | 3,53 | 18,03 | | 11 | 20p-26-27p-29p-42-43p-45 | | 21,56 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 66,53 | 235,17 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 12 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |

| Particella forestale | | | | | | Dati catastali | | Area protetta - zonizzazione | | | Aree percorse dal Fuoco | | *Vincoli | Dati Dendrometrici | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località | n° | Superficie in Ha | | | | Foglio | Particella | A | B | C | | | | Densità | | Pr unitaria mc/Ha | Pr totale mc | ***Pp unitaria mc/Ha | ***Pp totale mc | Incremento (medio e/o corrente) mc | Età all'anno di redazione del PGF |
| | | Totale | Bosco | Pascolo - prati - radure | Altro | | | Ha | Ha | Ha | Anno | Ha | | A.B. unitaria mq/Ha | **Soggetti n°/Ha | | | | | | |
| Valle del Limo | 52 | 31,14 | 5,37 | 25,77 | | 11 | 24-25-29p-38-39-40-41-43p-44 | | 31,14 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 75,11 | 403,23 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 12 | 1p-10-21-49-80-81-82-83-84 | | | | | | | | | | | | | | |
| Conca | 53 | 6,87 | 6,61 | 0,26 | | 7 | 22p-45-56p-73p | | 6,87 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 53,38 | 949 | 617,33 | 4.082,90 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 12 | 1p-68 | | | | | | | | | | | | | | |
| Monte Caruso | 54 | 12,57 | 5,38 | 7,19 | | 12 | 1p-12p-116-121-130-131-132-133 | | 12,15 | 0,42 | | | a/b/c/d/g/i/m | 40,97 | 364 | 460,67 | 2.477,04 | | | | indeterminata |
| Valle dei Sauci | 55 | 14,89 | 13,88 | 1,01 | | 12 | 1p-12p | | 14,89 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 69,18 | 796 | 822,89 | 11.423,50 | | | | indeterminata |
| Monte Caruso | 56 | 13,22 | 7,29 | 5,93 | | 12 | 1p-12p-401p | | 13,22 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,88 | 462 | 486,42 | 3.546,89 | | | | indeterminata |
| Valle Matauro | 57 | 35,36 | 23,27 | 12,09 | | 12 | 1p-14p-15-48p-178 | | 35,36 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 40,17 | 520 | 360,99 | 8.398,86 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 13 | 9p-15p-21p-62 | | | | | | | | | | | | | | |
| Colle Matauro | 59 | 12,88 | 10,18 | 2,70 | | 12 | 1p-14p-179 | | 12,88 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,64 | 696 | 458,14 | 4.665,20 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 13 | 4-9p-15p-16p-59-60 | | | | | | | | | | | | | | |
| Valle del Pero | 61 | 11,88 | 10,52 | 1,36 | | 13 | 15p-16p-54-55p | | 11,88 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 54,43 | 754 | 540,63 | 5.685,88 | | | | indeterminata |
| Raia dell'Acera | 62 | 12,88 | 10,43 | 2,45 | | 13 | 16p-22p-53 | | 12,88 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,16 | 773 | 458,72 | 4.783,35 | | | | indeterminata |
| Terrate | 63 | 12,05 | 10,68 | 1,37 | | 13 | 16p-22p | | 12,05 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 46,04 | 403 | 424,61 | 4.534,42 | | | | indeterminata |
| Terrate | 64 | 8,25 | 8,12 | 0,13 | | 13 | 5p-22p-144-152p-153p | | 8,25 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 51,94 | 706 | 460,81 | 3.740,39 | | | | indeterminata |
| Filettone | 65 | 8,08 | 7,94 | 0,14 | | 13 | 8p-22p-150p-151p-168p-171p-180p | | 8,08 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 48,53 | 645 | 469,18 | 3.723,68 | | | | indeterminata |
| La Peta | 66 | 13,89 | 8,74 | 5,15 | | 13 | 5p-22p-145-146-147-148-149-182 | | 13,89 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 209,30 | 1.829,31 | | | | indeterminata |
| Filettone | 67 | 13,70 | 11,11 | 2,59 | | 13 | 22p-173p | | 13,70 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 295,52 | 3.284,64 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 20 | 12p | | | | | | | | | | | | | | |
| Costa dell'Angelo | 68 | 8,44 | 6,67 | 1,77 | | 10 | 144-171 | | 8,44 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 176,67 | 1.177,60 | | | | indeterminata |
| Valle Nova | 70 | 33,18 | 23,39 | 9,79 | | 11 | 27p-29p | | 27,19 | 5,99 | | | a/b/c/d/g/i/m | 65,62 | 634 | 634,16 | 14.830,55 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 12 | 1p-17-18-85-86-87-88 | | | | | | | | | | | | | | |
| S. Maria | 72 | 17,41 | 11,71 | 5,70 | | 11 | 29p | | 13,63 | 3,78 | | | a/b/c/d/g/i/m | 52,07 | 936 | 396,38 | 4.642,47 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 12 | 1p-12p-18-89 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 18 | 11p | | | | | | | | | | | | | | |
| S. Maria | 73 | 11,99 | 7,49 | 4,50 | | 11 | 29p | | 11,99 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 232,57 | 1.741,60 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 12 | 1p-16 | | | | | | | | | | | | | | |
| S. Maria | 74 | 6,36 | 5,05 | 1,31 | | 12 | 1p-20-105-106-107 | | 4,44 | 1,92 | | | a/b/c/d/g/i/m | 42,15 | 515 | 416,85 | 2.103,95 | | | | indeterminata |
| Monte Caruso | 76 | 16,92 | 11,23 | 5,69 | | 12 | 1p-146-153p-154p-155p-156p-161p-162p-165p-167p-169p-172p-173p | | 15,61 | 1,31 | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,09 | 455 | 550,09 | 6.176,43 | | | | indeterminata |
| Raia della Spina | 78 | 21,15 | 13,63 | 7,52 | | 12 | 47-48p | | 3,62 | 17,53 | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,14 | 442 | 501,76 | 6.839,24 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 13 | 11p-12p-13p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 19 | 31-36p-238p-262 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 25 | 12p | | | | | | | | | | | | | | |
| Valle Piana | 80 | 5,05 | 4,30 | 0,75 | | 12 | 48p | | 5,05 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 56,18 | 1391 | 389,89 | 1.677,23 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 13 | 11p-15p-77p-78-81-86-89-93-94 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vado dell'Asta | 82 | 16,15 | 9,39 | 6,76 | | 13 | 15p-16p-22p-55p-56-57p-58 | | 16,15 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 195,19 | 1.832,04 | | | | indeterminata |
| Salve Regina | 83a | 9,84 | 6,54 | 3,30 | | 13 | 15p-17p-18p-124-125-126-127p | | 9,84 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 204,07 | 1.335,51 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 20 | 5p-12p | | | | | | | | | | | | | | |
| Vado dell'Asta | 84 | 13,47 | 10,04 | 3,43 | | 13 | 16p-18p-22p-57p-130p | | 13,47 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 209,9 | 2.108,06 | | | | indeterminata |
| Valle Coscia | 85 | 10,45 | 9,81 | 0,64 | | 13 | 16p-22p-57p-142-143p | | 10,45 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 40,56 | 491 | 410,7 | 4.026,65 | | | | indeterminata |
| Vado dell'Asta | 86 | 8,36 | 8,32 | 0,04 | | 13 | 20p-22p-131p-132p | | 8,36 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 66,96 | 988 | 697,9 | 5.806,28 | | | | indeterminata |
| Vado dell'Asta | 87 | 9,30 | 9,18 | 0,12 | | 13 | 22p-135p-138p-139p-140p-143p | | 9,30 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 59,30 | 695 | 583,2 | 5.356,49 | | | | indeterminata |
| La Peta | 88 | 3,12 | 3,00 | 0,12 | | 13 | 22p | | 3,12 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 52,66 | 442 | 711,38 | 2.132,50 | | | | indeterminata |
| Vallone di Ciccociangia | 89 | 10,38 | 4,81 | 5,57 | | 13 | 22p | | 10,38 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 43,96 | 338 | 490,92 | 2.362,81 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 20 | 12p | | | | | | | | | | | | | | |

| Particella forestale | | | | | | Dati catastali | | Area protetta - zonizzazione | | | Aree percorse dal Fuoco | | *Vincoli | Dati Dendrometrici | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località | n° | Superficie in Ha | | | | Foglio | Particella | A | B | C | | | | Densità | | Pr unitaria mc/Ha | Pr totale mc | ***Pp unitaria mc/Ha | ***Pp totale mc | Incremento (medio e/o corrente) mc | Età all'anno di redazione del PGF |
| | | Totale | Bosco | Pascolo - prati - radure | Altro | | | Ha | Ha | Ha | Anno | Ha | | A.B. unitaria mq/Ha | **Soggetti n°/Ha | | | | | | |
| Vallone di Ciccociangia | 90 | 8,38 | 4,74 | 3,64 | | 13 | 22p | | 8,38 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 27,15 | 468 | 222,17 | 1.052,56 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 20 | 12p | | | | | | | | | | | | | | |
| Costa dell'Angelo | 92 | 7,84 | 4,23 | 3,61 | | 10 | 148p | | 7,84 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 21,76 | 1326 | 105,83 | 447,74 | | | | indeterminata |
| Raia della Spina | 97 | 9,33 | 5,40 | 3,93 | | 12 | 48p | | 9,15 | 0,18 | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 183,70 | 991,83 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 13 | 11p-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 20 | 1p-18 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 25 | 1p-12p | | | | | | | | | | | | | | |
| Serro Tondo | 98a | 6,44 | 2,83 | 3,61 | | 13 | 18p | | 6,44 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 121,54 | 343,77 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 20 | 5p-12p-32p | | | | | | | | | | | | | | |
| Serro Tondo | 98b | 2,66 | 2,36 | 0,30 | | 20 | 12p | | 2,66 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 33,34 | 637 | 322,23 | 761,83 | | | | indeterminata |
| Serro Tondo | 99 | 6,78 | 6,38 | 0,40 | | 13 | 18p-20p-22p-130p-134p-136p-137p | | 6,78 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,62 | 540 | 500,62 | 3.194,30 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 20 | 5p-12p | | | | | | | | | | | | | | |
| Serrone Pizzuto | 100 | 14,02 | 13,40 | 0,62 | | 20 | 12p | | 14,02 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 52,30 | 1027 | 485,49 | 6.504,07 | | | | indeterminata |
| Serrone Pizzuto | 101 | 17,58 | 16,29 | 1,29 | | 20 | 12p | | 17,58 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,05 | 580 | 522,12 | 8.503,69 | | | | indeterminata |
| Vado dell'Asta | 102 | 11,66 | 10,68 | 0,98 | | 20 | 10-12p-36p-37p-39 | | 11,66 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 55,15 | 719 | 563,96 | 6.024,94 | | | | indeterminata |
| Valle di Liero | 103 | 14,73 | 14,72 | 0,01 | | 20 | 12p | | 14,73 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,29 | 687 | 462,78 | 6.813,63 | | | | indeterminata |
| Serro della Falasca | 104 | 5,17 | 5,14 | 0,03 | | 20 | 12p-40 | | 5,17 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 51,38 | 728 | 484,16 | 2.486,46 | | | | indeterminata |
| Serro della Falasca | 105 | 13,94 | 13,10 | 0,84 | | 20 | 12p | | 13,94 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 56,30 | 910 | 611,77 | 8.013,49 | | | | indeterminata |
| Calvelluzzo | 106 | 3,04 | 3,04 | 0,00 | | 20 | 12p | | 3,04 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 55,08 | 416 | 912,89 | 2.771,70 | | | | indeterminata |
| Tronola | 113b | 11,20 | 8,04 | 3,16 | | 19 | 36-39-287-288 | | 6,60 | 4,60 | | | a/b/c/d/g/i/m | 17,50 | 320 | 393,60 | 3.163,05 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 25 | 1p-3-4-5-6-12p-14-15-16 | | | | | | | | | | | | | | |
| Tronola | 114 | 16,61 | 12,41 | 4,20 | | 20 | 1p-11p-12p | | 16,56 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,08 | 517 | 498,79 | 6.190,61 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 25 | 1p-6-12p | | | | | | | | | | | | | | |
| Lagarello | 116 | 5,06 | 5,04 | 0,02 | | 20 | 12p | | 5,06 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 36,57 | 605 | 386,95 | 1.949,10 | | | | indeterminata |
| Corsa dei Cavalli | 119 | 11,22 | 10,00 | 1,22 | | 20 | 12p | | 11,22 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 53,23 | 988 | 462,28 | 4.622,83 | | | | indeterminata |
| Corsa dei Cavalli | 120 | 15,81 | 14,65 | 1,16 | | 20 | 12p | | 15,81 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,51 | 896 | 421,37 | 6.171,92 | | | | indeterminata |
| Valle del Ghiro | 121 | 9,15 | 9,14 | 0,01 | | 20 | 12p | | 9,15 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,41 | 605 | 574,43 | 5.248,07 | | | | indeterminata |
| Coste del Calvello | 122 | 10,92 | 10,50 | 0,42 | | 20 | 12p | | 10,92 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 52,19 | 884 | 470,79 | 4.944,86 | | | | indeterminata |
| Orno | 124 | 9,53 | 9,53 | 0,00 | | 17 | 101-163p | | 9,53 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 35,33 | 1560 | 253,73 | 2.418,66 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 18 | 11p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 23 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| Pietra di Alessio | 130 | 11,27 | 2,62 | 8,65 | | 18 | 11p | | 9,66 | 1,61 | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 50,12 | 131,20 | | | | indeterminata |
| Fontana di Sazzano | 132 | 18,37 | 13,41 | 4,96 | | 20 | 11p-12p-13p | | 11,27 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 55,51 | 741 | 607,52 | 8.148,93 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 25 | 12p | | | | | | | | | | | | | | |
| Corsa dei Cavalli | 136 | 9,47 | 9,46 | 0,01 | | 20 | 12p | | 9,47 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 52,77 | 767 | 533,97 | 5.050,96 | | | | indeterminata |
| Monte Calvello | 137a | 9,80 | 9,62 | 0,18 | | 20 | 12p-13p | | 9,80 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 367,15 | 3.532,00 | | | | indeterminata |
| Monte Calvello | 138 | 9,58 | 0,54 | 9,04 | | 20 | 12p | | 9,58 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 20,00 | 10,88 | | | | indeterminata |
| Aria della Preda | 153 | 42,34 | 18,19 | 24,15 | | 20 | 12p-13p | | 42,25 | 0,09 | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 131,25 | 2.388,08 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 25 | 10p-12p-21p-23p-24p-31p-33p | | | | | | | | | | | | | | |
| Sazzano | 154 | 41,14 | 13,92 | 27,22 | | 20 | 12p-13p-14p-15-16 | | 37,64 | 3,50 | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 137,49 | 1.914,20 | | | | indeterminata |
| Piano di Sazzano | 176 | 14,85 | 12,91 | 1,94 | | 25 | 12p-45p-49p-50p-51p-52p | | 14,57 | 0,28 | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,24 | 377 | 601,56 | 7.766,40 | | | | indeterminata |
| Gioco dei Colombi | 312 | 3,45 | 3,45 | 0,00 | | 16 | 2-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | a/b/c/d/i | | | | | | | | indeterminata |
| Valle dell'Ulivo | 314 | 15,06 | 4,25 | 10,81 | | 12 | 1p-11p | | 15,05 | 0,01 | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 69,14 | 293,87 | | | | indeterminata |
| Serrone Pizzuto | 315 | 8,01 | 3,25 | 4,76 | | 20 | 12p | | 8,01 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 120,82 | 392,13 | | | | indeterminata |
| Il Casone | 316 | 2,32 | 2,17 | 0,15 | | 19 | 323p | | 2,32 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 268,40 | 583,68 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 31 | 264-265p | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALI** | | **1.247,19** | **855,31** | **391,88** | **0,00** | | | **0,00** | **1.187,84** | **41,22** | | | | | | | **364.642,29** | | **0,00** | | |

* = Vincoli:

| | |
|---|---|
| a | Idrogeologico (L. 3267/1923) |
| b | Autorità di Bacino (L. 18 maggio 1989, n. 183 – L. R. 07/02/1994, n. 8) |
| c | Uso civico (L. 1766/1927 – L. R. 11/1981) |
| d | Bellezze naturali (L. 1497/1939 transitata nel D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) |
| e | Piani territoriali paesaggistici (ai sensi dell'art. 149 del D.lgs. 29/10/99, n. 490) |
| f | Parco Nazionale (L. 6 dicembre 1991, n. 394) |
| g | Parco Regionale (L. R. 1 settembre 1993, n. 33) |
| h | Riserva, altro (L. 6 dicembre 1991, n. 394) |
| i | Legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 21 novembre 2000, n. 353) |
| l | Conflitti di proprietà e/o di confinazione tra le aree oggetto di pianificazione ed altri Soggetti privati e/o pubblici |
| m | Rete Natura 2000 |
| n | Altro - specificare |

** = Fustaie e fustaie transitorie - *n° soggetti/Ha* ; ceduo - *n° polloni/Ha e n° matricine/Ha*

Pr = Provvigione reale

*** = Se impossibilitati a calcolare la Provvigione potenziale/normale fornire motivazione

Pp = Provvigione potenziale

SCHEMA 3

# PIANO DEI TAGLI - CLASSE ECONOMICA/COMPRESA "C"

**Art. 91, comma 2, e art. 97 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno di intervento | Particella forestale | | | | Area protetta - zonizzazione | | | *Vincoli | Provvigione | | | Alto Fusto - Cedui in conversione | | Descrizione Intervento | Saggio di Utilizzazione % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A | B | C | | | | | | | | |
| | n° | Superficie totale Ha | Superficie utile boscata Ha | Età al taglio | Ha | Ha | Ha | | Provvigione unitaria mc | Provvigione totale mc | Provvigione totale post intervento mc | Ripresa unitaria mc | Ripresa totale mc | | |
| 2026-2028 | 17 | 14,66 | 13,88 | | | 14,66 | | a/b/c/d/g/i/m | 851,45 | 11.823 | 9.463 | 170 | 2.360 | Moderato diradamento dal basso a carico dei soggetti del piano dominato e dei peggiori del piano dominante. | 19,96 |
| 2026-2028 | 24 | 8,75 | 8,68 | | | 8,75 | | a/b/c/d/g/i/m | 482,35 | 4.186 | 3.356 | 96 | 830 | Moderato diradamento dal basso a carico dei soggetti del piano dominato e dei peggiori del piano dominante. Nel diradamento andranno favorite specie diverse dal faggio, come l'acero opalo, l'ontano napoletano e il cerro. | 19,83 |
| 2026-2028 | 53 | 6,87 | 6,61 | | | 6,87 | | a/b/c/d/g/i/m | 617,33 | 4.083 | 3.453 | 95 | 630 | Debole diradamento dal basso che elimina i soggetti peggiori e quelli sovrannumerari, soprattutto se di origine agamica. | 15,43 |
| 2026-2028 | 68 | 8,44 | 6,16 | | | 8,44 | | a/b/c/d/g/i/m | 176,67 | 1.178 | 978 | 32 | 200 | Diradamento della fustaia transitoria a prevalenza di carpino nero; l'intervento dovrà incidere soprattutto sui polloni di carpino nero, favorendo la roverella, l'acero opalo, il cerro e l'ontano napoletano. | 18,38 |
| 2026-2028 | 70 | 33,18 | 23,39 | | | 27,19 | 5,99 | a/b/c/d/g/i/m | 634,16 | 14.831 | 12.591 | 96 | 2.240 | Diradamento da moderato a forte delle conifere per favorire l'insediamento e la progressiva affermazione delle latifoglie. | 15,10 |
| 2026-2028 | 72 | 17,41 | 11,71 | | | 13,63 | 3,78 | a/b/c/d/g/i/m | 396,38 | 4.642 | 3.972 | 57 | 670 | Diradamento da moderato a forte delle conifere per favorire l'insediamento e la progressiva affermazione delle latifoglie. | 14,43 |
| 2026-2028 | 73 | 11,99 | 7,46 | | | 11,99 | | a/b/c/d/g/i/m | 232,57 | 1.742 | 1.452 | 39 | 290 | Diradamento moderato dal basso. Selettivo a carico delle conifere. | 16,72 |
| 2026-2028 | 78 | 21,15 | 13,61 | | | 3,62 | 17,53 | a/b/c/d/g/i/m | 501,76 | 6.839 | 5.609 | 90 | 1.230 | Diradamento moderato dal basso, a scapito soprattutto del pino nero; andranno favorite le latifoglie e la douglasia. | 18,01 |
| 2026-2028 | 8 | 7,38 | 7,27 | | | 7,38 | | a/b/c/d/g/i/m | 605,89 | 4.405 | 3.525 | 121 | 880 | Moderato diradamento dal basso a carico dei soggetti del piano dominato e dei peggiori del piano dominante. | 19,98 |
| 2029-2031 | 116 | 5,06 | 5,04 | | | 5,06 | | a/b/c/d/g/i/m | 386,95 | 1.949 | 1.609 | 67 | 340 | Diradamento moderato dal basso. | 17,44 |
| 2029-2031 | 29a | 8,29 | 7,57 | | | 8,29 | | a/b/c/d/g/i/m | 640,55 | 4.850 | 3.980 | 115 | 870 | Debole diradamento dal basso, più lieve nelle aree di fustaia matura e più intenso nelle aree di fustaia e perticaia. | 17,94 |
| 2029-2031 | 31 | 17,68 | 17,41 | | | 17,68 | | a/b/c/d/g/i/m | 385,25 | 6.708 | 5.628 | 62 | 1.080 | Diradamento selettivo che colpisce soprattutto le conifere. Intervento di grado debole nelle aree con faggio e ontano napoletano, cercando di conservare entrambe le specie, in particolare l'acero montano. | 16,10 |
| 2029-2031 | 41 | 9,26 | 8,93 | | | 9,26 | | a/b/c/d/g/i/m | 573,02 | 5.116 | 4.286 | 93 | 830 | Moderato diradamento dal basso a carico dei soggetti del piano dominato e dei peggiori del piano dominante. Nel diradamento andranno favorite specie diverse dal faggio, come l'acero opalo, l'ontano napoletano e il cerro. | 16,22 |
| 2029-2031 | 44a | 7,99 | 7,70 | | | 7,99 | | a/b/c/d/g/i/m | 658,45 | 5.071 | 4.201 | 113 | 870 | Moderato diradamento dal basso a carico dei soggetti del piano dominato e dei peggiori del piano dominante, soprattutto se di origine agamica. | 17,16 |
| 2029-2031 | 45a | 19,12 | 18,68 | | | 19,12 | | a/b/c/d/g/i/m | 536,08 | 10.012 | 8.342 | 89 | 1.670 | Debole diradamento dal basso, soprattutto nelle aree di fustaia matura; più intenso nelle aree di fustaia adulta e perticaia. Eliminazione del pino silvestre. | 16,68 |
| 2029-2031 | 46 | 16,25 | 15,14 | | | 16,25 | | a/b/c/d/g/i/m | 465,43 | 7.046 | 5.836 | 80 | 1.210 | Debole diradamento dal basso, soprattutto nelle aree di fustaia matura; diradamento selettivo anche piuttosto intenso a carico dei pini, per liberare le latifoglie. | 17,17 |

SCHEMA 3

# PIANO DEI TAGLI - CLASSE ECONOMICA/COMPRESA "C"

**Art. 91, comma 2, e art. 97 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno di intervento | Particella forestale | | | | Area protetta - zonizzazione | | | *Vincoli | Provvigione | | | Alto Fusto - Cedui in conversione | | Descrizione Intervento | Saggio di Utilizzazione % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A | B | C | | | | | | | | |
| | n° | Superficie totale Ha | Superficie utile boscata Ha | Età al taglio | Ha | Ha | Ha | | Provvigione unitaria mc | Provvigione totale mc | Provvigione totale post intervento mc | Ripresa unitaria mc | Ripresa totale mc | | |
| 2029-2031 | 47 | 4,99 | 4,94 | | | 4,99 | | a/b/c/d/g/i/m | 491,81 | 2.430 | 1.990 | 89 | 440 | Diradamento selettivo a carico del pino nero per liberare le latifoglie e favorirne l'affermazione. Debole diradamento nelle aree di faggio. Salvaguardia del castagno e dell'ontano napoletano. | 18,11 |
| 2029-2031 | 62 | 12,88 | 10,43 | | | 12,88 | | a/b/c/d/g/i/m | 458,72 | 4.783 | 3.983 | 77 | 800 | Diradamento moderato dal basso per regolarizzare la densità, selettivo a carico del pino nero per liberare le latifoglie e favorirne l'affermazione. | 16,72 |
| 2029-2031 | 85 | 10,45 | 9,81 | | | 10,45 | | a/b/c/d/g/i/m | 410,65 | 4.027 | 3.357 | 68 | 670 | Diradamento da moderato a forte nei gruppi di conifere per favorire l'insediamento e la progressiva affermazione delle latifoglie. Diradamento moderato dal basso nelle latifoglie, salvaguardando le specie associate al faggio. | 16,64 |
| 2032-2035 | 100 | 14,02 | 13,40 | | | 14,02 | | a/b/c/d/g/i/m | 485,49 | 6.504 | 5.484 | 76 | 1.020 | Diradamento moderato dal basso nelle latifoglie, salvaguardando le specie associate al faggio. Diradamento da moderato a forte nei gruppi di conifere per favorire l'insediamento e la progressiva affermazione delle latifoglie. | 15,68 |
| 2032-2035 | 101 | 17,58 | 16,29 | | | 17,58 | | a/b/c/d/g/i/m | 522,12 | 8.504 | 7.214 | 79 | 1.290 | Diradamento moderato dal basso nelle latifoglie, salvaguardando le specie associate al faggio. Diradamento da moderato a forte nei gruppi di conifere per favorire l'insediamento e la progressiva affermazione delle latifoglie. | 15,17 |
| 2032-2035 | 102 | 11,66 | 10,68 | | | 11,66 | | a/b/c/d/g/i/m | 563,96 | 6.025 | 4.945 | 101 | 1.080 | Diradamento moderato dal basso nelle latifoglie, salvaguardando le specie associate al faggio. Diradamento da moderato a forte nei gruppi di conifere per favorire l'insediamento e la progressiva affermazione delle latifoglie. | 17,93 |
| 2032-2035 | 103 | 14,73 | 14,72 | | | 14,73 | | a/b/c/d/g/i/m | 462,78 | 6.814 | 5.594 | 83 | 1.220 | Diradamento moderato dal basso dell'ontano e delle altre latifoglie, salvaguardando le specie associate al faggio. Diradamento da moderato a forte nei gruppi di conifere per favorire l'insediamento e la progressiva affermazione delle latifoglie. | 17,91 |
| 2032-2035 | 104 | 5,17 | 5,14 | | | 5,17 | | a/b/c/d/g/i/m | 484,16 | 2.486 | 2.036 | 88 | 450 | Diradamento moderato dal basso dell'ontano e delle altre latifoglie, salvaguardando le specie associate al faggio. Diradamento da moderato a forte nei gruppi di conifere per favorire l'insediamento e la progressiva affermazione delle latifoglie. | 18,10 |
| 2032-2035 | 105 | 13,94 | 13,10 | | | 13,94 | | a/b/c/d/g/i/m | 611,77 | 8.013 | 6.683 | 102 | 1.330 | Diradamento moderato dal basso dell'ontano e delle altre latifoglie, salvaguardando le specie associate al faggio. Diradamento da moderato a forte nei gruppi di conifere per favorire l'insediamento e la progressiva affermazione delle latifoglie. | 16,60 |
| 2032-2035 | 106 | 3,04 | 3,04 | | | 3,04 | | a/b/c/d/g/i/m | 912,89 | 2.772 | 2.272 | 165 | 500 | Diradamento moderato dal basso. | 18,04 |
| 2032-2035 | 121 | 9,15 | 9,14 | | | 9,15 | | a/b/c/d/g/i/m | 574,43 | 5.248 | 4.308 | 103 | 940 | Diradamento moderato dal basso. | 17,91 |

SCHEMA 3

# PIANO DEI TAGLI - CLASSE ECONOMICA/COMPRESA "C"

**Art. 91, comma 2, e art. 97 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno di intervento | Particella forestale | | | | Area protetta - zonizzazione | | | *Vincoli | Provvigione | | | Alto Fusto - Cedui in conversione | | Descrizione Intervento | Saggio di Utilizzazione % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A | B | C | | | | | | | | |
| | n° | Superficie totale Ha | Superficie utile boscata Ha | Età al taglio | Ha | Ha | Ha | | Provvigione unitaria mc | Provvigione totale mc | Provvigione totale post intervento mc | Ripresa unitaria mc | Ripresa totale mc | | |
| 2032-2035 | 136 | 9,47 | 9,46 | | | 9,47 | | a/b/c/d/g/i/m | 533,97 | 5.051 | 4.171 | 93 | 880 | Diradamento moderato dal basso dell'ontano e delle altre latifoglie, salvaguardando le specie associate al faggio. Diradamento da moderato a forte nei gruppi di conifere per favorire l'insediamento e la progressiva affermazione delle latifoglie. | 17,42 |
| 2032-2035 | 34 | 5,24 | 5,20 | | | 5,24 | | a/b/c/d/g/i/m | 338,20 | 1.759 | 1.439 | 62 | 320 | Debole diradamento dal basso che elimina i soggetti peggiori e quelli sovrannumerari. L'intervento sul pino nero potrà essere di grado forte o moderato per favorire l'affermazione del faggio o di altre latifoglie. | 18,19 |
| 2032-2035 | 48 | 9,42 | 8,75 | | | 9,42 | | a/b/c/d/g/i/m | 661,12 | 5.787 | 4.747 | 119 | 1.040 | Diradamento selettivo a carico del pino nero per liberare le latifoglie e favorirne l'affermazione. | 17,97 |
| 2032-2035 | 64 | 8,25 | 8,12 | | | 8,25 | | a/b/c/d/g/i/m | 460,81 | 3.740 | 3.110 | 78 | 630 | Diradamento selettivo a carico del pino nero per liberare le latifoglie e favorirne l'affermazione. Diradamento moderato dal basso sul resto della superficie dove prevalgono le latifoglie. | 16,84 |
| 2032-2035 | 65 | 8,08 | 7,94 | | | 8,08 | | a/b/c/d/g/i/m | 469,18 | 3.724 | 3.064 | 83 | 660 | Diradamento selettivo a carico del pino nero per liberare le latifoglie e favorirne l'affermazione. Diradamento moderato dal basso sul resto della superficie dove prevalgono le latifoglie. | 17,72 |
| 2032-2035 | 86 | 8,36 | 8,32 | | | 8,36 | | a/b/c/d/g/i/m | 697,92 | 5.806 | 4.756 | 126 | 1.050 | Diradamento moderato dal basso. Selettivo a carico delle conifere. | 18,08 |
| 2032-2035 | 87 | 9,30 | 9,18 | | | 9,30 | | a/b/c/d/g/i/m | 583,21 | 5.356 | 4.426 | 101 | 930 | Diradamento selettivo a carico del pino nero per liberare le latifoglie e favorirne l'affermazione. Diradamento moderato dal basso sul resto della superficie dove prevalgono le latifoglie. | 17,36 |
| 2032-2035 | 88 | 3,12 | 3,00 | | | 3,12 | | a/b/c/d/g/i/m | 711,38 | 2.133 | 1.753 | 127 | 380 | Diradamento moderato dal basso nelle latifoglie, salvaguardando le specie associate al faggio. Diradamento da moderato a forte nei gruppi di conifere per favorire l'insediamento e la progressiva affermazione delle latifoglie. | 17,82 |
| **TOTALI** | | **392,33** | **349,87** | | | | | | | **185.442** | **153.612** | | **31.830** | | |

* = Vincoli:

| | |
|---|---|
| a | Idrogeologico (L. 3267/1923) |
| b | Autorità di Bacino (L. 18 maggio 1989 n. 183 – L. R. n. 8 del 07/02/1994) |
| c | Uso civico (L. 1766/1927 – L. R. 11/1981) |
| d | Bellezze naturali (L. 1497/1939 transitata nel d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004) |
| e | Piani territoriali paesaggistici (ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 29/10/99 n. 490) |
| f | Parco Nazionale (L. 6 dicembre 1991 n. 394) |
| g | Parco Regionale (L. R. 1 settembre 1993 n. 33) |
| h | Riserva, altro (L. 6 dicembre 1991 n. 394) |
| i | Legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 21 novembre 2000, n. 353) |
| l | Conflitti di proprietà e/o di confinazione tra le aree oggetto di pianificazione ed altri Soggetti privati e/o pubblici |
| m | Rete natura 2000 |
| n | Altro - specificare |

# RIEPILOGO GENERALE DELLE PARTICELLE FORESTALI

**Art. 108 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Classe economica (Compresa) | Particella forestale | | | | | | Dati catastali | | Area protetta - zonizzazione | | | Aree percorse dal Fuoco | | *Vincoli | Dati Dendrometrici | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Località | n° | Superficie in Ha | | | | Foglio | Particella | A | B | C | Anno | Ha | | Densità | | Pr unitaria mc/Ha | Pr totale mc | ***Pp unitaria mc/Ha | ***Pp totale mc | Incremento medio | Età all'anno di redazione del PGF |
| | | | Totale | Bosco | Pascolo prati radure | Altro | | | Ha | Ha | Ha | | | | A.B. unitaria mq/Ha | ** Soggetti n°/Ha | | | | | | |
| COMPRESA A | Peta di Piscacca | 6 | 16,15 | 16,15 | 0,00 | | 7 | 23-24-26-30p | | 16,15 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 37,51 | 640 | 411,1 | 6.639,82 | | | 4,11 | 90-110 |
| | Piscacca | 7 | 12,96 | 11,39 | 1,57 | | 7 | 22p-30p | | 12,96 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 44,91 | 653 | 504,9 | 5.750,98 | | | 6,31 | 70-90 |
| | Peta di Piscacca | 14 | 14,89 | 14,71 | 0,18 | | 7 | 22p-30p | | 14,89 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 43,70 | 714 | 507,1 | 7.459,36 | | | 5,07 | 90-110 |
| | Piscacca | 15 | 10,71 | 9,52 | 1,19 | | 7 | 22p-30p | | 10,71 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 42,49 | 686 | 455,1 | 4.334,71 | | | 4,55 | 90-110 |
| | Valle del Pero | 60 | 7,22 | 7,22 | 0,00 | | 13 | 15p-16p | | 7,22 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 42,29 | 901 | 454,0 | 3.276,24 | | | 4,54 | 90-110 |
| | Valle Foce di Capo Sele | 79 | 13,63 | 13,51 | 0,12 | | 12 | 1p-48p-176-177 | | 13,21 | 0,42 | | | a/b/c/d/g/i/m | 39,93 | 1534 | 355,2 | 4.799,51 | | | 4,44 | 70-90 |
| | | | | | | | 13 | 9p-11p-70p-71p-72p-73p-74p-75p-76p-77p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle del Pero | 81 | 12,26 | 11,94 | 0,32 | | 13 | 9p-15p-16p-127p | | 12,26 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,03 | 650 | 456,1 | 5.445,39 | | | 4,56 | 90-110 |
| | Colle del Leone | 95a | 17,06 | 17,02 | 0,04 | | 11 | 29p | | 13,04 | 4,01 | | | a/b/c/d/g/i/m | 37,14 | 762 | 420,5 | 7.157,06 | | | 4,20 | 90-110 |
| | | | | | | | 18 | 11p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Felicecchia | 95b | 11,31 | 11,15 | 0,16 | | 18 | 11p | | 11,11 | 0,20 | | | a/b/c/d/g/i/m | 42,13 | 1144 | 423,3 | 4.720,85 | | | 4,23 | 90-110 |
| | Corticella | 96 | 26,62 | 26,42 | 0,20 | | 18 | 8p-11p | | 21,85 | 4,77 | | | a/b/c/d/g/i/m | 48,60 | 1161 | 548,6 | 14.492,60 | | | 5,49 | 90-110 |
| | Valle Grande | 109a | 11,29 | 11,29 | 0,00 | | 18 | 11p | | 9,80 | 1,49 | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,39 | 1323 | 554,3 | 5.755,18 | | | 4,62 | 110-130 |
| | Fossa della Neve | 109b | 10,82 | 10,82 | 0,00 | | 18 | 11p | | 10,75 | 0,07 | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,40 | 1358 | 574,1 | 5.997,30 | | | 4,10 | 130-150 |
| | Fossa della Neve | 110 | 26,99 | 26,56 | 0,43 | | 18 | 11p | | 26,81 | 0,18 | | | a/b/c/d/g/i/m | 44,73 | 1089 | 523,3 | 13.895,83 | | | 4,36 | 110-130 |
| | Scaffa | 111 | 15,84 | 15,60 | 0,24 | | 18 | 11p | | 13,54 | 2,30 | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,67 | 593 | 649,5 | 10.129,42 | | | 5,41 | 110-130 |
| | | | | | | | 19 | 43 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lagarello | 115 | 17,52 | 15,78 | 1,74 | | 20 | 1p-2-12p-17-23-24-25-41-42 | | 17,50 | 0,02 | | | a/b/c/d/g/i/m | 38,67 | 608 | 443,4 | 6.995,86 | | | 4,43 | 90-110 |
| | | | | | | | 25 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lagarello | 117 | 12,32 | 11,99 | 0,33 | | 20 | 12p-13p | | 12,32 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 30,94 | 721 | 340,7 | 4.085,95 | | | 3,41 | 90-110 |
| | Lagarello | 118 | 18,58 | 15,43 | 3,15 | | 20 | 5p-7-12p-29-30-33p | | 18,58 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,55 | 470 | 645,6 | 9.960,98 | | | 7,17 | 70-90 |
| | Raja di Calende | 127 | 11,81 | 11,81 | 0,00 | | 18 | 11p | | 10,37 | 1,44 | | | a/b/c/d/g/i/m | 43,15 | 828 | 550,8 | 6.503,17 | | | 4,59 | 110-130 |
| | Valle Piana | 128 | 12,06 | 11,57 | 0,49 | | 18 | 11p | | 11,41 | 0,65 | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,86 | 1391 | 468,8 | 5.422,42 | | | 5,21 | 70-90 |
| | Teatro | 129 | 12,85 | 12,76 | 0,09 | | 18 | 11p | | 8,16 | 4,69 | | | a/b/c/d/g/i/m | 54,17 | 871 | 687,3 | 8.770,15 | | | 5,29 | 110-130 |
| | | | | | | | 29 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lagarello | 133 | 9,66 | 8,90 | 0,76 | | 20 | 12p-13p | | 9,66 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 40,16 | 498 | 523,5 | 4.659,68 | | | 4,76 | 90-110 |
| | Corsa dei Cavalli | 134 | 17,27 | 17,17 | 0,10 | | 20 | 12p-13p | | 17,27 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 48,99 | 671 | 576,4 | 9.897,83 | | | 4,80 | 110-130 |
| | Valle Piana | 142 | 18,17 | 18,17 | 0,00 | | 18 | 11p | | 18,17 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,10 | 1004 | 625,8 | 11.371,23 | | | 5,21 | 110-130 |
| | | | | | | | 23 | 29p-33p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle Piana | 143 | 23,06 | 22,99 | 0,07 | | 18 | 11p | | 23,03 | 0,03 | | | a/b/c/d/g/i/m | 42,47 | 667 | 624,5 | 14.353,13 | | | 4,46 | 130-150 |
| | Valle Piana | 144 | 12,71 | 12,66 | 0,05 | | 18 | 11p | | 9,99 | 2,72 | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,87 | 1053 | 588,9 | 7.456,22 | | | 4,91 | 110-130 |
| | Valle Piana | 145 | 16,87 | 16,86 | 0,01 | | 18 | 11p | | 13,01 | 3,86 | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,57 | 1053 | 650,6 | 10.966,35 | | | 5,42 | 110-130 |
| | Teatro | 146 | 18,85 | 18,80 | 0,05 | | 18 | 11p | | 14,26 | 4,59 | | | a/b/c/d/g/i/m | 40,72 | 770 | 490,8 | 9.226,09 | | | 4,09 | 110-130 |
| | | | | | | | 24 | 330p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 29 | 1p-5p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cervarolo di Sazzano | 150 | 21,55 | 21,49 | 0,06 | | 20 | 11p-12p-13p | | 21,55 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 39,76 | 549 | 524,1 | 11.261,31 | | | 4,37 | 110-130 |
| | | | | | | | 25 | 12p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cervarolo di Sazzano | 151 | 19,82 | 17,33 | 2,49 | | 20 | 13p | | 19,66 | 0,16 | | | a/b/c/d/g/i/m | 31,81 | 364 | 395,5 | 6.854,78 | | | 13,18 | 10-30 |
| | | | | | | | 25 | 10p-12p-21p-23p-24p-31p-33p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cervarolo di Sazzano | 152 | 15,90 | 15,87 | 0,03 | | 25 | 12p | | 15,90 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 38,38 | 489 | 471,5 | 7.481,12 | | | 15,72 | 10-30 |
| | Orno | 162 | 27,59 | 27,59 | 0,00 | | 23 | 29p-33p | | 27,59 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 51,09 | 1044 | 660,4 | 18.221,50 | | | 5,50 | 130-150 |
| | Orno | 163 | 12,59 | 12,59 | 0,00 | | 18 | 23 | | 12,59 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 41,16 | 532 | 623,8 | 7.854,42 | | | 5,20 | 130-150 |
| | | | | | | | 23 | 29p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle Piana | 164 | 26,74 | 26,74 | 0,00 | | 18 | 11p | | 26,74 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 50,45 | 779 | 717,7 | 19.195,34 | | | 5,98 | 130-150 |
| | Valle Piana | 165 | 8,60 | 8,60 | 0,00 | | 18 | 11p | | 8,60 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 42,39 | 602 | 610,0 | 5.248,35 | | | 5,08 | 130-150 |
| | Vallone Scurillo | 166 | 32,90 | 32,70 | 0,20 | | 18 | 11p | | 25,84 | 7,06 | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,05 | 841 | 700,0 | 22.893,66 | | | 5,83 | 130-150 |
| | | | | | | | 24 | 330p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 29 | 1p-5p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 30 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Creta Rossa | 167 | 37,65 | 37,54 | 0,11 | | 18 | 11p | | 34,00 | 3,65 | | | a/b/c/d/g/i/m | 53,68 | 986 | 706,0 | 26.502,45 | | | 5,88 | 130-150 |
| | | | | | | | 24 | 330p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 30 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 33 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Serroncelli | 169 | 17,92 | 17,89 | 0,03 | | 24 | 330p | | | 17,92 | | | a/b/c/d/g/i/m | 63,07 | 674 | 859,3 | 15.373,90 | | | 7,16 | 130-150 |
| | | | | | | | 30 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 31 | 17p-Y901p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 33 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Serroncelli | 170 | 12,62 | 12,60 | 0,02 | | 24 | 330p | | | 12,62 | | | a/b/c/d/g/i/m | 58,26 | 878 | 813,4 | 10.249,18 | | | 6,78 | 130-150 |
| | | | | | | | 30 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 31 | 7-11-17p-49-Y901p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cervarolo di Sazzano | 173 | 9,95 | 9,10 | 0,85 | | 25 | 12p-32-33p-34p-40p-41p-42p | | 9,95 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 48,00 | 539 | 641,8 | 5.842,88 | | | 5,35 | 110-130 |
| | Cervarolo di Sazzano | 174 | 24,88 | 24,67 | 0,21 | | 25 | 12p | | 24,88 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 51,44 | 1042 | 624,5 | 15.407,51 | | | 6,24 | 90-110 |
| | Apeticchia | 187 | 20,42 | 20,40 | 0,02 | | 23 | 29p | | 20,37 | 0,05 | | | a/b/c/d/g/i/m | 53,85 | 2064 | 492,4 | 10.042,54 | | | 4,92 | 90-110 |

SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **3b** | **Denominazione località** | **Costa della Guradia** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 3,31 |
| Utile Ha | 2,71 |
| Altro-tare Ha | 0,60 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 12;13 |
| Particella | 1p-3 ; 16p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Ovest | |
| Pendenza % | 29,27 | |
| Altitudine mt slm | min. 1153 | max 1199 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 284,52 |
| Provvigione reale totale | 2,71 | 771,90 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 1 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Faggio* | *8%* | *Acero opalo* | *46%* |
| *Ontano napoletano* | *5%* | *Carpino nero* | *41%* |

Descrizione:

Nella particella 3b, la fustaia adulta copre il 40% della superficie, seguita dalla fustaia giovane al 33%, dalla perticaia giovane al 12% e dalla fustaia matura al 14%. Il restante 1% è costituito da formazioni erbacee o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,32 | 11,92 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,08 | 39,79 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,90 | 33,14 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,38 | 14,13 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,03 | 1,03 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 2,71 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 2,71 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | presente |
| Specie prevalenti: | ginestra dei carbonai, biancospino, prugnolo |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | prevalente |
| Specie prevalenti: | felce aquilina, graminacee varie |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **4b** | **Denominazione località** | **Fieste** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 10,01 |
| Utile Ha | 1,70 |
| Altro-tare Ha | 8,31 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 7 |
| Particella | 30p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Ovest |
| Pendenza % | 26,24 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 749 | 816 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**CAP 6.5**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 64,19 |
| Provvigione reale totale | 1,70 | 109,29 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La particella 4b è quasi interamente coperta dalla spessina, che occupa il 99% della superficie, con il restante 1% rappresentato dal novelleto.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,25 | 14,51 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,46 | 85,49 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 1,70 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 1,70 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | abbondante |
| Specie prevalenti: | prugnolo, ginestra dei carbonai, rovo, biancospino |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | diffusa |
| Specie prevalenti: | - |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **8** | **Denominazione località** | **Varco di Marro** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 7,38 |
| Utile Ha | 7,27 |
| Altro-tare Ha | 0,11 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 7 |
| Particella | 22p-30p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Est |
| Pendenza % | 36,28 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1173 | 1324 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2025-2027** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 619,63 |
| Provvigione reale totale | 7,27 | 4505,81 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **121,0** |
| Ripresa totale | | **880** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 4 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Faggio* | *42%* | *Acero opalo* | *49%* |
| *Ontano napoletano* | *4%* | *Carpino nero* | *4%* |

Descrizione:

La fustaia giovane domina la particella 8 con una copertura del 49%. La fustaia adulta segue con il 21%. Le formazioni erbacee o arbustive coprono l'1%, e il resto è costituito da altre formazioni erbacee o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,04 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,02 | 0,21 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,45 | 6,23 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,56 | 21,46 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,64 | 22,58 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 1,58 | 21,71 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 1,02 | 14,02 |
| Fustaie mature h >32 m | 1,00 | 13,75 |
| **Totale** | 7,27 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderato diradamento dal basso a carico dei soggetti del piano dominato e dei peggiori del piano dominante. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2025-2027 | 7,27 | 121,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 880,2 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa (abbondante nel pascolo) |
| Specie prevalenti: | ginestra, biancospino, rosa canina |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | graminacee, felce |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **16** | **Denominazione località** | **Valle Scura di Sopra** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 16,36 |
| Utile Ha | 10,63 |
| Altro-tare Ha | 5,73 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 7 |
| Particella | 21-22p-41 |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Ovest |
| Pendenza % | 33,57 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1303 | 1446 |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.7** | |
| **Viabilità** | |
| **Scarsamente servita** | |
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata | |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata | |
| Anno di taglio | | **0** |
| Età media all'anno di taglio | | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 263,37 |
| Provvigione reale totale | 10,63 | 2799,88 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

Nella particella 16, le perticaie adulte coprono il 30% della superficie, seguite dalle fustaie giovani con il 37%, le fustaie adulte con il 19% e le fustaie mature con l'11%. Le perticaie giovani rappresentano il 2%. Il resto della superficie è occupato da formazioni erbacee o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,04 | 0,37 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,22 | 2,09 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 3,19 | 30,00 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,98 | 37,47 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,99 | 18,75 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,92 | 8,67 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,28 | 2,66 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 10,63 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 10,63 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Ginestra |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee xerofile, eringi, cerasti, felce aquilina |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **17** | **Denominazione località** | **Colle del Pozzo** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 14,66 |
| Utile Ha | 13,89 |
| Altro-tare Ha | 0,77 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 7 |
| Particella | 22p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Est |
| Pendenza % | 36,29 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1244 | 1445 |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

Giacitura

Manufatti

Risorse idriche

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2025-2027** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 581,83 |
| Provvigione reale totale | 13,89 | 8079,17 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **170,0** |
| Ripresa totale | | **2360** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 6 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | |
|---|---|
| *Faggio* | *98%* |
| *Ontano napoletano* | *2%* |

Descrizione:

Le fustaie mature rappresentano il 58% della superficie della particella 17, seguite dalle fustaie adulte con il 21%, le fustaie giovani con il 15% e le perticaie giovani con il 7%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,01 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,01 | 0,09 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,98 | 7,04 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,06 | 14,81 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,85 | 20,55 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 4,92 | 35,42 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 2,86 | 20,57 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,21 | 1,52 |
| **Totale** | 13,89 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderato diradamento dal basso a carico dei soggetti del piano dominato e dei peggiori del piano dominante. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2025-2027 | 13,89 | 170,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 2360,2 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Rovo, ginestra |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, localizzate nelle radure |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **18** | **Denominazione località** | **Il Montagnone** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 10,84 |
| Utile Ha | 7,89 |
| Altro-tare Ha | 2,95 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 7 |
| Particella | 22p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Ovest | |
| Pendenza % | 36,72 | |
| Altitudine mt slm | min. 1273 | max 1466 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 275,69 |
| Provvigione reale totale | 7,89 | 2176,47 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 5 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *2%* | *Acero opalo* | *5%* |
| *Agrifoglio* | *4%* | *Pino nero* | *15%* |
| *Faggio* | *74%* | | |

Descrizione:

La fustaia matura copre il 10% della superficie della particella 18, con la fustaia adulta al 16%, la fustaia giovane al 19%, la perticaia adulta al 35% e la perticaia giovane al 20%. Le formazioni erbacee o arbustive coprono il 7%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,61 | 20,33 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,78 | 35,22 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,51 | 19,18 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,24 | 15,69 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,43 | 5,49 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,28 | 3,61 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,04 | 0,49 |
| **Totale** | 7,89 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 7,89 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Eringi, cerastio, carlina, felce aquilina |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **20** | **Denominazione località** | **Caucciogliara** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 28,61 |
| Utile Ha | 10,98 |
| Altro-tare Ha | 17,63 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 7 |
| Particella | 22p-30p-34p-39p-49-50-51-52-57 |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud |
| Pendenza % | 36,96 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1174 | 1447 |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.7** | |
| **Viabilità** | |
| **Scarsamente servita** | |
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata | Anno di taglio | **0** |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata | Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: | | Ha: | mc: |
|---|---|---|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 105,94 | Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Provvigione reale totale | 10,98 | 1162,84 | Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

In questa particella, la fustaia matura copre il 5% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 13%, la fustaia giovane al 47% e la perticaia adulta al 35%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,01 | 0,06 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 3,82 | 34,78 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 5,13 | 46,70 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,45 | 13,25 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,57 | 5,17 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,01 | 0,05 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 10,98 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 10,98 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Assente |
| Specie prevalenti: | - |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, felce aquilina |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **21** | **Denominazione località** | **Belvedere** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 10,70 |
| Utile Ha | 7,26 |
| Altro-tare Ha | 3,44 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 7 |
| Particella | 22p-40-41-43-60-61 |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Ovest | |
| Pendenza % | 32,44 | |
| Altitudine mt slm | min. 1301 | max 1414 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 264,61 |
| Provvigione reale totale | 7,26 | 1920,89 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

In questa particella, la fustaia matura copre l'1% della superficie, con la fustaia adulta al 22%, la fustaia giovane al 39%, la perticaia adulta al 33% e la perticaia giovane al 5%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,01 | 0,13 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,34 | 4,72 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,38 | 32,80 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,80 | 38,50 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,63 | 22,49 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,10 | 1,36 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 7,26 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 7,26 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Assente nella fustaia |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai (nelle zone a monte) |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Assente nella fustaia |
| Specie prevalenti: | Graminacee, muschio, eringio, carlina, cerastio |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **24** | **Denominazione località** | **Castagna** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 8,75 |
| Utile Ha | 8,68 |
| Altro-tare Ha | 0,07 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 7 |
| Particella | 22p-37-44-49-53-54 |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord-Est | |
| Pendenza % | 37,41 | |
| Altitudine mt slm | min. 1141 | max 1311 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2025-2027** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 482,03 |
| Provvigione reale totale | 8,68 | 4183,27 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **95,6** |
| Ripresa totale | | **830** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 4 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Faggio* | *45%* | *Acero opalo* | *38%* | *Castagno* | *12%* |
| *Ontano napoletano* | *5%* | | | | |

Descrizione:

La fustaia matura copre l'86% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 65%, la perticaia giovane al 46%, la fustaia giovane al 28%, e il novelleto al 3%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,01 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,10 | 1,11 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,63 | 18,79 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,61 | 41,65 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,32 | 26,79 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 1,01 | 11,65 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 8,68 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderato diradamento dal basso a carico dei soggetti del piano dominato e dei peggiori del piano dominante. Nel diradamento andranno favorite specie diverse dal faggio, come l'acero opalo, l'ontano napoletano e il cerro. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2025-2027 | 8,68 | 95,6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 830,1 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Ginestra (più abbondante nelle lacune) |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, felce aquilina |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **25** | **Denominazione località** | **La Chiusa** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 13,12 |
| Utile Ha | 10,13 |
| Altro-tare Ha | 2,99 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 7;12 |
| Particella | 22p-39p ; 1p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest |
| Pendenza % | 37,59 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1131 | 1311 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| **Sottosuolo** |
|---|
| **Calcareo** |

| **Suolo** |
|---|
| **MAP 4.7** |

| **Viabilità** |
|---|
| **Ben servita** |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 270,12 |
| Provvigione reale totale | 10,13 | 2736,70 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 2 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Agrifoglio* | *57%* | *Acero opalo* | *5%* | *Douglasia* | *14%* |
| *Faggio* | *24%* | | | | |

Descrizione:

La perticaia giovane copre il 41% della superficie, seguita dalla spessina al 27%, la fustaia giovane al 15%, la fustaia matura al 7%, e il novelleto all'8%, con il resto formazioni erbacee o arbustive (2%).

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,76 | 7,48 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 4,56 | 45,05 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,09 | 30,52 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,54 | 15,19 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,18 | 1,76 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 10,13 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | Sì | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 10,13 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **26** | **Denominazione località** | **Pettinicchio** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 38,89 |
| Utile Ha | 10,84 |
| Altro-tare Ha | 28,05 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 7;12 |
| Particella | 22p ; 1p-2-9p-51-52-53-54-55-56-57 |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud | |
| Pendenza % | 32,29 | |
| Altitudine mt slm | min. 1246 | max 1445 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 96,81 |
| Provvigione reale totale | 10,84 | 1049,34 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La perticaia giovane rappresenta il 46% della superficie, seguita dalla fustaia matura al 40%, la fustaia adulta all'8%, e il novelleto al 5%, con il resto come formazioni erbacee o arbustive (1%).

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,02 | 0,14 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,56 | 5,14 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 5,04 | 46,47 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 4,35 | 40,12 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,88 | 8,12 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 10,84 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 10,84 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | - |
| Specie prevalenti: | - |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, felce aquilina, eringio, cerastio, carlina |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **27a** | **Denominazione località** | **I Morti** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 20,07 |
| Utile Ha | 7,21 |
| Altro-tare Ha | 12,86 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 12;13 |
| Particella | 1 & 1;16;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32 |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud | |
| Pendenza % | 35,65 | |
| Altitudine mt slm | min. 1246 | max 1465 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 109,58 |
| Provvigione reale totale | 7,21 | 790,06 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia adulta copre il 78%, seguita dalla fustaia giovane al 19%, dalla perticaia giovane all'1%, e il novelleto all'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,07 | 1,01 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 5,64 | 78,28 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,34 | 18,60 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,15 | 2,12 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 7,21 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 7,21 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai, rovo, agrifoglio, rosa, biancospino |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Abbondante |
| Specie prevalenti: | Graminacee, felce aquilina |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **28** | **Denominazione località** | **I Morti** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| Superficie | |
|---|---|
| Totale Ha | 2,30 |
| Utile Ha | 1,57 |
| Altro-tare Ha | 0,73 |

| Inquadramento Catastale | |
|---|---|
| Foglio | 13 |
| Particella | 16p-30p-31p |

| Generalità | |
|---|---|
| Esposizione | Sud |
| Pendenza % | 33,70 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1303 | 1359 |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

Giacitura

Manufatti

Risorse idriche

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 180,43 |
| Provvigione reale totale | 1,57 | 284,08 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia giovane copre l'82%, seguita dalla perticaia giovane all'8%, con il resto come formazioni erbacee o arbustive (1%).

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,13 | 8,20 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,30 | 82,42 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,15 | 9,38 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 1,57 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 1,57 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai, sporadico rovo |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Abbondante |
| Specie prevalenti: | Graminacee, felce aquilina, ortiche |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **29a** | **Denominazione località** | **Valle dei Morti** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 8,29 |
| Utile Ha | 7,57 |
| Altro-tare Ha | 0,72 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 13 |
| Particella | 16;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42 |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest |
| Pendenza % | 27,41 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1305 | 1379 |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.7** | |
| **Viabilità** | |
| **Scarsamente servita** | |
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata | |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata | |
| Anno di taglio | | **2028-2030** |
| Età media all'anno di taglio | | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 448,26 |
| Provvigione reale totale | 7,57 | 3393,81 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **115,0** |
| Ripresa totale | | **870** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 6 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

*Faggio* *95%* *Pino nero* *5%*

Descrizione:

Nella particella 29a, la fustaia giovane rappresenta il 34% della superficie. La fustaia adulta segue con il 28%, la perticaia giovane con il 16%, e la perticaia adulta con il 22%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,21 | 15,94 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,11 | 27,84 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,61 | 34,49 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 1,64 | 21,72 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 7,57 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Debole diradamento dal basso, più lieve nelle aree di fustaia matura e più intenso nelle aree di fustaia e perticaia. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2028-2030 | 7,57 | 115,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 870,7 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **30** | **Denominazione località** | **Valle dei Lupi** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 6,84 |
| Utile Ha | 5,00 |
| Altro-tare Ha | 1,84 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 13 |
| Particella | 2p-16p-43p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest | |
| Pendenza % | 27,93 | |
| Altitudine mt slm | min. 1299 | max 1378 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 304,46 |
| Provvigione reale totale | 5,00 | 1521,25 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 2 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

*Faggio* *100%*

Descrizione:

La fustaia giovane è la componente principale della particella 30, coprendo il 39% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 33% e dalla fustaia matura al 28%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,66 | 33,26 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,93 | 38,68 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,40 | 28,06 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 5,00 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 5,00 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Abbondante |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **31** | **Denominazione località** | **Valle dei Lupi** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 17,68 |
| Utile Ha | 17,41 |
| Altro-tare Ha | 0,27 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 13 |
| Particella | 16p-22p-42p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Ovest | |
| Pendenza % | 24,28 | |
| Altitudine mt slm | min. 1348 | max 1402 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2028-2030** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 393,99 |
| Provvigione reale totale | 17,41 | 6859,84 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **62,0** |
| Ripresa totale | | **1080** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 9 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Faggio* | *90%* | *Pino nero* | *7%* | *Acero campestre* | *1%* | *Castagno* | *2%* |
| *Maggiociondolo* | *1%* | | | | | | |
| *Ontano napoletano* | *1%* | | | | | | |

Descrizione:

Nella particella 31, la fustaia giovane rappresenta il 43% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 32%, dalla spessina al 10% e dalla perticaia giovane al 10%. Il restante 1% è costituito da formazioni erbacee o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,77 | 10,15 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 5,59 | 32,13 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 7,55 | 43,38 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,30 | 13,22 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,20 | 1,13 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 17,41 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento selettivo che colpisce soprattutto le conifere. Intervento di grado debole nelle aree con faggio e ontano napoletano, cercando di conservare entrambe le specie, in particolare l'acero montano. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2028-2030 | 17,41 | 62,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 1080,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai, rovo, rosa |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, ortica, lampone, eringio, carlina |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **32a** | **Denominazione località** | **Acero** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 5,72 |
| Utile Ha | 5,68 |
| Altro-tare Ha | 0,04 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 13 |
| Particella | 22;51;52 |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Est | |
| Pendenza % | 33,32 | |
| Altitudine mt slm | min. 1312 | max 1392 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 394,78 |
| Provvigione reale totale | 5,68 | 2242,28 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 4 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *19%* | *Pino nero* | *7%* | *Castagno* | *1%* |
| *Faggio* | *70%* | | | | |
| *Ontano napoletano* | *3%* | | | | |

Descrizione:

Nella particella 32a, la fustaia adulta rappresenta il 41% della superficie, seguita dalla fustaia giovane al 36%, dalla spessina al 5% e dalla fustaia matura al 17%. Il restante 1% è costituito da formazioni erbacee o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,30 | 5,30 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,28 | 40,20 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,15 | 37,87 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,94 | 16,64 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 5,68 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 5,68 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Rovo, ginestra |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Ortica, lampone |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **33** | **Denominazione località** | **Acero** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 10,84 |
| Utile Ha | 10,61 |
| Altro-tare Ha | 0,23 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 13 |
| Particella | 22p-52p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Est |
| Pendenza % | 34,07 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1203 | 1334 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 410,38 |
| Provvigione reale totale | 10,61 | 4354,86 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 6 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Faggio* | *76%* | *Pino nero* | *16%* | *Castagno* | *4%* |
| *Maggiociondolo* | *1%* | *Salicone* | *2%* | | |
| *Ontano napoletano* | *1%* | | | | |

Descrizione:

Nella particella 33, la fustaia adulta copre il 50% della superficie, seguita dalla perticaia adulta al 22%, dalla fustaia giovane al 24% e dalla fustaia matura al 5%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,32 | 21,86 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 5,26 | 49,56 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,54 | 23,95 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,49 | 4,63 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 10,61 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 10,61 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai, raro biancospino |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, felce, ortica |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **37a** | **Denominazione località** | **Valle del Limo** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 8,72 |
| Utile Ha | 7,16 |
| Altro-tare Ha | 1,56 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 7;11 |
| Particella | 22p-34 ; 20p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud | |
| Pendenza % | 36,79 | |
| Altitudine mt slm | min. 1099 | max 1259 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 207,70 |
| Provvigione reale totale | 7,16 | 1486,55 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La perticaia adulta rappresenta il 48% della superficie della particella 37a, seguita dalla perticaia giovane al 32%, dal novelleto al 3%, dalla fustaia giovane al 12% e dalla fustaia matura al 2%. Il restante 1% è costituito da formazioni erbacee o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,01 |
| Spessine h 4-8 m | 0,24 | 3,36 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 2,40 | 33,60 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 3,30 | 46,13 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,86 | 12,08 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,16 | 2,29 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,15 | 2,05 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,03 | 0,49 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 7,16 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 7,16 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | - |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai, rosa, coronilla emerus |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Prevalenza |
| Specie prevalenti: | Graminacee, eringi, carlina, cerastio |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **37b** | **Denominazione località** | **Valle del Limo** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 4,83 |
| Utile Ha | 4,43 |
| Altro-tare Ha | 0,40 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 7 |
| Particella | 27-30p-47 |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud |
| Pendenza % | 38,22 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1182 | 1310 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Non Servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 214,43 |
| Provvigione reale totale | 4,43 | 950,32 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

Nella particella 37b, la perticaia adulta copre il 38% della superficie, seguita dal novelleto al 36%, dalla fustaia giovane all'11%, dalla fustaia adulta al 10% e dalla fustaia matura al 6%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 1,59 | 35,78 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,68 | 37,83 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,49 | 11,07 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,43 | 9,70 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,25 | 5,63 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 4,43 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 4,43 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai, biancospino, nocciolo |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Abbondante |
| Specie prevalenti: | Graminacee, felce aquilina, timo serpillo, eringi |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **38** | **Denominazione località** | **La Chiusa** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 14,31 |
| Utile Ha | 10,05 |
| Altro-tare Ha | 4,26 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 7;12 |
| Particella | 22p ; 1p-11p-12p-63p-64p-69-74-75-76-77-79 |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest |
| Pendenza % | 35,12 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1078 | 1291 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 244,17 |
| Provvigione reale totale | 10,05 | 2453,68 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 4 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Agrifoglio* | *1%* | *Acero opalo* | *53%* |
| *Faggio* | *2%* | *Carpino nero* | *19%* |
| *Ontano napoletano* | *4%* | *Cerro* | *21%* |

Descrizione:

La fustaia adulta copre il 41% della superficie della particella 38, seguita dalla fustaia giovane al 21%, dalla perticaia adulta al 18%, dalla fustaia matura al 15% e dalla spessina al 2%. Il restante 4% è occupato da formazioni erbacee o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,20 | 1,96 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,83 | 18,20 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 4,10 | 40,76 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,01 | 20,03 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,55 | 15,38 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,37 | 3,67 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 10,05 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 10,05 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **39** | **Denominazione località** | **Lo Stazzo** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 17,32 |
| Utile Ha | 10,43 |
| Altro-tare Ha | 6,89 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 12 |
| Particella | 1p-6-7-12p-59-60-61-62 |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest | |
| Pendenza % | 34,09 | |
| Altitudine mt slm | min. 1112 | max 1293 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 175,49 |
| Provvigione reale totale | 10,43 | 1830,88 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

Nella particella 39, la fustaia giovane rappresenta il 36% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 29%, dalla perticaia giovane al 25% e dalla fustaia matura all'8%. Il restante 2% è costituito da formazioni erbacee o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,02 | 0,16 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 3,04 | 29,10 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 3,79 | 36,36 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,59 | 24,83 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,83 | 7,93 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,16 | 1,51 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,01 | 0,12 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 10,43 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 10,43 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai, rosa, biancospino |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Abbondante |
| Specie prevalenti: | Graminacee, felce aquilina, ortiche, sambuco erbaceo |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **40** | **Denominazione località** | **Lo Stazzo** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 11,15 |
| Utile Ha | 5,26 |
| Altro-tare Ha | 5,89 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 12 |
| Particella | 1p-8-9p-12p-13-58 |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest | |
| Pendenza % | 32,82 | |
| Altitudine mt slm | min. 1168 | max 1281 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 183,86 |
| Provvigione reale totale | 5,26 | 967,99 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia giovane rappresenta il 43% della superficie della particella 40, seguita dalla fustaia adulta al 38% e dalla fustaia matura al 13%. Il restante 6% è occupato da formazioni erbacee o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,02 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,27 | 43,13 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,02 | 38,38 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,67 | 12,76 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,28 | 5,24 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,03 | 0,49 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 5,26 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 5,26 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Felce aquilina, graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **41** | **Denominazione località** | **Vallone dello Stazzo** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 9,26 |
| Utile Ha | 8,93 |
| Altro-tare Ha | 0,33 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 12 |
| Particella | 1p-12p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest |
| Pendenza % | 38,66 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1082 | 1255 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2028-2030** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 442,25 |
| Provvigione reale totale | 8,93 | 3948,52 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **93,0** |
| Ripresa totale | | **830** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 4 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | | | |
|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *30%* | *Acero opalo* | *3%* |
| *Agrifoglio* | *15%* | | |
| *Faggio* | *43%* | | |
| *Ontano napoletano* | *10%* | | |

Descrizione:

Nella particella 41, la fustaia giovane copre il 22% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 22%, dalla perticaia giovane al 20%, dalla spessina al 10% e dalla fustaia matura al 26%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,90 | 10,07 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,79 | 20,03 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,00 | 22,37 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,94 | 21,68 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 1,61 | 18,09 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,48 | 5,32 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,22 | 2,44 |
| **Totale** | 8,93 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderato diradamento dal basso a carico dei soggetti del piano dominato e dei peggiori del piano dominante. Nel diradamento andranno favorite specie diverse dal faggio, come l'acero opalo, l'ontano napoletano e il cerro. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2028-2030 | 8,93 | 93,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 830,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Felce aquilina, lampone, graminacee, ortica |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **42** | **Denominazione località** | **Valle dei Sauci** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 28,53 |
| Utile Ha | 13,87 |
| Altro-tare Ha | 14,66 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 12;13 |
| Particella | 1p ; 16p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud |
| Pendenza % | 28,11 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1254 | 1384 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 173,45 |
| Provvigione reale totale | 13,87 | 2405,92 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia giovane rappresenta il 53% della superficie della particella 42, seguita dalla fustaia adulta al 26% e dalla fustaia matura al 16%, con la spessina all'1%. Il restante 5% è costituito da formazioni erbacee o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,03 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,12 | 0,89 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 7,31 | 52,72 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,60 | 25,95 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,18 | 15,69 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,65 | 4,72 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 13,87 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 13,87 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, cerastio, cardi, carlina |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **43** | **Denominazione località** | **Valle dei Morti** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 14,36 |
| Utile Ha | 12,46 |
| Altro-tare Ha | 1,90 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 12;13 |
| Particella | 1p ; 16p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest | |
| Pendenza % | 2,00 | |
| Altitudine mt slm | min. 1253 | max 1398 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 390,03 |
| Provvigione reale totale | 12,46 | 4857,98 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 10 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *1%* | *Cerro* | *1%* |
| *Agrifoglio* | *3%* | *Pino nero* | *16%* |
| *Faggio* | *79%* | | |
| *Ontano napoletano* | *1%* | | |

Descrizione:

Nella particella 43, la fustaia giovane copre il 32% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 24%, dalla perticaia giovane al 24% e dalla fustaia matura al 18%. Il restante 3% è occupato da formazioni erbacee o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,01 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,32 | 2,55 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,98 | 23,93 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,93 | 31,57 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 3,02 | 24,26 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 1,49 | 11,94 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,72 | 5,74 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 12,46 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 12,46 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, ortiche, sambuco |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **44a** | **Denominazione località** | **Valle dei Sauci** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 7,99 |
| Utile Ha | 7,70 |
| Altro-tare Ha | 0,29 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 12;13 |
| Particella | 1p ; 16p-44-45p-46p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord-Est | |
| Pendenza % | 31,16 | |
| Altitudine mt slm | min. 1301 | max 1399 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2028-2030** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 501,90 |
| Provvigione reale totale | 7,70 | 3865,46 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **113,0** |
| Ripresa totale | | **870** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 5 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

*Faggio* *57%* *Pino nero* *40%*

*Ontano napoletano* *2%*

Descrizione:

La fustaia matura rappresenta il 37% della superficie della particella 44a, seguita dalla fustaia giovane al 28%, dalla fustaia adulta al 18% e dalla perticaia giovane al 13%. Il restante 5% è costituito da formazioni erbacee o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,35 | 4,55 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,96 | 12,52 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,37 | 17,83 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,13 | 27,67 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 2,06 | 26,74 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,82 | 10,70 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 7,70 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderato diradamento dal basso a carico dei soggetti del piano dominato e dei peggiori del piano dominante, soprattutto se di origine agamica. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2028-2030 | 7,70 | 113,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 870,3 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Rovo, rosa, ginestra dei carbonai |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, ortica |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **44b** | **Denominazione località** | **Valle dei Sauci** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 4,68 |
| Utile Ha | 4,38 |
| Altro-tare Ha | 0,30 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 13 |
| Particella | 2p-3p-15p-16p-43p-45p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud-Est | |
| Pendenza % | 27,24 | |
| Altitudine mt slm | min. 1331 | max 1391 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 321,29 |
| Provvigione reale totale | 4,38 | 1407,98 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia matura copre il 39% della superficie nella particella 44b, seguita dalla fustaia giovane al 37%, dalla perticaia giovane al 19% e dalla fustaia adulta al 5%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,84 | 19,24 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,60 | 36,60 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,72 | 39,14 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,22 | 4,93 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,09 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 4,38 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 4,38 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Assente |
| Specie prevalenti: | Rara ginestra dei carbonai |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **45a** | **Denominazione località** | **Valle dei Sauci** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 19,12 |
| Utile Ha | 18,68 |
| Altro-tare Ha | 0,44 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 13 |
| Particella | 3;15;16;45;46;47 |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Ovest | |
| Pendenza % | 26,63 | |
| Altitudine mt slm | min. 1323 | max 1408 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2028-2030** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 477,58 |
| Provvigione reale totale | 18,68 | 8919,92 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **89,0** |
| Ripresa totale | | **1670** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 10 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | | | |
|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *1%* | *Pino nero* | *4%* |
| *Agrifoglio* | *1%* | | |
| *Faggio* | *78%* | | |
| *Ontano napoletano* | *16%* | | |

Descrizione:

Nella particella 45a, la fustaia matura rappresenta il 34% della superficie, seguita dalla fustaia giovane al 25%, dalla perticaia giovane al 14% e dalla fustaia adulta al 20%. Il restante 7% è occupato da formazioni erbacee o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,01 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,34 | 7,17 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,65 | 14,19 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 4,62 | 24,75 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 6,41 | 34,33 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 3,65 | 19,55 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 18,68 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Debole diradamento dal basso, soprattutto nelle aree di fustaia matura; più intenso nelle aree di fustaia adulta e perticaia. Eliminazione del pino silvestre. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2028-2030 | 18,68 | 89,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 1662,3 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, ortica, altra flora nitrofila |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **46** | **Denominazione località** | **Terrate** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 16,25 |
| Utile Ha | 15,14 |
| Altro-tare Ha | 1,11 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 13 |
| Particella | 16p-22p-48-49-50-52p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord-Est | |
| Pendenza % | 28,15 | |
| Altitudine mt slm | min. 1311 | max 1407 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2028-2030** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 380,61 |
| Provvigione reale totale | 15,14 | 5761,55 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **79,9** |
| Ripresa totale | | **1210** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 11 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | | | |
|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *1%* | *Pino nero* | *9%* |
| *Agrifoglio* | *3%* | *Salicone* | *1%* |
| *Faggio* | *77%* | | |
| *Ontano napoletano* | *10%* | | |
| *Sorbo degli Ucc.* | *1%* | | |

Descrizione:

Nella particella 46, la fustaia giovane rappresenta il 34% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 33%, dalla perticaia giovane al 20% e dalla fustaia matura all'8%. Il restante 4% è occupato da formazioni erbacee o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,66 | 4,38 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 4,97 | 32,86 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 5,18 | 34,21 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 3,07 | 20,31 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 1,25 | 8,25 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 15,14 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Debole diradamento dal basso, soprattutto nelle aree di fustaia matura; diradamento selettivo anche piuttosto intenso a carico dei pini, per liberare le latifoglie. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2028-2030 | 15,14 | 79,9 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 1210,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, ortiche |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **47** | **Denominazione località** | **Terrate** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 4,99 |
| Utile Ha | 4,94 |
| Altro-tare Ha | 0,05 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 13 |
| Particella | 22p-160p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Est |
| Pendenza % | 34,83 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1241 | 1314 |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.7** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata | |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata | |
| Anno di taglio | | **2028-2030** |
| Età media all'anno di taglio | | **0** |

| | Ha: | mc: | | Ha: | mc: |
|---|---|---|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 419,64 | Ripresa unitaria | | **89,1** |
| Provvigione reale totale | 4,94 | 2073,23 | Ripresa totale | | **440** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 4 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Faggio* | *71%* | *Pino nero* | *22%* | *Castagno* | *7%* |

Descrizione:

La fustaia adulta copre il 47% della superficie della particella 47, seguita dalla fustaia giovane al 24%, dalla fustaia matura al 21% e dalla spessina all'8%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,18 | 23,97 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,30 | 46,54 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,06 | 21,37 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,40 | 8,12 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 4,94 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento selettivo a carico del pino nero per liberare le latifoglie e favorirne l'affermazione. Debole diradamento nelle aree di faggio. Salvaguardia del castagno e dell'ontano napoletano. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2028-2030 | 4,94 | 89,1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 440,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Abbondante |
| Specie prevalenti: | Graminacee, ortica, sambuco, felce |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **48** | **Denominazione località** | **Filettone** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 9,42 |
| Utile Ha | 8,75 |
| Altro-tare Ha | 0,67 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 13 |
| Particella | 8p-22p-167p-169-170-171p-172-173p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud |
| Pendenza % | 29,21 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1229 | 1297 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 346,81 |
| Provvigione reale totale | 8,75 | 3035,80 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **118,8** |
| Ripresa totale | | **1040** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 6 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *1%* | *Cerro* | *1%* | *Castagno* | *6%* |
| *Agrifoglio* | *1%* | *Pino nero* | *46%* | | |
| *Faggio* | *44%* | | | | |

Descrizione:

Nella particella 48, la fustaia giovane copre il 54% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 29% e dalla perticaia adulta al 16%. Il restante 1% è costituito da formazioni erbacee o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,44 | 16,46 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 4,76 | 54,36 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,55 | 29,19 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 8,75 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento selettivo a carico del pino nero per liberare le latifoglie e favorirne l'affermazione. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 8,75 | 118,8 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 1040,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, felci |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **50** | **Denominazione località** | **Vallone della Vecchiarella** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 9,13 |
| Utile Ha | 7,88 |
| Altro-tare Ha | 1,25 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 11 |
| Particella | 20p-29p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Ovest |
| Pendenza % | 37,31 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 921 | 1159 |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

Giacitura

Manufatti

Risorse idriche

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 282,57 |
| Provvigione reale totale | 7,88 | 2226,58 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

Nella particella 50, la fustaia adulta è la più rappresentata, coprendo il 46% della superficie. La fustaia giovane segue con il 32%, mentre la perticaia adulta copre il 21%. Le formazioni erbacee o arbustive costituiscono l'1% rimanente.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,69 | 21,40 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 3,64 | 46,20 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,55 | 32,40 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 7,88 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 7,88 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai, rovo |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Abbondante |
| Specie prevalenti: | Graminacee, felce |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **51** | **Denominazione località** | **Orto di Calcio Lento** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 21,56 |
| Utile Ha | 3,53 |
| Altro-tare Ha | 18,03 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 11;12 |
| Particella | 20p-26-27p-29p-42-43p-45 ; 1p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest |
| Pendenza % | 27,28 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1149 | 1264 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 66,53 |
| Provvigione reale totale | 3,53 | 235,17 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia adulta è la componente principale della particella 51, occupando l'85% della superficie. La perticaia adulta e la fustaia giovane rappresentano rispettivamente il 4% e l'11%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,02 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,13 | 3,63 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 3,01 | 85,24 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,39 | 11,11 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 3,53 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 3,53 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | - |
| Specie prevalenti: | - |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | - |
| Specie prevalenti: | Graminacee, felce aquilina, ginestra dei carbonai |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **52** | **Denominazione località** | **Valle del Limo** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 31,14 |
| Utile Ha | 5,37 |
| Altro-tare Ha | 25,77 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 11;12 |
| Particella | 24-25-29p-38-39-40-41-43p-44 ; 1p-10-21-49-80-81-82-83-84 |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud | |
| Pendenza % | 30,98 | |
| Altitudine mt slm | min. 1074 | max 1282 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 75,11 |
| Provvigione reale totale | 5,37 | 403,23 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia giovane è la più diffusa nella particella 52, coprendo il 37% della superficie. Il novelleto copre il 13%, seguito dalla perticaia adulta al 12%, la perticaia giovane al 19% e la fustaia adulta al 18%. Le formazioni erbacee o arbustive costituiscono l'1% rimanente.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,71 | 13,29 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,67 | 12,50 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,03 | 19,28 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,01 | 37,41 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,94 | 17,53 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 5,37 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 5,37 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | - |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai, biancospino, rosa |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | - |
| Specie prevalenti: | Graminacee, felce aquilina |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **53** | **Denominazione località** | **Conca** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 6,87 |
| Utile Ha | 6,61 |
| Altro-tare Ha | 0,26 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 7;12 |
| Particella | 22p-45-56p-73p ; 1p-68 |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord-Est | |
| Pendenza % | 36,65 | |
| Altitudine mt slm | min. 1105 | max 1277 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2025-2027** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 391,08 |
| Provvigione reale totale | 6,61 | 2586,50 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **95,3** |
| Ripresa totale | | **630** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 4 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Agrifoglio* | *2%* | *Acero opalo* | *17%* | *Nocciolo* | *33%* |
| *Faggio* | *44%* | | | | |
| *Ontano napoletano* | *5%* | | | | |

Descrizione:

Nella particella 53, la fustaia giovane copre il 34% della superficie, seguita dalla fustaia adulta con il 22%. La perticaia giovane rappresenta il 14% e la fustaia matura il 12%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,91 | 13,71 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,23 | 33,64 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,47 | 22,26 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,21 | 18,31 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,80 | 12,08 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 6,61 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Debole diradamento dal basso che elimina i soggetti peggiori e quelli sovrannumerari, soprattutto se di origine agamica. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2025-2027 | 6,61 | 95,3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 630,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, felce aquilina |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **54** | **Denominazione località** | **Monte Caruso** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 12,57 |
| Utile Ha | 5,38 |
| Altro-tare Ha | 7,19 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 12 |
| Particella | 1p-12p-116-121-130-131-132-133 |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest |
| Pendenza % | 34,85 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1074 | 1212 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 148,43 |
| Provvigione reale totale | 5,38 | 798,10 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 2 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

*Acero montano* *55%* *Pino nero* *18%* *Abete rosso* *9%*
*Faggio* *18%*

Descrizione:

La fustaia giovane è predominante nella particella 54, con una copertura del 41%. Seguono la fustaia adulta al 26%, la perticaia giovane all'11% e la fustaia matura al 22%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,09 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,61 | 11,41 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,38 | 25,59 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,22 | 41,31 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,16 | 21,60 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 5,38 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 5,38 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Assente |
| Specie prevalenti: | - |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | - |
| Specie prevalenti: | Graminacee, felce aquilina |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **55** | **Denominazione località** | **Valle dei Sauci** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 14,89 |
| Utile Ha | 13,88 |
| Altro-tare Ha | 1,01 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 12 |
| Particella | 1p-12p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest | |
| Pendenza % | 37,07 | |
| Altitudine mt slm | min. 1178 | max 1333 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 451,76 |
| Provvigione reale totale | 13,88 | 6271,32 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 10 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *2%* | *Acero opalo* | *8%* |
| *Faggio* | *73%* | | |
| *Ontano napoletano* | *18%* | | |

Descrizione:

La fustaia giovane rappresenta il 37% della superficie della particella 55. La fustaia adulta copre il 30%, la perticaia giovane il 14% e la fustaia matura il 18%. Le formazioni erbacee o arbustive costituiscono l'1% rimanente.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,01 | 0,10 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,16 | 1,16 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,89 | 13,62 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 4,15 | 29,92 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 5,15 | 37,11 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 2,12 | 15,29 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,39 | 2,78 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,02 |
| **Totale** | 13,88 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 13,88 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Assente |
| Specie prevalenti: | Biancospino, Ginestra dei carbonai |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Ortica, Lampone, Felce Aquilina |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **56** | **Denominazione località** | **Monte Caruso** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 13,22 |
| Utile Ha | 7,29 |
| Altro-tare Ha | 5,93 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 12 |
| Particella | 1p-12p-401p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud | |
| Pendenza % | 35,23 | |
| Altitudine mt slm | min. 1097 | max 1267 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 184,24 |
| Provvigione reale totale | 7,29 | 1343,48 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 4 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *6%* | *Pino nero* | *29%* |
| *Agrifoglio* | *3%* | | |
| *Faggio* | *63%* | | |

Descrizione:

La fustaia giovane copre il 40% della particella 56, seguita dalla fustaia adulta al 35%, la perticaia giovane al 5% e la fustaia matura al 20%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,38 | 5,17 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,91 | 39,93 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,56 | 35,07 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,45 | 19,82 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 7,29 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 7,29 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Felce Aquilina, Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **57** | **Denominazione località** | **Valle Matauro** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 35,36 |
| Utile Ha | 23,27 |
| Altro-tare Ha | 12,09 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 12;13 |
| Particella | 1p-14p-15-48p-178 ; 9p-15p-21p-62 |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest | |
| Pendenza % | 37,01 | |
| Altitudine mt slm | min. 1087 | max 1295 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 224,30 |
| Provvigione reale totale | 23,27 | 5218,59 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 6 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Agrifoglio* | *28%* | *Acero opalo* | *7%* |
| *Faggio* | *14%* | *Carpino nero* | *13%* |
| *Ontano napoletano* | *35%* | *Cerro* | *3%* |

Descrizione:

Nella particella 57, la fustaia giovane è la più rappresentata con il 42%, seguita dalla fustaia adulta al 35%, la perticaia giovane all'8% e la fustaia matura al 13%. Le formazioni erbacee o arbustive costituiscono il 2% rimanente.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,03 | 0,11 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,80 | 7,75 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 9,71 | 41,74 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 8,05 | 34,61 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 3,13 | 13,43 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,51 | 2,20 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,04 | 0,15 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 23,27 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 23,27 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Abbondante |
| Specie prevalenti: | Ortica, Felce, Graminacee, Sambuco |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **59** | **Denominazione località** | **Colle Matauro** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 12,88 |
| Utile Ha | 10,18 |
| Altro-tare Ha | 2,70 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 12;13 |
| Particella | 1p-14p-179 ; 4-9p-15p-16p-59-60 |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud | |
| Pendenza % | 29,87 | |
| Altitudine mt slm | min. 1196 | max 1334 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.7** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 306,21 |
| Provvigione reale totale | 10,18 | 3118,09 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 4 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *1%* | *Pino nero* | *52%* |
| *Agrifoglio* | *7%* | | |
| *Faggio* | *19%* | | |
| *Ontano napoletano* | *20%* | | |

Descrizione:

La fustaia giovane copre il 39% della particella 59, mentre la fustaia adulta occupa il 38% e la fustaia matura il 14%. Le formazioni erbacee o arbustive costituiscono il 9% rimanente.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,01 | 0,08 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 3,99 | 39,14 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,83 | 37,62 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,48 | 14,55 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,88 | 8,61 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 10,18 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 10,18 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Abbondante |
| Specie prevalenti: | Graminacee, Ortiche, Felce |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **61** | **Denominazione località** | **Valle del Pero** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 11,88 |
| Utile Ha | 10,52 |
| Altro-tare Ha | 1,36 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 13 |
| Particella | 15p-16p-54-55p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest |
| Pendenza % | 26,67 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1335 | 1415 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 344,66 |
| Provvigione reale totale | 10,52 | 3624,85 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 6 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | | | |
|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *1%* | *Pino nero* | *13%* |
| *Agrifoglio* | *1%* | | |
| *Faggio* | *58%* | | |
| *Ontano napoletano* | *28%* | | |

Descrizione:

La fustaia giovane domina la particella 61 con il 34%, seguita dalla fustaia adulta al 31%, la perticaia giovane al 14% e la fustaia matura al 10%. Le formazioni erbacee o arbustive coprono il 10% restante.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,44 | 13,72 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 3,63 | 34,51 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,22 | 30,64 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,19 | 11,31 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 1,01 | 9,59 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,02 | 0,23 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 10,52 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 10,52 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, Felce, Ortiche |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **62** | **Denominazione località** | **Raia dell'Acera** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 12,88 |
| Utile Ha | 10,43 |
| Altro-tare Ha | 2,45 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 13 |
| Particella | 16p-22p-53 |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Est |
| Pendenza % | 30,08 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1298 | 1415 |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

Giacitura

Manufatti

Risorse idriche

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2028-2030** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 302,50 |
| Provvigione reale totale | 10,43 | 3154,29 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **76,7** |
| Ripresa totale | | **800** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 7 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *13%* | *Acero opalo* | *1%* | *Pioppo tremulo* | *1%* |
| *Faggio* | *74%* | *Pino nero* | *3%* | | |
| *Ontano napoletano* | *8%* | | | | |

Descrizione:

La fustaia giovane rappresenta il 41% della superficie della particella 62, seguita dalla fustaia adulta al 32%, la perticaia giovane al 7% e la fustaia matura al 16%. Le formazioni erbacee o arbustive costituiscono il 3% rimanente.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,72 | 6,90 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 4,30 | 41,27 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,36 | 32,23 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,72 | 16,49 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,32 | 3,11 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 10,43 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso per regolarizzare la densità, selettivo a carico del pino nero per liberare le latifoglie e favorirne l'affermazione. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2028-2030 | 10,43 | 76,7 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 800,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai, Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, Ortica |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **63** | **Denominazione località** | **Terrate** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 12,05 |
| Utile Ha | 10,68 |
| Altro-tare Ha | 1,37 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 13 |
| Particella | 16p-22p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud | |
| Pendenza % | 33,75 | |
| Altitudine mt slm | min. 1290 | max 1404 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 324,83 |
| Provvigione reale totale | 10,68 | 3468,90 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 2 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Agrifoglio* | *13%* | *Pino nero* | *38%* | *Pioppo tremulo* | *19%* |
| *Faggio* | *25%* | | | | |
| *Ontano napoletano* | *6%* | | | | |

Descrizione:

Nella particella 63, la fustaia giovane copre il 38% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 26%, la perticaia giovane al 14% e la fustaia matura al 9%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,47 | 13,74 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 4,09 | 38,30 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,80 | 26,22 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,41 | 13,21 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,91 | 8,53 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 10,68 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 10,68 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, Ortica, Sambuco, Lampone, Felce Aquilina |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **64** | **Denominazione località** | **Terrate** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 8,25 |
| Utile Ha | 8,12 |
| Altro-tare Ha | 0,13 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 13 |
| Particella | 5p-22p-144-152p-153p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Est |
| Pendenza % | 36,17 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1246 | 1310 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| **Sottosuolo** |
|---|
| **Calcareo** |

| **Suolo** |
|---|
| **MAP 4.7** |

| **Viabilità** |
|---|
| **Ben servita** |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 364,39 |
| Provvigione reale totale | 8,12 | 2957,78 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **77,6** |
| Ripresa totale | | **630** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 6 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *17%* | *Pino nero* | *35%* | *Abete bian* | *5%* | *Abete rosso* | *4%* |
| *Agrifoglio* | *25%* | | | *Castagno* | *3%* | | |
| *Faggio* | *5%* | | | | | | |
| *Ontano napoletano* | *7%* | | | | | | |

Descrizione:

La fustaia giovane è predominante nella particella 64, coprendo il 41% della superficie. La fustaia adulta segue con il 29%, la perticaia giovane con il 7%, con il resto come formazioni erbacee o arbustive (1%).

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,58 | 7,10 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,38 | 29,27 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,36 | 41,37 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,81 | 22,26 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 8,12 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento selettivo a carico del pino nero per liberare le latifoglie e favorirne l'affermazione. Diradamento moderato dal basso sul resto della superficie dove prevalgono le latifoglie. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 8,12 | 77,6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 630,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | diffusa |
| Specie prevalenti: | ortica, lampone, sambuco erbaceo, graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **65** | **Denominazione località** | **Filettone** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 8,08 |
| Utile Ha | 7,94 |
| Altro-tare Ha | 0,14 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 13 |
| Particella | 8p-22p-150p-151p-168p-171p-180p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord |
| Pendenza % | 32,41 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1249 | 1324 |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.7** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata | |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata | |
| Anno di taglio | | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | | **0** |

| | Ha: | mc: | | Ha: | mc: |
|---|---|---|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 392,74 | Ripresa unitaria | | **83,2** |
| Provvigione reale totale | 7,94 | 3116,97 | Ripresa totale | | **660** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 5 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Agrifoglio* | *5%* | *Pino nero* | *9%* | *Castagno* | *5%* |
| *Faggio* | *81%* | | | | |

Descrizione:

La fustaia giovane copre il 52% della superficie della particella 65, seguita dalla fustaia adulta al 29% e la perticaia giovane all'1%. Le formazioni erbacee o arbustive costituiscono l'1% rimanente.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,11 | 1,38 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,30 | 29,01 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 4,16 | 52,46 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,36 | 17,16 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 7,94 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento selettivo a carico del pino nero per liberare le latifoglie e favorirne l'affermazione. Diradamento moderato dal basso sul resto della superficie dove prevalgono le latifoglie. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 7,94 | 83,2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 660,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | abbondante |
| Specie prevalenti: | graminacee sotto il pino, ortica, felce, nelle vallecole |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **66** | **Denominazione località** | **La Peta** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 13,89 |
| Utile Ha | 8,74 |
| Altro-tare Ha | 5,15 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 13 |
| Particella | 5p-22p-145-146-147-148-149-182 |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud |
| Pendenza % | 29,32 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1217 | 1325 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 209,30 |
| Provvigione reale totale | 8,74 | 1829,31 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

Nella particella 66, la fustaia giovane rappresenta il 53% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 31%, la perticaia giovane al 2%, con il resto come formazioni erbacee o arbustive (3%).

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,15 | 1,77 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,73 | 31,27 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 4,62 | 52,84 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,00 | 11,40 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,24 | 2,72 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 8,74 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 8,74 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | diffusa |
| Specie prevalenti: | ginestra dei carbonai, agrifoglio, rosa, biancospino |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | estesa |
| Specie prevalenti: | graminacee, cerastio, eringio, cardo, felce |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **67** | **Denominazione località** | **Filettone** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 13,70 |
| Utile Ha | 11,11 |
| Altro-tare Ha | 2,59 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 13;20 |
| Particella | 22p-173p ; 12p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Est |
| Pendenza % | 35,80 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1139 | 1270 |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

Giacitura

Manufatti

Risorse idriche

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 295,52 |
| Provvigione reale totale | 11,11 | 3284,64 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia giovane copre il 48% della superficie nella particella 67, seguita dalla fustaia adulta al 38%, la perticaia giovane all'1%, la fustaia matura all'11%, con il resto come formazioni erbacee o arbustive (2%).

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,02 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,11 | 1,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 4,27 | 38,44 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 5,30 | 47,71 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,18 | 10,66 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,12 | 1,11 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,12 | 1,07 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 11,11 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 11,11 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | diffusa |
| Specie prevalenti: | rovo, ginestra dei carbonai |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | abbondante |
| Specie prevalenti: | felce, ortica, sambuco, graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar

SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **68** | **Denominazione località** | **Costa dell'Angelo** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 8,44 |
| Utile Ha | 6,67 |
| Altro-tare Ha | 1,77 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 10 |
| Particella | 144-171 |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Ovest |
| Pendenza % | 39,98 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 698 | 1005 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2025-2027** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 176,67 |
| Provvigione reale totale | 6,67 | 1177,60 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **32,5** |
| Ripresa totale | | **200** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

Nella particella 68, la spessina copre il 76% della superficie, seguita dalla perticaia giovane all'8% e la fustaia giovane al 16%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,51 | 7,62 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 5,08 | 76,21 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,07 | 15,99 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,01 | 0,11 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,00 | 0,06 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,01 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 6,67 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento della fustaia transitoria a prevalenza di carpino nero; l'intervento dovrà incidere soprattutto sui polloni di carpino nero, favorendo la roverella, l'acero opalo, il cerro e l'ontano napoletano. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2025-2027 | 6,67 | 32,5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 216,5 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | pungitopo, cisti, ginestra |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **70** | **Denominazione località** | **Valle Nova** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 33,18 |
| Utile Ha | 23,39 |
| Altro-tare Ha | 9,79 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 11;12 |
| Particella | 27p-29p ; 1p-17-18-85-86-87-88 |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest |
| Pendenza % | 28,68 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 984 | 1212 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| **Sottosuolo** |
|---|
| **Calcareo** |

| **Suolo** |
|---|
| **MAP 4.7** |

| **Viabilità** |
|---|
| **Ben servita** |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2025-2027** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 217,51 |
| Provvigione reale totale | 23,39 | 5086,60 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **95,8** |
| Ripresa totale | | **2240** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 10 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Ontano napoletano* | *9%* | *Acero opalo* | *2%* | *Olmo campestre* | *1%* | *Abete bian* | *1%* | *Abete rosso* | *3%* |
| | | *Carpino nero* | *1%* | | | | | | |
| | | *Cerro* | *7%* | | | | | | |
| | | *Pino nero* | *76%* | | | | | | |

Descrizione:

La fustaia giovane rappresenta il 41% della superficie della particella 70, seguita dalla fustaia adulta al 31%, la perticaia giovane al 16% e la fustaia matura al 12%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 3,72 | 15,92 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 9,63 | 41,17 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 7,24 | 30,97 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,79 | 11,94 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 23,39 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento da moderato a forte delle conifere per favorire l'insediamento e la progressiva affermazione delle latifoglie. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2025-2027 | 23,39 | 95,8 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 2240,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | diffusa |
| Specie prevalenti: | ginestra dei carbonai, felce aquilina, rosa |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | diffusa |
| Specie prevalenti: | graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **72** | **Denominazione località** | **S. Maria** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 17,41 |
| Utile Ha | 11,71 |
| Altro-tare Ha | 5,70 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 11;12;18 |
| Particella | 29p ; 1p-12p-18-89 ; 11p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud-Est | |
| Pendenza % | 36,26 | |
| Altitudine mt slm | min. 1054 | max 1206 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.7** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata | |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata | |
| Anno di taglio | | **2025-2027** |
| Età media all'anno di taglio | | **0** |

| | Ha: | mc: | | Ha: | mc: |
|---|---|---|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 179,51 | Ripresa unitaria | | **57,2** |
| Provvigione reale totale | 11,71 | 2102,44 | Ripresa totale | | **670** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 3 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

*Ontano napoletano* *2% Pino nero* *98%*

Descrizione:

La fustaia giovane copre il 62% della superficie della particella 72, seguita dalla fustaia adulta al 20%, la perticaia giovane al 20% e la fustaia matura al 4%. Le formazioni erbacee o arbustive costituiscono l'1% rimanente.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 2,34 | 19,95 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 7,30 | 62,31 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,57 | 13,43 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,50 | 4,31 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 11,71 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento da moderato a forte delle conifere per favorire l'insediamento e la progressiva affermazione delle latifoglie. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2025-2027 | 11,71 | 57,2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 670,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | ginestra dei carbonai, felce, rosa canina |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | diffusa |
| Specie prevalenti: | graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **73** | **Denominazione località** | **S. Maria** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 11,99 |
| Utile Ha | 7,49 |
| Altro-tare Ha | 4,50 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 11;12 |
| Particella | 29p ; 1p-16 |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud-Est | |
| Pendenza % | 32,30 | |
| Altitudine mt slm | min. 1102 | max 1220 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2025-2027** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 232,57 |
| Provvigione reale totale | 7,49 | 1741,60 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **38,9** |
| Ripresa totale | | **290** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

Nella particella 73, la fustaia giovane copre il 35% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 33%, la perticaia giovane al 6%, la fustaia matura al 16% e le formazioni erbacee o arbustive al 10%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,03 | 0,41 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,46 | 6,12 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,48 | 33,16 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,61 | 34,87 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,19 | 15,89 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,72 | 9,56 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 7,49 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso. Selettivo a carico delle conifere. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2025-2027 | 7,49 | 38,9 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 291,2 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Felce aquilina, Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **74** | **Denominazione località** | **S. Maria** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 6,36 |
| Utile Ha | 5,05 |
| Altro-tare Ha | 1,31 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 12 |
| Particella | 1p-20-105-106-107 |

| **Generalità** | | | |
|---|---|---|---|
| Esposizione | Sud-Est | | |
| Pendenza % | 36,86 | | |
| Altitudine mt slm | min. 1062 | max 1133 | |
| Giacitura | | | |
| Manufatti | | | |
| Risorse idriche | | | |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.7** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata | | Anno di taglio | 0 |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata | | Età media all'anno di taglio | 0 |

| | Ha: | mc: | | Ha: | mc: |
|---|---|---|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 274,26 | Ripresa unitaria | | 0,0 |
| Provvigione reale totale | 5,05 | 1384,25 | Ripresa totale | | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 5 | Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| | Cavallettamento - Ha | | Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| | Alberi modello - n | 0 | Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |
| | Relascopio | | | | |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *18%* | *Pino nero* | *71%* | *Abete bian* | *2%* |
| *Faggio* | *9%* | | | | |

Descrizione:

La fustaia giovane rappresenta il 55% della superficie della particella 74, seguita dalla fustaia adulta al 19%, la perticaia giovane al 6% e la fustaia matura al 20%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,02 | 0,38 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,29 | 5,72 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,94 | 18,69 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,80 | 55,48 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,00 | 19,73 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 5,05 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 5,05 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Nessuna specifica |
| Specie prevalenti: | - |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, Felce aquilina |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **76** | **Denominazione località** | **Monte Caruso** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 16,92 |
| Utile Ha | 11,23 |
| Altro-tare Ha | 5,69 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 12 |
| Particella | 1p-146-153p-154p-155p-156p-161p-162p-165p-167p-169p-172p-173p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest | |
| Pendenza % | 36,46 | |
| Altitudine mt slm | min. 1063 | max 1205 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 231,27 |
| Provvigione reale totale | 11,23 | 2596,75 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 4 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *25%* | *Pino nero* | *58%* | *Abete rosso* | *3%* |
| *Faggio* | *13%* | | | *Douglasia* | *3%* |

Descrizione:

Nella particella 76, la fustaia giovane copre il 44% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 34% e la fustaia matura al 22%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 3,84 | 34,19 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 4,97 | 44,24 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,42 | 21,57 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 11,23 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | Sì | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 11,23 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | MANCANTE |
| Specie prevalenti: | - |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | MANCANTE |
| Specie prevalenti: | - |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **78** | **Denominazione località** | **Raia della Spina** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 21,15 |
| Utile Ha | 13,63 |
| Altro-tare Ha | 7,52 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 12;13;19;25 |
| Particella | 47-48p ; 11p-12p-13p ; 31-36p-238p-262 ; 12p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest | |
| Pendenza % | 35,87 | |
| Altitudine mt slm | min. 1070 | max 1205 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2025-2027** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 253,00 |
| Provvigione reale totale | 13,63 | 3448,51 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **90,4** |
| Ripresa totale | | **1230** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 5 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

*Agrifoglio* *30%* *Pino nero* *30%* *Douglasia* *32%*
*Faggio* *8%*

Descrizione:

La fustaia giovane è la componente principale della particella 78, coprendo il 34% della superficie. La fustaia adulta segue con il 30%, mentre la fustaia matura rappresenta il 23%. Il resto della superficie è costituito da formazioni erbacee o arbustive (13%).

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,02 | 0,12 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,02 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,01 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 4,60 | 33,78 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 4,06 | 29,76 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 3,15 | 23,09 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 1,80 | 13,22 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 13,63 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | Sì | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso, a scapito soprattutto del pino nero; andranno favorite le latifoglie e la douglasia. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2025-2027 | 13,63 | 90,4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 1231,7 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, Felci |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **80** | **Denominazione località** | **Valle Piana** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 5,05 |
| Utile Ha | 4,30 |
| Altro-tare Ha | 0,75 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 12;13 |
| Particella | 48p ; 11p-15p-77p-78-81-86-89-93-94 |

| **Generalità** | | | |
|---|---|---|---|
| Esposizione | Sud | | |
| Pendenza % | 33,91 | | |
| Altitudine mt slm | min. 1141 | max 1207 | |
| Giacitura | | | |
| Manufatti | | | |
| Risorse idriche | | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 233,24 |
| Provvigione reale totale | 4,30 | 1003,35 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 2 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Agrifoglio* | *58%* | *Cerro* | *2%* |
| *Ontano napoletano* | *31%* | *Pino nero* | *8%* |

Descrizione:

Nella particella 80, la fustaia giovane copre l'84% della superficie, rendendola la copertura dominante. La fustaia adulta rappresenta il 10%, e il resto è costituito da formazioni erbacee o arbustive (1%).

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,43 | 10,06 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 3,63 | 84,47 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,24 | 5,46 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 4,30 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 4,30 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Abbondante |
| Specie prevalenti: | Felce aquilina, Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **82** | **Denominazione località** | **Vado dell'Asta** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 16,15 |
| Utile Ha | 9,39 |
| Altro-tare Ha | 6,76 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 13 |
| Particella | 15p-16p-22p-55p-56-57p-58 |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest |
| Pendenza % | 30,48 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1258 | 1387 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 195,19 |
| Provvigione reale totale | 9,39 | 1832,04 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



| STRATO ARBOREO | |
|---|---|
| Specie presenti: | |

Descrizione:

Nella particella 82, la fustaia giovane copre il 46% della superficie. Seguono la fustaia adulta e la perticaia giovane, entrambe al 14%. La fustaia matura copre il 26%, con il resto della superficie occupata da formazioni erbacee o arbustive (2%).

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,31 | 13,99 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 4,37 | 46,51 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,43 | 25,87 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,08 | 11,46 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,20 | 2,17 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 9,39 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 9,39 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

| STRATO ARBUSTIVO | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai, Agrifoglio |

| STRATO ERBACEO | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Ortica, Felce aquilina |

| PRESCRIZIONI |
|---|
| |

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **83a** | **Denominazione località** | **Salve Regina** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 9,84 |
| Utile Ha | 6,54 |
| Altro-tare Ha | 3,30 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 11;18 |
| Particella | 29p ; 11p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest | |
| Pendenza % | 36,28 | |
| Altitudine mt slm | min. 1181 | max 1283 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 204,07 |
| Provvigione reale totale | 6,54 | 1335,51 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia giovane è predominante nella particella 83a, coprendo il 57% della superficie. La fustaia adulta segue con il 29%, mentre la fustaia matura rappresenta l'11%. Le formazioni erbacee o arbustive costituiscono il 3% restante.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 3,70 | 56,57 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,90 | 29,04 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,73 | 11,09 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,22 | 3,30 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 6,54 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 6,54 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai, Rose, Pruni |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **84** | **Denominazione località** | **Vado dell'Asta** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 13,47 |
| Utile Ha | 10,04 |
| Altro-tare Ha | 3,43 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 13 |
| Particella | 16p-18p-22p-57p-130p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud | |
| Pendenza % | 32,17 | |
| Altitudine mt slm | min. 1226 | max 1378 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 209,88 |
| Provvigione reale totale | 10,04 | 2108,06 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia giovane domina la particella 84, rappresentando il 57% della superficie. La fustaia adulta e la perticaia giovane occupano entrambe il 17%, mentre la fustaia matura copre il 5%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,74 | 17,30 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 5,71 | 56,81 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,07 | 20,62 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,53 | 5,27 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 10,04 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 10,04 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Ginestra, Rovo |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Abbondante |
| Specie prevalenti: | Felce aquilina, Graminacee, Ortiche, Sambuco erbaceo |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **85** | **Denominazione località** | **Valle Coscia** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 10,45 |
| Utile Ha | 9,81 |
| Altro-tare Ha | 0,64 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 13 |
| Particella | 16p-22p-57p-142-143p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord-Est | |
| Pendenza % | 30,62 | |
| Altitudine mt slm | min. 1247 | max 1387 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.7** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata | |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata | |
| Anno di taglio | | **2028-2030** |
| Età media all'anno di taglio | | **0** |

| | Ha: | mc: | | Ha: | mc: |
|---|---|---|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 367,27 | Ripresa unitaria | | **68,3** |
| Provvigione reale totale | 9,81 | 3601,29 | Ripresa totale | | **670** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 8 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *1%* | *Acero opalo* | *12%* | *Olmo campestre* | *1%* |
| *Agrifoglio* | *14%* | *Pino nero* | *14%* | | |
| *Faggio* | *38%* | | | | |
| *Ontano napoletano* | *20%* | | | | |

Descrizione:

Nella particella 85, la fustaia giovane copre il 35% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 33%. La perticaia giovane rappresenta il 7%, e la fustaia matura il 21%. Le formazioni erbacee o arbustive coprono il restante 4%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,69 | 7,05 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 3,23 | 32,90 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,47 | 35,39 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,06 | 20,99 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,36 | 3,66 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 9,81 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento da moderato a forte nei gruppi di conifere per favorire l'insediamento e la progressiva affermazione delle latifoglie. Diradamento moderato dal basso nelle latifoglie, salvaguardando le specie associate al faggio. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2028-2030 | 9,81 | 68,3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 670,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Abbondante |
| Specie prevalenti: | Felce aquilina, ortica, sambuco, lampone |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **86** | **Denominazione località** | **Vado dell'Asta** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 8,36 |
| Utile Ha | 8,32 |
| Altro-tare Ha | 0,04 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 13 |
| Particella | 20p-22p-131p-132p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Est |
| Pendenza % | 37,19 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1211 | 1293 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 424,57 |
| Provvigione reale totale | 8,32 | 3532,19 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **126,2** |
| Ripresa totale | | **1050** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 2 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

*Faggio* *45%* *Pino nero* *19%*

*Ontano napoletano* *36%*

Descrizione:

La fustaia giovane rappresenta il 39% della superficie della particella 86, seguita dalla fustaia adulta al 24% e dalla fustaia matura al 36%. Le formazioni erbacee o arbustive costituiscono l'1% restante.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,04 | 24,49 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,23 | 38,85 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,97 | 35,71 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,08 | 0,95 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 8,32 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso. Selettivo a carico delle conifere. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 8,32 | 126,2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 1050,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Rovo, felce |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Ortica, felce aquilina, lampone |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **87** | **Denominazione località** | **Vado dell'Asta** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 9,30 |
| Utile Ha | 9,18 |
| Altro-tare Ha | 0,12 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 13 |
| Particella | 22p-135p-138p-139p-140p-143p |

| **Generalità** | | | |
|---|---|---|---|
| Esposizione | Sud-Est | | |
| Pendenza % | 33,01 | | |
| Altitudine mt slm | min. 1206 | max 1277 | |
| Giacitura | | | |
| Manufatti | | | |
| Risorse idriche | | | |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.7** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata | | Anno di taglio | | **2031-2034** |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata | | Età media all'anno di taglio | | **0** |
| | Ha: | mc: | | Ha: | mc: |
| Provvigione reale unitaria | 1 | 426,08 | Ripresa unitaria | | **101,3** |
| Provvigione reale totale | 9,18 | 3913,29 | Ripresa totale | | **930** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 7 | Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| | Cavallettamento - Ha | | Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| | Alberi modello - n | 0 | Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |
| | Relascopio | | | | |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *4%* | *Cerro* | *1%* | *Castagno* | *1%* | *Perastro* | *1%* |
| *Agrifoglio* | *7%* | *Pino nero* | *41%* | | | | |
| *Faggio* | *24%* | | | | | | |
| *Ontano napoletano* | *19%* | | | | | | |
| *Sorbo degli Ucc.* | *2%* | | | | | | |

Descrizione:

Nella particella 87, la fustaia giovane copre il 36% della superficie. La fustaia adulta rappresenta il 15%, mentre la perticaia giovane occupa il 4%. La fustaia matura è predominante con il 44%, e il resto della superficie è costituito da formazioni erbacee o arbustive (2%).

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,34 | 3,67 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,34 | 14,55 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,31 | 36,08 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 4,03 | 43,82 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,17 | 1,88 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 9,18 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento selettivo a carico del pino nero per liberare le latifoglie e favorirne l'affermazione. Diradamento moderato dal basso sul resto della superficie dove prevalgono le latifoglie. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 9,18 | 101,3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 930,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Felce, ortica, sambuco |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **88** | **Denominazione località** | **La Peta** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 3,12 |
| Utile Ha | 3,00 |
| Altro-tare Ha | 0,12 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 13 |
| Particella | 22p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest |
| Pendenza % | 29,62 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1227 | 1292 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 502,83 |
| Provvigione reale totale | 3,00 | 1507,35 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **126,8** |
| Ripresa totale | | **380** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 2 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Faggio* | *39%* | *Acero opalo* | *17%* | *Castagno* | *6%* | *Pioppo tremulo* | *6%* |
| *Ontano napoletano* | *33%* | | | | | | |

Descrizione:

La fustaia giovane è la componente principale della particella 88, coprendo il 19% della superficie. La fustaia adulta e la perticaia giovane occupano entrambe il 17%, mentre la fustaia matura rappresenta il 21%. Le formazioni erbacee o arbustive coprono il restante 43%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,51 | 16,90 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,57 | 18,90 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,63 | 20,99 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 1,30 | 43,21 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 3,00 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso nelle latifoglie, salvaguardando le specie associate al faggio. Diradamento da moderato a forte nei gruppi di conifere per favorire l'insediamento e la progressiva affermazione delle latifoglie. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 3,00 | 126,8 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 380,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai, biancospino |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Abbondante |
| Specie prevalenti: | Graminacee, felce, sambuco erbaceo, ortica |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **89** | **Denominazione località** | **Vallone di Ciccociangia** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 10,38 |
| Utile Ha | 4,81 |
| Altro-tare Ha | 5,57 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 13;20 |
| Particella | 22p ; 12p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud |
| Pendenza % | 39,43 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1149 | 1292 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 162,14 |
| Provvigione reale totale | 4,81 | 780,40 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 1 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

*Pino nero* *100%*

Descrizione:

Nella particella 89, la fustaia giovane copre il 39% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 35% e dalla fustaia matura al 26%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,01 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,87 | 38,79 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,71 | 35,47 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,23 | 25,63 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,01 | 0,11 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 4,81 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 4,81 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai, rovo |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, felce |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **90** | **Denominazione località** | **Vallone di Ciccociangia** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 8,38 |
| Utile Ha | 4,74 |
| Altro-tare Ha | 3,64 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 13;20 |
| Particella | 22p ; 12p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud | |
| Pendenza % | 37,48 | |
| Altitudine mt slm | min. 1098 | max 1267 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 206,00 |
| Provvigione reale totale | 4,74 | 975,92 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 1 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

*Ontano napoletano* *33%* *Pino nero* *22%* *Castagno* *44%*

Descrizione:

La fustaia matura copre il 49% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 34% e dalla fustaia giovane al 17%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,61 | 34,02 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,32 | 48,90 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,81 | 17,08 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 4,74 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 4,74 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Rovo, ginestra, biancospino |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Felce, graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **91** | **Denominazione località** | **Pasteria** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 4,55 |
| Utile Ha | 1,98 |
| Altro-tare Ha | 2,57 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 15 |
| Particella | 113p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest |
| Pendenza % | 38,55 |

| Altitudine mt | min. | max |
|---|---|---|
| slm | 599 | 813 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| **Sottosuolo** |
|---|
| **Calcareo** |

| **Suolo** |
|---|
| **MAP 4.7** |

| **Viabilità** |
|---|
| **Ben servita** |

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata | |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata | |
| Anno di taglio | | **0** |
| Età media all'anno di taglio | | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 115,55 |
| Provvigione reale totale | 1,98 | 228,25 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La spessina rappresenta l'81% della copertura, con la perticaia giovane al 17% e la fustaia giovane al 2%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,34 | 17,16 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,59 | 80,73 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,04 | 2,11 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 1,98 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 1,98 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Ginestra odorosa, cisti |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **92** | **Denominazione località** | **Costa dell'Angelo** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 7,84 |
| Utile Ha | 4,23 |
| Altro-tare Ha | 3,61 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 10 |
| Particella | 148p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Ovest | |
| Pendenza % | 38,70 | |
| Altitudine mt slm | min. 800 | max 1018 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 106,99 |
| Provvigione reale totale | 4,23 | 452,65 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 1 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *17%* | *Acero opalo* | *2%* | *Castagno* | *2%* |
| | | *Carpino nero* | *52%* | *Roverella* | *26%* |

Descrizione:

La spessina occupa l'89% della superficie, con la fustaia adulta che copre l'11%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,02 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 3,75 | 88,68 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,48 | 11,30 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 4,23 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 4,23 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Cisti, eringio, pungitopo, ginestra |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **97** | **Denominazione località** | **Raia della Spina** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 9,33 |
| Utile Ha | 5,40 |
| Altro-tare Ha | 3,93 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 12;13;20;25 |
| Particella | 48p ;11p-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113 ; 1p-18 ; 1p-12p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord-Est | |
| Pendenza % | 31,58 | |
| Altitudine mt slm | min. 1132 | max 1206 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.7** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata | |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata | |
| Anno di taglio | | **0** |
| Età media all'anno di taglio | | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 183,70 |
| Provvigione reale totale | 5,40 | 991,83 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia giovane e la fustaia adulta coprono entrambe il 47%, con la fustaia matura al 6%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,05 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,02 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,01 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,55 | 47,26 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,52 | 46,76 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,32 | 5,90 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 5,40 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 5,40 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Rovo, ginestra |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Felce, ortiche |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **98a** | **Denominazione località** | **Serro Tondo** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 6,44 |
| Utile Ha | 2,83 |
| Altro-tare Ha | 3,61 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 13 |
| Particella | 18p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest |
| Pendenza % | 30,63 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1245 | 1324 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 121,54 |
| Provvigione reale totale | 2,83 | 343,77 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia giovane copre il 54%, seguita dalla fustaia adulta al 25%, dalla spessina al 15% e dalla perticaia giovane al 5%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,02 | 0,66 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,42 | 14,93 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,71 | 25,01 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,53 | 54,17 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,15 | 5,22 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 2,83 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 2,83 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Abbondante |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **98b** | **Denominazione località** | **Serro Tondo** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 2,66 |
| Utile Ha | 2,36 |
| Altro-tare Ha | 0,30 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 20 |
| Particella | 12p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Est | |
| Pendenza % | 36,72 | |
| Altitudine mt slm | min. 1217 | max 1320 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 294,45 |
| Provvigione reale totale | 2,36 | 696,14 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 2 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Faggio* | *61%* |
| *Ontano napoletano* | *39%* |

Descrizione:

La fustaia adulta rappresenta il 40%, seguita dalla fustaia giovane al 28%, dalla spessina al 24% e dalla fustaia matura al 7%. Le formazioni erbacee o arbustive coprono l'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,57 | 24,14 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,95 | 40,26 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,67 | 28,36 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,17 | 7,24 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 2,36 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 2,36 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Rovo, biancospino |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Abbondante |
| Specie prevalenti: | Felce aquilina, ortiche |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **99** | **Denominazione località** | **Serro Tondo** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 6,78 |
| Utile Ha | 6,38 |
| Altro-tare Ha | 0,40 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 13;20 |
| Particella | 18p-20p-22p-130p-134p-136p-137p ; 5p-12p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord | |
| Pendenza % | 37,14 | |
| Altitudine mt slm | min. 1211 | max 1323 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 384,09 |
| Provvigione reale totale | 6,38 | 2450,75 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 4 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *11%* | *Acero opalo* | *4%* |
| *Agrifoglio* | *6%* | *Pino nero* | *2%* |
| *Faggio* | *51%* | | |
| *Ontano napoletano* | *26%* | | |

Descrizione:

La fustaia giovane copre il 47%, seguita dalla fustaia adulta al 26%, dalla spessina al 20% e dalla fustaia matura al 4%. Le formazioni erbacee o arbustive coprono l'1%

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,13 | 2,03 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,31 | 20,50 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,02 | 47,40 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,64 | 25,69 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,28 | 4,37 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 6,38 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 6,38 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Ortica, sambuco erbaceo, felce aquilina, ombrellifere |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **100** | **Denominazione località** | **Serrone Pizzuto** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 14,02 |
| Utile Ha | 13,40 |
| Altro-tare Ha | 0,62 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 20 |
| Particella | 12p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest |
| Pendenza % | 37,84 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1216 | 1474 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 423,50 |
| Provvigione reale totale | 13,40 | 5673,61 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **76,1** |
| Ripresa totale | | **1020** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 6 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Faggio* | *86%* | *Acero opalo* | *2%* |
| *Ontano napoletano* | *9%* | *Pino nero* | *2%* |

Descrizione:

La struttura di questa particella è dominata dalla fustaia giovane al 34% e dalla fustaia adulta al 21%. La perticaia giovane copre il 13%, mentre il novellame è assente. La presenza di perticaie adulte è al 2% e le fustaie mature sono al 12%, mostrando una maggiore eterogeneità nelle età delle piante.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,76 | 13,14 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,74 | 20,46 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 4,49 | 33,54 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,85 | 21,27 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 1,47 | 10,95 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,09 | 0,65 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 13,40 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso nelle latifoglie, salvaguardando le specie associate al faggio. Diradamento da moderato a forte nei gruppi di conifere per favorire l'insediamento e la progressiva affermazione delle latifoglie. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 13,40 | 76,1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 1020,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Assente |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio, biancospino |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | Ortiche, graminacee, geranio |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **101** | **Denominazione località** | **Serrone Pizzuto** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 17,58 |
| Utile Ha | 16,29 |
| Altro-tare Ha | 1,29 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 20 |
| Particella | 12p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord |
| Pendenza % | 39,02 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1212 | 1469 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| **Sottosuolo** |
|---|
| **Calcareo** |

| **Suolo** |
|---|
| **MAP 4.7** |

| **Viabilità** |
|---|
| **Ben servita** |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 381,68 |
| Provvigione reale totale | 16,29 | 6216,34 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **79,2** |
| Ripresa totale | | **1290** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 10 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *3%* | *Acero opalo* | *5%* | *Olmo campestre* | *2%* | *Pioppo tremulo* | *4%* |
| *Agrifoglio* | *2%* | *Cerro* | *1%* | | | | |
| *Faggio* | *61%* | *Pino nero* | *2%* | | | | |
| *Ontano napoletano* | *18%* | | | | | | |
| *Sorbo degli Ucc.* | *2%* | | | | | | |

Descrizione:

In questa particella, la fustaia giovane è al 35% e la fustaia adulta al 26%. Le perticaie giovani e adulte costituiscono rispettivamente il 16% e il 18%. Le fustaie mature sono al 4%, con un'assenza di novellame e spessina, segnalando una predominanza di piante in stadi avanzati.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 2,61 | 16,05 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,97 | 18,24 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 5,71 | 35,04 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 4,29 | 26,36 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,70 | 4,31 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 16,29 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso nelle latifoglie, salvaguardando le specie associate al faggio. Diradamento da moderato a forte nei gruppi di conifere per favorire l'insediamento e la progressiva affermazione delle latifoglie. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 16,29 | 79,2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 1290,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Ortiche, felce aquilina |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **102** | **Denominazione località** | **Vado dell'Asta** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 11,66 |
| Utile Ha | 10,68 |
| Altro-tare Ha | 0,98 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 20 |
| Particella | 10-12p-36p-37p-39 |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord | |
| Pendenza % | 29,04 | |
| Altitudine mt slm | min. 1204 | max 1286 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 422,68 |
| Provvigione reale totale | 10,68 | 4515,69 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **101,1** |
| Ripresa totale | | **1080** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 6 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *13%* | *Acero opalo* | *1%* | *Castagno* | *8%* |
| *Agrifoglio* | *2%* | *Pino nero* | *12%* | | |
| *Faggio* | *22%* | | | | |
| *Ontano napoletano* | *37%* | | | | |
| *Sorbo degli Ucc.* | *6%* | | | | |

Descrizione:

Qui, la copertura è fortemente dominata dalla fustaia giovane al 38% e dalla fustaia adulta al 48%. La perticaia giovane è al 12%, mentre le fustaie mature sono al 2%. Non sono presenti novellame e spessina, con una marcata prevalenza di formazioni avanzate.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,01 | 0,08 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,23 | 11,54 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 4,10 | 38,34 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 5,10 | 47,75 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,24 | 2,29 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 10,68 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso nelle latifoglie, salvaguardando le specie associate al faggio. Diradamento da moderato a forte nei gruppi di conifere per favorire l'insediamento e la progressiva affermazione delle latifoglie. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 10,68 | 101,1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 1080,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Ortica, felce aquilina |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **103** | **Denominazione località** | **Valle di Liero** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 14,73 |
| Utile Ha | 14,72 |
| Altro-tare Ha | 0,01 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 20 |
| Particella | 12p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord | |
| Pendenza % | 38,78 | |
| Altitudine mt slm | min. 1098 | max 1278 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.7** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata | |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata | |
| Anno di taglio | | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | | **0** |

| | Ha: | mc: | | Ha: | mc: |
|---|---|---|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 386,12 | Ripresa unitaria | | **82,9** |
| Provvigione reale totale | 14,72 | 5684,95 | Ripresa totale | | **1220** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 12 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *7%* | *Acero opalo* | *6%* | *Olmo campestre* | *2%* | *Abete bian* | *4%* | *Abete rosso* | *4%* |
| *Faggio* | *28%* | *Pino nero* | *13%* | | | *Castagno* | *5%* | *Douglasia* | *1%* |
| *Ontano napoletano* | *30%* | | | | | | | | |
| *Sorbo degli Ucc.* | *0%* | | | | | | | | |

Descrizione:

Questa particella ha una distribuzione più equilibrata con la fustaia giovane al 53% e la fustaia adulta al 13%. La perticaia giovane rappresenta solo l'1% e la perticaia adulta il 3%. Le fustaie mature sono al 3%, con l'assenza di novellame e spessina.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,14 | 0,92 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 4,42 | 30,04 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 7,86 | 53,39 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,85 | 12,59 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,45 | 3,05 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 14,72 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | Sì | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso dell'ontano e delle altre latifoglie, salvaguardando le specie associate al faggio. Diradamento da moderato a forte nei gruppi di conifere per favorire l'insediamento e la progressiva affermazione delle latifoglie. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 14,72 | 82,9 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 1220,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Rovo, rosa, biancospino |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Ortiche, felce, sambuco erbaceo |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **104** | **Denominazione località** | **Serro della Falasca** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 5,17 |
| Utile Ha | 5,14 |
| Altro-tare Ha | 0,03 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 20 |
| Particella | 12p-40 |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Est |
| Pendenza % | 27,14 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1226 | 1280 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| **Sottosuolo** |
|---|
| **Calcareo** |

| **Suolo** |
|---|
| **MAP 4.7** |

| **Viabilità** |
|---|
| **Ben servita** |

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata | |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata | |
| Anno di taglio | | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | | **0** |

| | Ha: | mc: | | Ha: | mc: |
|---|---|---|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 421,42 | Ripresa unitaria | | **87,6** |
| Provvigione reale totale | 5,14 | 2164,26 | Ripresa totale | | **450** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 1 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Agrifoglio* | *26%* | *Pino nero* | *26%* | *Abete rosso* | *5%* |
| *Faggio* | *42%* | | | | |

Descrizione:

Le formazioni giovani dominano con il 53% di fustaia giovane e il 26% di fustaia adulta. La perticaia giovane è al 21%, mentre la perticaia adulta è assente. Non sono presenti novellame, spessina e fustaie mature, concentrandosi quindi sulle fasi giovanili.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,08 | 21,08 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,72 | 52,99 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,33 | 25,93 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 5,14 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso dell'ontano e delle altre latifoglie, salvaguardando le specie associate al faggio. Diradamento da moderato a forte nei gruppi di conifere per favorire l'insediamento e la progressiva affermazione delle latifoglie. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 5,14 | 87,6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 450,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **105** | **Denominazione località** | **Serro della Falasca** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 13,94 |
| Utile Ha | 13,10 |
| Altro-tare Ha | 0,84 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 20 |
| Particella | 12p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest |
| Pendenza % | 41,26 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1100 | 1344 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 378,15 |
| Provvigione reale totale | 13,10 | 4953,33 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **101,5** |
| Ripresa totale | | **1330** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 6 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *1%* | *Acero opalo* | *2%* | *Castagno* | *15%* |
| *Agrifoglio* | *1%* | *Pino nero* | *28%* | | |
| *Faggio* | *35%* | | | | |
| *Ontano napoletano* | *15%* | | | | |
| *Sorbo degli Ucc.* | *4%* | | | | |

Descrizione:

Questa particella presenta una copertura abbastanza bilanciata tra perticaie giovani e adulte (8% e 31% rispettivamente), e fustaie giovani e adulte (31% e 17%). La presenza di fustaie mature è al 13%, senza novellame e spessina.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,06 | 8,07 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 4,05 | 30,93 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 4,07 | 31,06 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,26 | 17,25 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 1,06 | 8,06 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,45 | 3,41 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,16 | 1,22 |
| **Totale** | 13,10 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso dell'ontano e delle altre latifoglie, salvaguardando le specie associate al faggio. Diradamento da moderato a forte nei gruppi di conifere per favorire l'insediamento e la progressiva affermazione delle latifoglie. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 13,10 | 101,5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 1330,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, ortiche, lamponi, felce aquilina |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **106** | **Denominazione località** | **Calvelluzzo** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 3,04 |
| Utile Ha | 3,04 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 20 |
| Particella | 12p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord-Est | |
| Pendenza % | 39,88 | |
| Altitudine mt slm | min. 1122 | max 1272 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.7** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata | |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata | |
| Anno di taglio | | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | | **0** |

| | Ha: | mc: | | Ha: | mc: |
|---|---|---|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 763,20 | Ripresa unitaria | | **164,7** |
| Provvigione reale totale | 3,04 | 2317,22 | Ripresa totale | | **500** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 1 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

*Faggio* *100%*

Descrizione:

Predomina la fustaia matura con l'86%, seguita da una bassa percentuale di fustaia giovane (7%) e perticaie (1% ciascuna). Non sono presenti novellame e spessina, con una struttura forestale orientata verso le formazioni mature.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,02 | 0,78 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,18 | 6,06 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,21 | 6,98 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,47 | 15,48 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 1,08 | 35,65 |
| Fustaie mature h >32 m | 1,06 | 35,05 |
| **Totale** | 3,04 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 3,04 | 164,7 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 500,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Assente |
| Specie prevalenti: | – |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Ciclamino, rovo, graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **113b** | **Denominazione località** | **Tronola** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 0,00 |
| Utile Ha | 8,04 |
| Altro-tare Ha | -8,04 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 19;25 |
| Particella | 36-39-287-288 ; 1p-3-4-5-6-12p-14-15-16 |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Ovest |
| Pendenza % | 36,96 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | #N/D |
| Classe cronologica o diametrica | #N/D |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 0,00 |
| Provvigione reale totale | 8,04 | 0,00 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| | |

| Descrizione: |
|---|
| 0 |

**Tipologie strutturali**

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,30 | 3,68 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,42 | 17,64 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,05 | 38,01 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,53 | 31,42 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,62 | 7,71 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,10 | 1,25 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,02 | 0,28 |
| **Totale** | 8,04 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

**Interventi gestionali**

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 8,04 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| Copertura: | #N/D |
|---|---|
| Specie prevalenti: | #N/D |

**STRATO ERBACEO**

| Copertura: | #N/D |
|---|---|
| Specie prevalenti: | #N/D |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **114** | **Denominazione località** | **Tronola** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 16,61 |
| Utile Ha | 12,41 |
| Altro-tare Ha | 4,20 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 20;25 |
| Particella | 1p-11p-12p ; 1p-6-12p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Ovest | |
| Pendenza % | 36,04 | |
| Altitudine mt slm | min. 1174 | max 1391 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 322,59 |
| Provvigione reale totale | 12,41 | 4003,76 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 10 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *2%* | *Pino nero* | *1%* |
| *Agrifoglio* | *9%* | | |
| *Faggio* | *75%* | | |
| *Ontano napoletano* | *13%* | | |

Descrizione:

Le fustaie adulte rappresentano il 28% della copertura nella particella 114, seguite dalle fustaie mature al 23% e dalle fustaie giovani al 20%. Le perticaie adulte e giovani sono entrambe al 9%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,16 | 9,37 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 3,53 | 28,42 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,49 | 20,07 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,41 | 19,39 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 2,07 | 16,65 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,76 | 6,10 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 12,41 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 12,41 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee e felci |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **116** | **Denominazione località** | **Lagarello** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 5,06 |
| Utile Ha | 5,04 |
| Altro-tare Ha | 0,02 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 20 |
| Particella | 12p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest | |
| Pendenza % | 35,71 | |
| Altitudine mt slm | min. 1185 | max 1301 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.7** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata | |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata | |
| Anno di taglio | | **2028-2030** |
| Età media all'anno di taglio | | **0** |

| | Ha: | mc: | | Ha: | mc: |
|---|---|---|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 456,88 | Ripresa unitaria | | **67,5** |
| Provvigione reale totale | 5,04 | 2301,33 | Ripresa totale | | **340** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 4 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

*Faggio* *79%* *Acero opalo* *12%*

*Ontano napoletano* *9%*

Descrizione:

Le fustaie giovani dominano nella particella 116, coprendo il 35%. Seguono le fustaie adulte al 21% e le fustaie mature al 23%. Le perticaie adulte e giovani sono entrambe al 4%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,23 | 4,48 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,75 | 34,80 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,05 | 20,87 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,83 | 16,42 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,89 | 17,59 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,18 | 3,48 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,12 | 2,36 |
| **Totale** | 5,04 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2028-2030 | 5,04 | 67,5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 340,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Limitatamente presente |
| Specie prevalenti: | Ginestra, rovo, biancospino |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Abbondante |
| Specie prevalenti: | Graminacee, sambuco erbaceo, rovo |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar

RDM STUDIO




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali

RDM STUDIO




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar

RDM STUDIO




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar

RDM STUDIO



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **119** | **Denominazione località** | **Corsa dei Cavalli** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 11,22 |
| Utile Ha | 10,00 |
| Altro-tare Ha | 1,22 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 20 |
| Particella | 12p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud | |
| Pendenza % | 29,73 | |
| Altitudine mt slm | min. 1351 | max 1474 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 311,78 |
| Provvigione reale totale | 10,00 | 3117,87 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 4 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | | | |
|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *2%* | *Pino nero* | *23%* |
| *Agrifoglio* | *1%* | | |
| *Faggio* | *48%* | | |
| *Maggiociondolo* | *1%* | | |
| *Ontano napoletano* | *25%* | | |

Descrizione:

La copertura forestale della particella 119 è dominata dalle fustaie giovani al 31% e dalle fustaie adulte al 33%. Le perticaie adulte rappresentano il 21%, mentre le fustaie mature sono quasi assenti con solo l'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 2,15 | 21,49 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 3,07 | 30,73 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,27 | 32,69 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,44 | 14,35 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,07 | 0,74 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 10,00 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 10,00 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, felce, eringio, sambuco erbaceo, rovo |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **120** | **Denominazione località** | **Corsa dei Cavalli** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 15,81 |
| Utile Ha | 14,65 |
| Altro-tare Ha | 1,16 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 20 |
| Particella | 12p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Est |
| Pendenza % | 33,74 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1325 | 1465 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.7** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata | |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata | |
| Anno di taglio | | **0** |
| Età media all'anno di taglio | | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 322,73 |
| Provvigione reale totale | 14,65 | 4727,15 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 11 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *0%* | *Acero opalo* | *1%* | *Pioppo tremulo* | *2%* |
| *Agrifoglio* | *0%* | *Cerro* | *0%* | | |
| *Faggio* | *26%* | *Pino nero* | *6%* | | |
| *Maggiociondolo* | *1%* | | | | |
| *Ontano napoletano* | *64%* | | | | |

Descrizione:

La perticaia giovane copre il 31% della superficie nella particella 120, seguita dalle fustaie giovani al 27% e dalle fustaie adulte al 15%. Le perticaie adulte rappresentano il 26% della copertura.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 3,87 | 26,41 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 4,60 | 31,41 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,90 | 26,62 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,25 | 15,35 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,03 | 0,22 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 14,65 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 14,65 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Ortica, sambuco, lampone, felce aquilina, graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **121** | **Denominazione località** | **Valle del Ghiro** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 9,15 |
| Utile Ha | 9,14 |
| Altro-tare Ha | 0,01 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 20 |
| Particella | 12p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord |
| Pendenza % | 34,44 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1255 | 1347 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| **Sottosuolo** |
|---|
| **Calcareo** |

| **Suolo** |
|---|
| **MAP 4.7** |

| **Viabilità** |
|---|
| **Ben servita** |

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata | |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata | |
| Anno di taglio | | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | | **0** |

| | Ha: | mc: | | Ha: | mc: |
|---|---|---|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 437,03 | Ripresa unitaria | | **102,9** |
| Provvigione reale totale | 9,14 | 3992,78 | Ripresa totale | | **940** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 8 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Faggio* | *39%* | *Acero opalo* | *1%* | *Abete bian* | *4%* |
| *Ontano napoletano* | *32%* | *Pino nero* | *23%* | | |
| *Sorbo degli Ucc.* | *1%* | | | | |

Descrizione:

Le fustaie mature coprono il 31% della superficie nella particella 121, seguite dalle fustaie adulte al 35% e dalle fustaie giovani al 29%. Le perticaie adulte rappresentano il 4% della copertura.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,01 | 0,07 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,69 | 29,47 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,24 | 35,42 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,82 | 30,90 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,38 | 4,14 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 9,14 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 9,14 | 102,9 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 940,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Rovo, biancospino, rosa |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Abbondante |
| Specie prevalenti: | Ortica, felce, sambuco, graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **122** | **Denominazione località** | **Coste del Calvello** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 10,92 |
| Utile Ha | 10,50 |
| Altro-tare Ha | 0,42 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 20 |
| Particella | 12p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest |
| Pendenza % | 39,40 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1206 | 1359 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 415,56 |
| Provvigione reale totale | 10,50 | 4364,80 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 6 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

*Faggio* *58%* *Pino nero* *29%* *Olmo campestre* *1%* *Castagno* *3%*
*Ontano napoletano* *9%*

Descrizione:

La fustaia giovane rappresenta il 45% della copertura nella particella 122, seguita dalle fustaie adulte al 12% e dalle fustaie mature all'11%. Le perticaie adulte e giovani sono rispettivamente al 30% e al 2%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,19 | 1,79 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 3,10 | 29,56 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 4,76 | 45,30 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,26 | 12,03 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,62 | 5,89 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,56 | 5,30 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,01 | 0,12 |
| **Totale** | 10,50 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 10,50 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai, rovo, ortica, rosa, maggiociondolo, biancospino |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, ortica, sambuco, felce |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **124** | **Denominazione località** | **Orno** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 9,53 |
| Utile Ha | 9,53 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 17;18;23 |
| Particella | 101-163p ; 11p ; 1p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest | |
| Pendenza % | 33,82 | |
| Altitudine mt slm | min. 1011 | max 1174 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 347,06 |
| Provvigione reale totale | 9,53 | 3308,37 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 4 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Faggio* | *6%* | *Acero opalo* | *30%* | *Orniello* | *2%* | *Ciliegio selvatico* | *0%* |
| *Ontano napoletano* | *0%* | *Carpino nero* | *53%* | *Roverella* | *1%* | | |
| | | *Cerro* | *7%* | | | | |

Descrizione:

La perticaia adulta copre il 33% della superficie nella particella 124, seguita dalle fustaie giovani al 22% e dalle fustaie adulte all'11%. Le perticaie giovani rappresentano il 27% e le spessine il 6%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,55 | 5,81 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 2,56 | 26,90 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 3,19 | 33,43 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,11 | 22,14 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,08 | 11,31 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,04 | 0,40 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 9,53 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 9,53 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Coronilla, erica, biancospino, rosa |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **130** | **Denominazione località** | **Pietra di Alessio** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 11,27 |
| Utile Ha | 2,62 |
| Altro-tare Ha | 8,65 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 18 |
| Particella | 11p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud |
| Pendenza % | 37,24 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1054 | 1276 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 50,12 |
| Provvigione reale totale | 2,62 | 131,20 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La perticaia adulta rappresenta la componente dominante con il 54% della superficie, seguita dalla perticaia giovane con il 33% e dalla fustaia giovane con il 12%. Il resto sono formazioni erbacce o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,12 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,89 | 33,88 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,43 | 54,50 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,30 | 11,51 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 2,62 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 2,62 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Assente |
| Specie prevalenti: | - |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Prevalente |
| Specie prevalenti: | Graminacee, cardi, carlina, cerastio |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **132** | **Denominazione località** | **Fontana di Sazzano** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 18,37 |
| Utile Ha | 13,41 |
| Altro-tare Ha | 4,96 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 20;25 |
| Particella | 11p-12p-13p ; 12p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud | |
| Pendenza % | 33,56 | |
| Altitudine mt slm | min. 1034 | max 1456 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 297,18 |
| Provvigione reale totale | 13,41 | 3986,23 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 6 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Faggio* | *66%* |
| *Ontano napoletano* | *34%* |

Descrizione:

La fustaia giovane copre il 41% della superficie, seguita dalle fustaie adulte con il 22% e dalle fustaie mature con il 13%. Le perticaie adulte coprono il 23%. Il resto sono formazioni erbacce o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,01 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,07 | 0,49 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 3,06 | 22,79 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 5,50 | 40,98 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,96 | 22,08 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 1,72 | 12,85 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,11 | 0,80 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 13,41 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 13,41 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Abbondante |
| Specie prevalenti: | Graminacee, sambuco, felce aquilina |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **136** | **Denominazione località** | **Corsa dei Cavalli** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 9,47 |
| Utile Ha | 9,46 |
| Altro-tare Ha | 0,01 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 20 |
| Particella | 12p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest |
| Pendenza % | 33,70 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1327 | 1396 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 472,77 |
| Provvigione reale totale | 9,46 | 4472,00 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **93,0** |
| Ripresa totale | | **880** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 4 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Faggio* | *57%* | *Acero opalo* | *9%* | *Orniello* | *1%* |
| *Maggiociondolo* | *2%* | *Pino nero* | *7%* | | |
| *Ontano napoletano* | *23%* | | | | |

Descrizione:

La perticaia adulta copre il 27% della superficie, seguita dalle fustaie giovani con il 31% e dalle fustaie adulte con il 24%. Le perticaie giovani occupano il 3%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,26 | 2,75 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,53 | 26,79 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,94 | 31,09 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,29 | 24,22 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 1,43 | 15,14 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 9,46 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento moderato dal basso dell'ontano e delle altre latifoglie, salvaguardando le specie associate al faggio. Diradamento da moderato a forte nei gruppi di conifere per favorire l'insediamento e la progressiva affermazione delle latifoglie. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 9,46 | 93,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 880,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Rovo, rosa, maggiociondolo |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, ortiche (sotto ontano), assente nelle faggete |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **137a** | **Denominazione località** | **Monte Calvello** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 9,80 |
| Utile Ha | 9,62 |
| Altro-tare Ha | 0,18 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 20 |
| Particella | 12 |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Ovest |
| Pendenza % | 36,87 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1341 | 1457 |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

Giacitura

Manufatti

Risorse idriche

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 367,15 |
| Provvigione reale totale | 9,62 | 3532,00 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La perticaia adulta rappresenta il 43% della superficie, seguita dalla fustaia giovane con il 30% e dalla fustaia adulta con il 16%. La perticaia giovane occupa l'11%. Il resto sono formazioni erbacce o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,07 | 11,11 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 4,13 | 42,91 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,87 | 29,81 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,55 | 16,13 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,04 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 9,62 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 9,62 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | - |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | Graminacee (30% superficie) |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **138** | **Denominazione località** | **Monte Calvello** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 9,58 |
| Utile Ha | 0,54 |
| Altro-tare Ha | 9,04 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 20 |
| Particella | 12p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud | |
| Pendenza % | 39,16 | |
| Altitudine mt slm | min. 1377 | max 1577 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 20,00 |
| Provvigione reale totale | 0,54 | 10,88 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La perticaia giovane copre il 97% della superficie, mentre la perticaia adulta occupa il restante 3%. Il resto sono formazioni erbacce o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,53 | 97,42 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,01 | 2,58 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 0,54 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 0,54 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Assente |
| Specie prevalenti: | - |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | abbondante |
| Specie prevalenti: | Graminacee, eringio (100%) |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **153** | **Denominazione località** | **Aria della Preda** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 42,34 |
| Utile Ha | 18,19 |
| Altro-tare Ha | 24,15 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 20;25 |
| Particella | 12p-13p ; 10p-12p-21p-23p-24p-31p-33p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud | |
| Pendenza % | 38,65 | |
| Altitudine mt slm | min. 1268 | max 1471 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.7** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata | |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata | |
| Anno di taglio | | **0** |
| Età media all'anno di taglio | | **0** |

| | Ha: | mc: | | Ha: | mc: |
|---|---|---|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 131,25 | Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Provvigione reale totale | 18,19 | 2388,08 | Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

Le perticaie adulte coprono il 43% della superficie, seguite dalle fustaie mature con il 40% e dalle fustaie giovani con il 12%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,02 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,98 | 5,38 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 7,77 | 42,71 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 7,26 | 39,92 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,18 | 11,97 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 18,19 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 18,19 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai, biancospino |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Felce, ginestra, sambuco |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **154** | **Denominazione località** | **Sazzano** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 41,14 |
| Utile Ha | 13,92 |
| Altro-tare Ha | 27,22 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 20 |
| Particella | 12p-13p-14p-15-16 |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud |
| Pendenza % | 33,07 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1174 | 1465 |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.7** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata | |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata | |
| Anno di taglio | | **0** |
| Età media all'anno di taglio | | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 137,49 |
| Provvigione reale totale | 13,92 | 1914,20 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|

Descrizione:

Le fustaie mature coprono il 40% della superficie, seguite dalle fustaie adulte con il 39%, dalle fustaie giovani con il 16%, dalle perticaie adulte con l'1% e dalle formazioni erbacce o arbustive con il 5%. Non ci sono altre formazioni.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,01 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,01 | 0,05 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 6,52 | 46,82 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 6,10 | 43,84 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,29 | 9,29 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 13,92 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 13,92 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| Copertura: | Scarsa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | Ginestra, rovo, agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| Copertura: | Diffusa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | Graminacee, sambuco |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **155** | **Denominazione località** | **Porcacciolo** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 2,94 |
| Utile Ha | 2,92 |
| Altro-tare Ha | 0,02 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 23 |
| Particella | 33p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest |
| Pendenza % | 41,25 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 875 | 977 |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

Giacitura

Manufatti

Risorse idriche

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 292,31 |
| Provvigione reale totale | 2,92 | 852,51 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

Le spessine rappresentano il 23% della superficie, seguite dalle perticaie giovani con il 28%, dalle perticaie adulte con il 38%, dalle fustaie giovani con il 5%, dalle fustaie adulte con il 4% e dalle fustaie mature con il 2%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,66 | 22,59 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,83 | 28,38 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,10 | 37,72 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,15 | 5,04 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,11 | 3,94 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,07 | 2,33 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 2,92 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 2,92 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai, cisti |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **158** | **Denominazione località** | **Porcacciolo** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 4,24 |
| Utile Ha | 2,42 |
| Altro-tare Ha | 1,82 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 23 |
| Particella | 33p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Ovest |
| Pendenza % | 40,04 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 971 | 1230 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 185,23 |
| Provvigione reale totale | 2,42 | 448,45 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

Le spessine dominano la particella 158, coprendo il 25% della superficie. Seguono le perticaie giovani con il 27%, le perticaie adulte con il 17%, le fustaie giovani con il 13%, le fustaie adulte con il 10% e le fustaie mature con il 9%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,60 | 24,96 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,64 | 26,62 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,40 | 16,56 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,31 | 12,66 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,25 | 10,33 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,21 | 8,87 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 2,42 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 2,42 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Cisti, ginestra dei carbonai, erica arborea, rovi, rose |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **176** | **Denominazione località** | **Piano di Sazzano** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 14,85 |
| Utile Ha | 12,91 |
| Altro-tare Ha | 1,94 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 25 |
| Particella | 12p-45p-49p-50p-51p-52p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest |
| Pendenza % | 22,02 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1261 | 1315 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 406,09 |
| Provvigione reale totale | 12,91 | 5242,85 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 8 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

*Faggio* 32% *Acero opalo* 2%
*Ontano napoletano* 66%

Descrizione:

La fustaia matura copre il 27% della superficie della particella 176, con la fustaia adulta al 48%, la fustaia giovane al 14% e la perticaia adulta al 14%. Le formazioni erbacee o arbustive coprono il 19%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,79 | 13,90 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 6,23 | 48,25 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,39 | 10,81 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 2,38 | 18,44 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 1,11 | 8,60 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 12,91 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 12,91 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Ginestra (localizzata ai margini arborei) |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Abbondante |
| Specie prevalenti: | Graminacee, cardo, sambuco, digitalis, cerastium |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **267** | **Denominazione località** | **Vallone Cupo** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 16,68 |
| Utile Ha | 16,07 |
| Altro-tare Ha | 0,61 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 27 |
| Particella | 3p-151p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Ovest | |
| Pendenza % | 43,46 | |
| Altitudine mt slm | min. 904 | max 1378 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 425,41 |
| Provvigione reale totale | 16,07 | 6838,39 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La spessina copre il 24% della superficie, seguita dalla perticaia giovane con un altro 24%. La fustaia giovane occupa il 18% e la fustaia adulta il 17%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 2,71 | 16,89 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 3,55 | 22,09 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,96 | 24,66 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,84 | 17,66 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 2,15 | 13,36 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,71 | 4,39 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,15 | 0,94 |
| **Totale** | 16,07 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 16,07 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | rovo, coronilla, ginestra |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | diffusa |
| Specie prevalenti: | graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **312** | **Denominazione località** | **Gioco dei Colombi** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 3,45 |
| Utile Ha | #N/D |
| Altro-tare Ha | #N/D |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 19;25;31;32 |
| Particella | 43p-323p ; 9p-12p ; 265p ; 14p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | 0 | |
| Pendenza % | #N/D | |
| Altitudine mt slm | min. 0 | max 0 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 0,00 |
| Provvigione reale totale | #N/D | #N/D |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| | |

| Descrizione: |
|---|
| 0 |

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | #N/D | #N/D |
| Spessine h 4-8 m | #N/D | #N/D |
| Perticaie giovani h 8-12 m | #N/D | #N/D |
| Perticaie adulte h 12-16 m | #N/D | #N/D |
| Fustaie giovani h 16-20 m | #N/D | #N/D |
| Fustaie mature h 20-24 m | #N/D | #N/D |
| Fustaie mature h 24-28 m | #N/D | #N/D |
| Fustaie mature h 28-32 m | #N/D | #N/D |
| Fustaie mature h >32 m | #N/D | #N/D |
| **Totale** | #N/D | #N/D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | #N/D | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | #N/D | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| Copertura: | diffusa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | rovo, agrifoglio, ligustro |

**STRATO ERBACEO**

| Copertura: | abbondante |
|---|---|
| Specie prevalenti: | graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **314** | **Denominazione località** | **Valle dell'Ulivo** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 15,06 |
| Utile Ha | 4,25 |
| Altro-tare Ha | 10,81 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 20 |
| Particella | 12p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Est |
| Pendenza % | 33,03 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1074 | 1274 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 69,14 |
| Provvigione reale totale | 4,25 | 293,87 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

Nella particella 314, la fustaia matura predomina, coprendo il 61% della superficie. Segue la fustaia adulta, che occupa il 35%, mentre la perticaia giovane rappresenta il 3%. Il restante 1% è costituito da formazioni erbacee o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 2,60 | 61,19 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,52 | 35,66 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,13 | 3,15 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 4,25 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 4,25 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | assente |
| Specie prevalenti: | - |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | diffusa |
| Specie prevalenti: | graminacee, felce |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **315** | **Denominazione località** | **Serrone Pizzuto** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 8,01 |
| Utile Ha | 3,25 |
| Altro-tare Ha | 4,76 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 19;31 |
| Particella | 323p ; 264-265p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest |
| Pendenza % | 32,27 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1299 | 1474 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| **Sottosuolo** |
|---|
| **Calcareo** |

| **Suolo** |
|---|
| **MAP 4.7** |

| **Viabilità** |
|---|
| **Ben servita** |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 120,82 |
| Provvigione reale totale | 3,25 | 392,13 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La particella 315 vede la fustaia adulta come la copertura principale, con il 42%. La fustaia giovane copre il 35%, seguita dalla perticaia giovane all'8% e dalla fustaia matura al 5%. Il restante 1% è occupato da formazioni erbacee o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,13 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,27 | 8,30 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,36 | 41,96 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,15 | 35,45 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,30 | 9,15 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,16 | 5,02 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 3,25 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 3,25 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | assente |
| Specie prevalenti: | agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | diffusa |
| Specie prevalenti: | graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **C** |
|---|---|

| **Particella** | **316** | **Denominazione località** | **Il Casone** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 2,32 |
| Utile Ha | 2,17 |
| Altro-tare Ha | 0,15 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 18 |
| Particella | 11p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Ovest |
| Pendenza % | 22,36 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1050 | 1066 |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **PIM 5.3** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata | |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata | |
| Anno di taglio | | **0** |
| Età media all'anno di taglio | | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 268,40 |
| Provvigione reale totale | 2,17 | 583,68 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La perticaia adulta domina nella particella 316, coprendo il 66% della superficie, seguita dalla fustaia giovane al 34%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,43 | 65,65 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,75 | 34,35 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 2,17 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservativa | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 2,17 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | per lo più assente |
| Specie prevalenti: | rovo |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | diffusa |
| Specie prevalenti: | graminacee, felce |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar

SCHEMA 2

# PARTICELLE FORESTALI DELLA CLASSE ECONOMICA/COMPRESA "FD"

**Art. 90, comma 2, del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Particella forestale | | | | | | Dati catastali | | Area protetta - zonizzazione | | | Aree percorse dal Fuoco | | *Vincoli | Dati Dendrometrici | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località | n° | Superficie in Ha | | | | Foglio | Particella | A | B | C | | | | Densità | | Pr unitaria mc/Ha | Pr totale mc | ***Pp unitaria mc/Ha | ***Pp totale mc | Incremento (medio ) mc | Età all'anno di redazione del PGF |
| | | Totale | Bosco | Pascolo - prati - radure | Altro | | | Ha | Ha | Ha | Anno | Ha | | A.B. unitaria mq/Ha | **Soggetti n°/Ha | | | | | | |
| Tronola | 112 | 13,77 | 13,33 | 0,44 | | 25 | 8p-9p-12p | | 1,55 | 12,22 | | | a/b/c/d/g/i/m | 44,20 | 555 | 503,78 | 6.715,5 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 32 | 14p | | | | | | | | | | | | | | |
| Tronola | 113a | 7,06 | 7,06 | 0,00 | | 25 | 7-8p-12p | | 2,98 | 4,08 | | | a/b/c/d/g/i/m | 31,31 | 544 | 425,22 | 3.002,1 | | | | indeterminata |
| Tronola | 131 | 13,65 | 13,52 | 0,13 | | 25 | 12p | | 13,51 | 0,14 | | | a/b/c/d/g/i/m | 37,04 | 1048 | 427,59 | 5.780,0 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 32 | 14p | | | | | | | | | | | | | | |
| Cervarolo di Laceno | 148 | 25,72 | 25,72 | 0,00 | | 25 | 12p | | 15,08 | 10,64 | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,89 | 751 | 629,62 | 16.192,7 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 32 | 14p-49 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cervarolo di Laceno | 171 | 18,14 | 18,11 | 0,03 | | 25 | 12p | | 16,33 | 1,81 | | | a/b/c/d/g/i/m | 51,53 | 858 | 752,57 | 13.627,7 | | | | indeterminata |
| Cervarolo di Laceno | 195 | 23,44 | 23,27 | 0,17 | | 25 | 12p | | 17,55 | 5,89 | | | a/b/c/d/g/i/m | 46,02 | 812 | 661,76 | 15.396,8 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 31 | 18p | | | | | | | | | | | | | | |
| Cervarolo di Laceno | 196 | 25,49 | 25,48 | 0,01 | | 25 | 12p | | 21,96 | 3,53 | | | a/b/c/d/g/i/m | 37,78 | 462 | 544,78 | 13.880,2 | | | | indeterminata |
| Apeticchia | 205a | 22,40 | 22,34 | 0,06 | | 23 | 29p | | 21,55 | 0,85 | | | a/b/c/d/g/i/m | 56,97 | 1832 | 597,59 | 13.348,9 | | | 5,98 | 90-110 |
| | | | | | | 27 | 151p | | | | | | | | | | | | | | |
| Terremoto | 206a | 34,63 | 34,51 | 0,12 | | 23 | 29p-4-5-6-7-151-157 | | 2,21 | 32,42 | | | a/b/c/d/g/i/m | 58,62 | 2216 | 591,67 | 20.416,9 | | | | indeterminata |
| Terremoto | 206b | 24,86 | 24,85 | 0,01 | | 23 | 29p | | | | | | a/b/c/d/g/i/m | 55,06 | 1209 | 754,96 | 18.760,0 | | | 5,39 | 130-150 |
| | | | | | | 24 | 330p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 27 | 151p | | 24,86 | | | | | | | | | | | | |
| Terremoto | 206c | 27,61 | 27,28 | 0,33 | | 24 | 38-39-40-54-55-56-57-58-59-60-61-330p | | 27,61 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 52,63 | 2063 | 527,20 | 14.383,4 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 27 | 8-9-151p | | | | | | | | | | | | | | |
| Terremoto | 207a | 23,11 | 23,11 | 0,00 | | 24 | 21-22-23-24-33-34-35- | | | 23,11 | | | a/b/c/d/g/i/m | 50,57 | 686 | 759,80 | 17.557,5 | | | 5,43 | 130-150 |
| Terremoto | 207b | 22,95 | 22,88 | 0,07 | | 24 | 301-310-330p | | 0,13 | 22,82 | | | a/b/c/d/g/i/m | 51,89 | 985 | 693,26 | 15.859,0 | | | 4,95 | 130-150 |
| Cervarolo di Laceno | 210 | 13,91 | 13,90 | 0,01 | | 25 | 12p | 7,82 | 6,09 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 55,56 | 841 | 563,76 | 7.838,0 | | | | indeterminata |
| Sette Valli | 226 | 8,69 | 8,45 | 0,24 | | 24 | 62-330p | | 0,38 | 8,31 | | | a/b/c/d/g/i/m | 62,49 | 2266 | 636,70 | 5.379,2 | | | 7,96 | 70-90 |
| | | | | | | 27 | 151p | | | | | | | | | | | | | | |
| Sette Valli | 227 | 11,15 | 11,06 | 0,09 | | 24 | 42-43-44-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-319-320-322-330p-332p | | 0,17 | 10,98 | | | a/b/c/d/g/i/m | 55,17 | 1540 | 579,04 | 6.403,0 | | | 5,79 | 90-110 |
| Coste di Cervialto | 234 | 14,85 | 14,01 | 0,84 | | 25 | 12p-13p | 14,85 | | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 389,95 | 5.464,5 | | | | indeterminata |
| Coste di Cervialto | 237 | 10,24 | 10,24 | 0,00 | | 25 | 12p | 10,24 | | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 456,15 | 4.669,4 | | | | indeterminata |
| Valle Giamberardino | 239 | 11,36 | 11,29 | 0,07 | | 25 | 12p | 11,36 | | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 452,72 | 5.109,8 | | | | indeterminata |
| Coste di Cervialto | 264 | 16,01 | 16,00 | 0,01 | | 26 | 1p-2p | 16,01 | | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 399,11 | 6.385,5 | | | | indeterminata |
| Coste di Cervialto | 265 | 14,58 | 14,36 | 0,22 | | 25 | 12p-13p | 14,58 | | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 422,57 | 6.069,6 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 26 | 1p-2p | | | | | | | | | | | | | | |
| Coste di Cervialto | 303 | 9,19 | 9,18 | 0,01 | | 26 | 1p-2p | 9,19 | | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 486,20 | 4.463,0 | | | | indeterminata |
| **TOTALI** | | **392,81** | **389,93** | **2,88** | | | | | | | | | | | | | **226.702,82** | | **0,00** | | |

* = Vincoli:

| | |
|---|---|
| a | Idrogeologico (L. 3267/1923) |
| b | Autorità di Bacino (L. 18 maggio 1989, n. 183 – L. R. 07/02/1994, n. 8) |
| c | Uso civico (L. 1766/1927 – L. R. 11/1981) |
| d | Bellezze naturali (L. 1497/1939 transitata nel D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) |
| e | Piani territoriali paesaggistici (ai sensi dell'art. 149 del D.lgs. 29/10/99, n. 490) |
| f | Parco Nazionale (L. 6 dicembre 1991, n. 394) |
| g | Parco Regionale (L. R. 1 settembre 1993, n. 33) |
| h | Riserva, altro (L. 6 dicembre 1991, n. 394) |
| i | Legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 21 novembre 2000, n. 353) |
| l | Conflitti di proprietà e/o di confinazione tra le aree oggetto di pianificazione ed altri Soggetti privati e/o pubblici |
| m | Rete Natura 2000 |
| n | Altro - specificare |

** = Fustaie e fustaie transitorie - *n° soggetti/Ha* ; ceduo - *n° polloni/Ha e n° matricine/Ha*

*** = Se impossibilitati a calcolare la Provvigione potenziale/normale fornire motivazione

Pr = Provvigione reale

Pp = Provvigione potenziale

SCHEMA 3

# PIANO DEI TAGLI - CLASSE ECONOMICA/COMPRESA "FD"

**Art. 91, comma 2, e art. 97 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno di intervento | Particella forestale | | | | Area protetta - zonizzazione | | | *Vincoli | Provvigione | | | Alto Fusto - Cedui in conversione | | Descrizione Intervento | Saggio di Utilizzazione % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A | B | C | | | | | | | | |
| | n° | Superficie totale Ha | Superficie utile boscata Ha | Età al taglio | Ha | Ha | Ha | | Provvigione unitaria mc | Provvigione totale mc | Provvigione totale post intervento mc | Ripresa unitaria mc | Ripresa totale mc | | |
| 2026-2028 | 113a | 7,06 | 7,06 | | | 2,98 | 4,08 | a/b/c/d/g/i/m | 425,22 | 3.002,08 | 2.330,64 | 95,10 | 671 | Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 4-6 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere selezionate preferibilmente in tratti di fustaia matura. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti | 22,37 |
| 2026-2028 | 205a | 22,40 | 22,40 | 90-110 | | 21,55 | 0,85 | a/b/c/d/g/i/m | 595,93 | 13.348,90 | 10.457,85 | 129,06 | 2.891 | Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 10-12 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere distribuite uniformemente nella particella. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | 21,66 |
| 2026-2028 | 207a | 23,11 | 23,11 | 130-150 | | | 23,11 | a/b/c/d/g/i/m | 759,74 | 17.557,50 | 13.626,51 | 170,10 | 3.931 | Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 16-18 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere selezionate preferibilmente nei tratti di fustaia matura, con almeno 2 gruppi situati nelle zone di fustaia a monte. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | 22,39 |

SCHEMA 3

# PIANO DEI TAGLI - CLASSE ECONOMICA/COMPRESA "FD"

**Art. 91, comma 2, e art. 97 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno di intervento | Particella forestale | | | | Area protetta - zonizzazione | | | *Vincoli | Provvigione | | | Alto Fusto - Cedui in conversione | | Descrizione Intervento | Saggio di Utilizzazione % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A | B | C | | | | | | | | |
| | n° | Superficie totale Ha | Superficie utile boscata Ha | Età al taglio | Ha | Ha | Ha | | Provvigione unitaria mc | Provvigione totale mc | Provvigione totale post intervento mc | Ripresa unitaria mc | Ripresa totale mc | | |
| 2026-2028 | 206a | 34,63 | 34,63 | | | 2,21 | 32,42 | a/b/c/d/g/i/m | 589,57 | 20.416,90 | 16.023,90 | 126,86 | 4.393 | Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 14-18 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere selezionate preferibilmente nei tratti di fustaia matura, con almeno 4 gruppi situati nelle zone di fustaia a monte. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | 21,52 |
| 2026-2028 | 206c | 27,61 | 24,34 | | | 27,61 | | a/b/c/d/g/i/m | 590,94 | 14.383,40 | 11.591,49 | 114,70 | 2.792 | Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 11-14 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere selezionate preferibilmente nei tratti di fustaia matura, con almeno 2 gruppi situati nelle zone di fustaia a monte. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | 19,41 |
| 2026-2028 | 206b | 24,86 | 24,86 | 130-150 | | 24,86 | | a/b/c/d/g/i/m | 754,63 | 18.760,00 | 14.555,99 | 169,11 | 4.204 | Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 18-20 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere distribuite uniformemente nella particella. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | 22,41 |

SCHEMA 3

# PIANO DEI TAGLI - CLASSE ECONOMICA/COMPRESA "FD"

**Art. 91, comma 2, e art. 97 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno di intervento | Particella forestale | | | | Area protetta - zonizzazione | | | *Vincoli | Provvigione | | | Alto Fusto - Cedui in conversione | | Descrizione Intervento | Saggio di Utilizzazione % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A | B | C | | | | | | | | |
| | n° | Superficie totale Ha | Superficie utile boscata Ha | Età al taglio | Ha | Ha | Ha | | Provvigione unitaria mc | Provvigione totale mc | Provvigione totale post intervento mc | Ripresa unitaria mc | Ripresa totale mc | | |
| 2029-2031 | 112 | 13,77 | 13,77 | | | 1,55 | 12,22 | a/b/c/d/g/i/m | 487,69 | 6.715,50 | 5.202,75 | 109,86 | 1.513 | Diradamento della pineta per favorire l'affermazione e l'insediamento del faggio. Il taglio potrà essere piuttosto intenso e assumere anche il carattere di un taglio di sgombero laddove il novellame è sufficientemente abbondante e affermato da garantire la perpetuazione del bosco. Nella faggeta, si eseguirà un taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 2-3 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere reperite soprattutto nelle zone di fustaia matura situate nel settore sud della particella. Si eseguirà inoltre un diradamento moderato dal basso nel resto della superficie interessata dal faggio, con salvaguardia degli alberi migliori per dimensioni e portamento nella zona adiacente all'ex caserma. | 22,53 |
| 2029-2031 | 171 | 18,14 | 18,14 | | | 16,33 | 1,81 | a,g,l | 751,25 | 13.627,70 | 13.627,70 | 168,49 | 3.056 | Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 12 -14 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere distribuite uniformemente nella particella. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | 22,43 |
| 2029-2031 | 131 | 13,65 | 13,65 | | | 13,51 | 0,14 | a/b/c/d/g/i/m | 423,44 | 5.780,00 | 4.502,99 | 93,55 | 1.277 | Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 13-15 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere distribuite uniformemente nella particella. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | 22,09 |

SCHEMA 3

# PIANO DEI TAGLI - CLASSE ECONOMICA/COMPRESA "FD"

**Art. 91, comma 2, e art. 97 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno di intervento | Particella forestale | | | | Area protetta - zonizzazione | | | *Vincoli | Provvigione | | | Alto Fusto - Cedui in conversione | | Descrizione Intervento | Saggio di Utilizzazione % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A | B | C | | | | | | | | |
| | n° | Superficie totale Ha | Superficie utile boscata Ha | Età al taglio | Ha | Ha | Ha | | Provvigione unitaria mc | Provvigione totale mc | Provvigione totale post intervento mc | Ripresa unitaria mc | Ripresa totale mc | | |
| 2032-2035 | 207b | 22,95 | 22,95 | 135-155 | | 0,13 | 22,82 | a/b/c/d/g/i/m | 691,02 | 15.859,00 | 12.313,19 | 154,50 | 3.546 | Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 14-16 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere selezionate preferibilmente nei tratti di fustaia matura, con almeno 2 gruppi situati nelle zone di fustaia a monte. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | 22,36 |
| 2032-2035 | 195 | 23,44 | 23,44 | | | 17,55 | 5,89 | a/b/c/d/g/i/m | 656,86 | 15.396,80 | 11.928,10 | 147,98 | 3.469 | Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 16-18 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere distribuite uniformemente nella particella. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | 22,53 |
| 2032-2035 | 226 | 8,69 | 8,45 | 75-95 | | 0,38 | 8,31 | a/b/c/d/g/i/m | 636,59 | 5.379,20 | 4.891,36 | 57,73 | 488 | Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 3-4 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere selezionate nei tratti di fustaia adulta e matura. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | 9,07 |
| 2032-2035 | 227 | 11,15 | 11,15 | 95-115 | | 0,17 | 10,98 | a/b/c/d/g/i/m | 574,26 | 6.403,00 | 5.011,64 | 124,79 | 1.391 | Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 4-5 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere selezionate nei tratti di fustaia adulta e matura. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | 21,73 |

SCHEMA 3

# PIANO DEI TAGLI - CLASSE ECONOMICA/COMPRESA "FD"

**Art. 91, comma 2, e art. 97 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno di intervento | Particella forestale | | | | Area protetta - zonizzazione | | | *Vincoli | Provvigione | | | Alto Fusto - Cedui in conversione | | Descrizione Intervento | Saggio di Utilizzazione % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A | B | C | | | | | | | | |
| | n° | Superficie totale Ha | Superficie utile boscata Ha | Età al taglio | Ha | Ha | Ha | | Provvigione unitaria mc | Provvigione totale mc | Provvigione totale post intervento mc | Ripresa unitaria mc | Ripresa totale mc | | |
| 2032-2035 | 148 | 25,72 | 25,72 | | | 15,08 | 10,64 | a/b/c/d/g/i/m | 629,58 | 16.192,70 | 12.594,90 | 139,88 | 3.598 | Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 17-19 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere distribuite uniformemente nella particella, includendo anche i tratti di fustaia giovane situati nella zona alta della particella. Per il resto dellaparticella non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | 22,22 |
| 2032-2035 | 210 | 13,91 | 13,91 | | 7,82 | 6,09 | | a/b/c/d/g/i/m | 563,48 | 7.838,00 | 6.165,13 | 120,26 | 1.673 | Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 4-5 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere distribuite uniformemente nella particella. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | 21,34 |
| **TOTALI** | | **291,09** | **287,58** | | | | | | | **180.661** | **144.824** | | **38.893** | | |

* = Vincoli:

| | |
|---|---|
| a | Idrogeologico (L. 3267/1923) |
| b | Autorità di Bacino (L. 18 maggio 1989 n. 183 – L. R. n. 8 del 07/02/1994) |
| c | Uso civico (L. 1766/1927 – L. R. 11/1981) |
| d | Bellezze naturali (L. 1497/1939 transitata nel d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004) |
| e | Piani territoriali paesaggistici (ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 29/10/99 n. 490) |
| f | Parco Nazionale (L. 6 dicembre 1991 n. 394) |
| g | Parco Regionale (L. R. 1 settembre 1993 n. 33) |
| h | Riserva, altro (L. 6 dicembre 1991 n. 394) |
| i | Legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 21 novembre 2000, n. 353) |
| l | Conflitti di proprietà e/o di confinazione tra le aree oggetto di pianificazione ed altri Soggetti privati e/o pubblici |
| m | Rete natura 2000 |
| n | Altro - specificare |

SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **FD** |
|---|---|

| **Particella** | **112** | **Denominazione località** | **Tronola** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 13,77 |
| Utile Ha | 13,33 |
| Altro-tare Ha | 0,44 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 25;32 |
| Particella | 8p-9p-12p ; 14p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Ovest | |
| Pendenza % | 36,16 | |
| Altitudine mt slm | min. 1052 | max 1220 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2028-2030** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 526,40 |
| Provvigione reale totale | 13,33 | 7017,08 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **109,9** |
| Ripresa totale | | **1512,746096** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 6 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Agrifoglio* | *15%* | *Cerro* | *3%* |
| *Faggio* | *59%* | *Pino nero* | *7%* |
| *Ontano napoletano* | *15%* | | |

Descrizione:

Le fustaie mature coprono il 49% della superficie nella particella 112. Le fustaie adulte seguono con il 29% e le fustaie giovani con il 15%. Le perticaie adulte rappresentano il 7% della copertura.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,01 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,90 | 6,75 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,06 | 15,47 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 3,82 | 28,64 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 4,16 | 31,22 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 2,28 | 17,09 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,11 | 0,83 |
| **Totale** | 13,33 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Diradamento della pineta per favorire l'affermazione e l'insediamento del faggio. Il taglio potrà essere piuttosto intenso e assumere anche il carattere di un taglio di sgombero laddove il novellame è sufficientemente abbondante e affermato da garantire la perpetuazione del bosco. Nella faggeta, si eseguirà un taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 2-3 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere reperite soprattutto nelle zone di fustaia matura situate nel settore sud della particella. Si eseguirà inoltre un diradamento moderato dal basso nel resto della superficie interessata dal faggio, con salvaguardia degli alberi migliori per dimensioni e portamento nella zona adiacente all'ex caserma. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2028-2030 | 13,33 | 109,9 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 1464,4 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, con felce nelle lacune |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **FD** |
|---|---|

| **Particella** | **113a** | **Denominazione località** | **Tronola** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 11,20 |
| Utile Ha | 7,06 |
| Altro-tare Ha | 4,14 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 25 |
| Particella | 7-8p-12p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | #N/D | |
| Pendenza % | 34,84 | |
| Altitudine mt slm | min. 1072 | max 1199 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP4,4** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | #N/D |
| Classe cronologica o diametrica | #N/D |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 453,73 |
| Provvigione reale totale | 7,06 | 3202,17 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2025-2027** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **95,1** |
| Ripresa totale | | **671** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 9 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Agrifoglio* | *6%* |
| *Faggio* | *79%* |
| *Ontano napoletano* | *15%* |

Descrizione:
#N/D

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,10 | 1,39 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,27 | 17,99 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 2,27 | 32,19 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 3,00 | 42,53 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,42 | 5,90 |
| **Totale** | 7,06 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 4-6 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere selezionate preferibilmente in tratti di fustaia matura. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2025-2027 | 7,06 | 95,1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 671,2 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| Copertura: | Diffusa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| Copertura: | #N/D |
|---|---|
| Specie prevalenti: | #N/D |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **FD** |
|---|---|

| **Particella** | **131** | **Denominazione località** | **Tronola** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 13,65 |
| Utile Ha | 13,52 |
| Altro-tare Ha | 0,13 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 25;32 |
| Particella | 12p ; 14p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest | |
| Pendenza % | 41,44 | |
| Altitudine mt slm | min. 1093 | max 1332 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2028-2030** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 594,08 |
| Provvigione reale totale | 13,52 | 8030,57 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **93,6** |
| Ripresa totale | | **1277,011058** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 10 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Agrifoglio* | *2%* |
| *Faggio* | *97%* |
| *Maggiociondolo* | *1%* |

Descrizione:

Le fustaie adulte coprono il 25% della superficie, seguite dalle fustaie mature con il 26% e dalle fustaie giovani con il 13%. Le perticaie giovani occupano il 5% e le perticaie adulte il 3%. Il resto sono formazioni erbacce o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,01 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,40 | 2,96 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,62 | 4,57 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,81 | 13,39 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 3,42 | 25,27 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 3,54 | 26,15 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 2,87 | 21,21 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,87 | 6,44 |
| **Totale** | 13,52 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 13-15 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere distribuite uniformemente nella particella. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2028-2030 | 13,52 | 93,6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 1264,6 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| Copertura: | Diffusa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| Copertura: | Assente |
|---|---|
| Specie prevalenti: | - |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **FD** |
|---|---|

| **Particella** | **148** | **Denominazione località** | **Cervarolo di Laceno** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 25,72 |
| Utile Ha | 25,72 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 25;32 |
| Particella | 12p ; 14p-49 |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Ovest | |
| Pendenza % | 39,16 | |
| Altitudine mt slm | min. 1066 | max 1328 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 719,35 |
| Provvigione reale totale | 25,72 | 18500,28 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **139,9** |
| Ripresa totale | | **3597,79519** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 19 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | | | |
|---|---|---|---|
| *Agrifoglio* | *15%* | *Acero opalo* | *0%* |
| *Faggio* | *83%* | | |
| *Maggiociondolo* | *1%* | | |
| *Ontano napoletano* | *1%* | | |

Descrizione:

Le fustaie giovani coprono il 36% della superficie, seguite dalle fustaie adulte con il 16% e dalle fustaie mature con il 40%. Le perticaie giovani occupano il 2% e le perticaie adulte il 6%. Il resto sono formazioni erbacce o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,53 | 2,06 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,43 | 5,56 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 4,21 | 16,38 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 9,36 | 36,40 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 6,37 | 24,79 |
| Fustaie mature h >32 m | 3,81 | 14,81 |
| **Totale** | 25,72 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 17-19 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere distribuite uniformemente nella particella, includendo anche i tratti di fustaia giovane situati nella zona alta della particella. Per il resto dellaparticella non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 25,72 | 139,9 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 3597,5 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Rovo, felce e graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **FD** |
|---|---|

| **Particella** | **171** | **Denominazione località** | **Cervarolo di Laceno** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 18,14 |
| Utile Ha | 18,11 |
| Altro-tare Ha | 0,03 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 25 |
| Particella | 12p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Ovest |
| Pendenza % | 36,96 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1093 | 1343 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2028-2030** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 808,99 |
| Provvigione reale totale | 18,11 | 14649,40 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **168,5** |
| Ripresa totale | | **3056,479787** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 9 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Acero montano* | *0%* |
| *Agrifoglio* | *68%* |
| *Faggio* | *32%* |
| *Maggiociondolo* | *0%* |

Descrizione:

La situazione è simile nella particella 171, dove la fustaia matura copre il 92% della superficie, mentre le fustaie giovani rappresentano l'8%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,01 | 0,04 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,04 | 0,23 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,26 | 6,97 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 3,75 | 20,68 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 6,46 | 35,68 |
| Fustaie mature h >32 m | 6,59 | 36,39 |
| **Totale** | 18,11 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 12 -14 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere distribuite uniformemente nella particella. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2028-2030 | 18,11 | 168,5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 3051,1 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| Copertura: | Diffusa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| Copertura: | Scarsa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | Rovo e felce |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **FD** |
|---|---|

| **Particella** | **195** | **Denominazione località** | **Cervarolo di Laceno** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 23,44 |
| Utile Ha | 23,27 |
| Altro-tare Ha | 0,17 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 25;31 |
| Particella | 12p ; 18p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Ovest | |
| Pendenza % | 33,72 | |
| Altitudine mt slm | min. 1089 | max 1350 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 804,65 |
| Provvigione reale totale | 23,27 | 18721,32 |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 14 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **148,0** |
| Ripresa totale | | **3468,701326** |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Agrifoglio* | *67%* |
| *Faggio* | *33%* |
| *Maggiociondolo* | *0%* |

Descrizione:

La fustaia matura è la componente principale con il 93% della superficie. La fustaia adulta e quella giovane contribuiscono rispettivamente per il 6% e l'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,01 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,01 | 0,04 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,19 | 0,80 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,13 | 4,87 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 3,94 | 16,95 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 10,93 | 46,97 |
| Fustaie mature h >32 m | 7,07 | 30,37 |
| **Totale** | 23,27 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 16-18 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere distribuite uniformemente nella particella. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 23,27 | 148,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 3443,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| Copertura: | Diffusa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| Copertura: | Scarsa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | Rovo e felce |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **FD** |
|---|---|

| **Particella** | **196** | **Denominazione località** | **Cervarolo di Laceno** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 25,49 |
| Utile Ha | 25,48 |
| Altro-tare Ha | 0,01 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 25 |
| Particella | 12p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Ovest | |
| Pendenza % | 35,35 | |
| Altitudine mt slm | min. 1097 | max 1354 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 814,31 |
| Provvigione reale totale | 25,48 | 20747,32 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 16 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

*Agrifoglio* *61%* *Acero opalo* *1%*
*Faggio* *38%*

Descrizione:

La fustaia matura occupa il 97% della superficie, con la fustaia adulta che completa il restante 3%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,00 | 0,01 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,78 | 3,07 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 4,84 | 19,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 12,70 | 49,84 |
| Fustaie mature h >32 m | 7,15 | 28,08 |
| **Totale** | 25,48 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 25,48 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | - |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **FD** |
|---|---|

| **Particella** | **205a** | **Denominazione località** | **Apeticchia** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 22,40 |
| Utile Ha | 22,34 |
| Altro-tare Ha | 0,06 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 23 |
| Particella | 29p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord | |
| Pendenza % | 38,68 | |
| Altitudine mt slm | min. 1388 | max 1618 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.4** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | | 100 |
| Classe cronologica o diametrica | | 90-110 |
| | Ha: | mc: |
| Provvigione reale unitaria | 1 | 563,98 |
| Provvigione reale totale | 22,34 | 12598,13 |
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 17 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Anno di taglio | | **2025-2027** |
| Età media all'anno di taglio | | **90-110** |
| | Ha: | mc: |
| Ripresa unitaria | | **129,1** |
| Ripresa totale | | **2891** |
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *0%* | *Acero opalo* | *0%* | *Olmo campestre* | *0%* |
| *Agrifoglio* | *0%* | | | | |
| *Faggio* | *96%* | | | | |
| *Maggiociondolo* | *2%* | | | | |
| *Sorbo degli Ucc.* | *1%* | | | | |

Descrizione:

La fustaia matura rappresenta il 31% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 36%, la fustaia giovane al 19%, la perticaia adulta al 10% e la perticaia giovane al 4%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,06 | 0,25 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,97 | 4,35 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,23 | 9,96 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 4,17 | 18,68 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 7,92 | 35,44 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 6,85 | 30,66 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,15 | 0,65 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 22,34 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 10-12 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere distribuite uniformemente nella particella. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2025-2027 | 22,34 | 129,1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 2882,9 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **FD** |
|---|---|

| **Particella** | **206a** | **Denominazione località** | **Terremoto** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 34,63 |
| Utile Ha | 34,51 |
| Altro-tare Ha | 0,12 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 23;24;27 |
| Particella | 29p ; 330p ; 151p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord | |
| Pendenza % | 40,93 | |
| Altitudine mt slm | min. 1367 | max 1656 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.4** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata | | Anno di taglio | **2025-2027** |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata | | Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: | | Ha: | mc: |
|---|---|---|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 552,78 | Ripresa unitaria | | **126,9** |
| Provvigione reale totale | 34,51 | 19074,94 | Ripresa totale | | **4392,995391** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 21 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | | | |
|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *1%* | *Salicone* | *0%* |
| *Faggio* | *96%* | | |
| *Maggiociondolo* | *3%* | | |
| *Ontano napoletano* | *0%* | | |
| *Sorbo degli Ucc.* | *0%* | | |

Descrizione:

La fustaia matura copre il 24% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 35%, la fustaia giovane al 29%, la perticaia adulta all'8%, la perticaia giovane al 2% e il novelleto all'1%. Le formazioni erbacee o arbustive completano l'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,43 | 1,25 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,78 | 2,27 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,64 | 7,65 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 9,87 | 28,61 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 11,83 | 34,28 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 8,67 | 25,12 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,28 | 0,82 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 34,51 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 14-18 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere selezionate preferibilmente nei tratti di fustaia matura, con almeno 4 gruppi situati nelle zone di fustaia a monte. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2025-2027 | 34,51 | 126,9 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 4377,5 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| Copertura: | Scarsa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | Agrifoglio e rovo |

**STRATO ERBACEO**

| Copertura: | Scarsa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **FD** |
|---|---|

| **Particella** | **206b** | **Denominazione località** | **Terremoto** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 24,86 |
| Utile Ha | 24,85 |
| Altro-tare Ha | 0,01 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 24;27 |
| Particella | 38-39-40-54-55-56-57-58-59-60-61-330p ; 8-9-151p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord |
| Pendenza % | 35,48 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1163 | 1431 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 140 |
| Classe cronologica o diametrica | 130-150 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2025-2027** |
| Età media all'anno di taglio | **130-150** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 789,31 |
| Provvigione reale totale | 24,85 | 19617,75 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **169,1** |
| Ripresa totale | | **4204,00843** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 18 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 2 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

*Faggio* *100% Salicone* *0% Olmo campestre* *0%*

Descrizione:

In questa particella, la fustaia matura copre il 97% della superficie, con la fustaia adulta al 3%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,77 | 3,11 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 8,71 | 35,06 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 12,91 | 51,96 |
| Fustaie mature h >32 m | 2,45 | 9,88 |
| **Totale** | 24,85 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 18-20 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere distribuite uniformemente nella particella. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2025-2027 | 24,85 | 169,1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 4203,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **FD** |
|---|---|

| **Particella** | **206c** | **Denominazione località** | **Terremoto** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 24,34 |
| Utile Ha | 27,28 |
| Altro-tare Ha | -2,94 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 24 |
| Particella | 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-33-34-35-36-37-311p-330p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord | |
| Pendenza % | 45,32 | |
| Altitudine mt slm | min. 1339 | max 1656 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.4** | |
| **Viabilità** | |
| **Scarsamente servita** | |

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata | |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata | |
| Anno di taglio | | **2025-2027** |
| Età media all'anno di taglio | | **0** |

| | Ha: | mc: | | Ha: | mc: |
|---|---|---|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 472,90 | Ripresa unitaria | | **114,7** |
| Provvigione reale totale | 27,28 | 12902,08 | Ripresa totale | | **2791,912634** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 20 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | | | |
|---|---|---|---|
| *Acero montano* | *0%* | *Salicone* | *0%* |
| *Faggio* | *95%* | | |
| *Maggiociondolo* | *2%* | | |
| *Ontano napoletano* | *0%* | | |
| *Sorbo degli Ucc.* | *2%* | | |

Descrizione:

La fustaia matura rappresenta il 24% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 37%, la fustaia giovane al 27% e la perticaia giovane al 10%. Le formazioni erbacee o arbustive coprono l'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,02 | 0,06 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,42 | 1,52 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,62 | 9,59 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 6,41 | 23,51 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 10,33 | 37,87 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 6,21 | 22,77 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 1,28 | 4,69 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 27,28 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 11-14 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere selezionate preferibilmente nei tratti di fustaia matura, con almeno 2 gruppi situati nelle zone di fustaia a monte. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2025-2027 | 27,28 | 114,7 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 3129,5 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio e rovo |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **FD** |
|---|---|

| **Particella** | **207a** | **Denominazione località** | **Terremoto** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 23,11 |
| Utile Ha | 23,11 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 24 |
| Particella | 301-310-330p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord |
| Pendenza % | 37,29 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1112 | 1356 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| **Sottosuolo** |
|---|
| **Calcareo** |

| **Suolo** |
|---|
| **MAP 4.4** |

| **Viabilità** |
|---|
| **Ben servita** |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 140 |
| Classe cronologica o diametrica | 130-150 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2025-2027** |
| Età media all'anno di taglio | **130-150** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 786,82 |
| Provvigione reale totale | 23,11 | 18181,90 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **170,1** |
| Ripresa totale | | **3930,985427** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 16 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Faggio* | *99%* |
| *Maggiociondolo* | *1%* |

Descrizione:

La fustaia matura copre il 92% della superficie, con la fustaia adulta al 7% e la fustaia giovane all'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,12 | 0,52 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,05 | 4,54 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 4,15 | 17,95 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 11,87 | 51,37 |
| Fustaie mature h >32 m | 5,92 | 25,62 |
| **Totale** | 23,11 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 16-18 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere selezionate preferibilmente nei tratti di fustaia matura, con almeno 2 gruppi situati nelle zone di fustaia a monte. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2025-2027 | 23,11 | 170,1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 3930,6 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| Copertura: | Scarsa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | rovo |

**STRATO ERBACEO**

| Copertura: | Diffusa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | geranio,felce maschio,asperula |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **FD** |
|---|---|

| **Particella** | **207b** | **Denominazione località** | **Terremoto** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 22,95 |
| Utile Ha | 22,88 |
| Altro-tare Ha | 0,07 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 27 |
| Particella | 151p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord | |
| Pendenza % | 36,59 | |
| Altitudine mt slm | min. 1103 | max 1380 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 140 |
| Classe cronologica o diametrica | 130-150 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **130-150** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 736,33 |
| Provvigione reale totale | 22,88 | 16844,31 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **154,5** |
| Ripresa totale | | **3546** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 18 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 9 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Acero montano* | *0%* |
| *Faggio* | *98%* |
| *Maggiociondolo* | *0%* |
| *Sorbo degli Ucc.* | *1%* |

Descrizione:

La fustaia matura rappresenta l'84% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 12%, la fustaia giovane al 3% e la perticaia adulta all'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,33 | 1,45 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,68 | 2,98 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,74 | 11,98 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 6,96 | 30,44 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 8,62 | 37,69 |
| Fustaie mature h >32 m | 3,54 | 15,46 |
| **Totale** | 22,88 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 14-16 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere selezionate preferibilmente nei tratti di fustaia matura, con almeno 2 gruppi situati nelle zone di fustaia a monte. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 22,88 | 154,5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 3534,3 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| Copertura: | Scarsa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | rovo |

**STRATO ERBACEO**

| Copertura: | Diffusa |
|---|---|
| Specie prevalenti: | dafne laureala,asperula,acetosella,felce maschio |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **FD** |
|---|---|

| **Particella** | **210** | **Denominazione località** | **Cervarolo di Laceno** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 13,91 |
| Utile Ha | 13,90 |
| Altro-tare Ha | 0,01 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 25 |
| Particella | 12p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Ovest |
| Pendenza % | 37,10 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1253 | 1508 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| **Sottosuolo** |
|---|
| **Calcareo** |

| **Suolo** |
|---|
| **MAP 4.4** |

| **Viabilità** |
|---|
| **Ben servita** |

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata | |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata | |
| Anno di taglio | | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | | **0** |

| | Ha: | mc: | | Ha: | mc: |
|---|---|---|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 517,05 | Ripresa unitaria | | **120,3** |
| Provvigione reale totale | 13,90 | 7188,64 | Ripresa totale | | **1672,868581** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 9 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | | | |
|---|---|---|---|
| *Agrifoglio* | *3%* | *Abete bian* | *0%* |
| *Faggio* | *94%* | | |
| *Maggiociondolo* | *2%* | | |
| *Ontano napoletano* | *0%* | | |

Descrizione:

La fustaia matura copre il 32% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 21%, la fustaia giovane al 23%, la perticaia adulta al 15% e la perticaia giovane al 9%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,92 | 6,58 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,04 | 14,66 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,23 | 23,21 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 3,01 | 21,65 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 1,78 | 12,79 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 2,69 | 19,34 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,25 | 1,77 |
| **Totale** | 13,90 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 4-5 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere distribuite uniformemente nella particella. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 13,90 | 120,3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 1672,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Abbondante |
| Specie prevalenti: | Graminacee, vinca e dafne |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **FD** |
|---|---|

| **Particella** | **226** | **Denominazione località** | **Sette Valli** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 3,21 |
| Utile Ha | 8,45 |
| Altro-tare Ha | -5,24 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 24;27 |
| Particella | 62-330p ; 151p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Est | |
| Pendenza % | 37,42 | |
| Altitudine mt slm | min. 1404 | max 1652 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 80 |
| Classe cronologica o diametrica | 70-90 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 306,22 |
| Provvigione reale totale | 8,45 | 2587,14 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **57,7** |
| Ripresa totale | | **487,8411366** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 7 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Faggio* | *100%* |
| *Sorbo degli Ucc.* | *0%* |

Descrizione:

La fustaia matura rappresenta il 49% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 36%, la fustaia giovane al 7%, e la perticaia giovane al 7%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,36 | 4,25 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,91 | 34,49 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 4,38 | 51,87 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,79 | 9,38 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 8,45 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 3-4 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere selezionate nei tratti di fustaia adulta e matura. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 8,45 | 57,7 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 487,8 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| Copertura: | Assente |
|---|---|
| Specie prevalenti: | 0 |

**STRATO ERBACEO**

| Copertura: | Assente |
|---|---|
| Specie prevalenti: | 0 |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **FD** |
|---|---|

| **Particella** | **227** | **Denominazione località** | **Sette Valli** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 11,15 |
| Utile Ha | 11,06 |
| Altro-tare Ha | 0,09 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 24 |
| Particella | 42-43-44-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-319-320-322-330p-332p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord | |
| Pendenza % | 36,95 | |
| Altitudine mt slm | min. 1393 | max 1561 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 100 |
| Classe cronologica o diametrica | 90-110 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 480,06 |
| Provvigione reale totale | 11,06 | 5308,56 |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 9 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2031-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **124,8** |
| Ripresa totale | | **1391,358326** |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | |
|---|---|
| *Faggio* | *99%* |
| *Sorbo degli Ucc.* | *1%* |

Descrizione:

La fustaia matura copre il 55% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 28%, la fustaia giovane al 7%, e la perticaia giovane al 7%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,78 | 7,06 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,07 | 27,79 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 6,13 | 55,43 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 1,07 | 9,71 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 11,06 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 4-5 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere selezionate nei tratti di fustaia adulta e matura. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | Vedi grafico | trattrice forestale lungo i tracciati esistenti/temporanei - a strascico con verricello | 2031-2034 | 11,06 | 124,8 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 1379,9 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | maggiociondolo |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **FD** |
|---|---|

| **Particella** | **234** | **Denominazione località** | **Coste di Cervialto** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 14,85 |
| Utile Ha | 14,01 |
| Altro-tare Ha | 0,84 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 25 |
| Particella | 12p-13p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Ovest |
| Pendenza % | 45,88 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1464 | 1793 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 389,95 |
| Provvigione reale totale | 14,01 | 5464,47 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia giovane rappresenta il 44% della superficie, seguita dalla spessina al 30%, la perticaia giovane al 27%, la fustaia adulta al 41%, e la fustaia matura al 7%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 2,55 | 18,22 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,80 | 20,00 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 4,13 | 29,48 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 3,88 | 27,72 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,64 | 4,58 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 14,01 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 14,01 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Rovo e lampone |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **FD** |
|---|---|

| **Particella** | **237** | **Denominazione località** | **Coste di Cervialto** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 10,24 |
| Utile Ha | 10,24 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 25 |
| Particella | 12p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord |
| Pendenza % | 43,15 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1484 | 1785 |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

Giacitura

Manufatti

Risorse idriche

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 456,15 |
| Provvigione reale totale | 10,24 | 4669,44 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La perticaia giovane rappresenta il 26% della superficie, seguita dalla fustaia giovane al 26%, la fustaia adulta al 26%, il novelleto al 3%, e il resto sono formazioni erbacee o arbustive (21%).

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,36 | 3,48 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,45 | 23,94 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,38 | 32,97 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 3,39 | 33,16 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,66 | 6,46 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 10,24 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 10,24 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio, dafne e rovo |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Ortica, cardi, viola, felce maschio, lampone, stellaria |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **FD** |
|---|---|

| **Particella** | **239** | **Denominazione località** | **Valle Giamberardino** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 11,36 |
| Utile Ha | 11,29 |
| Altro-tare Ha | 0,07 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 25 |
| Particella | 12p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord |
| Pendenza % | 41,99 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1478 | 1781 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 452,72 |
| Provvigione reale totale | 11,29 | 5109,82 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia matura copre l'85% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 41%, la fustaia giovane al 10%, e la perticaia giovane al 27%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 2,12 | 18,75 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,84 | 16,32 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 5,18 | 45,88 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,12 | 18,75 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,02 | 0,14 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,02 | 0,16 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 11,29 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 11,29 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Rovo, dafne e agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Cardi, ortica e lampone |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **FD** |
|---|---|

| **Particella** | **264** | **Denominazione località** | **Coste di Cervialto** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 16,01 |
| Utile Ha | 16,00 |
| Altro-tare Ha | 0,01 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 25;26 |
| Particella | 12p-13p ; 1p-2p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Ovest | |
| Pendenza % | 42,37 | |
| Altitudine mt slm | min. 1527 | max 1794 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 399,11 |
| Provvigione reale totale | 16,00 | 6385,54 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia matura copre il 42% della superficie, seguita da vicino dalla perticaia giovane con il 40%. La fustaia adulta rappresenta il 12% e il novelleto copre il 6%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,85 | 11,54 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 6,45 | 40,33 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 6,68 | 41,78 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,01 | 6,34 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,02 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 16,00 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 16,00 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Assente |
| Specie prevalenti: | Rovo |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Abbondante |
| Specie prevalenti: | Graminacee, vinca e rovo |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **FD** |
|---|---|

| **Particella** | **265** | **Denominazione località** | **Coste di Cervialto** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 14,58 |
| Utile Ha | 14,36 |
| Altro-tare Ha | 0,22 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 27 |
| Particella | 3p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest |
| Pendenza % | 47,27 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1484 | 1793 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 422,57 |
| Provvigione reale totale | 14,36 | 6069,58 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

In questa particella, la fustaia matura rappresenta il 44%, seguita dalla fustaia adulta al 29% e dalla perticaia giovane al 19%. La spessina copre il 6% e il novelleto l'1%, con il resto come formazioni erbacee o arbustive (1%).

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,20 | 1,41 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,84 | 5,83 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,75 | 19,16 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 6,25 | 43,53 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 4,19 | 29,18 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,13 | 0,89 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 14,36 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 14,36 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Rovo e lampone |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **FD** |
|---|---|

| **Particella** | **303** | **Denominazione località** | **Coste di Cervialto** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 9,19 |
| Utile Ha | 9,18 |
| Altro-tare Ha | 0,01 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 26 |
| Particella | 1p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Ovest |
| Pendenza % | 40,12 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1535 | 1775 |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

Giacitura

Manufatti

Risorse idriche

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 486,20 |
| Provvigione reale totale | 9,18 | 4463,00 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia giovane rappresenta il 32% della superficie della particella 303, seguita dalla fustaia adulta al 30%, dalla perticaia giovane al 18% e dalla perticaia adulta all'8%, con la fustaia matura al 13%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,65 | 7,12 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,55 | 16,91 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,83 | 30,80 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 3,05 | 33,20 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 1,10 | 11,98 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 9,18 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 9,18 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Rovo |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, rovo, sanicula e luzula |

**PRESCRIZIONI**

SCHEMA 2

# PARTICELLE FORESTALI DELLA CLASSE ECONOMICA/COMPRESA "P"

**Art. 90, comma 2, del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Particella forestale | | | | | | Dati catastali | | Area protetta - zonizzazione | | | Aree percorse dal Fuoco | | *Vincoli | Dati Dendrometrici | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località | n° | Superficie in Ha | | | | Foglio | Particella | A | B | C | | | | Densità | | Pr unitaria mc/Ha | Pr totale mc | ***Pp unitaria mc/Ha | ***Pp totale mc | Incremento (medio ) mc | Età all'anno di redazione del PGF |
| | | Totale | Bosco | Pascolo - prati - radure | Altro | | | Ha | Ha | Ha | Anno | Ha | | A.B. unitaria mq/Ha | **Soggetti n°/Ha | | | | | | |
| Salve Regina di Piscacca | 1 | 13,23 | 12,76 | 0,47 | | 7 | 23p-30p | | 12,23 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 328,39 | 4.190,73 | | | | indeterminata |
| Vallone di Piscacca | 2 | 13,59 | 12,75 | 0,84 | | 7 | 23p-24-25-26-30p-48 | | 13,59 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 345,57 | 4.407,67 | | | | indeterminata |
| Costa della Guradia | 3a | 13,03 | 12,94 | 0,09 | | 7 | 27-30p-47 | | 13,03 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,77 | 776 | 627,65 | 8.120,08 | | | | indeterminata |
| Costa della Guradia | 5a | 11,81 | 11,16 | 0,65 | | 7 | 30p | | 11,81 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 307,19 | 3.427,70 | | | | indeterminata |
| Costa della Guradia | 5b | 2,27 | 0,53 | 1,74 | | 7 | 30p | | 2,27 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 26,55 | 14,06 | | | | indeterminata |
| Coste di Villa Romana | 9 | 14,73 | 1,81 | 12,92 | | 7 | 22p | | 14,73 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 49,13 | 88,90 | | | | indeterminata |
| Canale di Mariella | 10 | 10,22 | 7,85 | 2,37 | | 7 | 22p-30p | | 10,22 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 201,86 | 1.583,70 | | | | indeterminata |
| Ripa dei Corvi | 11 | 14,69 | 13,25 | 1,44 | | 7 | 28-29-30p | | 14,69 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 273,80 | 3.628,36 | | | | indeterminata |
| Monte Magnone | 12 | 5,36 | 5,19 | 0,17 | | 7 | 22p-30p | | 5,36 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 525,47 | 2.724,68 | | | | indeterminata |
| Ripa dei Corvi | 13 | 13,97 | 12,63 | 1,34 | | 3<br>7 | 94-156<br>30p | | 13,97 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 245,36 | 3.098,93 | | | | indeterminata |
| Acerito | 19 | 19,29 | 3,92 | 15,37 | | 7 | 22p-30p-34p | | 19,29 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 70,83 | 277,66 | | | | indeterminata |
| Acerito | 22 | 4,59 | 3,57 | 1,02 | | 7 | 34p | | 4,59 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 351,23 | 1.253,82 | | | | indeterminata |
| Conca | 23 | 17,92 | 16,96 | 0,96 | | 7 | 22p-34p-36 | | 17,92 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 33,18 | 689 | 339,69 | 5.762,61 | | | | indeterminata |
| Guarella | 35 | 11,16 | 5,41 | 5,75 | | 11 | 20p | | 11,16 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 102,55 | 554,97 | | | | indeterminata |
| Guarella | 36 | 5,16 | 5,07 | 0,09 | | 7<br>11<br>12 | 34p-73p<br>20p-29p<br>1p | | 5,16 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,76 | 485 | 490,33 | 2.485,70 | | | | indeterminata |
| Rompeciciuno | 49 | 10,17 | 4,17 | 6,00 | | 11 | 20p | | 10,17 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 97,39 | 405,69 | | | | indeterminata |
| La Difesa e Camparella | 69 | 10,85 | 9,52 | 1,33 | | 10 | 126-128-129-132-144-153-156-163-189 | | 10,85 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 7,77 | 858 | 26,40 | 251,28 | | | | indeterminata |
| Pasteria | 91 | 4,55 | 1,98 | 2,57 | | 15 | 113p | | 4,55 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 115,55 | 228,25 | | | | indeterminata |
| Bocca di Calende | 93 | 19,12 | 13,29 | 5,83 | | 10<br>15 | 148p<br>113p | | 19,12 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 137,26 | 1.824,53 | | | | indeterminata |
| Calende | 94 | 20,38 | 19,82 | 0,56 | | 18 | 11p | | 20,38 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 283,17 | 5.611,65 | | | | indeterminata |
| Calende | 107 | 24,34 | 24,24 | 0,10 | | 17<br>18 | 163p-164<br>11p | | 24,34 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 365,81 | 8.866,38 | | | | indeterminata |
| Calende | 108 | 20,32 | 19,88 | 0,44 | | 18 | 11p | | 20,26 | 0,06 | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 293,02 | 5.825,27 | | | | indeterminata |
| Vallone di Calende | 123 | 4,70 | 4,70 | 0,00 | | 17 | 101-102-163p | | 4,70 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 32,70 | 1763 | 216,03 | 1.014,84 | | | | indeterminata |
| Raia di Calende | 125 | 6,68 | 6,68 | 0,00 | | 18 | 11p | | 6,68 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 511,71 | 3.418,92 | | | | indeterminata |
| Raia di Calende | 126 | 6,70 | 6,68 | 0,02 | | 18 | 11p | | 6,43 | 0,27 | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 399,47 | 2.670,23 | | | | indeterminata |
| Orno | 139 | 3,70 | 3,62 | 0,08 | | 23 | 1p | | 3,70 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 273,00 | 987,92 | | | | indeterminata |
| Vallone delle Querce | 141 | 8,05 | 8,05 | 0,00 | | 18<br>23 | 11p<br>29p-23 | | 8,05 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 276,01 | 2.221,04 | | | | indeterminata |
| Porcacciolo | 155 | 2,94 | 2,92 | 0,02 | | 23 | 33p | | 2,94 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 292,31 | 852,51 | | | | indeterminata |
| Porcacciolo | 156 | 3,41 | 3,41 | 0,00 | | 23 | 33p | | 3,41 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 384,52 | 1.311,03 | | | | indeterminata |

SCHEMA 2

# PARTICELLE FORESTALI DELLA CLASSE ECONOMICA/COMPRESA "P"

**Art. 90, comma 2, del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Particella forestale | | | | | | Dati catastali | | Area protetta - zonizzazione | | | Aree percorse dal Fuoco | | *Vincoli | Dati Dendrometrici | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località | n° | Superficie in Ha | | | | Foglio | Particella | A | B | C | | | | Densità | | Pr unitaria mc/Ha | Pr totale mc | ***Pp unitaria mc/Ha | ***Pp totale mc | Incremento (medio ) mc | Età all'anno di redazione del PGF |
| | | Totale | Bosco | Pascolo - prati - radure | Altro | | | Ha | Ha | Ha | Anno | Ha | | A.B. unitaria mq/Ha | **Soggetti n°/Ha | | | | | | |
| Porcacciolo | 157 | 6,00 | 5,25 | 0,75 | | 23 | 33p | | 6,00 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 237,42 | 1.245,80 | | | | indeterminata |
| Porcacciolo | 158 | 4,24 | 2,42 | 1,82 | | 23 | 33p | | 4,24 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 185,23 | 448,45 | | | | indeterminata |
| Vallone delle Querce | 159 | 10,68 | 10,63 | 0,05 | | 23 | 29p-33p | | 10,68 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 578,69 | 6.152,81 | | | | indeterminata |
| Porcacciolo | 160 | 4,71 | 4,57 | 0,14 | | 23 | 33p | | 4,71 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 471,12 | 2.153,79 | | | | indeterminata |
| Valle del Porco | 161 | 12,84 | 11,55 | 1,29 | | 23 | 29p-33p | | 12,84 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 234,53 | 2.708,75 | | | | indeterminata |
| Vallone del Porco | 177 | 9,32 | 9,32 | 0,00 | | 23 | 33p | | 9,32 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 581,78 | 5.422,09 | | | | indeterminata |
| Montagna Grande | 178 | 9,50 | 8,82 | 0,68 | | 23 | 33p | | 9,50 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 254,80 | 2.246,81 | | | | indeterminata |
| Montagna Grande | 179 | 6,01 | 5,89 | 0,12 | | 23 | 33p | | 6,01 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 303,84 | 1.788,82 | | | | indeterminata |
| Montagna Grande | 180 | 8,14 | 6,50 | 1,64 | | 23 | 33p | | 8,14 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 163,04 | 1.059,87 | | | | indeterminata |
| Montagna Grande | 181 | 2,36 | 2,36 | 0,00 | | 23 | 33p | | 2,36 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 433,71 | 1.021,46 | | | | indeterminata |
| Vallone di Cola | 182 | 3,47 | 3,45 | 0,02 | | 23 | 33p | | 3,47 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 249,64 | 862,42 | | | | indeterminata |
| Montagna Grande | 183 | 9,20 | 8,84 | 0,36 | | 23 | 33p | | 9,20 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 436,37 | 3.859,05 | | | | indeterminata |
| Vallone di Cola | 184 | 7,91 | 6,45 | 1,46 | | 23 | 33p | | 7,91 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 205,10 | 1.323,16 | | | | indeterminata |
| Apeticchia | 185 | 13,85 | 13,79 | 0,06 | | 23 | 29p-33p | | 13,85 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 775,38 | 10.696,26 | | | 5,17 | 130-150 |
| Apeticchia | 186 | 12,88 | 12,81 | 0,07 | | 23 | 29p-33p | | 12,88 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 506,72 | 6.489,37 | | | | indeterminata |
| Vallone di Cola | 201 | 8,68 | 8,66 | 0,02 | | 23 | 33p | | 6,68 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 592,03 | 5.129,57 | | | | indeterminata |
| Vallone dell'Acero | 202 | 14,62 | 14,01 | 0,61 | | 23 | 33p | | 14,62 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 294,15 | 4.119,60 | | | | indeterminata |
| Vallone di Valle dell'Acero | 203 | 11,45 | 10,97 | 0,48 | | 23 | 29p-33p | | 11,45 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 428,63 | 4.700,18 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 27 | 3p-151p | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallone della Scarrupata | 216 | 7,83 | 7,65 | 0,18 | | 23 | 33p | | 7,83 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 212,17 | 1.623,55 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 27 | 3p | | | | | | | | | | | | | | |
| Coste dell'Ausano | 217 | 16,50 | 16,15 | 0,35 | | 23 | 33p | | 16,50 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 420,29 | 6.788,37 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 27 | 3p | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallone di Valle dell'Acero | 218 | 13,14 | 13,11 | 0,03 | | 23 | 33p | | 13,14 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 654,65 | 8.582,07 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 27 | 3p | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallone della Scarrupata | 219 | 9,92 | 8,29 | 1,63 | | 27 | 3p | | 9,92 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 220,37 | 1.827,59 | | | | indeterminata |
| Valle d'Acero | 222b | 8,30 | 8,08 | 0,22 | | 27 | 151p | | 8,30 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 37,96 | 822 | 259,38 | 2.097,05 | | | | indeterminata |
| Valle d'Acero | 223b | 6,28 | 6,26 | 0,02 | | 27 | 151p | | 6,28 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 41,48 | 780 | 397,95 | 2.489,56 | | | | indeterminata |
| Valle d'Acero | 224a | 21,07 | 20,30 | 0,77 | | 27 | 151p-152-157-158-159-160 | | 19,17 | 1,90 | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,88 | 670 | 471,58 | 9.572,98 | | | | indeterminata |
| Vallone della Scarrupata | 242 | 16,28 | 15,55 | 0,73 | | 27 | 3p | | 16,28 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 344,26 | 5.353,21 | | | | indeterminata |
| Coste dell'Ausano | 243 | 9,10 | 9,08 | 0,02 | | 27 | 3p | | 9,10 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 361,80 | 3.283,94 | | | | indeterminata |
| Vallone della Scarrupata | 244 | 17,36 | 17,35 | 0,01 | | 27 | 3p-151p | | 17,36 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 680,59 | 11.807,11 | | | | indeterminata |
| Grotta dei Briganti | 245 | 18,15 | 15,29 | 2,86 | | 27 | 3p-151p | | 18,15 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 400,22 | 6.119,13 | | | | indeterminata |

SCHEMA 2

# PARTICELLE FORESTALI DELLA CLASSE ECONOMICA/COMPRESA "P"

**Art. 90, comma 2, del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Particella forestale | | | | | | Dati catastali | | Area protetta - zonizzazione | | | Aree percorse dal Fuoco | | *Vincoli | Dati Dendrometrici | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località | n° | Superficie in Ha | | | | Foglio | Particella | A | B | C | | | | Densità | | Pr unitaria mc/Ha | Pr totale mc | ***Pp unitaria mc/Ha | ***Pp totale mc | Incremento (medio ) mc | Età all'anno di redazione del PGF |
| | | Totale | Bosco | Pascolo - prati - radure | Altro | | | Ha | Ha | Ha | Anno | Ha | | A.B. unitaria mq/Ha | **Soggetti n°/Ha | | | | | | |
| Scarrupata | 246 | 9,45 | 9,41 | 0,04 | | 27 | 3p-151p | | 9,45 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 630,35 | 5.932,27 | | | | indeterminata |
| Vallone Cupo | 267 | 16,68 | 16,07 | 0,61 | | 27 | 3p | | 16,68 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 425,41 | 6.838,39 | | | | indeterminata |
| Vallone Cupo | 268 | 17,07 | 17,07 | 0,00 | | 27 | 3p-151p | | 17,07 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 617,59 | 10.544,30 | | | | indeterminata |
| Vallebona | 269 | 11,85 | 11,84 | 0,01 | | 27 | 1p-3p-151p | | 11,85 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 587,39 | 6.955,86 | | | | indeterminata |
| Vallone Cupo | 270 | 18,41 | 18,08 | 0,33 | | 27 | 3p-151p | | 18,41 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 506,07 | 9.151,44 | | | | indeterminata |
| Coste di Tannaro | 281 | 8,59 | 8,59 | 0,00 | | 28 | 1p | 6,63 | 1,96 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 614,22 | 5.276,65 | | | | indeterminata |
| Coste di Tannaro | 283 | 34,30 | 33,98 | 0,32 | | 28 | 1p | 12,80 | 21,50 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 468,79 | 15.928,17 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 23 | 29p | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALI** | | **733,07** | **653,19** | **79,88** | | | | | | | | | | | | | **258.708,97** | | **0,00** | | |

* = Vincoli:

| | |
|---|---|
| a | Idrogeologico (L. 3267/1923) |
| b | Autorità di Bacino (L. 18 maggio 1989, n. 183 – L. R. 07/02/1994, n. 8) |
| c | Uso civico (L. 1766/1927 – L. R. 11/1981) |
| d | Bellezze naturali (L. 1497/1939 transitata nel D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) |
| e | Piani territoriali paesaggistici (ai sensi dell'art. 149 del D.lgs. 29/10/99, n. 490) |
| f | Parco Nazionale (L. 6 dicembre 1991, n. 394) |
| g | Parco Regionale (L. R. 1 settembre 1993, n. 33) |
| h | Riserva, altro (L. 6 dicembre 1991, n. 394) |
| i | Legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 21 novembre 2000, n. 353) |
| l | Conflitti di proprietà e/o di confinazione tra le aree oggetto di pianificazione ed altri Soggetti privati e/o pubblici |
| m | Rete Natura 2000 |
| n | Altro - specificare |

** = Fustaie e fustaie transitorie - *n° soggetti/Ha* ; ceduo - *n° polloni/Ha e n° matricine/Ha*

*** = Se impossibilitati a calcolare la Provvigione potenziale/normale fornire motivazione

Pr = Provvigione reale

Pp = Provvigione potenziale

SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **1** | **Denominazione località** | **Salve Regina di Piscacca** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 13,23 |
| Utile Ha | 12,76 |
| Altro-tare Ha | 0,47 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 7 |
| Particella | 23p-30p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest |
| Pendenza % | 50,16 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 891 | 1333 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 328,39 |
| Provvigione reale totale | 12,76 | 4190,73 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La copertura è dominata da formazioni giovani e adulte, con il 31% di fustaie giovani e l'11% di fustaie adulte. Il novellame rappresenta il 18% della copertura, mentre la perticaia adulta è al 2%. La presenza di fustaie mature è al 13%, indicando una struttura forestale diversificata ma con una prevalenza di stadi giovanili.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 2,26 | 17,73 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 4,01 | 31,41 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,49 | 19,51 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,40 | 10,94 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,00 | 7,81 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 1,03 | 8,06 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,58 | 4,54 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 12,76 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 12,76 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | coronilla, ginestra dei carbonai |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | diffusa |
| Specie prevalenti: | graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **2** | **Denominazione località** | **Vallone di Piscacca** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 13,59 |
| Utile Ha | 12,75 |
| Altro-tare Ha | 0,84 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 7 |
| Particella | 23p-24-25-26-30p-48 |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest | |
| Pendenza % | 49,46 | |
| Altitudine mt slm | min. 868 | max 1183 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 345,57 |
| Provvigione reale totale | 12,75 | 4407,67 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia matura rappresenta una piccola porzione del 5% della superficie. La fustaia adulta copre il 9%, la fustaia giovane il 22%, la perticaia adulta il 31%, la perticaia giovane il 29% e la spessina il 3%. Le formazioni erbacee o arbustive coprono l'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,41 | 3,18 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 3,73 | 29,27 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 3,93 | 30,77 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,81 | 22,06 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,18 | 9,24 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,46 | 3,59 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,18 | 1,41 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,06 | 0,48 |
| **Totale** | 12,75 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 12,75 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | ginestra dei carbonai, coronilla emerus, nocciolo |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | 0 |
| Specie prevalenti: | 0 |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **3a** | **Denominazione località** | **Costa della Guradia** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 13,03 |
| Utile Ha | 12,94 |
| Altro-tare Ha | 0,09 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 7 |
| Particella | 27-30p-46-47-48 |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord-Est | |
| Pendenza % | 45,29 | |
| Altitudine mt slm | min. 850 | max 1254 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 537,46 |
| Provvigione reale totale | 12,94 | 6953,22 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 7 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Faggio* | *55%* | *Acero opalo* | *42%* |
| *Ontano napoletano* | *1%* | *Carpino nero* | *2%* |

Descrizione:

La fustaia matura rappresenta il 32% della superficie della particella 3a, seguita dalla fustaia giovane al 25%, dalla fustaia adulta al 22%, dalla perticaia giovane al 16% e dalla spessina al 4%. Il restante 1% è occupato da formazioni erbacee o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,06 | 0,46 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,56 | 4,30 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,08 | 16,06 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,27 | 25,30 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,85 | 22,04 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 2,53 | 19,59 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 1,39 | 10,74 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,20 | 1,51 |
| **Totale** | 12,94 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 12,94 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | coronilla, ginestra dei carbonai |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | graminacee, ciclamino, asperula, acetosella, vinca |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **5a** | **Denominazione località** | **Costa della Guradia** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 11,81 |
| Utile Ha | 11,16 |
| Altro-tare Ha | 0,65 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 13;20 |
| Particella | 15p-17p-18p-124-125-126-127p ; 5p-12p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest | |
| Pendenza % | 49,81 | |
| Altitudine mt slm | min. 929 | max 1405 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 307,19 |
| Provvigione reale totale | 11,16 | 3427,70 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

Nella particella 5a, la spessina è la componente principale, coprendo il 35% della superficie. Il novelleto segue con il 19%, mentre la perticaia giovane, la fustaia giovane, la fustaia adulta e la fustaia matura rappresentano rispettivamente il 18%, 10%, 9% e 10%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 2,07 | 18,52 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 3,86 | 34,56 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,02 | 18,13 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,09 | 9,78 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,02 | 9,18 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,56 | 5,04 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,54 | 4,80 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 11,16 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 11,16 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | coronilla, ginestra dei carbonai, rosa, biancospino |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | diffusa |
| Specie prevalenti: | graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **5b** | **Denominazione località** | **Costa della Guradia** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 2,27 |
| Utile Ha | 0,53 |
| Altro-tare Ha | 1,74 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 13;20 |
| Particella | 15 & 5;6;12;31;32;33 |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest |
| Pendenza % | 43,40 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1130 | 1298 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 26,55 |
| Provvigione reale totale | 0,53 | 14,06 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La spessina domina la particella 5b con il 75% della copertura, seguita dal novelleto con il 25%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,13 | 24,63 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,40 | 75,37 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 0,53 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 0,53 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | presente |
| Specie prevalenti: | ginestra dei carbonai, rosa, biancospino |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | prevalente |
| Specie prevalenti: | felce aquilina, graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **9** | **Denominazione località** | **Coste di Villa Romana** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 14,73 |
| Utile Ha | 1,81 |
| Altro-tare Ha | 12,92 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 7 |
| Particella | 22p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest |
| Pendenza % | 49,31 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 751 | 1155 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 49,13 |
| Provvigione reale totale | 1,81 | 88,90 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La spessina domina con l'80%, seguita dalla perticaia giovane al 18% e dalla fustaia giovane al 3%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,32 | 17,70 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,44 | 79,78 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,05 | 2,52 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,00 | 0,01 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 1,81 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 1,81 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | abbondante |
| Specie prevalenti: | ginestra dei carbonai, coronilla, cisto |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | diffusa |
| Specie prevalenti: | graminacee xerofile |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **10** | **Denominazione località** | **Canale di Mariella** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 10,22 |
| Utile Ha | 7,85 |
| Altro-tare Ha | 2,37 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 7 |
| Particella | 22p-30p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest |
| Pendenza % | 51,14 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 861 | 1360 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 201,86 |
| Provvigione reale totale | 7,85 | 1583,70 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

Questa particella presenta una forte presenza di fustaie giovani con il 38%, e una copertura di novellame del 24%. Le perticaie adulte costituiscono anch'esse il 24%, mentre la fustaia adulta è quasi assente con solo l'1%. La spessina rappresenta il 10% e le fustaie mature sono al 4%, indicando una distribuzione molto concentrata sulle formazioni giovanili.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 1,88 | 23,98 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 2,99 | 38,12 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,85 | 23,59 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,79 | 10,06 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,33 | 4,24 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 7,85 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 7,85 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | diffusa |
| Specie prevalenti: | ginestra dei carbonai, coronilla emerus, rose, rovi |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | diffusa |
| Specie prevalenti: | graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **11** | **Denominazione località** | **Ripa dei Corvi** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 14,69 |
| Utile Ha | 13,25 |
| Altro-tare Ha | 1,44 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 7 |
| Particella | 28-29-30p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest |
| Pendenza % | 49,21 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 884 | 1359 |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

Giacitura

Manufatti

Risorse idriche

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 273,80 |
| Provvigione reale totale | 13,25 | 3628,36 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

Una predominanza di perticaie giovani è evidente con il 39%, seguita da fustaie giovani al 16% e fustaie adulte al 14%. Le spessine costituiscono il 17%, mentre le fustaie mature sono solo al 3% e le perticaie adulte al 10%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 2,30 | 17,39 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 5,18 | 39,09 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,14 | 16,15 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,83 | 13,83 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,39 | 10,48 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,41 | 3,06 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 13,25 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 13,25 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | coronilla, ginestra dei carbonai, rose, colutea |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | diffusa |
| Specie prevalenti: | graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **12** | **Denominazione località** | **Monte Magnone** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 5,36 |
| Utile Ha | 5,19 |
| Altro-tare Ha | 0,17 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 7 |
| Particella | 22p-30p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord |
| Pendenza % | 46,15 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1217 | 1447 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 525,47 |
| Provvigione reale totale | 5,19 | 2724,68 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

Le fustaie mature rappresentano il 37% della copertura nella particella 12, seguite dalle fustaie adulte al 21% e dalle fustaie giovani al 19%. Le perticaie adulte e giovani sono rispettivamente al 12% e all'11%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,58 | 11,16 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,63 | 12,23 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,96 | 18,55 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,08 | 20,77 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 1,20 | 23,17 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,73 | 14,12 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 5,19 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 5,19 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | - |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | felce aquilina, graminacee, ciclamino |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **13** | **Denominazione località** | **Ripa dei Corvi** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 13,97 |
| Utile Ha | 12,63 |
| Altro-tare Ha | 1,34 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 3;7 |
| Particella | 94-156 ; 30p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Ovest | |
| Pendenza % | 48,40 | |
| Altitudine mt slm | min. 884 | max 1447 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 245,36 |
| Provvigione reale totale | 12,63 | 3098,93 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

Le perticaie giovani coprono il 50% della superficie nella particella 13, seguite dalle fustaie giovani al 27% e dalle fustaie adulte all'8%. Le fustaie mature rappresentano il 2% della copertura, con le spessine al 10% e le perticaie adulte al 3%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 1,28 | 10,15 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 6,26 | 49,58 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 3,38 | 26,76 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,05 | 8,35 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,39 | 3,08 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,23 | 1,83 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,03 | 0,25 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 12,63 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 12,63 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | coronilla, ginestra dei carbonai, rose, rovi, colutea |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | diffusa |
| Specie prevalenti: | graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **19** | **Denominazione località** | **Acerito** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 19,29 |
| Utile Ha | 3,92 |
| Altro-tare Ha | 15,37 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 7 |
| Particella | 22p-30p-34p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest |
| Pendenza % | 46,46 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 762 | 1360 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 70,83 |
| Provvigione reale totale | 3,92 | 277,66 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La particella 19 presenta un evidente errore di calcolo, indicando una fustaia matura che copre il 408% della superficie. Tuttavia, la distribuzione mostra la fustaia adulta al 5%, la fustaia giovane al 3% e la perticaia giovane all'82%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 3,23 | 82,42 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,39 | 9,84 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,19 | 4,81 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,11 | 2,93 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 3,92 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 3,92 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai, cisti, rosa |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **22** | **Denominazione località** | **Acerito** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 4,59 |
| Utile Ha | 3,57 |
| Altro-tare Ha | 1,02 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 7 |
| Particella | 34p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Ovest |
| Pendenza % | 47,96 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 904 | 1186 |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.7** | |
| **Viabilità** | |
| **Non Servita** | |
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 351,23 |
| Provvigione reale totale | 3,57 | 1253,82 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La perticaia giovane rappresenta il 33% della superficie, seguita dalla fustaia giovane al 24%, la fustaia adulta al 24%, e la perticaia adulta al 19%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,17 | 32,89 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,67 | 18,67 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,86 | 23,97 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,87 | 24,46 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 3,57 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 3,57 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai, coronilla emerus |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Abbondante |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **23** | **Denominazione località** | **Conca** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 17,92 |
| Utile Ha | 16,96 |
| Altro-tare Ha | 0,96 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 7 |
| Particella | 22p-34p-36 |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Ovest |
| Pendenza % | 40,87 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 949 | 1311 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Non Servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 447,18 |
| Provvigione reale totale | 16,96 | 7586,14 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 6 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Faggio* | *7%* | *Acero opalo* | *21%* | *Douglasia* | *7%* |
| *Ontano napoletano* | *2%* | *Carpino nero* | *54%* | | |
| | | *Cerro* | *9%* | | |
| | | *Pino nero* | *1%* | | |

Descrizione:

La fustaia adulta rappresenta il 28% della superficie, seguita dalla fustaia giovane al 23%, la spessina al 20%, la perticaia giovane al 14%, la fustaia matura al 15%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 2,38 | 14,04 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 3,32 | 19,56 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,89 | 22,91 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 4,77 | 28,14 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 2,32 | 13,67 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,28 | 1,68 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 16,96 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | Sì | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 16,96 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai, biancospino |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Graminacee (localizzate soprattutto nelle radure) |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **35** | **Denominazione località** | **Guarella** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 11,16 |
| Utile Ha | 5,41 |
| Altro-tare Ha | 5,75 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 11 |
| Particella | 20p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest |
| Pendenza % | 45,30 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 765 | 1265 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 102,55 |
| Provvigione reale totale | 5,41 | 554,97 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La perticaia giovane domina la particella 35, coprendo il 74% della superficie. Seguono la perticaia adulta con il 20% e il novelleto con il 4%, mentre la fustaia matura rappresenta il 2%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,22 | 4,03 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 4,03 | 74,39 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,07 | 19,82 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,10 | 1,76 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 5,41 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 5,41 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai, coronilla |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **36** | **Denominazione località** | **Guarella** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 5,16 |
| Utile Ha | 5,07 |
| Altro-tare Ha | 0,09 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 7;11;12 |
| Particella | 34p-73p ; 20p-29p ; 1p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord | |
| Pendenza % | 38,22 | |
| Altitudine mt slm | min. 1180 | max 1282 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Non Servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 503,06 |
| Provvigione reale totale | 5,07 | 2550,24 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 3 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Faggio* | *21%* | *Acero opalo* | *55%* |
| *Ontano napoletano* | *3%* | *Carpino nero* | *21%* |

Descrizione:

Nella particella 36, la fustaia adulta copre il 44% della superficie, seguita dalla fustaia matura al 23%, dalla perticaia giovane al 15% e dalla perticaia adulta al 12%. Il restante 6% è occupato da formazioni erbacee o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,33 | 6,48 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,62 | 12,14 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,76 | 15,02 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,22 | 43,78 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 1,14 | 22,57 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 5,07 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 5,07 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | - |
| Specie prevalenti: | - |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Felce aquilina, ortiche, graminacee, geranio robertianum |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **49** | **Denominazione località** | **Rompeciciuno** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 10,17 |
| Utile Ha | 4,17 |
| Altro-tare Ha | 6,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 11 |
| Particella | 20p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Ovest |
| Pendenza % | 43,27 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 783 | 1154 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 97,39 |
| Provvigione reale totale | 4,17 | 405,69 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La spessina rappresenta il 54% della superficie della particella 49, seguita dalla perticaia giovane al 32%, dal novelleto al 9% e dalla fustaia giovane al 5%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,39 | 9,30 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 2,25 | 53,90 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,34 | 32,16 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,19 | 4,64 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 4,17 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 4,17 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai, rovo, biancospino |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Abbondante |
| Specie prevalenti: | Graminacee, cardi, eringi |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **69** | **Denominazione località** | **La Difesa e Camparella** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 10,85 |
| Utile Ha | 9,52 |
| Altro-tare Ha | 1,33 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 10 |
| Particella | 126-128-129-132-144-153-156-163-189 |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Ovest |
| Pendenza % | 40,59 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 741 | 1077 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 226,13 |
| Provvigione reale totale | 9,52 | 2152,59 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 1 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

*Carpino nero* *88%* *Roverella* *13%*

Descrizione:

La particella 69 vede la spessina coprire il 42% della superficie, seguita dalla perticaia giovane al 42%, il novelleto al 10%, la fustaia giovane al 5% e la fustaia adulta all'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,97 | 10,20 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 3,98 | 41,81 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 4,03 | 42,36 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,46 | 4,80 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,08 | 0,82 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 9,52 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 9,52 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | diffusa |
| Specie prevalenti: | cisti, ginestra dei carbonai, biancospino, rosa canina |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **93** | **Denominazione località** | **Bocca di Calende** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 19,12 |
| Utile Ha | 13,29 |
| Altro-tare Ha | 5,83 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 10;15 |
| Particella | 148p ; 113p |

| **Generalità** | | | |
|---|---|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest | | |
| Pendenza % | 50,63 | | |
| Altitudine mt slm | min. 594 | max 1005 | |
| Giacitura | | | |
| Manufatti | | | |
| Risorse idriche | | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 137,26 |
| Provvigione reale totale | 13,29 | 1824,53 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La spessina rappresenta il 53% della copertura, seguita dalla perticaia giovane al 35%, dalla fustaia giovane al 10% e dalla fustaia adulta al 3%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 4,62 | 34,77 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 7,00 | 52,67 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,26 | 9,51 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,40 | 3,05 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 13,29 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 13,29 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai, rosa, coronilla, cisti |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, cerastio |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar

SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **94** | **Denominazione località** | **Calende** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 20,38 |
| Utile Ha | 19,82 |
| Altro-tare Ha | 0,56 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 18 |
| Particella | 11p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest |
| Pendenza % | 54,90 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 649 | 1008 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 283,17 |
| Provvigione reale totale | 19,82 | 5611,65 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La spessina copre il 49%, seguita dalla perticaia giovane al 26%, dalla fustaia giovane al 13%, dalla fustaia adulta al 6% e dalle formazioni erbacee o arbustive all'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,76 | 3,81 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 9,78 | 49,35 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 5,12 | 25,81 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,63 | 13,26 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,26 | 6,34 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,24 | 1,23 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,04 | 0,19 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 19,82 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 19,82 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Rosa, ginestra dei carbonai, coronilla, cisti |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **107** | **Denominazione località** | **Calende** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 24,34 |
| Utile Ha | 24,24 |
| Altro-tare Ha | 0,10 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 17;18 |
| Particella | 163p-164 ; 11p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord-Est | |
| Pendenza % | 58,80 | |
| Altitudine mt slm | min. 657 | max 1148 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 365,81 |
| Provvigione reale totale | 24,24 | 8866,38 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La perticaia giovane rappresenta il 21%, con un 29% di fustaie giovani e un 16% di fustaie adulte. Il novellame è al 2% e le fustaie mature al 6%, mostrando una buona distribuzione tra le diverse fasi di crescita.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,47 | 1,94 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 4,98 | 20,55 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 6,49 | 26,77 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 7,01 | 28,92 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 3,95 | 16,28 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 1,32 | 5,46 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,02 | 0,09 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 24,24 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 24,24 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Coronilla, genista, erica arborea, biancospino |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **108** | **Denominazione località** | **Calende** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 20,32 |
| Utile Ha | 19,88 |
| Altro-tare Ha | 0,44 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 18 |
| Particella | 11p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest |
| Pendenza % | 60,35 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 688 | 1107 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 293,02 |
| Provvigione reale totale | 19,88 | 5825,27 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La perticaia giovane copre il 32%, con il 28% di fustaie giovani e il 22% di fustaie adulte. Il novellame è al 7% e le fustaie mature all'1%, indicando una prevalenza di stadi giovanili ma con una presenza di fasi mature.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 1,46 | 7,36 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 6,34 | 31,88 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 5,65 | 28,40 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 4,41 | 22,21 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,88 | 9,45 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,14 | 0,70 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 19,88 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 19,88 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Coronilla, genista, ginestra dei carbonai |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **123** | **Denominazione località** | **Vallone di Calende** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 4,70 |
| Utile Ha | 4,70 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 17 |
| Particella | 101-102-163p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Ovest |
| Pendenza % | 40,14 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 832 | 1029 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 281,31 |
| Provvigione reale totale | 4,70 | 1321,48 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 5 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Agrifoglio* | *0%* | *Acero opalo* | *27%* | *Leccio* | *7%* |
| *Faggio* | *0%* | *Carpino nero* | *33%* | *Orniello* | *24%* |
| *Ontano napoletano* | *0%* | *Cerro* | *8%* | | |

Descrizione:

Le perticaie giovani coprono il 53% della superficie nella particella 123, seguite dalle fustaie adulte al 13% e dalle fustaie giovani al 31%. Le spessine rappresentano il 3% della copertura.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,13 | 2,80 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 2,49 | 53,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,44 | 30,70 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,63 | 13,50 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 4,70 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 4,70 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Abbondante |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **125** | **Denominazione località** | **Raia di Calende** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 6,68 |
| Utile Ha | 6,68 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 18 |
| Particella | 11p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord-Est | |
| Pendenza % | 48,83 | |
| Altitudine mt slm | min. 847 | max 1141 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.4** | |
| **Viabilità** | |
| **Scarsamente servita** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata | | Anno di taglio | **0** |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata | | Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: | | Ha: | mc: |
|---|---|---|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 511,71 | Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Provvigione reale totale | 6,68 | 3418,92 | Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

Le fustaie mature rappresentano il 32% della copertura nella particella 125, seguite dalle fustaie giovani al 13% e dalle fustaie adulte al 14%. Le perticaie giovani coprono il 24% e le perticaie adulte al 16%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,09 | 16,26 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,63 | 24,42 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,85 | 12,72 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,94 | 14,05 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,81 | 12,11 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,60 | 9,04 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,76 | 11,41 |
| **Totale** | 6,68 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 6,68 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Coronilla, maggiociondolo |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **126** | **Denominazione località** | **Raia di Calende** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 6,70 |
| Utile Ha | 6,68 |
| Altro-tare Ha | 0,02 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 18 |
| Particella | 11p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Ovest |
| Pendenza % | 54,45 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 804 | 1143 |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.4** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata | |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata | |
| Anno di taglio | | **0** |
| Età media all'anno di taglio | | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 399,47 |
| Provvigione reale totale | 6,68 | 2670,23 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La copertura nella particella 126 è dominata dalle fustaie adulte al 29% e dalle perticaie giovani al 31%. Le fustaie mature coprono il 20% della superficie, mentre le fustaie giovani rappresentano l'11%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 2,16 | 32,34 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,01 | 30,07 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,73 | 10,91 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,59 | 8,87 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,53 | 7,97 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,27 | 3,99 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,39 | 5,85 |
| **Totale** | 6,68 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 6,68 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Coronilla, meliloto, dafne |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Abbondante |
| Specie prevalenti: | Vinca (a monte), graminacee (a valle) |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **139** | **Denominazione località** | **Orno** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 3,70 |
| Utile Ha | 3,62 |
| Altro-tare Ha | 0,08 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 23 |
| Particella | 1p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Ovest |
| Pendenza % | 41,44 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 815 | 1054 |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.4** | |
| **Viabilità** | |
| **Scarsamente servita** | |
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata | | Anno di taglio | **0** |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata | | Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: | | Ha: | mc: |
|---|---|---|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 273,00 | Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Provvigione reale totale | 3,62 | 987,92 | Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La perticaia giovane copre il 55% della superficie, mentre la perticaia adulta copre il 30%. Le fustaie giovani occupano il 9% e le fustaie adulte il 6%. Il resto sono formazioni erbacce o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,34 | 9,28 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,99 | 55,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,09 | 30,00 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,21 | 5,72 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 3,62 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 3,62 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Erica arborea, coronilla, ginestra dei carbonai |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **141** | **Denominazione località** | **Vallone delle Querce** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 8,05 |
| Utile Ha | 8,05 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 18;23 |
| Particella | 11p ; 29p-23 |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest | |
| Pendenza % | 44,19 | |
| Altitudine mt slm | min. 831 | max 1124 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.4** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata | | Anno di taglio | **0** |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata | | Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: | | Ha: | mc: |
|---|---|---|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 276,01 | Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Provvigione reale totale | 8,05 | 2221,04 | Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La perticaia giovane copre il 55% della superficie, seguita dalle spessine con il 18%. Le perticaie adulte rappresentano il 13%, le fustaie giovani e le fustaie adulte coprono ciascuna il 6%. Il resto sono formazioni erbacce o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 1,47 | 18,25 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 4,40 | 54,73 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,04 | 12,98 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,48 | 5,96 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,46 | 5,75 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,12 | 1,45 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,07 | 0,88 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 8,05 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 8,05 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Erica arborea, biancospino, coronilla emerus, ginestra dei carbonai |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **156** | **Denominazione località** | **Porcacciolo** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 3,41 |
| Utile Ha | 3,41 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 23 |
| Particella | 33p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest |
| Pendenza % | 44,23 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 872 | 1054 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 384,52 |
| Provvigione reale totale | 3,41 | 1311,03 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

Le perticaie adulte coprono il 38% della superficie, seguite dalle perticaie giovani con il 23%, dalle fustaie giovani con il 21%, dalle fustaie adulte con il 12% e dalle fustaie mature con il 7%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,04 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,28 | 37,66 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,77 | 22,63 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,72 | 21,25 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,40 | 11,72 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,23 | 6,71 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 3,41 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 3,41 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Erica arborea, coronilla, ginestra dei carbonai, rose |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Abbondante |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **157** | **Denominazione località** | **Porcacciolo** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 6,00 |
| Utile Ha | 5,25 |
| Altro-tare Ha | 0,75 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 23 |
| Particella | 33p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest |
| Pendenza % | 42,90 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 911 | 1134 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 237,42 |
| Provvigione reale totale | 5,25 | 1245,80 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

Le spessine rappresentano il 17% della superficie, seguite dalle perticaie giovani con il 39%, dalle perticaie adulte con il 30%, dalle fustaie giovani con il 12% e dalle fustaie adulte con l'1%. Il resto sono formazioni erbacce o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,92 | 17,48 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 2,06 | 39,19 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,58 | 30,18 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,65 | 12,47 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,04 | 0,68 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 5,25 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 5,25 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Erica, rovi, biancospino, rose, ginestra dei carbonai |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **159** | **Denominazione località** | **Vallone delle Querce** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 10,68 |
| Utile Ha | 10,63 |
| Altro-tare Ha | 0,05 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 23 |
| Particella | 29p-33p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord |
| Pendenza % | 49,48 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 848 | 1226 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 578,69 |
| Provvigione reale totale | 10,63 | 6152,81 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

Le perticaie adulte coprono il 21% della superficie nella particella 159, seguite dalle fustaie giovani con il 34% e dalle fustaie mature con il 35%. Le perticaie giovani rappresentano il 4% e le spessine il 5%. Il resto della superficie è occupato da formazioni erbacee o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,46 | 4,32 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,54 | 5,07 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,26 | 21,28 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 3,61 | 33,97 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 3,10 | 29,13 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,66 | 6,23 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 10,63 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 10,63 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Biancospino, ginestra |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Graminacee (soprattutto nel ceduo) |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **160** | **Denominazione località** | **Porcacciolo** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 4,71 |
| Utile Ha | 4,57 |
| Altro-tare Ha | 0,14 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 23 |
| Particella | 33p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest |
| Pendenza % | 39,31 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1041 | 1300 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 471,12 |
| Provvigione reale totale | 4,57 | 2153,79 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

Le perticaie giovani coprono il 16% della superficie della particella 160, seguite dalle perticaie adulte con il 12%, le fustaie giovani con il 15%, le fustaie adulte con il 14% e le fustaie mature con il 34%. Le spessine rappresentano il 9%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,43 | 9,34 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,74 | 16,13 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,53 | 11,65 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,70 | 15,32 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,63 | 13,81 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,88 | 19,16 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,67 | 14,59 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 4,57 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 4,57 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Assente |
| Specie prevalenti: | Raro rovo |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Assente |
| Specie prevalenti: | Poche graminacee (verso il crinale) |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **161** | **Denominazione località** | **Valle del Porco** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 12,84 |
| Utile Ha | 11,55 |
| Altro-tare Ha | 1,29 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 23 |
| Particella | 29p-33p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest | |
| Pendenza % | 48,08 | |
| Altitudine mt slm | min. 832 | max 1302 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 234,53 |
| Provvigione reale totale | 11,55 | 2708,75 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

Nella particella 161, le spessine rappresentano il 34% della superficie, seguite dalle perticaie giovani con il 37%, le perticaie adulte con il 13%, le fustaie giovani con il 5%, le fustaie adulte con il 5% e le fustaie mature con il 5%. Il resto della superficie è occupato da formazioni erbacee o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 3,98 | 34,42 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 4,31 | 37,29 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,49 | 12,92 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,61 | 5,32 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,59 | 5,10 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,50 | 4,35 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,07 | 0,59 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 11,55 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 11,55 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai, coronilla, erica arborea, cisti |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Abbondante |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **177** | **Denominazione località** | **Vallone del Porco** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 9,32 |
| Utile Ha | 9,32 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 23 |
| Particella | 33p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord |
| Pendenza % | 53,12 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 880 | 1274 |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

Giacitura

Manufatti

Risorse idriche

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 581,78 |
| Provvigione reale totale | 9,32 | 5422,09 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

Nella particella 177, la fustaia matura e la fustaia adulta rappresentano entrambe il 37% della superficie, seguite dalla fustaia giovane con il 17%, la perticaia adulta con il 6% e la perticaia giovane con il 4%. Le formazioni erbacee o arbustive coprono l'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,01 | 0,07 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,33 | 3,56 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,54 | 5,77 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,57 | 16,84 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 3,42 | 36,70 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 2,68 | 28,81 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,66 | 7,04 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,11 | 1,21 |
| **Totale** | 9,32 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 9,32 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Ginestra, coronilla, rovo |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **178** | **Denominazione località** | **Montagna Grande** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 9,50 |
| Utile Ha | 8,82 |
| Altro-tare Ha | 0,68 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 23 |
| Particella | 33p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Ovest |
| Pendenza % | 44,16 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 882 | 1251 |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

Giacitura

Manufatti

Risorse idriche

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 254,80 |
| Provvigione reale totale | 8,82 | 2246,81 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia matura copre il 32% della superficie della particella 178, seguita dalla fustaia adulta con il 6%, la fustaia giovane con il 5%, la perticaia adulta con il 39% e la perticaia giovane con il 17%. Le formazioni erbacee o arbustive coprono l'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 1,50 | 17,05 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 3,43 | 38,90 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,86 | 32,40 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,56 | 6,40 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,46 | 5,17 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,01 | 0,09 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 8,82 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 8,82 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai, rosa, erica arborea |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Abbondante |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **179** | **Denominazione località** | **Montagna Grande** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 6,01 |
| Utile Ha | 5,89 |
| Altro-tare Ha | 0,12 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 23 |
| Particella | 33p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest |
| Pendenza % | 44,12 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 923 | 1253 |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

Giacitura

Manufatti

Risorse idriche

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 303,84 |
| Provvigione reale totale | 5,89 | 1788,82 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

Nella particella 179, la fustaia matura rappresenta il 22% della superficie, con la fustaia adulta al 18%, la fustaia giovane al 7%, la perticaia adulta al 39% e la perticaia giovane al 14%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,85 | 14,42 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 2,30 | 38,99 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,29 | 21,89 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,04 | 17,65 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,41 | 7,04 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 5,89 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 5,89 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai, erica arborea, rosa |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **180** | **Denominazione località** | **Montagna Grande** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 8,14 |
| Utile Ha | 6,50 |
| Altro-tare Ha | 1,64 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 23 |
| Particella | 33p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest |
| Pendenza % | 42,87 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 858 | 1274 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 163,04 |
| Provvigione reale totale | 6,50 | 1059,87 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

Nella particella 180, la fustaia matura rappresenta il 3% della superficie, con la fustaia adulta al 3%, la fustaia giovane al 7%, la perticaia adulta al 41% e la perticaia giovane al 47%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 3,04 | 46,69 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 2,66 | 40,88 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,47 | 7,16 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,18 | 2,73 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,16 | 2,53 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 6,50 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 6,50 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai, erica arborea |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **181** | **Denominazione località** | **Montagna Grande** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 2,36 |
| Utile Ha | 2,36 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 23 |
| Particella | 33p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest |
| Pendenza % | 50,90 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 857 | 1104 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 433,71 |
| Provvigione reale totale | 2,36 | 1021,46 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia matura copre il 22% della superficie della particella 181, con la fustaia adulta al 31%, la fustaia giovane al 28% e la perticaia adulta al 19%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,45 | 19,02 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,66 | 28,13 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,51 | 21,79 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,73 | 31,06 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 2,36 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 2,36 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai, coronilla |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Abbondante |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **182** | **Denominazione località** | **Vallone di Cola** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 3,47 |
| Utile Ha | 3,45 |
| Altro-tare Ha | 0,02 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 23 |
| Particella | 33p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Ovest |
| Pendenza % | 50,58 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 855 | 1119 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 249,64 |
| Provvigione reale totale | 3,45 | 862,42 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

Nella particella 182, la fustaia matura rappresenta il 2% della superficie, con la fustaia adulta al 5%, la fustaia giovane al 4%, la perticaia adulta al 15% e la perticaia giovane al 44%. Le formazioni erbacee o arbustive coprono il 2%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 1,03 | 29,82 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,51 | 43,79 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,53 | 15,47 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,13 | 3,85 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,18 | 5,19 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,07 | 1,88 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 3,45 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 3,45 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai, erica arbustiva, coronilla |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **183** | **Denominazione località** | **Montagna Grande** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 9,20 |
| Utile Ha | 8,84 |
| Altro-tare Ha | 0,36 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 23 |
| Particella | 33p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest |
| Pendenza % | 38,89 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1090 | 1388 |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

Giacitura

Manufatti

Risorse idriche

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 436,37 |
| Provvigione reale totale | 8,84 | 3859,05 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia matura copre il 15% della superficie della particella 183, con la fustaia adulta al 29%, la fustaia giovane al 19%, la perticaia adulta al 16% e la perticaia giovane al 18%. Le formazioni erbacee o arbustive coprono l'8%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,34 | 3,86 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,61 | 18,19 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,38 | 15,57 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,67 | 18,87 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,53 | 28,65 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,97 | 11,01 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,34 | 3,85 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 8,84 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 8,84 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Rovo, ginestra dei carbonai, coronilla |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Abbondante |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **184** | **Denominazione località** | **Vallone di Cola** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 7,91 |
| Utile Ha | 6,45 |
| Altro-tare Ha | 1,46 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 23 |
| Particella | 33p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest | |
| Pendenza % | 46,36 | |
| Altitudine mt slm | min. 1003 | max 1396 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 205,10 |
| Provvigione reale totale | 6,45 | 1323,16 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



| STRATO ARBOREO | |
|---|---|
| Specie presenti: | |

Descrizione:

Nella particella 184, la fustaia matura copre una piccola parte della superficie, appena il 2%. La fustaia adulta e la fustaia giovane sono distribuite equamente, ciascuna coprendo il 6%. La perticaia adulta occupa il 13%, mentre la perticaia giovane rappresenta una quota significativa con il 46%. Il resto della superficie è occupato da formazioni erbacee o arbustive, che coprono il 2%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 1,77 | 27,49 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 2,99 | 46,32 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,84 | 12,95 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,37 | 5,67 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,36 | 5,54 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,11 | 1,65 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,02 | 0,38 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 6,45 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 6,45 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

| STRATO ARBUSTIVO | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai, rovo, coronilla, genista, erica |

| STRATO ERBACEO | |
|---|---|
| Copertura: | Abbondante |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

| PRESCRIZIONI |
|---|
| |

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **185** | **Denominazione località** | **Apeticchia** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 13,85 |
| Utile Ha | 13,79 |
| Altro-tare Ha | 0,06 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 23 |
| Particella | 29p-33p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord-Est | |
| Pendenza % | 48,24 | |
| Altitudine mt slm | min. 1060 | max 1436 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | 140 |
| Classe cronologica o diametrica | 130-150 |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 775,38 |
| Provvigione reale totale | 13,79 | 10696,26 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia matura domina la particella 185, coprendo l'84% della superficie. Seguono la fustaia adulta con l'8%, la fustaia giovane con il 5% e la perticaia adulta con il 2%. Le formazioni erbacee o arbustive coprono l'1% della superficie.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,07 | 0,51 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,28 | 2,03 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,71 | 5,15 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,13 | 8,17 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 2,44 | 17,68 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 4,60 | 33,34 |
| Fustaie mature h >32 m | 4,57 | 33,12 |
| **Totale** | 13,79 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 13,79 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | agrifoglio, rovo, daphne laureola |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | graminacee, vinca, ciclamino |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **186** | **Denominazione località** | **Apeticchia** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 12,88 |
| Utile Ha | 12,81 |
| Altro-tare Ha | 0,07 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 23 |
| Particella | 29p-33p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Ovest |
| Pendenza % | 41,37 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1092 | 1374 |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.4** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata | |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata | |
| Anno di taglio | | **0** |
| Età media all'anno di taglio | | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 506,72 |
| Provvigione reale totale | 12,81 | 6489,37 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La distribuzione nella particella 186 vede la fustaia matura coprire il 29% della superficie. La fustaia adulta e la fustaia giovane sono quasi uguali, con il 22% e il 20% rispettivamente. La perticaia adulta rappresenta il 19% della superficie, mentre la perticaia giovane copre il 9%. Le formazioni erbacee o arbustive coprono l'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,03 | 0,22 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,13 | 8,83 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,47 | 19,28 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,59 | 20,23 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,85 | 22,22 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 2,23 | 17,39 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 1,33 | 10,40 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,18 | 1,43 |
| **Totale** | 12,81 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 12,81 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio, ginestra dei carbonai e rosa |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **201** | **Denominazione località** | **Vallone di Cola** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 8,68 |
| Utile Ha | 8,66 |
| Altro-tare Ha | 0,02 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 23 |
| Particella | 33p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord |
| Pendenza % | 55,30 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 922 | 1337 |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

Giacitura

Manufatti

Risorse idriche

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 592,03 |
| Provvigione reale totale | 8,66 | 5129,57 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia matura rappresenta il 46% della superficie, mentre la fustaia adulta copre il 28%, la fustaia giovane l'11%, la perticaia adulta l'8%, la perticaia giovane il 6% e la spessina l'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,10 | 1,11 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,50 | 5,81 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,73 | 8,48 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,93 | 10,75 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,39 | 27,62 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 2,90 | 33,42 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 1,11 | 12,81 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 8,66 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 8,66 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | - |
| Specie prevalenti: | - |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **202** | **Denominazione località** | **Vallone dell'Acero** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 14,62 |
| Utile Ha | 14,01 |
| Altro-tare Ha | 0,61 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 23 |
| Particella | 33p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest |
| Pendenza % | 49,01 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 865 | 1362 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 294,15 |
| Provvigione reale totale | 14,01 | 4119,60 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia matura copre solo il 6% della superficie, con la fustaia adulta al 9%, la fustaia giovane al 10%, la perticaia adulta al 16%, la perticaia giovane al 38% e il novelleto al 20%. Le formazioni erbacee o arbustive completano l'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 2,79 | 19,94 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 5,37 | 38,38 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,30 | 16,40 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,42 | 10,17 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,24 | 8,84 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,72 | 5,15 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,16 | 1,12 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 14,01 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 14,01 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Rosa, ginestra dei carbonai, biancospino |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Abbondante |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **203** | **Denominazione località** | **Vallone di Valle dell'Acero** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 11,45 |
| Utile Ha | 10,97 |
| Altro-tare Ha | 0,48 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 23;27 |
| Particella | 29p-33p ; 3p-151p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest | |
| Pendenza % | 45,64 | |
| Altitudine mt slm | min. 1150 | max 1410 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 428,63 |
| Provvigione reale totale | 10,97 | 4700,18 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

In questa particella, la fustaia matura copre il 19% della superficie. La fustaia adulta e la fustaia giovane coprono rispettivamente il 20% e il 18%, seguite dalla perticaia adulta al 18%, la perticaia giovane al 22% e il novelleto al 3%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,33 | 3,02 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 2,37 | 21,64 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,98 | 18,07 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,98 | 18,02 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,17 | 19,76 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 1,73 | 15,74 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,41 | 3,75 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 10,97 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 10,97 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | rovo, dafne |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | diffusa |
| Specie prevalenti: | graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **216** | **Denominazione località** | **Vallone della Scarrupata** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 7,83 |
| Utile Ha | 7,65 |
| Altro-tare Ha | 0,18 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 23;27 |
| Particella | 33p ; 3p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Ovest |
| Pendenza % | 50,18 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 869 | 1161 |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.4** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata | |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata | |
| Anno di taglio | | **0** |
| Età media all'anno di taglio | | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 212,17 |
| Provvigione reale totale | 7,65 | 1623,55 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La spessina copre il 31% della superficie, seguita dalla perticaia giovane al 57%, la fustaia giovane all'11%, e la fustaia adulta e matura all'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 2,34 | 30,58 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 4,35 | 56,83 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,83 | 10,89 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,07 | 0,89 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,05 | 0,69 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,01 | 0,11 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 7,65 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 7,65 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | rosa, ginestra dei carbonai, biancospino |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | abbondante |
| Specie prevalenti: | graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **217** | **Denominazione località** | **Coste dell'Ausano** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 16,50 |
| Utile Ha | 16,15 |
| Altro-tare Ha | 0,35 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 23;27 |
| Particella | 33p ; 3p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest |
| Pendenza % | 51,15 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 861 | 1353 |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| Giacitura | |
|---|---|
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 420,29 |
| Provvigione reale totale | 16,15 | 6788,37 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La spessina occupa il 23% della superficie, seguita dalla perticaia giovane al 23%, la fustaia giovane al 23%, la fustaia adulta al 16%, e la fustaia matura al 15%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,20 | 1,24 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 3,68 | 22,79 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 3,66 | 22,66 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,66 | 22,67 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,59 | 16,01 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 1,86 | 11,54 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,50 | 3,07 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 16,15 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 16,15 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | assente |
| Specie prevalenti: | - |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | abbondante |
| Specie prevalenti: | graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **218** | **Denominazione località** | **Vallone di Valle dell'Acero** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 13,14 |
| Utile Ha | 13,11 |
| Altro-tare Ha | 0,03 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 23;27 |
| Particella | 33p ; 3p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord |
| Pendenza % | 52,77 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 978 | 1399 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| **Sottosuolo** |
|---|
| **Calcareo** |

| **Suolo** |
|---|
| **MAP 4.4** |

| **Viabilità** |
|---|
| **Scarsamente servita** |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 654,65 |
| Provvigione reale totale | 13,11 | 8582,07 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia matura rappresenta il 63% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 24%, la fustaia giovane all'8%, e la perticaia giovane al 3%. La spessina è presente al 2%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,29 | 2,22 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,43 | 3,31 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,05 | 8,00 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 3,10 | 23,64 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 4,77 | 36,35 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 3,13 | 23,91 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,34 | 2,57 |
| **Totale** | 13,11 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 13,11 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | ginestra dei carbonai, coronilla |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **219** | **Denominazione località** | **Vallone della Scarrupata** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 9,92 |
| Utile Ha | 8,29 |
| Altro-tare Ha | 1,63 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 27 |
| Particella | 3p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest |
| Pendenza % | 46,24 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1044 | 1401 |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.4** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata | |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata | |
| Anno di taglio | | **0** |
| Età media all'anno di taglio | | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 220,37 |
| Provvigione reale totale | 8,29 | 1827,59 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La spessina copre il 57% della superficie, seguita dalla perticaia giovane al 15%, la fustaia giovane all'8%, la fustaia adulta al 5%, e la fustaia matura al 3%. Il novelleto rappresenta il 13%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 1,05 | 12,61 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 4,69 | 56,60 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,26 | 15,25 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,66 | 7,94 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,40 | 4,85 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,22 | 2,64 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,01 | 0,10 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 8,29 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 8,29 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | ginestra dei carbonai |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | diffusa |
| Specie prevalenti: | graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **222b** | **Denominazione località** | **Valle d'Acero** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 8,30 |
| Utile Ha | 8,08 |
| Altro-tare Ha | 0,22 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 27 |
| Particella | 151p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest |
| Pendenza % | 40,54 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1402 | 1605 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 321,62 |
| Provvigione reale totale | 8,08 | 2600,26 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 5 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | |
|---|---|
| *Faggio* | *96%* |
| *Sorbo degli Ucc.* | *4%* |

Descrizione:

La spessina rappresenta il 35% della superficie, seguita dalla perticaia giovane al 35%, la fustaia giovane al 20%, e la fustaia adulta al 10%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 2,79 | 34,52 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,85 | 35,25 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,64 | 20,29 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,80 | 9,93 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 8,08 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 8,08 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Ginestra dei carbonai, rovo |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **223b** | **Denominazione località** | **Valle d'Acero** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 6,28 |
| Utile Ha | 6,26 |
| Altro-tare Ha | 0,02 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 27 |
| Particella | 151p-152-157-158-159-160 |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud | |
| Pendenza % | 40,70 | |
| Altitudine mt slm | min. 1406 | max 1599 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.4** | |
| **Viabilità** | |
| **Scarsamente servita** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata | | Anno di taglio | 0 |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata | | Età media all'anno di taglio | 0 |

| | Ha: | mc: | | Ha: | mc: |
|---|---|---|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 446,75 | Ripresa unitaria | | 0,0 |
| Provvigione reale totale | 6,26 | 2794,83 | Ripresa totale | | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 4 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Faggio* | *93%* | *Carpino nero* | *2%* |
| *Maggiociondolo* | *5%* | | |

Descrizione:

La fustaia giovane rappresenta il 45% della superficie, seguita dalla spessina al 21%, la fustaia adulta al 23%, e la fustaia matura al 4%. La spessina è presente al 7%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,43 | 6,84 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,27 | 20,24 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,80 | 44,73 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,49 | 23,81 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,27 | 4,38 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 6,26 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 6,26 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Rovo, ginestra |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, rovi |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **224a** | **Denominazione località** | **Valle d'Acero** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 21,07 |
| Utile Ha | 20,30 |
| Altro-tare Ha | 0,77 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 27;28 |
| Particella | 151p ; 1p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest | |
| Pendenza % | 40,05 | |
| Altitudine mt slm | min. 1352 | max 1648 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 460,28 |
| Provvigione reale totale | 20,30 | 9343,65 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 13 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| *Agrifoglio* | *0%* |
| *Faggio* | *97%* |
| *Maggiociondolo* | *2%* |
| *Sorbo degli Ucc.* | *0%* |

Descrizione:

La fustaia giovane copre il 31% della superficie, con la fustaia adulta al 29%, la spessina al 19%, e la fustaia matura al 16%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,94 | 4,63 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 4,02 | 19,82 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 6,36 | 31,31 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 5,81 | 28,60 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 2,55 | 12,56 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,58 | 2,84 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,05 | 0,24 |
| **Totale** | 20,30 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 20,30 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, rovi |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **242** | **Denominazione località** | **Vallone della Scarrupata** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 16,28 |
| Utile Ha | 15,55 |
| Altro-tare Ha | 0,73 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 27 |
| Particella | 3p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Ovest |
| Pendenza % | 50,72 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 850 | 1381 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 344,26 |
| Provvigione reale totale | 15,55 | 5353,21 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La spessina copre il 30% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 24%, la perticaia giovane al 24%, la fustaia giovane al 16%, la fustaia matura all'8%, e il novelleto al 6%, con il resto formazioni erbacee o arbustive (4%).

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,97 | 6,22 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 4,83 | 31,05 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 3,90 | 25,07 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,52 | 16,18 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,98 | 12,73 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 1,07 | 6,90 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,29 | 1,86 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 15,55 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 15,55 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | ginestra dei carbonai, coronilla, ginestra |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | abbondante |
| Specie prevalenti: | graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **243** | **Denominazione località** | **Coste dell'Ausano** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 9,10 |
| Utile Ha | 9,08 |
| Altro-tare Ha | 0,02 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 27 |
| Particella | 3p-151p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Ovest |
| Pendenza % | 42,81 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 885 | 1290 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 361,80 |
| Provvigione reale totale | 9,08 | 3283,94 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia adulta rappresenta il 51% della superficie, seguita dalla fustaia giovane al 40%, la perticaia giovane al 27%, e la fustaia matura al 14%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,04 | 11,46 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,86 | 20,53 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 3,04 | 33,51 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,04 | 22,48 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,77 | 8,45 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,22 | 2,43 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,10 | 1,15 |
| **Totale** | 9,08 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 9,08 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | rovo, ginestra dei carbonai, coronilla |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | diffusa |
| Specie prevalenti: | graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **244** | **Denominazione località** | **Vallone della Scarrupata** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 17,36 |
| Utile Ha | 17,35 |
| Altro-tare Ha | 0,01 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 27 |
| Particella | 3p-151p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord |
| Pendenza % | 48,75 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 866 | 1501 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 680,59 |
| Provvigione reale totale | 17,35 | 11807,11 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia matura copre il 103% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 24%, la fustaia giovane al 15%, e la perticaia giovane all'11%, con il novelleto al 3%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,37 | 2,12 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,24 | 7,17 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,67 | 9,63 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,71 | 15,61 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 4,59 | 26,44 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 4,97 | 28,64 |
| Fustaie mature h >32 m | 1,80 | 10,40 |
| **Totale** | 17,35 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 17,35 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Rovo, dafne |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, asperula, acetosella, viola |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **245** | **Denominazione località** | **Grotta dei Briganti** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 18,15 |
| Utile Ha | 15,29 |
| Altro-tare Ha | 2,86 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 27 |
| Particella | 3p-151p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Ovest |
| Pendenza % | 45,56 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1033 | 1502 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 400,22 |
| Provvigione reale totale | 15,29 | 6119,13 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia matura rappresenta il 67% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 47%, la fustaia giovane al 40%, la perticaia adulta al 40%, e il novelleto all'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,05 | 0,32 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 2,46 | 16,08 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 3,41 | 22,32 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,46 | 16,09 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,84 | 18,58 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 2,11 | 13,80 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 1,26 | 8,22 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,70 | 4,59 |
| **Totale** | 15,29 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 15,29 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | assente |
| Specie prevalenti: | maggiociondolo |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | diffusa |
| Specie prevalenti: | graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **246** | **Denominazione località** | **Scarrupata** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 9,45 |
| Utile Ha | 9,41 |
| Altro-tare Ha | 0,04 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 27 |
| Particella | 3p-151p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord |
| Pendenza % | 44,63 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1061 | 1504 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 630,35 |
| Provvigione reale totale | 9,41 | 5932,27 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia matura copre il 52% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 28%, la fustaia giovane al 10%, la perticaia adulta al 4%, e la perticaia giovane all'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,01 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,15 | 1,62 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,82 | 8,70 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,95 | 10,08 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,91 | 20,28 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 3,64 | 38,70 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 1,94 | 20,60 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 9,41 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 9,41 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Rovo, dafne |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Diffusa |
| Specie prevalenti: | Graminacee, dafne |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **268** | **Denominazione località** | **Vallone Cupo** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 17,07 |
| Utile Ha | 17,07 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 27 |
| Particella | 1p-3p-151p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord | |
| Pendenza % | 43,94 | |
| Altitudine mt slm | min. 911 | max 1338 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 617,59 |
| Provvigione reale totale | 17,07 | 10544,30 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia matura domina questa particella con il 48%, seguita dalla fustaia adulta al 33% e dalla perticaia giovane al 13%. La spessina copre il 6%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,02 | 6,00 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,25 | 13,17 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 5,55 | 32,50 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 7,09 | 41,53 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 1,16 | 6,80 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 17,07 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 17,07 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Assente |
| Specie prevalenti: | Agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Abbondante |
| Specie prevalenti: | Graminacee, vinca, rovo |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **269** | **Denominazione località** | **Vallebona** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 11,85 |
| Utile Ha | 11,84 |
| Altro-tare Ha | 0,01 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 27 |
| Particella | 3p-151p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Ovest |
| Pendenza % | 41,39 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1061 | 1339 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 587,39 |
| Provvigione reale totale | 11,84 | 6955,86 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia matura copre il 42%, seguita dalla fustaia adulta al 24%, la fustaia giovane al 19%, e la perticaia giovane al 15%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 1,74 | 14,70 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 2,20 | 18,61 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,90 | 24,46 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 2,93 | 24,75 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 1,92 | 16,20 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,15 | 1,26 |
| **Totale** | 11,84 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 11,84 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Scarsa |
| Specie prevalenti: | Coronilla, rovo |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | Abbondante |
| Specie prevalenti: | Graminacee, vinca |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **270** | **Denominazione località** | **Vallone Cupo** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 18,41 |
| Utile Ha | 18,08 |
| Altro-tare Ha | 0,33 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 27 |
| Particella | 151p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Ovest | |
| Pendenza % | 41,60 | |
| Altitudine mt slm | min. 1059 | max 1445 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 506,07 |
| Provvigione reale totale | 18,08 | 9151,44 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

Questa particella vede la fustaia matura al 32%, seguita dalla fustaia giovane e adulta entrambe al 23%. La perticaia giovane occupa il 12%, la spessina l'8%, e il novelleto l'1%, con il resto come formazioni erbacee o arbustive (1%).

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,25 | 1,37 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 1,53 | 8,48 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 2,13 | 11,80 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 4,15 | 22,95 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 4,15 | 22,93 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 4,76 | 26,32 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 1,11 | 6,16 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 18,08 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 18,08 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | rovo, agrifoglio |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | diffusa |
| Specie prevalenti: | graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **281** | **Denominazione località** | **Coste di Tannaro** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 8,59 |
| Utile Ha | 8,59 |
| Altro-tare Ha | 0,00 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 28 |
| Particella | 1p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud |
| Pendenza % | 52,58 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 968 | 1205 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 614,22 |
| Provvigione reale totale | 8,59 | 5276,65 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia matura copre il 40%, seguita dalla fustaia adulta al 31%, dalla fustaia giovane al 14%, e dalla perticaia giovane all'11%, con la spessina al 4%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,36 | 4,17 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,94 | 10,99 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,22 | 14,25 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,63 | 30,64 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 1,31 | 15,20 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,80 | 9,30 |
| Fustaie mature h >32 m | 1,33 | 15,45 |
| **Totale** | 8,59 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 8,59 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | assente |
| Specie prevalenti: | rovo, ginestra dei carbonai |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | abbondante |
| Specie prevalenti: | graminacee |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **P** |
|---|---|

| **Particella** | **283** | **Denominazione località** | **Coste di Tannaro** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 34,30 |
| Utile Ha | 33,98 |
| Altro-tare Ha | 0,32 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 28 |
| Particella | 1p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest |
| Pendenza % | 50,17 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 918 | 1263 |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

Giacitura

Manufatti

Risorse idriche

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 468,79 |
| Provvigione reale totale | 33,98 | 15928,17 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia giovane copre il 26%, seguita dalla fustaia adulta al 26%, dalla perticaia giovane al 23%, dalla spessina all'8%, e il novelleto all'1%, con il resto come formazioni erbacee o arbustive (1%).

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,14 | 0,42 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 2,75 | 8,10 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 8,87 | 26,11 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 7,93 | 23,34 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 5,53 | 16,27 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 4,79 | 14,10 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 2,42 | 7,13 |
| Fustaie mature h >32 m | 1,54 | 4,53 |
| **Totale** | 33,98 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | Protezione idrogeologica | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 33,98 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | scarsa |
| Specie prevalenti: | ginestra dei carbonai, rovo |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | abbondante |
| Specie prevalenti: | graminacee, felce |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



# PARTICELLE FORESTALI DELLA CLASSE ECONOMICA/COMPRESA V

**Art. 90, comma 2, del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Particella forestale | | | | | | Dati catastali | | Area protetta - zonizzazione | | | Aree percorse dal Fuoco | | *Vincoli | Dati Dendrometrici | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località | n° | Superficie in Ha | | | | Foglio | Particella | A | B | C | | | | Densità | | Pr unitaria mc/Ha | Pr totale mc | ***Pp unitaria mc/Ha | ***Pp totale mc | Incremento (medio e/o corrente) mc | Età all'anno di redazione del PGF |
| | | Totale | Bosco | Pascolo - prati - radure | Altro | | | Ha | Ha | Ha | Anno | Ha | | A.B. unitaria mq/Ha | **Soggetti n°/Ha | | | | | | |
| Tronola | 313 | 9,06 | 7,60 | 1,46 | | 19 | 43p-323p | | 5,88 | 3,18 | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 311,04 | 2.365,36 | | | | indeterminata |
| | | | | | | 25 | 9p-12p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 31 | 265p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 32 | 14p | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALI** | | **9,06** | **7,60** | **1,46** | | | | | | | | | | | | | **2.365,36** | | **0,00** | | |

* = Vincoli:

| | |
|---|---|
| a | Idrogeologico (L. 3267/1923) |
| b | Autorità di Bacino (L. 18 maggio 1989, n. 183 – L. R. 07/02/1994, n. 8) |
| c | Uso civico (L. 1766/1927 – L. R. 11/1981) |
| d | Bellezze naturali (L. 1497/1939 transitata nel D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) |
| e | Piani territoriali paesaggistici (ai sensi dell'art. 149 del D.lgs. 29/10/99, n. 490) |
| f | Parco Nazionale (L. 6 dicembre 1991, n. 394) |
| g | Parco Regionale (L. R. 1 settembre 1993, n. 33) |
| h | Riserva, altro (L. 6 dicembre 1991, n. 394) |
| i | Legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 21 novembre 2000, n. 353) |
| l | Conflitti di proprietà e/o di confinazione tra le aree oggetto di pianificazione ed altri Soggetti privati e/o pubblici |
| m | Rete Natura 2000 |
| n | Altro - specificare |

** = Fustaie e fustaie transitorie - *n° soggetti/Ha* ; ceduo - *n° polloni/Ha e n° matricine/Ha*

Pr = Provvigione reale

*** = Se impossibilitati a calcolare la Provvigione potenziale/normale fornire motivazione

Pp = Provvigione potenziale

SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **V** |
|---|---|

| **Particella** | **313** | **Denominazione località** | **Tronola** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 9,06 |
| Utile Ha | 7,60 |
| Altro-tare Ha | 1,46 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 12 |
| Particella | 1p-11p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Ovest | |
| Pendenza % | 21,13 | |
| Altitudine mt slm | min. 1049 | max 1076 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**PIM 5.3**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 311,04 |
| Provvigione reale totale | 7,60 | 2365,36 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia matura copre il 54% della superficie della particella 313, seguita dalla fustaia giovane al 43% e dalla perticaia giovane al 2%. Il restante 1% è costituito da formazioni erbacee o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,04 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,02 | 0,27 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,00 | 0,03 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,19 | 2,47 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 4,10 | 53,97 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 3,21 | 42,23 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,08 | 0,99 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 7,60 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Naturalistica/conservazione della biodiversità | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 7,60 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



# PARTICELLE FORESTALI DELLA CLASSE ECONOMICA/COMPRESA "PASCOLI"

**Art. 90, comma 2, del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Particella forestale | | | | | | Dati catastali | | Area protetta - zonizzazione | | | Aree percorse dal Fuoco | | *Vincoli | Dati Dendrometrici | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località | n° | Superficie in Ha | | | | Foglio | Particella | A | B | C | | | | Densità | | Pr unitaria mc/Ha | Pr totale mc | ***Pp unitaria mc/Ha | ***Pp totale mc | Incremento (medio e/o corrente) mc | Età all'anno di redazione del PGF |
| | | Totale | Bosco | Pascolo - prati - radure | Altro | | | Ha | Ha | Ha | Anno | Ha | | A.B. unitaria mq/Ha | **Soggetti n°/Ha | | | | | | |
| I morti | 27b | 7,44 | | 7,44 | | 12 | 1p | | 7,44 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | | | | | | 13 | 1-16p-23p-24p-25-26-27-28p-29p-30p-31p-32 | | | | | | | | | | | | | | |
| Valle dei Morti | 29b | 6,55 | | 6,55 | | 13 | 16p-33p-34p-35-36-37-38-39-40-41-42p | | 6,55 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| Acero | 32b | 0,94 | | 0,94 | | 13 | 22p-51p-52p | | 0,94 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| Valle dei Sauci | 45b | 2,44 | | 2,44 | | 13 | 3p-15-16p-45p-46p-47 | | 2,44 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| Terrate | 47b | 8,30 | | 8,30 | | 13 | 6-22p-150p-151p-152p-153p-154-155-156-157-158-159-160p-161-162-163-164-165-166-167p-168p-180p-181 | | 8,30 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| Valle Foce di Caposele | 79b | 3,38 | | 3,38 | | 13 | 9p-10-15p-63-64-65-66-67-68-69-70p-71p-72p-73p-74p-75p-76p-77p-176-177-178 | | 3,38 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| Salve Regina | 83b | 2,98 | | 2,98 | | 13 | 15p | | 2,98 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | | | | | | 20 | 5p-6-12p-31-32p-33p | | | | | | | | | | | | | | |
| Vado dell'Asta | 84b | 1,28 | | 1,28 | | 13 | 15p-16p-17p-18-19-22p-127p-128-129-130p | | 1,28 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| Vado dell'Asta | 86b | 8,15 | | 8,15 | | 13 | 20p-21p-22p-131p-132p-133-134p-135p-136p-137p-138p-139p-140p-141 | | 8,15 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | | | | | | 20 | 37p-38 | | | | | | | | | | | | | | |
| Monte Calvello | 137b | 3,89 | | 3,89 | | 20 | 12p | | 3,89 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| Tronola | 147a | 167,41 | | 167,41 | | 18 | 8p-11p | | 131,80 | 35,61 | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | | | | | | 19 | 43p-323p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 29 | 1p-2-4-5p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 30 | 1p-23-47-66 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 31 | 8-265p-Y901 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 32 | 15-16 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 33 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| Tronola | 147b | 8,86 | | 8,86 | | 12 | 169p-170-171-172p-173p-175-401p-402 | | 1,53 | 7,33 | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | | | | | | 19 | 30-36-238p-239-243-244 | | | | | | | | | | | | | | |
| Tronola | 147c | 5,24 | | 5,24 | | 12 | 1p-21-44-247 | | 0,29 | 4,95 | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| Tronola | 147d | 1,83 | | 1,83 | | 12 | 153p-154p-155p-156p- | | 0,04 | 1,79 | | | | | | | | | | | |
| Cervarolo di Sazzano | 175 | 17,92 | | 17,92 | | 20 | 13p-14p | | 4,15 | 13,77 | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | | | | | | 25 | 10p-12p-21p-22-23p-24p-25-26-27-28-29-30-31p-32-34p-35-36-37-38-39-40p-41p-42p-43-44-45p-46-47-48-49p-50p- | | | | | | | | | | | | | | |
| Coste di Cervialto | 232b | 15,20 | | 15,20 | | 24 | 3p-4p-330p | | 15,20 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | | | | | | 26 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 28 | 4p | | | | | | | | | | | | | | |
| Valle dell'Acero | 249 | 2,71 | | 2,71 | | 27 | 151p | | 2,71 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| Valle dell'Acero | 255c | 0,39 | | 0,39 | | 27 | 151p | | 0,39 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| Piano dei Vaccari | 260b | 3,07 | | 3,07 | | 28 | 1p-2p-3p-4p | | 3,07 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| Vallebona | 273b | 1,22 | | 1,22 | | 27 | 151p | | 1,22 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| Sierro della Zà Popa | 291b | 1,72 | | 1,72 | | 28 | 6p | | 1,72 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| Colle del Leone | 292b | 4,56 | | 4,56 | | 28 | 1p | | 4,56 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| **TOTALI** | | **275,48** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | **0,00** | | |

## PARTICELLE FORESTALI DELLA CLASSE ECONOMICA/COMPRESA "PASCOLI"

**Art. 90, comma 2, del Regolamento regionale n. 3/2017**

* = Vincoli:

| | |
|---|---|
| a | Idrogeologico (L. 3267/1923) |
| b | Autorità di Bacino (L. 18 maggio 1989, n. 183 – L. R. 07/02/1994, n. 8) |
| c | Uso civico (L. 1766/1927 – L. R. 11/1981) |
| d | Bellezze naturali (L. 1497/1939 transitata nel D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) |
| e | Piani territoriali paesaggistici (ai sensi dell'art. 149 del D.lgs. 29/10/99, n. 490) |
| f | Parco Nazionale (L. 6 dicembre 1991, n. 394) |
| g | Parco Regionale (L. R. 1 settembre 1993, n. 33) |
| h | Riserva, altro (L. 6 dicembre 1991, n. 394) |
| i | Legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 21 novembre 2000, n. 353) |
| l | Conflitti di proprietà e/o di confinazione tra le aree oggetto di pianificazione ed altri Soggetti privati e/o pubblici |
| m | Rete Natura 2000 |
| n | Altro - specificare |

** = Fustaie e fustaie transitorie - *n° soggetti/Ha* ; ceduo - *n° polloni/Ha e n° matricine/Ha*

Pr = Provvigione reale

*** = Se impossibilitati a calcolare la Provvigione potenziale/normale fornire motivazione

Pp = Provvigione potenziale

SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **Pascoli** |
|---|---|

| **Particella** | **27b** | **Denominazione località** | **I Morti** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 7,44 |
| Utile Ha | 1,39 |
| Altro-tare Ha | 6,05 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 28 |
| Particella | 1p-5p |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud | |
| Pendenza % | 24,50 | |
| Altitudine mt slm | min. 1260 | max 1325 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2025-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 48,64 |
| Provvigione reale totale | 1,39 | 67,58 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

Nella particella 27b, la fustaia giovane rappresenta il 39%, seguita dalla fustaia adulta al 34%, dalla fustaia matura al 24%, dalla spessina all'1%, e il novelleto all'1%, con il resto come formazioni erbacee o arbustive (1%).

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,01 | 0,83 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,02 | 1,20 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,54 | 39,03 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,48 | 34,21 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,34 | 24,30 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,01 | 0,43 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 1,39 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Erpicatura e concimazione con concime complesso ternario 8-20-24 (6 q/ha). L'operazione di concimazione deve essere ripetuta ad anni alterni, mentre l'erpicatura va eseguita ogni quattro anni. Contenimento della felce aquilina da effettuarsi somministrando, contemporaneamente alla concimazione con concime 8-20-24, calce idrata nella quantità di 20 q/ha. Le superfici trattate devono essere sottoposte al taglio delle felci per tre volte durante la stagione vegetativa. Il taglio deve essere eseguito quando la maggior parte delle foglie è srotolata per metà. Decespugliamento meccanico seguito dalla temporanea concentrazione dei carichi di bestiame. | Vedi grafico | 0 | 2025-2034 | 1,39 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **Pascoli** |
|---|---|

| **Particella** | **29b** | **Denominazione località** | **Valle dei Morti** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 6,55 |
| Utile Ha | 0,69 |
| Altro-tare Ha | 5,86 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 26 |
| Particella | 1p-8p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Est |
| Pendenza % | 20,29 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1345 | 1357 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| **Sottosuolo** |
|---|
| **Calcareo** |

| **Suolo** |
|---|
| **MAP 4.7** |

| **Viabilità** |
|---|
| **Scarsamente servita** |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 17,42 |
| Provvigione reale totale | 0,69 | 12,06 |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2025-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia giovane copre il 50% della superficie nella particella 29b, seguita dalla fustaia adulta al 30%. La perticaia giovane rappresenta il 15%, mentre la fustaia matura copre il 5%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,10 | 14,91 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,34 | 49,62 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,21 | 30,39 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,04 | 5,08 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 0,69 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Erpicatura e concimazione con concime complesso ternario 8-20-24 (6 q/ha). L'operazione di concimazione deve essere ripetuta ad anni alterni, mentre l'erpicatura va eseguita ogni quattro anni. Sfalcio delle spinose nel momento che precede la fioritura. | Vedi grafico | 0 | 2025-2034 | 0,69 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **Pascoli** |
|---|---|

| **Particella** | **32b** | **Denominazione località** | **Acero** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 0,94 |
| Utile Ha | 0,34 |
| Altro-tare Ha | 0,60 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 7;11;12 |
| Particella | 22p-34p-45p-55-56p-73p ; 20p ; 1p-4-63p-64p-65-66-67-68-191 |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Est |
| Pendenza % | 21,14 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1314 | 1325 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata | |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata | |
| Anno di taglio | | **2025-2034** |
| Età media all'anno di taglio | | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 89,60 |
| Provvigione reale totale | 0,34 | 30,85 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia adulta copre il 95% della superficie nella particella 32b, seguita dalla perticaia adulta al 5%, con il resto della superficie occupato da formazioni erbacee o arbustive (1%).

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,02 | 6,35 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,32 | 93,65 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 0,34 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Erpicatura e concimazione con concime complesso ternario 8-20-24 (6 q/ha). L'operazione di concimazione deve essere ripetuta ad anni alterni, mentre l'erpicatura va eseguita ogni quattro anni. Sfalcio delle spinose nel momento che precede la fioritura. | Vedi grafico | 0 | 2025-2034 | 0,34 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **Pascoli** |
|---|---|

| **Particella** | **45b** | **Denominazione località** | **Valle dei Sauci** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 2,44 |
| Utile Ha | 0,80 |
| Altro-tare Ha | 1,64 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 2;3;6 |
| Particella | 63 ; 40-41-57-58-94 ; 48 |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Est | |
| Pendenza % | 20,72 | |
| Altitudine mt slm | min. 1334 | max 1349 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.7** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata | | Anno di taglio | **2025-2034** |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata | | Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: | | Ha: | mc: |
|---|---|---|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 76,09 | Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Provvigione reale totale | 0,80 | 61,00 | Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia matura copre il 50% della superficie della particella 45b, seguita dalla fustaia giovane al 36%, dalla perticaia giovane al 9%. Il restante 5% è costituito da formazioni erbacee o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,07 | 8,92 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,29 | 35,97 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,40 | 49,64 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,04 | 5,47 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 0,80 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Erpicatura e concimazione con concime complesso ternario 8-20-24 (6 q/ha). L'operazione di concimazione deve essere ripetuta ad anni alterni, mentre l'erpicatura va eseguita ogni quattro anni. Sfalcio delle spinose nel momento che precede la fioritura. | Vedi grafico | 0 | 2025-2034 | 0,80 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **Pascoli** |
|---|---|

| **Particella** | **47b** | **Denominazione località** | **Terrate** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| Superficie | |
|---|---|
| Totale Ha | 8,30 |
| Utile Ha | 1,47 |
| Altro-tare Ha | 6,83 |

| Inquadramento Catastale | |
|---|---|
| Foglio | 13 |
| Particella | 6;22;150;151;152;153;154;155;156;157; 158;159;161;162;163;164;165;166;167; 168;180;181 |

| Generalità | | |
|---|---|---|
| Esposizione | 0 | |
| Pendenza % | 21,87 | |
| Altitudine mt slm | min. 0 | max 0 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | #N/D |
| Classe cronologica o diametrica | #N/D |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2025-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 0,00 |
| Provvigione reale totale | 1,47 | 0,00 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:
0

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,01 | 0,41 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,13 | 8,97 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,81 | 55,29 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,52 | 35,33 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 1,47 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Erpicatura e concimazione con concime complesso ternario 8-20-24 (6 q/ha).<br>L'operazione di concimazione deve essere ripetuta ad anni alterni, mentre l'erpicatura va eseguita ogni quattro anni.<br>Decespugliamento meccanico della ginestra, seguito dalla temporanea concentrazione dei carichi di bestiame.<br>Sfalcio delle spinose nel momento che precede la fioritura. | Vedi grafico | 0 | 2025-2034 | 1,47 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **Pascoli** |
|---|---|

| **Particella** | **79b** | **Denominazione località** | **Valle Foce di Capo Sele** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| Superficie | |
|---|---|
| Totale Ha | 0,00 |
| Utile Ha | 0,78 |
| Altro-tare Ha | -0,78 |

| Inquadramento Catastale | |
|---|---|
| Foglio | 13 |
| Particella | 9;10;63;64;65;66;67;68;69;70;71;72;73;74;75;76;77;176;177;178 |

| Generalità | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest |
| Pendenza % | 24,36 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | #N/D |
| Classe cronologica o diametrica | #N/D |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2025-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 0,00 |
| Provvigione reale totale | 0,78 | 0,00 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:
0

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,21 | 27,05 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,44 | 56,57 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,13 | 16,38 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 0,78 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Erpicatura e concimazione con concime complesso ternario 8-20-24 (6 q/ha). L'operazione di concimazione deve essere ripetuta ad anni alterni, mentre l'erpicatura va eseguita ogni quattro anni. Sfalcio delle spinose nel momento che precede la fioritura. | Vedi grafico | 0 | 2025-2034 | 0,78 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **Pascoli** |
|---|---|

| **Particella** | **83b** | **Denominazione località** | **Salve Regina** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 2,98 |
| Utile Ha | 0,71 |
| Altro-tare Ha | 2,27 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 18 |
| Particella | 11p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest |
| Pendenza % | 26,85 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1207 | 1249 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 75,47 |
| Provvigione reale totale | 0,71 | 53,82 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

Nella particella 83b, la fustaia giovane copre il 33% della superficie, seguita dalla fustaia adulta al 29% e dalla fustaia matura al 38%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,15 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,20 | 28,63 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,24 | 33,05 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,27 | 38,17 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 0,71 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 0,71 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **Pascoli** |
|---|---|

| **Particella** | **84b** | **Denominazione località** | **Vado dell'Asta** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| Superficie | |
|---|---|
| Totale Ha | 0,00 |
| Utile Ha | 0,40 |
| Altro-tare Ha | -0,40 |

| Inquadramento Catastale | |
|---|---|
| Foglio | 13 |
| Particella | 17;18;19;127;128;129;130 |

| Generalità | | | |
|---|---|---|---|
| Esposizione | Est | | |
| Pendenza % | 22,31 | | |
| Altitudine mt slm | min. 0 | max 0 | |
| Giacitura | | | |
| Manufatti | | | |
| Risorse idriche | | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | #N/D |
| Classe cronologica o diametrica | #N/D |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2025-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 0,00 |
| Provvigione reale totale | 0,40 | 0,00 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:
0

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,19 | 46,60 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,19 | 48,61 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,02 | 4,79 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 0,40 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Erpicatura e concimazione con concime complesso ternario 8-20-24 (6 q/ha). L'operazione di concimazione deve essere ripetuta ad anni alterni, mentre l'erpicatura va eseguita ogni quattro anni. Contenimento della felce aquilina da effettuarsi somministrando, contemporaneamente alla concimazione con concime 8-20-24, calce idrata nella quantità di 20 q/ha. Le superfici trattate devono essere sottoposte al taglio delle felci per tre volte durante la stagione vegetativa. Il taglio deve essere eseguito quando la maggior parte delle foglie è srotolata per metà. Decespugliamento meccanico seguito dalla temporanea concentrazione dei carichi di bestiame. | Vedi grafico | 0 | 2025-2034 | 0,40 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **Pascoli** |
|---|---|

| **Particella** | **86b** | **Denominazione località** | **Vado dell'Asta** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| Superficie | |
|---|---|
| Totale Ha | 0,00 |
| Utile Ha | 0,96 |
| Altro-tare Ha | -0,96 |

| Inquadramento Catastale | |
|---|---|
| Foglio | 13;20 |
| Particella | 20;21;22;131;132;133;134;135;136;137;138;139;140;141 & 8;12 |

| Generalità | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord | |
| Pendenza % | 22,15 | |
| Altitudine mt slm | min. 0 | max 0 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | #N/D |
| Classe cronologica o diametrica | #N/D |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2025-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 0,00 |
| Provvigione reale totale | 0,96 | 0,00 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:
0

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,53 | 55,19 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,43 | 44,81 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 0,96 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Erpicatura e concimazione con concime complesso ternario 8-20-24 (6 q/ha). L'operazione di concimazione deve essere ripetuta ad anni alterni, mentre l'erpicatura va eseguita ogni quattro anni. Sfalcio delle spinose nel momento che precede la fioritura. | Vedi grafico | 0 | 2025-2034 | 0,96 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **Pascoli** |
|---|---|

| **Particella** | **137b** | **Denominazione località** | **Monte Calvello** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 3,89 |
| Utile Ha | 1,34 |
| Altro-tare Ha | 2,55 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 18;19;24;25;26;29;30;31;32;33 |
| Particella | 8;11 & 43;323;334 & 273;274;330 & 12 & 1 & 1;2;3;4;5;A & 1;23;26;47;66;202 & 8;17;18;20;265;Y901 & 15;16 & 1;17 |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Ovest | |
| Pendenza % | 20,29 | |
| Altitudine mt slm | min. 1340 | max 1363 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.7** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata | |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata | |
| Anno di taglio | | **2025-2034** |
| Età media all'anno di taglio | | **0** |

| | Ha: | mc: | | Ha: | mc: |
|---|---|---|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 103,35 | Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Provvigione reale totale | 1,34 | 138,00 | Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La perticaia adulta copre il 62% della superficie, mentre la fustaia giovane e la fustaia adulta coprono rispettivamente il 21% e il 16%. Il resto sono formazioni erbacce o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,28 | 20,66 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,83 | 61,97 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,21 | 16,06 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,02 | 1,31 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 1,34 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Erpicatura e concimazione con concime complesso ternario 8-20-24 (6 q/ha). L'operazione di concimazione deve essere ripetuta ad anni alterni, mentre l'erpicatura va eseguita ogni quattro anni. | Vedi grafico | 0 | 2025-2034 | 1,34 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **Pascoli** |
|---|---|

| **Particella** | **147a** | **Denominazione località** | **Tronola** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| Superficie | |
|---|---|
| Totale Ha | 173,38 |
| Utile Ha | 5,41 |
| Altro-tare Ha | 167,97 |

| Inquadramento Catastale | |
|---|---|
| Foglio | 12;19 |
| Particella | 1;46;47;48;167;168;169;170;171;172;173;175;401;402 & 30;36;233;238;239;243;244 |

| Generalità | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Nord | |
| Pendenza % | 20,35 | |
| Altitudine mt slm | min. 1044 | max 1159 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**PIM 5.3**

**Viabilità**

**Scarsamente servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 37,50 |
| Provvigione reale totale | 5,41 | 202,92 |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2025-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

Le fustaie adulte coprono il 51% della superficie, seguite dalle fustaie giovani con il 19% e dalle fustaie mature con il 19%. Le perticaie giovani occupano il 6% e le perticaie adulte l'1%. Le spessine occupano il 2%. Il resto sono formazioni erbacce o arbustive.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,26 | 4,77 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,06 | 1,19 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,54 | 10,00 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 1,22 | 22,56 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 2,08 | 38,37 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 1,21 | 22,35 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,04 | 0,76 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 5,41 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Erpicatura e concimazione con concime complesso ternario 8-20-24 (6 q/ha). L'operazione di concimazione deve essere ripetuta ad anni alterni, mentre l'erpicatura va eseguita ogni quattro anni. Contenimento della felce aquilina da effettuarsi somministrando, contemporaneamente alla concimazione con concime 8-20-24, calce idrata nella quantità di 20 q/ha. Le superfici trattate devono essere sottoposte al taglio delle felci per tre volte durante la stagione vegetativa. Il taglio deve essere eseguito quando la maggior parte delle foglie è srotolata per metà. Sfalcio delle spinose nel momento che precede la fioritura. Risanamento idrico delle superfici soggette a ristagni mediante l'apertura di canalette | Vedi grafico | 0 | 2025-2034 | 5,41 | 0,0 |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **Pascoli** |
|---|---|

| **Particella** | **147b** | **Denominazione località** | **Tronola** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| Superficie | |
|---|---|
| Totale Ha | 8,86 |
| Utile Ha | 0,87 |
| Altro-tare Ha | 7,99 |

| Inquadramento Catastale | |
|---|---|
| Foglio | 12 |
| Particella | 1;21;44;247 |

| Generalità | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud | |
| Pendenza % | 22,26 | |
| Altitudine mt slm | min. 1056 | max 1102 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**PIM 5.3**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 17,82 |
| Provvigione reale totale | 0,87 | 15,48 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

Le perticaie adulte coprono il 50% della superficie, seguite dalle fustaie adulte con il 34% e dalle fustaie giovani con il 12%. Le perticaie giovani occupano il 4%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,03 | 3,60 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,44 | 50,50 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,30 | 34,40 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,10 | 11,50 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 0,87 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 0,87 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **Pascoli** |
|---|---|

| **Particella** | **147c** | **Denominazione località** | **Tronola** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 5,24 |
| Utile Ha | #N/D |
| Altro-tare Ha | #N/D |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 12 |
| Particella | 1;45;145;146;147;153;154;155;156;160;161;162;165;189;258;259;260;262;263;264;265;267;269;270;272;274 |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud |
| Pendenza % | 20,10 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1058 | 1078 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**PIM 5.3**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 20,00 |
| Provvigione reale totale | #N/D | #N/D |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



## STRATO ARBOREO

| Specie presenti: | |
|---|---|
| | |

| Descrizione: |
|---|
| #N/D |

### Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | #N/D | #N/D |
| Spessine h 4-8 m | #N/D | #N/D |
| Perticaie giovani h 8-12 m | #N/D | #N/D |
| Perticaie adulte h 12-16 m | #N/D | #N/D |
| Fustaie giovani h 16-20 m | #N/D | #N/D |
| Fustaie mature h 20-24 m | #N/D | #N/D |
| Fustaie mature h 24-28 m | #N/D | #N/D |
| Fustaie mature h 28-32 m | #N/D | #N/D |
| Fustaie mature h >32 m | #N/D | #N/D |
| **Totale** | #N/D | #N/D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

### Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | #N/D | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | #N/D | |

## STRATO ARBUSTIVO

| Copertura: | #N/D |
|---|---|
| Specie prevalenti: | #N/D |

## STRATO ERBACEO

| Copertura: | #N/D |
|---|---|
| Specie prevalenti: | #N/D |

## PRESCRIZIONI

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **Pascoli** |
|---|---|

| **Particella** | **147d** | **Denominazione località** | **Tronola** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| Superficie | |
|---|---|
| Totale Ha | 1,83 |
| Utile Ha | 0,22 |
| Altro-tare Ha | 1,61 |

| Inquadramento Catastale | |
|---|---|
| Foglio | 23;27 |
| Particella | 29p ; 151p |

| Generalità | |
|---|---|
| Esposizione | Sud-Ovest |
| Pendenza % | 21,91 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1060 | 1082 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.7**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 18,39 |
| Provvigione reale totale | 0,22 | 3,98 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

Le fustaie mature coprono il 78% della superficie, seguite dalle fustaie giovani con il 22%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,05 | 22,04 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,17 | 77,96 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 0,22 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 0,22 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **Pascoli** |
|---|---|

| **Particella** | **175** | **Denominazione località** | **Cervarolo di Sazzano** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 17,92 |
| Utile Ha | 1,17 |
| Altro-tare Ha | 16,75 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 20;25 |
| Particella | 13;14 & 10;12;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52 |

| **Generalità** | | |
|---|---|---|
| Esposizione | Sud | |
| Pendenza % | 22,10 | |
| Altitudine mt slm | min. 1242 | max 1282 |
| Giacitura | | |
| Manufatti | | |
| Risorse idriche | | |

| **Sottosuolo** |
|---|
| **Calcareo** |

| **Suolo** |
|---|
| **MAP 4.7** |

| **Viabilità** |
|---|
| **Ben servita** |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 20,81 |
| Provvigione reale totale | 1,17 | 24,36 |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

Nella particella 175, la fustaia matura rappresenta il 27% della superficie, con la fustaia adulta al 58%, la fustaia giovane al 14% e la perticaia adulta all'1%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,01 | 1,14 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,17 | 14,44 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,68 | 57,89 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,31 | 26,52 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 1,17 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 1,17 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **Pascoli** |
|---|---|

| **Particella** | **232b** | **Denominazione località** | **Coste di Cervialto** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 0,00 |
| Utile Ha | 1,81 |
| Altro-tare Ha | -1,81 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 24 |
| Particella | 3;4 |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest |
| Pendenza % | 20,11 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **PIM 5.3** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | #N/D | |
| Classe cronologica o diametrica | #N/D | |
| Anno di taglio | | **2025-2034** |
| Età media all'anno di taglio | | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 0,00 |
| Provvigione reale totale | 1,81 | 0,00 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:
0

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,01 | 0,75 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,31 | 16,94 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 1,39 | 77,03 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,10 | 5,28 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 1,81 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Erpicatura e concimazione con concime complesso ternario 8-20-24 (6 q/ha). L'operazione di concimazione deve essere ripetuta ad anni alterni, mentre l'erpicatura va eseguita ogni quattro anni. Sfalcio delle spinose nel momento che precede la fioritura. | Vedi grafico | 0 | 2025-2034 | 1,81 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **Pascoli** |
|---|---|

| **Particella** | **249** | **Denominazione località** | **Valle d'Acero** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 2,71 |
| Utile Ha | 0,79 |
| Altro-tare Ha | 1,92 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 27 |
| Particella | 151p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Est |
| Pendenza % | 20,17 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 1314 | 1334 |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.4** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| | |
|---|---|
| Età media attuale | Indeterminata |
| Classe cronologica o diametrica | Indeterminata |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **0** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 94,46 |
| Provvigione reale totale | 0,79 | 74,38 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:

La fustaia matura rappresenta il 93% della superficie, con la fustaia giovane al 4%, e la fustaia adulta al 3%.

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,01 | 1,05 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,01 | 0,69 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,36 | 45,12 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,41 | 52,24 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,01 | 0,89 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 0,79 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedi grafico | 0 | 0 | 0,79 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **Pascoli** |
|---|---|

| **Particella** | **255c** | **Denominazione località** | **Valle d'Acero** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 0,39 |
| Utile Ha | 0,15 |
| Altro-tare Ha | 0,24 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 26 |
| Particella | 1p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud |
| Pendenza % | 20,44 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| **Sottosuolo** | |
| **Calcareo** | |
| **Suolo** | |
| **MAP 4.4** | |
| **Viabilità** | |
| **Ben servita** | |
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

| | | |
|---|---|---|
| Età media attuale | #N/D | |
| Classe cronologica o diametrica | #N/D | |
| Anno di taglio | **2025-2034** | |
| Età media all'anno di taglio | **0** | |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 0,00 |
| Provvigione reale totale | 0,15 | 0,00 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Rilievo tassatorio | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:
0

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,02 | 11,02 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,13 | 87,90 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 1,08 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 0,15 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | |
| Danni gravi: | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Erpicatura e concimazione con concime complesso ternario 8-20-24 (6 q/ha). L'operazione di concimazione deve essere ripetuta ad anni alterni, mentre l'erpicatura va eseguita ogni quattro anni. Sfalcio delle spinose nel momento che precede la fioritura. | Vedi grafico | 0 | 2025-2034 | 0,15 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar

SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **Pascoli** |
|---|---|

| **Particella** | **260b** | **Denominazione località** | **Piano dei Vaccari** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 0,00 |
| Utile Ha | 0,67 |
| Altro-tare Ha | -0,67 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 26 |
| Particella | 1p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Nord-Ovest |
| Pendenza % | 20,19 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 0 | 0 |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

Giacitura

Manufatti

Risorse idriche

| | |
|---|---|
| Età media attuale | #N/D |
| Classe cronologica o diametrica | #N/D |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2025-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 0,00 |
| Provvigione reale totale | 0,67 | 0,00 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| | |

| Descrizione: |
|---|
| 0 |

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,01 | 2,04 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,63 | 93,70 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,03 | 4,26 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 0,67 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Erpicatura e concimazione con concime complesso ternario 8-20-24 (6 q/ha). L'operazione di concimazione deve essere ripetuta ad anni alterni, mentre l'erpicatura va eseguita ogni quattro anni. Sfalcio delle spinose nel momento che precede la fioritura. | Vedi grafico | 0 | 2025-2034 | 0,67 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| Copertura: | #N/D |
|---|---|
| Specie prevalenti: | #N/D |

**STRATO ERBACEO**

| Copertura: | #N/D |
|---|---|
| Specie prevalenti: | #N/D |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

## DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **Pascoli** |
|---|---|

| **Particella** | **273b** | **Denominazione località** | **Vallebona** |
|---|---|---|---|

### CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 0,93 |
| Utile Ha | 0,67 |
| Altro-tare Ha | 0,26 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 27 |
| Particella | 151p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Sud |
| Pendenza % | 22,20 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 615 | 1257 |

| | |
|---|---|
| Giacitura | |
| Manufatti | |
| Risorse idriche | |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

| | |
|---|---|
| Età media attuale | #N/D |
| Classe cronologica o diametrica | #N/D |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2025-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 301,99 |
| Provvigione reale totale | 0,67 | 202,53 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

### SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:
#N/D

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,01 | 1,86 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,00 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,46 | 68,99 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,20 | 29,15 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 0,67 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Erpicatura e concimazione con concime complesso ternario 8-20-24 (6 q/ha). L'operazione di concimazione deve essere ripetuta ad anni alterni, mentre l'erpicatura va eseguita ogni quattro anni. Contenimento della felce aquilina da effettuarsi somministrando, contemporaneamente alla concimazione con concime 8-20-24, calce idrata nella quantità di 20 q/ha. Le superfici trattate devono essere sottoposte al taglio delle felci per tre volte durante la stagione vegetativa. Il taglio deve essere eseguito quando la maggior parte delle foglie è srotolata per metà. Decespugliamento meccanico seguito dalla temporanea concentrazione dei carichi di bestiame. | Vedi grafico | 0 | 2025-2034 | 0,67 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino
Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino
Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino
Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **Pascoli** |
|---|---|

| **Particella** | **291b** | **Denominazione località** | **Sierro della Zà Popa** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 0,00 |
| Utile Ha | 1,32 |
| Altro-tare Ha | -1,32 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 26;28 |
| Particella | 1p ; 1p-4p-5p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Ovest |
| Pendenza % | 20,04 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 0 | 0 |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

Giacitura

Manufatti

Risorse idriche

| | |
|---|---|
| Età media attuale | #N/D |
| Classe cronologica o diametrica | #N/D |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2025-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 0,00 |
| Provvigione reale totale | 1,32 | 0,00 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

| Specie presenti: | |
|---|---|
| | |

| Descrizione: |
|---|
| 0 |

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,83 | 62,81 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,04 | 2,71 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,44 | 33,55 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,01 | 0,93 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 1,32 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Decespugliamento meccanico seguito dalla temporanea concentrazione dei carichi di bestiame. | Vedi grafico | 0 | 2025-2034 | 1,32 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| Copertura: | #N/D |
|---|---|
| Specie prevalenti: | #N/D |

**STRATO ERBACEO**

| Copertura: | #N/D |
|---|---|
| Specie prevalenti: | #N/D |

**PRESCRIZIONI**

PDA Bagnoli Irpino

Stima delle provvigioni elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Accessibilità alle particelle forestali




PDA Bagnoli Irpino

Classi strutturali elaborate da Lidar




PDA Bagnoli Irpino

Stima delle pendenze elaborate da Lidar



SCHEMA 4/a

# DESCRIZIONE PARTICELLARE

**Art. 107 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| **CLASSE ECONOMICA:** | **Pascoli** |
|---|---|

| **Particella** | **292b** | **Denominazione località** | **Colle del Leone** |
|---|---|---|---|

## CARATTERI DELLA STAZIONE

| **Superficie** | |
|---|---|
| Totale Ha | 0,00 |
| Utile Ha | 1,25 |
| Altro-tare Ha | -1,25 |

| **Inquadramento Catastale** | |
|---|---|
| Foglio | 26;28 |
| Particella | 1p ; 1p-4p-5p-7p |

| **Generalità** | |
|---|---|
| Esposizione | Ovest |
| Pendenza % | 20,23 |

| Altitudine mt slm | min. | max |
|---|---|---|
| | 0 | 0 |

**Sottosuolo**

**Calcareo**

**Suolo**

**MAP 4.4**

**Viabilità**

**Ben servita**

Giacitura

Manufatti

Risorse idriche

| | |
|---|---|
| Età media attuale | #N/D |
| Classe cronologica o diametrica | #N/D |

| | |
|---|---|
| Anno di taglio | **2025-2034** |
| Età media all'anno di taglio | **0** |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Provvigione reale unitaria | 1 | 0,00 |
| Provvigione reale totale | 1,25 | 0,00 |

| | Ha: | mc: |
|---|---|---|
| Ripresa unitaria | | **0,0** |
| Ripresa totale | | **0** |

| Rilievo tassatorio | | |
|---|---|---|
| | AdS - n | 0 |
| | Cavallettamento - Ha | |
| | Alberi modello - n | 0 |
| | Relascopio | |

| | | |
|---|---|---|
| Area naturale protetta | P.R. Monti Picentini | |
| Autorità di Bacino | Distr. Appennino Meridionale | |
| Rete Natura 2000 | ZPS IT8040021 | SIC IT8040010 |

## SOPRASSUOLO



**STRATO ARBOREO**

Specie presenti:

Descrizione:
0

Tipologie strutturali

| | Ha | % |
|---|---|---|
| Novelleti h 2-4 m | 0,00 | 0,00 |
| Spessine h 4-8 m | 0,02 | 1,34 |
| Perticaie giovani h 8-12 m | 0,00 | 0,13 |
| Perticaie adulte h 12-16 m | 0,25 | 20,01 |
| Fustaie giovani h 16-20 m | 0,69 | 55,49 |
| Fustaie mature h 20-24 m | 0,21 | 16,80 |
| Fustaie mature h 24-28 m | 0,08 | 6,24 |
| Fustaie mature h 28-32 m | 0,00 | 0,00 |
| Fustaie mature h >32 m | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 1,25 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pascolamento: | Presente | | | |
| Danni gravi: | | | | |
| Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi morti: | | | n. piante/Ha | |
| Alberi vetusti: | | | n. piante/Ha | |
| Bosco storico-culturale o spirituale: | No | | | |
| Presenza di specie alloctone o introdotte: | No | | | |
| Rinnovazione: | Sporadica | | | |
| Funzione prevalente (indirizzo di gestione): | | Produttiva | | |

Interventi gestionali

| Tipologia intervento | Tipo strutturale | Sistema di esbosco previsto | Anno | Superficie - Ha | Ripresa - mc/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Erpicatura e concimazione con concime complesso ternario 8-20-24 (6 q/ha). L'operazione di concimazione deve essere ripetuta ad anni alterni, mentre l'erpicatura va eseguita ogni quattro anni. Contenimento della felce aquilina da effettuarsi somministrando, contemporaneamente alla concimazione con concime 8-20-24, calce idrata nella quantità di 20 q/ha. Le superfici trattate devono essere sottoposte al taglio delle felci per tre volte durante la stagione vegetativa. Il taglio deve essere eseguito quando la maggior parte delle foglie è srotolata per metà. Decespugliamento meccanico seguito dalla temporanea concentrazione dei carichi di bestiame. | Vedi grafico | 0 | 2025-2034 | 1,25 | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Totale** | 0,0 | |

**STRATO ARBUSTIVO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**STRATO ERBACEO**

| | |
|---|---|
| Copertura: | #N/D |
| Specie prevalenti: | #N/D |

**PRESCRIZIONI**

# Tavola di cubatura a doppia entrata del faggio di alto fusto di Bagnoli Irpino

## 1 Raccolta dati

107 alberi di faggio misurati ij diversi popolamenti di faggio.

```
df_cav   |> ggplot(aes(dbh*100))
   + geom_histogram(bins = 30)
   +xlab("DBH  (cm)")
```



# 2 Equazioni di volume

Sono state valutate due differenti impostazioni modellistiche.

La prima mette in relazione il diametro con l'altezza.

```
mod1 <- lm(vol_m3 ~ dbh + Htot, data = df_cav)mod1
|> summary()
```

```
Call:
lm(formula = vol_m3 ~ dbh + Htot, data = df_cav)

Residuals:
      Min        1Q    Median        3Q       Max
-1.26311  -0.24311   0.03587   0.30617   1.99310

Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -0.46190    0.23265  -1.985   0.0497
*
dbh         11.57912    0.44815  25.838  < 2e-16 ***
Htot        -0.08549    0.01781  -4.801  5.3e-06 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.5109 on 104 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.9269,    Adjusted R-squared:
                     0.9255F-statistic: 659.2 on 2 and 104
DF,                  p-value: < 2.2e-16
```

Entrambe le variabili indipendenti sono molto significativamente correlate al volume(p-values molto inferiori a 0.05). Il valore di R^2 è piuttosto alto.

Con la seconda opzione modellistica è stato messo in relazione l'altezza, il quadratodei diametri e la loro interazione.

```
- lm(vol_m3 ~ Htot + I(dbh^2) + Htot*I(dbh^2), data = df_cav)mod2 |>
summary()
```

```
Call:
lm(formula = vol_m3 ~ Htot + I(dbh^2) + Htot * I(dbh^2), data = df_cav)

Residuals:
      Min        1Q    Median        3Q       Max
-0.71785 -0.03771 -0.00605 0.02878 0.91532

Coefficients:
                 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)    -0.095541   0.099745  -0.958  0.34038
Htot            0.003685   0.005993   0.615  0.53996
I(dbh^2)        3.529380   1.333766   2.646  0.00942 **
Htot:I(dbh^2)   0.357396   0.056331   6.345 6.05e-09 ***
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.201 on 103 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.9888,    Adjusted R-squared:
                0.9885F-statistic: 3029 on 3 and 103 DF,  p-
value: < 2.2e-16
```

In questo secondo caso è il diametro la variabile maggiormente correlata, mentre l'altezza contribuisce poco a migliorare la qualità delle stime. I valori di R^2 sono decisamente alti in assoluto (più alti di mod1).

Guardando ai risultati, la seconda opzione (mod2) risulta quella da utilizzare tra ledue.

**L'equazione del volume risulta pertanto:**

$$VOLUME = -0.091856 + 0.003685 * Htot + 3.886776 * dbh^2 + 0.357396 * Htot * dbh^2$$

*Nota: in questa funzione Htot*e *dbh*devono essere espressi in metri (m).

# 3 Tavola di cubatura

Per facilitare l'uso dell'equazione di cubatura, viene proposta anche la tavola di cubatura tradizionale.

```
tavola.cubatura |>
  kbl(caption = "Tavola di cubatura per il faggio di Bagnoli Irpino da dati TLS.
```

*Tavola di cubatura per il faggio di Bagnoli Irpino da dati TLS. Intestazione di riga: diametro (in centimetri). Intestazione di colonna: altezza (in metri). I valori di volume sono espressi in metri cubi.*

| dbh | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | 0,0088 | 0,0233 | 0,0378 | 0,0523 | | | | | | |
| 15 | 0,0696 | 0,0931 | 0,1165 | 0,1400 | 0,1635 | 0,1869 | | | | | |
| 20 | | | | 0,2831 | 0,3190 | 0,3550 | 0,3910 | 0,4269 | 0,4629 | | |
| 25 | | | | 0,4670 | 0,5191 | 0,5711 | 0,6232 | 0,6752 | 0,7272 | | |
| 30 | | | | | | 0,8352 | 0,9070 | 0,9787 | 1,0504 | | |
| 35 | | | | | | 1,1474 | 1,2423 | 1,3373 | 1,4322 | 1,5271 | |
| 40 | | | | | | 1,5076 | 1,6293 | 1,7511 | 1,8728 | 1,9946 | |
| 45 | | | | | | 1,9158 | 2,0679 | 2,2201 | 2,3722 | 2,5243 | 2,6764 |
| 50 | | | | | | | 2,5581 | 2,7442 | 2,9303 | 3,1163 | |
| 55 | | | | | | | 3,0999 | 3,3235 | 3,5471 | 3,7707 | |
| 60 | | | | | | | 3,6933 | 3,9580 | 4,2227 | 4,4874 | |
| 65 | | | | | | | 4,3383 | 4,6477 | 4,9571 | 5,2664 | |
| 70 | | | | | | | | | 5,7501 | 6,1078 | |
| 75 | | | | | | | | | 6,6020 | 7,0114 | |
| 80 | | | | | | | | | | 7,9774 | |




*Figure 1 Table 1: Tavola grafica di cubatura per il faggio di Bagnoli  Irpino da dati TLS. Intestazione di riga: diametro (in centimetri). Intestazione di colonna: altezza (in metri). I valori di volume sono espressi in metri cubi.*

# RIEPILOGO GENERALE DELLE PARTICELLE FORESTALI

**Art. 108 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Classe economica (Compresa) | Particella forestale | | | | | | Dati catastali | | Area protetta - zonizzazione | | | Aree percorse dal Fuoco | | *Vincoli | Dati Dendrometrici | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Località | n° | Superficie in Ha | | | | Foglio | Particella | A | B | C | Anno | Ha | | Densità | | Pr unitaria mc/Ha | Pr totale mc | ***Pp unitaria mc/Ha | ***Pp totale mc | Incremento medio | Età all'anno di redazione del PGF |
| | | | Totale | Bosco | Pascolo prati radure | Altro | | | Ha | Ha | Ha | | | | A.B. unitaria mq/Ha | ** Soggetti n°/Ha | | | | | | |
| | Apeticchia | 188 | 15,60 | 15,55 | 0,05 | | 18 | 11p | | 15,60 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 51,79 | 769 | 726,4 | 11.298,37 | | | 6,05 | 110-130 |
| | | | | | | | 23 | 29p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Montagna Grande | 189 | 24,37 | 24,36 | 0,01 | | 18 | 11p | | 24,37 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 44,40 | 739 | 586,6 | 14.290,68 | | | 4,89 | 130-150 |
| | | | | | | | 23 | 29p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ripa di Moggio | 190 | 12,93 | 12,93 | 0,00 | | 18 | 11p | | 12,93 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 38,67 | 877 | 454,8 | 5.882,28 | | | 3,79 | 110-130 |
| | Filettone | 191 | 32,71 | 32,59 | 0,12 | | 18 | 11p | | 23,00 | 9,71 | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,55 | 934 | 545,9 | 17.789,46 | | | 4,55 | 110-130 |
| | | | | | | | 23 | 29p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 24 | 330p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Terremoto | 192 | 36,38 | 36,37 | 0,01 | | 18 | 11p | | 6,28 | 30,10 | | | a/b/c/d/g/i/m | 52,28 | 986 | 708,9 | 25.779,80 | | | 5,91 | 130-150 |
| | | | | | | | 24 | 311p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 24 | 330p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 33 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Serra dei Frasci | 193 | 19,98 | 19,96 | 0,02 | | 24 | 278-279-280-281-297p-298p-299p-300p-328-330p-X1p | | | 19,98 | | | a/b/c/d/g/i/m | 44,80 | 620 | 644,2 | 12.858,01 | | | 5,37 | 130-150 |
| | | | | | | | 31 | 17p-Y901p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Serroncelli Soprani | 194 | 11,99 | 11,98 | 0,01 | | 24 | 275-286-291-295-296-297p-298p-299p-300p-330p-X1p | | | 11,99 | | | a/b/c/d/g/i/m | 48,95 | 1063 | 640,7 | 7.673,12 | | | 5,34 | 130-150 |
| | | | | | | | 30 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 33 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Serroncelli Soprani | 198 | 17,70 | 16,81 | 0,89 | | 25 | 12p-42p | | 17,69 | 0,01 | | | a/b/c/d/g/i/m | 29,43 | 330 | 426,2 | 7.164,28 | | | 21,31 | 10-30 |
| | Cervarolo di Sazzano | 199 | 14,12 | 14,12 | 0,00 | | 25 | 12p | 9,58 | 4,54 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 50,92 | 605 | 700,6 | 9.892,12 | | | 5,84 | 130-150 |
| | Cervarolo di Sazzano | 204 | 12,28 | 11,85 | 0,43 | | 23 | 29p-33p | | 12,28 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 54,30 | 1244 | 647,7 | 7.673,03 | | | 8,10 | 70-90 |
| | Fossa della Neve | 205b | 11,18 | 11,18 | 0,00 | | 23 | 29p | | 11,19 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,40 | 1358 | 574,1 | 6.416,66 | | | 4,78 | 130-150 |
| | Apeticchia | 208 | 35,41 | 35,39 | 0,02 | | 24 | 330p | | 26,82 | 8,59 | | | a/b/c/d/g/i/m | 53,85 | 803 | 731,1 | 25.871,89 | | | 6,09 | 130-150 |
| | | | | | | | 25 | 12p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stretta dell'Acernese | 209 | 31,70 | 31,52 | 0,18 | | 24 | 330p | | 29,26 | 2,44 | | | a/b/c/d/g/i/m | 54,69 | 1286 | 674,9 | 21.270,91 | | | 5,62 | 110-130 |
| | | | | | | | 25 | 12p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 31 | 17p-18p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Coste di Cervialto | 211 | 21,59 | 21,59 | 0,00 | | 25 | 12p | 0,38 | 20,19 | 1,02 | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,14 | 986 | 624,3 | 13.481,29 | | | 4,16 | 130-150 |
| | Coste di Cervialto | 212 | 29,47 | 29,38 | 0,09 | | 25 | 12p | 28,38 | 1,09 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,43 | 855 | 584,8 | 17.184,32 | | | 4,50 | 110-130 |
| | Valle Giamberardino | 215 | 3,49 | 3,49 | 0,00 | | 25 | 12p | 2,57 | 0,92 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 50,02 | 156 | 882,2 | 3.075,08 | | | 5,88 | 130-150 |
| | Impiccato | 220 | 22,81 | 22,80 | 0,01 | | 27 | 3p-151p | | 22,81 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 50,70 | 452 | 718,9 | 16.394,23 | | | 4,79 | 130-150 |
| | Valle d'Acero | 221 | 8,36 | 8,33 | 0,03 | | 27 | 3p-151p | | 8,36 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 48,32 | 490 | 731,5 | 6.096,84 | | | 6,10 | 110-130 |
| | Apeticchia | 222a | 16,56 | 16,56 | 0,00 | | 27 | 151p | | 16,56 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 43,32 | 473 | 550,5 | 9.115,62 | | | 4,59 | 110-130 |
| | Apeticchia | 223a | 10,58 | 10,58 | 0,00 | | 27 | 151p | | 10,58 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 43,97 | 517 | 578,0 | 6.113,21 | | | 4,13 | 130-150 |
| **COMPRESA A** | Terremoto | 224b | 6,50 | 6,50 | 0,00 | | 27 | 151p | | 6,50 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 53,33 | 397 | 782,0 | 5.080,22 | | | 5,59 | 130-150 |
| | | | | | | | 28 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle d'Acero | 225 | 16,29 | 16,29 | 0,00 | | 24 | 330p | | 15,92 | 0,37 | | | a/b/c/d/g/i/m | 62,70 | 1056 | 715,1 | 11.646,51 | | | 5,96 | 110-130 |
| | | | | | | | 27 | 151p-162 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 28 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle d'Acero | 228 | 24,40 | 24,00 | 0,40 | | 24 | 3p-330p | | 23,79 | 0,61 | | | a/b/c/d/g/i/m | 50,50 | 936 | 655,9 | 15.740,71 | | | 5,47 | 110-130 |
| | Sette Valli | 229 | 34,06 | 33,85 | 0,21 | | 24 | 3p-46-47-48-49-330p-332p | | 24,34 | 9,72 | | | a/b/c/d/g/i/m | 50,27 | 1052 | 656,5 | 22.221,33 | | | 5,05 | 110-130 |
| | Sette Valli | 230 | 35,75 | 35,72 | 0,03 | | 24 | 330p | | 30,71 | 5,04 | | | a/b/c/d/g/i/m | 56,74 | 1272 | 694,5 | 24.812,18 | | | 5,34 | 110-130 |
| | | | | | | | 25 | 12p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 26 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Chiuvarelli | 232 | 40,81 | 40,72 | 0,09 | | 24 | 3p-4p-330p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 25 | 12p | 0,08 | 40,73 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,86 | 814 | 684,9 | 27.884,35 | | | 4,565745865 | 130-150 |
| | | | | | | | 26 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vallone del Turco | 233 | 34,69 | 34,69 | 0,00 | | 24 | 330p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 25 | 12p | 0,12 | 34,57 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 58,66 | 1369 | 759,5 | 26.344,30 | | | 6,33 | 110-130 |
| | | | | | | | 26 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vallone del Turco | 235 | 13,14 | 13,14 | 0,00 | | 25 | 12p | 12,69 | 0,45 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 43,73 | 627 | 550,6 | 7.234,29 | | | 5,23 | 110-130 |
| | | | | | | | 26 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Coste di Cervialto | 236 | 11,10 | 11,10 | 0,00 | | 25 | 12p | 11,02 | 0,08 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 38,43 | 1564 | 376,3 | 4.178,65 | | | 3,76 | 90-110 |
| | Coste di Cervialto | 240 | 7,36 | 6,75 | 0,61 | | 25 | 12p | 7,36 | | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 653,6 | 4.409,75 | | | 5,45 | 110-130 |
| | Coste di Cervialto | 247 | 14,20 | 13,78 | 0,42 | | 27 | 3p-151p | | 14,20 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 54,60 | 806 | 629,6 | 8.676,71 | | | 6,30 | 90-110 |
| | Coste di Cervialto | 248 | 12,92 | 12,92 | 0,00 | | 27 | 151p | | 12,92 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 56,38 | 509 | 782,8 | 10.115,12 | | | 5,22 | 130-150 |
| | Impiccato | 250 | 22,87 | 22,86 | 0,01 | | 27 | 151p | | 22,87 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 51,26 | 522 | 719,4 | 16.445,48 | | | 4,80 | 130-150 |
| | Scarrupata | 251 | 13,98 | 13,98 | 0,00 | | 27 | 151p | | 13,98 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 51,54 | 586 | 736,6 | 10.295,25 | | | 5,26 | 130-150 |
| | Valle d'Acero | 253 | 11,59 | 11,59 | 0,00 | | 27 | 151p | | 11,59 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 52,67 | 556 | 795,6 | 9.223,16 | | | 6,12 | 130-150 |
| | | | | | | | 28 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle d'Acero | 254 | 15,01 | 15,01 | 0,00 | | 28 | 1p | | 15,01 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 57,23 | 647 | 889,3 | 13.347,26 | | | 7,41 | 130-150 |
| | Terremoto | 255a | 9,19 | 9,18 | 0,01 | | 27 | 151p | | 9,19 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 55,51 | 563 | 845,6 | 7.765,07 | | | 7,05 | 130-150 |
| | | | | | | | 28 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Terremoto | 255b | 12,00 | 12,00 | 0,00 | | 27 | 151p | | 12,00 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,65 | 457 | 776,6 | 9.315,82 | | | 6,47 | 130-150 |
| | | | | | | | 28 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle d'Acero | 256 | 17,21 | 17,18 | 0,03 | | 24 | 330p | | 17,21 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 55,25 | 763 | 720,0 | 12.369,50 | | | 6,00 | 110-130 |
| | | | | | | | 27 | 151p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 28 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle d'Acero | 257 | 8,93 | 8,87 | 0,06 | | 24 | 330p | | 8,93 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 41,48 | 399 | 631,5 | 5.601,97 | | | 5,26 | 110-130 |
| | | | | | | | 28 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle d'Acero | 258 | 32,27 | 32,21 | 0,06 | | 24 | 330p | | 32,27 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 46,30 | 484 | 574,4 | 18.502,59 | | | 5,74 | 90-110 |
| | | | | | | | 28 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |

# RIEPILOGO GENERALE DELLE PARTICELLE FORESTALI

**Art. 108 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Classe economica (Compresa) | Particella forestale | | | | | | Dati catastali | | Area protetta - zonizzazione | | | Aree percorse dal Fuoco | | *Vincoli | Dati Dendrometrici | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Località | n° | Superficie in Ha | | | | Foglio | Particella | A | B | C | Anno | Ha | | Densità | | Pr unitaria mc/Ha | Pr totale mc | ***Pp unitaria mc/Ha | ***Pp totale mc | Incremento medio | Età all'anno di redazione del PGF |
| | | | Totale | Bosco | Pascolo prati radure | Altro | | | Ha | Ha | Ha | | | | A.B. unitaria mq/Ha | ** Soggetti n°/Ha | | | | | | |
| COMPRESA A | Valle d'Acero | 259 | 27,71 | 27,14 | 0,57 | | 24 | 3p-330p | | 27,71 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 51,36 | 1077 | 610,7 | 16.576,11 | | | 5,09 | 110-130 |
| | | | | | | | 28 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pagliarolo | 260 | 19,87 | 19,76 | 0,11 | | 24 | 3p-4p | | 19,87 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,90 | 777 | 688,5 | 13.603,31 | | | 6,88 | 90-110 |
| | | | | | | | 26 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 28 | 1p-2p-3p-4p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle d'Acero | 261a | 16,20 | 16,20 | 0,00 | | 26 | 1p | | 16,20 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,85 | 1028 | 658,7 | 10.672,27 | | | 5,49 | 110-130 |
| | Valle d'Acero | 261b | 14,86 | 14,86 | 0,00 | | 26 | 1p | 0,76 | 14,10 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 40,93 | 1688 | 420,8 | 6.253,58 | | | 4,21 | 90-110 |
| | Pagliarolo | 262 | 16,87 | 16,87 | 0,00 | | 26 | 1p | | 16,87 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 40,89 | 1042 | 483,5 | 8.154,82 | | | 4,03 | 110-130 |
| | Chiuvarelli | 263 | 24,81 | 24,81 | 0,00 | | 26 | 1p | 22,30 | 2,51 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,84 | 960 | 585,3 | 14.523,02 | | | | indeterminata |
| | Piano dei Vaccari | 271 | 9,54 | 9,54 | 0,00 | | 27 | 151p | | 9,54 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 50,00 | 406 | 791,2 | 7.543,93 | | | 6,59 | 130-150 |
| | Piano Acernese | 272 | 24,79 | 24,77 | 0,02 | | 27 | 151p | | 24,79 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 605,7 | 15.004,61 | | | 20,19 | 10-30 |
| | Vallebona | 273 | 0,93 | 0,93 | 0,00 | | 27 | 151p | | 0,93 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,00 | | | | indeterminata |
| | Vallebona | 274 | 25,84 | 25,82 | 0,02 | | 27 | 151p | | 25,84 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 57,01 | 817 | 678,8 | 17.525,37 | | | 5,22 | 110-130 |
| | Raia della Scannella | 275 | 19,12 | 19,12 | 0,00 | | 27 | 151p | | 19,12 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 46,19 | 546 | 621,8 | 11.887,55 | | | 4,78 | 110-130 |
| | Valle d'Acero | 276a | 10,31 | 10,29 | 0,02 | | 27 | 151p | | 10,31 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 56,26 | 653 | 662,6 | 6.818,63 | | | 5,93 | 90-110 |
| | Valle d'Acero | 276b | 12,54 | 12,54 | 0,00 | | 27 | 151p | | 12,54 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 54,44 | 809 | 669,6 | 8.398,84 | | | 7,36 | 90-110 |
| | Vallebona | 277 | 18,56 | 18,56 | 0,00 | | 27 | 151p | 5,08 | 13,48 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,76 | 565 | 587,0 | 10.891,96 | | | 4,89 | 130-150 |
| | | | | | | | 28 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vallebona | 278 | 9,10 | 8,83 | 0,27 | | 27 | 151p | | 9,10 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 38,46 | 507 | 449,7 | 3.968,63 | | | 14,99 | 10-30 |
| | | | | | | | 28 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vallebona | 279 | 11,41 | 11,41 | 0,00 | | 27 | 151p | 2,28 | 9,13 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 40,14 | 364 | 706,6 | 8.059,76 | | | 5,89 | 130-150 |
| | | | | | | | 28 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vallebona | 280 | 12,50 | 12,50 | 0,00 | | 28 | 1p | | 12,50 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 42,88 | 437 | 995,4 | 12.445,64 | | | 6,64 | 130-150 |
| | Vallone dell'Acero | 282 | 22,04 | 21,54 | 0,50 | | 28 | 1p | | 22,04 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 29,76 | 295 | 602,4 | 12.975,58 | | | 20,08 | 10-30 |
| | Vallone dell'Acero | 284 | 17,45 | 17,45 | 0,00 | | 28 | 1p | | 17,45 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 43,24 | 416 | 642,4 | 11.206,95 | | | 4,28 | 130-150 |
| | Conca di Marco | 285 | 17,05 | 16,87 | 0,18 | | 28 | 1p-5p | 0,21 | 16,84 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 30,03 | 316 | 578,7 | 9.760,98 | | | 19,29 | 10-30 |
| | Conca di Marco | 286 | 18,28 | 18,22 | 0,06 | | 28 | 1p | | 18,28 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 43,93 | 567 | 641,1 | 11.678,64 | | | 21,37 | 10-30 |
| | Valle d'Acero | 288a | 20,22 | 20,01 | 0,21 | | 28 | 1p | | 20,22 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 37,19 | 584 | 598,7 | 11.978,22 | | | 19,96 | 10-30 |
| | | | | | | | 28 | 5p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Piano Acernese | 288b | 21,68 | 21,57 | 0,11 | | 28 | 1p | | 21,68 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,35 | 489 | 787,0 | 16.976,21 | | | 5,25 | 130-150 |
| | Conca di Marco | 291 | 28,65 | 28,62 | 0,03 | | 26 | 1p-3p-4p | | 28,65 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 54,53 | 1274 | 699,5 | 20.016,97 | | | 5,38 | 110-130 |
| | | | | | | | 28 | 1p-5p-6p-7p-8 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sierro della Zà Popa | 292 | 24,83 | 24,79 | 0,04 | | 26 | 1p | | 24,83 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 53,20 | 948 | 684,1 | 16.962,28 | | | 6,22 | 90-110 |
| | | | | | | | 28 | 1p-4p-5p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Colle del Leone | 294 | 27,74 | 27,72 | 0,02 | | 26 | 1p | | 27,74 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 44,74 | 630 | 642,1 | 17.801,05 | | | 4,28 | 130-150 |
| | | | | | | | 28 | 1p-4p-5p-7p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Piano Acernese | 295a | 15,83 | 15,71 | 0,12 | | 26 | 1p | | 15,83 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 43,75 | 897 | 480,2 | 7.545,81 | | | 4,37 | 90-110 |
| | | | | | | | 28 | 1p-4p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vallebona | 295b | 19,28 | 19,18 | 0,10 | | 26 | 1p | | 19,28 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 34,99 | 1529 | 297,4 | 5.704,78 | | | 3,30 | 70-90 |
| | Colle del Leone | 296 | 8,95 | 8,94 | 0,01 | | 26 | 1p | | 8,95 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 39,91 | 1395 | 359,0 | 3.211,39 | | | 3,26 | 90-110 |
| | | | | | | | 28 | 4p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Colle del Leone | 297 | 23,48 | 19,47 | 4,01 | | 26 | 1p | | 23,48 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 41,68 | 1406 | 386,2 | 7.521,63 | | | 4,29 | 70-90 |
| | | | | | | | 28 | 4p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vallone del Cupone | 298 | 10,72 | 10,72 | 0,00 | | 26 | 1p-4p | | 10,72 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 48,46 | 1876 | 505,6 | 5.421,38 | | | 3,89 | 110-130 |
| | | | | | | | 28 | 4p-7p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vallone del Cupone | 300 | 23,92 | 23,90 | 0,02 | | 26 | 1p | 20,81 | 3,10 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,75 | 1097 | 502,0 | 11.998,93 | | | 7,17 | 50-70 |
| | Felicecchia | 301 | 19,49 | 17,65 | 1,84 | | 26 | 1p | | 19,49 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 33,49 | 1224 | 290,8 | 5.131,88 | | | 3,23 | 70-90 |
| | Felicecchia | 302 | 20,89 | 20,86 | 0,03 | | 26 | 1p | 20,00 | 0,89 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,78 | 674 | 589,8 | 12.300,73 | | | 4,91 | 110-130 |
| | Coste di Cervialto | 304 | 22,47 | 21,85 | 0,62 | | 26 | 1p | | 22,47 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 35,98 | 1193 | 341,4 | 7.457,74 | | | 4,27 | 70-90 |
| | Colle delle Radici | 305 | 21,65 | 21,32 | 0,33 | | 26 | 1p-5p-8p | | 21,65 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 42,17 | 1588 | 393,4 | 8.387,27 | | | 4,92 | 70-90 |
| | Colle delle Radici | 306 | 18,48 | 18,47 | 0,01 | | 26 | 1p | | 18,48 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 46,14 | 761 | 531,3 | 9.811,10 | | | 5,31 | 90-110 |
| | Piano Migliato | 307 | 19,18 | 19,00 | 0,18 | | 26 | 1p | 11,47 | 7,71 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 52,49 | 1214 | 480,9 | 9.135,17 | | | 6,01 | 70-90 |
| | Vallebona | 308a | 21,10 | 20,90 | 0,20 | | 26 | 1p-8p | 5,25 | 15,85 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 43,02 | 906 | 480,0 | 10.030,67 | | | 2,53 | 190-210 |
| | Colle del Leone | 308b | 7,44 | 7,39 | 0,05 | | 26 | 1p | 6,99 | 0,45 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 64,25 | 1050 | 657,1 | 4.857,05 | | | 6,57 | 90-110 |
| | Piano Migliato | 309 | 16,88 | 16,85 | 0,03 | | 26 | 1p-5p-8p | | 16,88 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 39,77 | 1094 | 441,1 | 7.434,22 | | | 3,68 | 110-130 |
| | Colle delle Radici | 310 | 23,71 | 23,67 | 0,04 | | 26 | 1p-5p-6-7p-8p | | 23,71 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 43,54 | 842 | 487,4 | 11.537,81 | | | 4,87 | 90-110 |
| | Piano Migliato | 311 | 15,05 | 14,02 | 1,03 | | 26 | 1p-5p-7p-8p | | 15,05 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 44,56 | 1040 | 518,0 | 7.261,11 | | | 4,71 | 90-110 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPRESA BV | Cervarolo di Laceno | 149 | 10,02 | 9,98 | 0,04 | | 20 | 11p-12p-13p | | 10,02 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 50,31 | 854 | 474,6 | 4.735,62 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 25 | 12p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cervarolo di Laceno | 172 | 10,35 | 10,28 | 0,07 | | 25 | 12p | | 10,35 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 55,15 | 1002 | 569,6 | 5.857,28 | | | | indeterminata |
| | Cervarolo di Laceno | 197 | 19,60 | 19,58 | 0,02 | | 25 | 12p | 0,57 | 19,03 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 51,89 | 604 | 612,6 | 11.996,13 | | | | indeterminata |

# RIEPILOGO GENERALE DELLE PARTICELLE FORESTALI

**Art. 108 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Classe economica (Compresa) | Particella forestale | | | | | | Dati catastali | | Area protetta - zonizzazione | | | Aree percorse dal Fuoco | | *Vincoli | Dati Dendrometrici | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Località | n° | Superficie in Ha | | | | Foglio | Particella | A | B | C | | | | Densità | | Pr unitaria mc/Ha | Pr totale mc | ***Pp unitaria mc/Ha | ***Pp totale mc | Incremento medio | Età all'anno di redazione del PGF |
| | | | Totale | Bosco | Pascolo prati radure | Altro | | | Ha | Ha | Ha | Anno | Ha | | A.B. unitaria mq/Ha | ** Soggetti n°/Ha | | | | | | |
| | Costa della Guradia | 3b | 3,31 | 2,71 | 0,60 | | 7 | 27-30p-46-47-48 | | 3,31 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 57,05 | 1248 | 498,02 | 1.351,13 | | | | indeterminata |
| | Fieste | 4b | 10,01 | 1,70 | 8,31 | | 2 | 62 - 63 | | 2,48 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 64,19 | 109,29 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 3 | 40-41-57-58-94 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6 | 48 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Varco di Marro | 8 | 7,38 | 7,27 | 0,11 | | 7 | 22p-30p | | 7,38 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 43,91 | 787 | 605,89 | 4.404,82 | | | | indeterminata |
| | Valle Scura di Sopra | 16 | 16,36 | 10,63 | 5,73 | | 7 | 21-22p-41 | | 16,36 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 263,37 | 2.799,88 | | | | indeterminata |
| | Colle del Pozzo | 17 | 14,66 | 13,89 | 0,77 | | 7 | 22p | | 14,66 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 58,68 | 451 | 851,45 | 11.823,07 | | | | indeterminata |
| | Il Montagnone | 18 | 10,84 | 7,89 | 2,95 | | 7 | 22p | | 10,84 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 39,58 | 660 | 380,03 | 3.000,17 | | | | indeterminata |
| | Cauciogliara | 20 | 28,61 | 10,98 | 17,63 | | 7 | 22p-30p-34p-39p-49-50-51-52-57 | | 28,61 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 105,94 | 1.162,84 | | | | indeterminata |
| | Belvedere | 21 | 10,70 | 7,26 | 3,44 | | 7 | 22p-40-41-43-60-61 | | 10,70 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 264,61 | 1.920,89 | | | | indeterminata |
| | Castagna | 24 | 8,75 | 8,68 | 0,07 | | 7 | 22p-37-44-49-53-54 | | 8,75 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 35,31 | 501 | 482,35 | 4.186,04 | | | | indeterminata |
| | La Chiusa | 25 | 13,12 | 10,13 | 2,99 | | 7 | 22p-39p | | 13,12 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 12,04 | 312 | 116,70 | 1.182,34 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 12 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pettinicchio | 26 | 38,89 | 10,84 | 28,05 | | 7 | 22p | | 38,89 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 96,81 | 1.049,34 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 12 | 1p-2-9p-51-52-53-54-55-56-57 | | | | | | | | | | | | | | |
| | I Morti | 27a | 20,07 | 7,21 | 12,86 | | 7 | 22p | | 20,07 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 109,58 | 790,06 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 12 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 13 | 16p-23p-24p-28p-29p | | | | | | | | | | | | | | |
| | I Morti | 28 | 2,30 | 1,57 | 0,73 | | 13 | 16p-30p-31p | | 2,30 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 180,43 | 284,08 | | | | indeterminata |
| | Valle dei Morti | 29a | 8,29 | 7,57 | 0,72 | | 13 | 16p-33p-34p-42p | | 8,29 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 50,78 | 386 | 640,55 | 4.849,71 | | | | indeterminata |
| | Valle dei Lupi | 30 | 6,84 | 5,00 | 1,84 | | 13 | 2p-16p-43p | | 6,84 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 69,00 | 533 | 911,73 | 4.555,53 | | | | indeterminata |
| | Valle dei Lupi | 31 | 17,68 | 17,41 | 0,27 | | 13 | 16p-22p-42p | | 17,68 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 37,95 | 794 | 385,25 | 6.707,66 | | | | indeterminata |
| | Acero | 32a | 5,72 | 5,68 | 0,04 | | 13 | 16p-22p-51p-52p | | 5,72 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,96 | 793 | 444,04 | 2.522,09 | | | | indeterminata |
| | Acero | 33 | 10,84 | 10,61 | 0,23 | | 13 | 22p-52p | | 10,84 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 50,68 | 936 | 472,10 | 5.009,83 | | | | indeterminata |
| | Filettone | 34 | 5,24 | 5,20 | 0,04 | | 13 | 22p | | 5,24 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 38,83 | 793 | 338,20 | 1.758,76 | | | | indeterminata |
| | Valle del Limo | 37a | 8,72 | 7,16 | 1,56 | | 7 | 22p-34p-45p-55-56p-73p | | 8,72 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 207,70 | 1.486,55 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 11 | 20p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 12 | 1p-4-63p-64p-65-66-67-68-191 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle del Limo | 37b | 4,83 | 4,43 | 0,40 | | 7 | 22p-34 | | 4,83 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 214,43 | 950,32 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 11 | 20p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lo Stazzo | 38 | 14,31 | 10,05 | 4,26 | | 7 | 22p | | 14,31 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 37,02 | 826 | 345,85 | 3.475,38 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 12 | 1p-11p-12p-63p-64p-69-74-75-76-77-79 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lo Stazzo | 39 | 17,32 | 10,43 | 6,89 | | 12 | 1p-6-7-12p-59-60-61-62 | | 17,32 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 175,49 | 1.830,88 | | | | indeterminata |
| | Lo Stazzo | 40 | 11,15 | 5,26 | 5,89 | | 12 | 1p-8-9p-12p-13-58 | | 11,15 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 183,86 | 967,99 | | | | indeterminata |
| | Vallone dello Stazzo | 41 | 9,26 | 8,93 | 0,33 | | 12 | 1p-12p | | 9,26 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 52,46 | 494 | 573,02 | 5.116,04 | | | | indeterminata |
| **COMPRESA C** | Valle dei Sauci | 42 | 28,53 | 13,87 | 14,66 | | 12 | 1p | | 28,53 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 173,45 | 2.405,92 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 13 | 16p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle dei Morti | 43 | 14,36 | 12,46 | 1,90 | | 12 | 1p | | 14,36 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 48,51 | 616 | 488,78 | 6.087,99 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 13 | 16p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle dei Sauci | 44a | 7,99 | 7,70 | 0,29 | | 12 | 1p-3 | | 7,99 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,13 | 468 | 658,45 | 5.071,21 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 13 | 16p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle dei Sauci | 44b | 4,68 | 4,38 | 0,30 | | 12 | 1p | | 4,68 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 321,29 | 1.407,98 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 13 | 16p-44-45p-46p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle dei Sauci | 45a | 19,12 | 18,68 | 0,44 | | 13 | 2p-3p-15p-16p-43p-45p | | 19,12 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 44,57 | 533 | 536,08 | 10.012,45 | | | | indeterminata |
| | Terrate | 46 | 16,25 | 15,14 | 1,11 | | 13 | 16p-22p-48-49-50-52p | | 16,25 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,41 | 650 | 465,43 | 7.045,61 | | | | indeterminata |
| | Terrate | 47 | 4,99 | 4,94 | 0,05 | | 13 | 22p-160p | | 4,99 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 52,06 | 800 | 491,81 | 2.429,82 | | | | indeterminata |
| | Filettone | 48 | 9,42 | 8,75 | 0,67 | | 13 | 8p-22p-167p-169-170-171p-172-173p | | 9,42 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 61,70 | 546 | 661,12 | 5.787,16 | | | | indeterminata |
| | Vallone della Vecchiarella | 50 | 9,13 | 7,88 | 1,25 | | 11 | 20p-29p | | 9,13 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 282,57 | 2.226,58 | | | | indeterminata |
| | Orto di Calcio Lento | 51 | 21,56 | 3,53 | 18,03 | | 11 | 20p-26-27p-29p-42-43p-45 | | 21,56 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 66,53 | 235,17 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 12 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle del Limo | 52 | 31,14 | 5,37 | 25,77 | | 11 | 24-25-29p-38-39-40-41-43p-44 | | 31,14 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 75,11 | 403,23 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 12 | 1p-10-21-49-80-81-82-83-84 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Conca | 53 | 6,87 | 6,61 | 0,26 | | 7 | 22p-45-56p-73p | | 6,87 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 53,38 | 949 | 617,33 | 4.082,90 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 12 | 1p-68 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monte Caruso | 54 | 12,57 | 5,38 | 7,19 | | 12 | 1p-12p-116-121-130-131-132-133 | | 12,15 | 0,42 | | | a/b/c/d/g/i/m | 40,97 | 364 | 460,67 | 2.477,04 | | | | indeterminata |
| | Valle dei Sauci | 55 | 14,89 | 13,88 | 1,01 | | 12 | 1p-12p | | 14,89 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 69,18 | 796 | 822,89 | 11.423,50 | | | | indeterminata |
| | Monte Caruso | 56 | 13,22 | 7,29 | 5,93 | | 12 | 1p-12p-401p | | 13,22 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,88 | 462 | 486,42 | 3.546,89 | | | | indeterminata |
| | Valle Matauro | 57 | 35,36 | 23,27 | 12,09 | | 12 | 1p-14p-15-48p-178 | | 35,36 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 40,17 | 520 | 360,99 | 8.398,86 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 13 | 9p-15p-21p-62 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Colle Matauro | 59 | 12,88 | 10,18 | 2,70 | | 12 | 1p-14p-179 | | 12,88 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,64 | 696 | 458,14 | 4.665,20 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 13 | 4-9p-15p-16p-59-60 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle del Pero | 61 | 11,88 | 10,52 | 1,36 | | 13 | 15p-16p-54-55p | | 11,88 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 54,43 | 754 | 540,63 | 5.685,88 | | | | indeterminata |
| | Raia dell'Acera | 62 | 12,88 | 10,43 | 2,45 | | 13 | 16p-22p-53 | | 12,88 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,16 | 773 | 458,72 | 4.783,35 | | | | indeterminata |
| | Terrate | 63 | 12,05 | 10,68 | 1,37 | | 13 | 16p-22p | | 12,05 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 46,04 | 403 | 424,61 | 4.534,42 | | | | indeterminata |
| | Terrate | 64 | 8,25 | 8,12 | 0,13 | | 13 | 5p-22p-144-152p-153p | | 8,25 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 51,94 | 706 | 460,81 | 3.740,39 | | | | indeterminata |
| | Filettone | 65 | 8,08 | 7,94 | 0,14 | | 13 | 8p-22p-150p-151p-168p-171p-180p | | 8,08 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 48,53 | 645 | 469,18 | 3.723,68 | | | | indeterminata |
| | La Peta | 66 | 13,89 | 8,74 | 5,15 | | 13 | 5p-22p-145-146-147-148-149-182 | | 13,89 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 209,30 | 1.829,31 | | | | indeterminata |
| | Filettone | 67 | 13,70 | 11,11 | 2,59 | | 13 | 22p-173p | | 13,70 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 295,52 | 3.284,64 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 20 | 12p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Costa dell'Angelo | 68 | 8,44 | 6,67 | 1,77 | | 10 | 144-171 | | 8,44 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 176,67 | 1.177,60 | | | | indeterminata |
| | Valle Nova | 70 | 33,18 | 23,39 | 9,79 | | 11 | 27p-29p | | 27,19 | 5,99 | | | a/b/c/d/g/i/m | 65,62 | 634 | 634,16 | 14.830,55 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 12 | 1p-17-18-85-86-87-88 | | | | | | | | | | | | | | |

# RIEPILOGO GENERALE DELLE PARTICELLE FORESTALI

**Art. 108 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Classe economica (Compresa) | Particella forestale | | | | | | Dati catastali | | Area protetta - zonizzazione | | | Aree percorse dal Fuoco | | *Vincoli | Dati Dendrometrici | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Località | n° | Superficie in Ha | | | | Foglio | Particella | A | B | C | | | | Densità | | Pr unitaria mc/Ha | Pr totale mc | ***Pp unitaria mc/Ha | ***Pp totale mc | Incremento medio | Età all'anno di redazione del PGF |
| | | | Totale | Bosco | Pascolo prati radure | Altro | | | Ha | Ha | Ha | Anno | Ha | | A.B. unitaria mq/Ha | ** Soggetti n°/Ha | | | | | | |
| | S. Maria | 72 | 17,41 | 11,71 | 5,70 | | 11 | 29p | | 13,63 | 3,78 | | | a/b/c/d/g/i/m | 52,07 | 936 | 396,38 | 4.642,47 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 12 | 1p-12p-18-89 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 18 | 11p | | | | | | | | | | | | | | |
| | S. Maria | 73 | 11,99 | 7,49 | 4,50 | | 11 | 29p | | 11,99 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 232,57 | 1.741,60 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 12 | 1p-16 | | | | | | | | | | | | | | |
| | S. Maria | 74 | 6,36 | 5,05 | 1,31 | | 12 | 1p-20-105-106-107 | | 4,44 | 1,92 | | | a/b/c/d/g/i/m | 42,15 | 515 | 416,85 | 2.103,95 | | | | indeterminata |
| | Monte Caruso | 76 | 16,92 | 11,23 | 5,69 | | 12 | 1p-146-153p-154p-155p-156p-161p-162p-165p-167p-169p-172p-173p | | 15,61 | 1,31 | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,09 | 455 | 550,09 | 6.176,43 | | | | indeterminata |
| | Raia della Spina | 78 | 21,15 | 13,63 | 7,52 | | 12 | 47-48p | | 3,62 | 17,53 | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,14 | 442 | 501,76 | 6.839,24 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 13 | 11p-12p-13p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 19 | 31-36p-238p-262 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 25 | 12p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle Piana | 80 | 5,05 | 4,30 | 0,75 | | 12 | 48p | | 5,05 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 56,18 | 1391 | 389,89 | 1.677,23 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 13 | 11p-15p-77p-78-81-86-89-93-94 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vado dell'Asta | 82 | 16,15 | 9,39 | 6,76 | | 13 | 15p-16p-22p-55p-56- | | 16,15 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 195,19 | 1.832,04 | | | | indeterminata |
| | Salve Regina | 83a | 9,84 | 6,54 | 3,30 | | 13 | 15p-17p-18p-124-125-126-127p | | 9,84 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 204,07 | 1.335,51 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 20 | 5p-12p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vado dell'Asta | 84 | 13,47 | 10,04 | 3,43 | | 13 | 16p-18p-22p-57p-130p | | 13,47 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 209,9 | 2.108,06 | | | | indeterminata |
| | Valle Coscia | 85 | 10,45 | 9,81 | 0,64 | | 13 | 16p-22p-57p-142-143p | | 10,45 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 40,56 | 491 | 410,7 | 4.026,65 | | | | indeterminata |
| | Vado dell'Asta | 86 | 8,36 | 8,32 | 0,04 | | 13 | 20p-22p-131p-132p | | 8,36 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 66,96 | 988 | 697,9 | 5.806,28 | | | | indeterminata |
| | Vado dell'Asta | 87 | 9,30 | 9,18 | 0,12 | | 13 | 22p-135p-138p-139p-140p-143p | | 9,30 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 59,30 | 695 | 583,2 | 5.356,49 | | | | indeterminata |
| | La Peta | 88 | 3,12 | 3,00 | 0,12 | | 13 | 22p | | 3,12 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 52,66 | 442 | 711,38 | 2.132,50 | | | | indeterminata |
| | Vallone di Ciccociangia | 89 | 10,38 | 4,81 | 5,57 | | 13 | 22p | | 10,38 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 43,96 | 338 | 490,92 | 2.362,81 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 20 | 12p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vallone di Ciccociangia | 90 | 8,38 | 4,74 | 3,64 | | 13 | 22p | | 8,38 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 27,15 | 468 | 222,17 | 1.052,56 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 20 | 12p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Costa dell'Angelo | 92 | 7,84 | 4,23 | 3,61 | | 10 | 148p | | 7,84 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 21,76 | 1326 | 105,83 | 447,74 | | | | indeterminata |
| | Raia della Spina | 97 | 9,33 | 5,40 | 3,93 | | 12 | 48p | | 9,15 | 0,18 | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 183,70 | 991,83 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 13 | 11p-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 20 | 1p-18 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 25 | 1p-12p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Serro Tondo | 98a | 6,44 | 2,83 | 3,61 | | 13 | 18p | | 6,44 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 121,54 | 343,77 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 20 | 5p-12p-32p | | | | | | | | | | | | | | |
| **COMPRESA C** | Serro Tondo | 98b | 2,66 | 2,36 | 0,30 | | 20 | 12p | | 2,66 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 33,34 | 637 | 322,23 | 761,83 | | | | indeterminata |
| | Serro Tondo | 99 | 6,78 | 6,38 | 0,40 | | 13 | 18p-20p-22p-130p-134p-136p-137p | | 6,78 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,62 | 540 | 500,62 | 3.194,30 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 20 | 5p-12p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Serrone Pizzuto | 100 | 14,02 | 13,40 | 0,62 | | 20 | 12p | | 14,02 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 52,30 | 1027 | 485,49 | 6.504,07 | | | | indeterminata |
| | Serrone Pizzuto | 101 | 17,58 | 16,29 | 1,29 | | 20 | 12p | | 17,58 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,05 | 580 | 522,12 | 8.503,69 | | | | indeterminata |
| | Vado dell'Asta | 102 | 11,66 | 10,68 | 0,98 | | 20 | 10-12p-36p-37p-39 | | 11,66 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 55,15 | 719 | 563,96 | 6.024,94 | | | | indeterminata |
| | Valle di Liero | 103 | 14,73 | 14,72 | 0,01 | | 20 | 12p | | 14,73 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,29 | 687 | 462,78 | 6.813,63 | | | | indeterminata |
| | Serro della Falasca | 104 | 5,17 | 5,14 | 0,03 | | 20 | 12p-40 | | 5,17 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 51,38 | 728 | 484,16 | 2.486,46 | | | | indeterminata |
| | Serro della Falasca | 105 | 13,94 | 13,10 | 0,84 | | 20 | 12p | | 13,94 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 56,30 | 910 | 611,77 | 8.013,49 | | | | indeterminata |
| | Calvelluzzo | 106 | 3,04 | 3,04 | 0,00 | | 20 | 12p | | 3,04 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 55,08 | 416 | 912,89 | 2.771,70 | | | | indeterminata |
| | Tronola | 113b | 11,20 | 8,04 | 3,16 | | 19 | 36-39-287-288 | | 6,60 | 4,60 | | | a/b/c/d/g/i/m | 17,50 | 320 | 393,60 | 3.163,05 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 25 | 1p-3-4-5-6-12p-14-15-16 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tronola | 114 | 16,61 | 12,41 | 4,20 | | 20 | 1p-11p-12p | | 16,56 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,08 | 517 | 498,79 | 6.190,61 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 25 | 1p-6-12p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lagarello | 116 | 5,06 | 5,04 | 0,02 | | 20 | 12p | | 5,06 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 36,57 | 605 | 386,95 | 1.949,10 | | | | indeterminata |
| | Corsa dei Cavalli | 119 | 11,22 | 10,00 | 1,22 | | 20 | 12p | | 11,22 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 53,23 | 988 | 462,28 | 4.622,83 | | | | indeterminata |
| | Corsa dei Cavalli | 120 | 15,81 | 14,65 | 1,16 | | 20 | 12p | | 15,81 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,51 | 896 | 421,37 | 6.171,92 | | | | indeterminata |
| | Valle del Ghiro | 121 | 9,15 | 9,14 | 0,01 | | 20 | 12p | | 9,15 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,41 | 605 | 574,43 | 5.248,07 | | | | indeterminata |
| | Coste del Calvello | 122 | 10,92 | 10,50 | 0,42 | | 20 | 12p | | 10,92 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 52,19 | 884 | 470,79 | 4.944,86 | | | | indeterminata |
| | Orno | 124 | 9,53 | 9,53 | 0,00 | | 17 | 101-163p | | 9,53 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 35,33 | 1560 | 253,73 | 2.418,66 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 18 | 11p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 23 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pietra di Alessio | 130 | 11,27 | 2,62 | 8,65 | | 18 | 11p | | 9,66 | 1,61 | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 50,12 | 131,20 | | | | indeterminata |
| | Fontana di Sazzano | 132 | 18,37 | 13,41 | 4,96 | | 20 | 11p-12p-13p | | 11,27 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 55,51 | 741 | 607,52 | 8.148,93 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 25 | 12p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Corsa dei Cavalli | 136 | 9,47 | 9,46 | 0,01 | | 20 | 12p | | 9,47 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 52,77 | 767 | 533,97 | 5.050,96 | | | | indeterminata |
| | Monte Calvello | 137a | 9,80 | 9,62 | 0,18 | | 20 | 12p-13p | | 9,80 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 367,15 | 3.532,00 | | | | indeterminata |
| | Monte Calvello | 138 | 9,58 | 0,54 | 9,04 | | 20 | 12p | | 9,58 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 20,00 | 10,88 | | | | indeterminata |
| | Aria della Preda | 153 | 42,34 | 18,19 | 24,15 | | 20 | 12p-13p | | 42,25 | 0,09 | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 131,25 | 2.388,08 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 25 | 10p-12p-21p-23p-24p-31p-33p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sazzano | 154 | 41,14 | 13,92 | 27,22 | | 20 | 12p-13p-14p-15-16 | | 37,64 | 3,50 | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 137,49 | 1.914,20 | | | | indeterminata |
| | Piano di Sazzano | 176 | 14,85 | 12,91 | 1,94 | | 25 | 12p-45p-49p-50p-51p-52p | | 14,57 | 0,28 | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,24 | 377 | 601,56 | 7.766,40 | | | | indeterminata |
| | Gioco dei Colombi | 312 | 3,45 | 3,45 | 0,00 | | 16 | 2-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | a/b/c/d/i | | | | | | | | indeterminata |
| | Valle dell'Ulivo | 314 | 15,06 | 4,25 | 10,81 | | 12 | 1p-11p | | 15,05 | 0,01 | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 69,14 | 293,87 | | | | indeterminata |
| | Serrone Pizzuto | 315 | 8,01 | 3,25 | 4,76 | | 20 | 12p | | 8,01 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 120,82 | 392,13 | | | | indeterminata |
| | Il Casone | 316 | 2,32 | 2,17 | 0,15 | | 19 | 323p | | 2,32 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 268,40 | 583,68 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 31 | 264-265p | | | | | | | | | | | | | | |

# RIEPILOGO GENERALE DELLE PARTICELLE FORESTALI

**Art. 108 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Classe economica (Compresa) | Particella forestale | | | | | | Dati catastali | | Area protetta - zonizzazione | | | Aree percorse dal Fuoco | | *Vincoli | Dati Dendrometrici | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Località | n° | Superficie in Ha | | | | Foglio | Particella | A | B | C | Anno | Ha | | Densità | | Pr unitaria mc/Ha | Pr totale mc | ***Pp unitaria mc/Ha | ***Pp totale mc | Incremento medio | Età all'anno di redazione del PGF |
| | | | Totale | Bosco | Pascolo prati radure | Altro | | | Ha | Ha | Ha | | | | A.B. unitaria mq/Ha | ** Soggetti n°/Ha | | | | | | |
| COMPRESA FD | Tronola | 112 | 13,77 | 13,33 | 0,44 | | 25 | 8p-9p-12p | | 1,55 | 12,22 | | | a/b/c/d/g/i/m | 44,20 | 555 | 503,78 | 6.715,49 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 32 | 14p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tronola | 113a | 7,06 | 7,06 | 0,00 | | 25 | 7-8p-12p | | 2,98 | 4,08 | | | a/b/c/d/g/i/m | 31,31 | 544 | 464,75 | 3.281,14 | | | | indeterminata |
| | Tronola | 131 | 13,65 | 13,52 | 0,13 | | 25 | 12p | | 13,51 | 0,14 | | | a/b/c/d/g/i/m | 37,04 | 1048 | 427,59 | 5.780,01 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 32 | 14p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cervarolo di Laceno | 148 | 25,72 | 25,72 | 0,00 | | 25 | 12p | | 15,08 | 10,64 | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,89 | 751 | 629,62 | 16.192,74 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 32 | 14p-49 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cervarolo di Laceno | 171 | 18,14 | 18,11 | 0,03 | | 25 | 12p | | 16,33 | 1,81 | | | a/b/c/d/g/i/m | 51,53 | 858 | 752,57 | 13.627,73 | | | | indeterminata |
| | Cervarolo di Laceno | 195 | 23,44 | 23,27 | 0,17 | | 25 | 12p | | 17,55 | 5,89 | | | a/b/c/d/g/i/m | 46,02 | 812 | 661,76 | 15.396,75 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 31 | 18p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cervarolo di Laceno | 196 | 25,49 | 25,48 | 0,01 | | 25 | 12p | | 21,96 | 3,53 | | | a/b/c/d/g/i/m | 37,78 | 462 | 544,78 | 13.880,16 | | | | indeterminata |
| | Apeticchia | 205a | 22,40 | 22,34 | 0,06 | | 23 | 29p | | 21,55 | 0,85 | | | a/b/c/d/g/i/m | 56,97 | 1832 | 597,59 | 13.348,90 | | | 5,98 | 90-110 |
| | | | | | | | 27 | 151p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Terremoto | 206a | 34,63 | 34,51 | 0,12 | | 23 | 29p-4-5-6-7-151-157 | | 2,21 | 32,42 | | | a/b/c/d/g/i/m | 58,62 | 2216 | 591,67 | 20.416,94 | | | | indeterminata |
| | Terremoto | 206b | 24,86 | 24,85 | 0,01 | | 23 | 29p | | 24,86 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 55,06 | 1209 | 754,96 | 18.763,97 | | | 5,39 | 130-150 |
| | | | | | | | 24 | 330p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 27 | 151p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Terremoto | 206c | 27,61 | 27,28 | 0,33 | | 24 | 38-39-40-54-55-56-57-58-59-60-61-330p | | 27,61 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 52,63 | 2063 | 527,20 | 14.383,40 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 27 | 8-9-151p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Terremoto | 207a | 23,11 | 23,11 | 0,00 | | 24 | 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-33-34-35-36-37-311p-330p | | | 23,11 | | | a/b/c/d/g/i/m | 50,57 | 686 | 759,80 | 17.557,52 | | | 5,43 | 130-150 |
| | Terremoto | 207b | 22,95 | 22,88 | 0,07 | | 24 | 301-310-330p | | 0,13 | 22,82 | | | a/b/c/d/g/i/m | 51,89 | 985 | 693,26 | 15.858,98 | | | 4,95 | 130-150 |
| | Cervarolo di Laceno | 210 | 13,91 | 13,90 | 0,01 | | 25 | 12p | 7,82 | 6,09 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 55,56 | 841 | 563,76 | 7.837,99 | | | | indeterminata |
| | Sette Valli | 226 | 8,69 | 8,45 | 0,24 | | 24 | 62-330p | | 0,38 | 8,31 | | | a/b/c/d/g/i/m | 62,49 | 2266 | 636,70 | 5.379,22 | | | 7,96 | 70-90 |
| | | | | | | | 27 | 151p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sette Valli | 227 | 11,15 | 11,06 | 0,09 | | 24 | 42-43-44-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-319-320-322-330p-332p | | 0,17 | 10,98 | | | a/b/c/d/g/i/m | 55,17 | 1540 | 579,04 | 6.403,03 | | | 5,79 | 90-110 |
| | Coste di Cervialto | 234 | 14,85 | 14,01 | 0,84 | | 25 | 12p-13p | 14,85 | | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 389,95 | 5.464,47 | | | | indeterminata |
| | Coste di Cervialto | 237 | 10,24 | 10,24 | 0,00 | | 25 | 12p | 10,24 | | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 456,15 | 4.669,44 | | | | indeterminata |
| | Valle Giamberardino | 239 | 11,36 | 11,29 | 0,07 | | 25 | 12p | 11,36 | | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 452,72 | 5.109,82 | | | | indeterminata |
| | Coste di Cervialto | 264 | 16,01 | 16,00 | 0,01 | | 26 | 1p-2p | 16,01 | | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 399,11 | 6.385,54 | | | | indeterminata |
| | Coste di Cervialto | 265 | 14,58 | 14,36 | 0,22 | | 25 | 12p-13p | 14,58 | | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 422,57 | 6.069,58 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 26 | 1p-2p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Coste di Cervialto | 303 | 9,19 | 9,18 | 0,01 | | 26 | 1p-2p | 9,19 | | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 486,20 | 4.463,00 | | | | indeterminata |
| COMPRESA P | Salve Regina di Piscacca | 1 | 13,23 | 12,76 | 0,47 | | 7 | 23p-30p | | 12,23 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 328,39 | 4.190,73 | | | | indeterminata |
| | Vallone di Piscacca | 2 | 13,59 | 12,75 | 0,84 | | 7 | 23p-24-25-26-30p-48 | | 13,59 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 345,57 | 4.407,67 | | | | indeterminata |
| | Costa della Guradia | 3a | 13,03 | 12,94 | 0,09 | | 7 | 27-30p-47 | | 13,03 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,77 | 776 | 627,65 | 8.120,08 | | | | indeterminata |
| | Costa della Guradia | 5a | 11,81 | 11,16 | 0,65 | | 7 | 30p | | 11,81 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 307,19 | 3.427,70 | | | | indeterminata |
| | Costa della Guradia | 5b | 2,27 | 0,53 | 1,74 | | 7 | 30p | | 2,27 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 26,55 | 14,06 | | | | indeterminata |
| | Coste di Villa Romana | 9 | 14,73 | 1,81 | 12,92 | | 7 | 22p | | 14,73 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 49,13 | 88,90 | | | | indeterminata |
| | Canale di Mariella | 10 | 10,22 | 7,85 | 2,37 | | 7 | 22p-30p | | 10,22 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 201,86 | 1.583,70 | | | | indeterminata |
| | Ripa dei Corvi | 11 | 14,69 | 13,25 | 1,44 | | 7 | 28-29-30p | | 14,69 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 273,80 | 3.628,36 | | | | indeterminata |
| | Monte Magnone | 12 | 5,36 | 5,19 | 0,17 | | 7 | 22p-30p | | 5,36 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 525,47 | 2.724,68 | | | | indeterminata |
| | Ripa dei Corvi | 13 | 13,97 | 12,63 | 1,34 | | 3 | 94-156 | | 13,97 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 245,36 | 3.098,93 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 7 | 30p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Acerito | 19 | 19,29 | 3,92 | 15,37 | | 7 | 22p-30p-34p | | 19,29 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 70,83 | 277,66 | | | | indeterminata |
| | Acerito | 22 | 4,59 | 3,57 | 1,02 | | 7 | 34p | | 4,59 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 351,23 | 1.253,82 | | | | indeterminata |
| | Conca | 23 | 17,92 | 16,96 | 0,96 | | 7 | 22p-34p-36 | | 17,92 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 33,18 | 689 | 339,69 | 5.762,61 | | | | indeterminata |
| | Guarella | 35 | 11,16 | 5,41 | 5,75 | | 11 | 20p | | 11,16 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 102,55 | 554,97 | | | | indeterminata |
| | Guarella | 36 | 5,16 | 5,07 | 0,09 | | 7 | 34p-73p | | 5,16 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,76 | 485 | 490,33 | 2.485,70 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 11 | 20p-29p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 12 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rompeciciuno | 49 | 10,17 | 4,17 | 6,00 | | 11 | 20p | | 10,17 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 97,39 | 405,69 | | | | indeterminata |
| | La Difesa e Camparella | 69 | 10,85 | 9,52 | 1,33 | | 10 | 126-128-129-132-144-153-156-163- | | 10,85 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 7,77 | 858 | 26,40 | 251,28 | | | | indeterminata |
| | Pasteria | 91 | 4,55 | 1,98 | 2,57 | | 15 | 113p | | 4,55 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 115,55 | 228,25 | | | | indeterminata |
| | Bocca di Calende | 93 | 19,12 | 13,29 | 5,83 | | 10 | 148p | | 19,12 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 137,26 | 1.824,53 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 15 | 113p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Calende | 94 | 20,38 | 19,82 | 0,56 | | 18 | 11p | | 20,38 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 283,17 | 5.611,65 | | | | indeterminata |
| | Calende | 107 | 24,34 | 24,24 | 0,10 | | 17 | 163p-164 | | 24,34 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 365,81 | 8.866,38 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 18 | 11p | | | | | | | | | | | | | | |

# RIEPILOGO GENERALE DELLE PARTICELLE FORESTALI

**Art. 108 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Classe economica (Compresa) | Particella forestale | | | | | | Dati catastali | | Area protetta - zonizzazione | | | Aree percorse dal Fuoco | | *Vincoli | Dati Dendrometrici | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Località | n° | Superficie in Ha | | | | Foglio | Particella | A | B | C | Anno | Ha | | Densità | | Pr unitaria mc/Ha | Pr totale mc | ***Pp unitaria mc/Ha | ***Pp totale mc | Incremento medio | Età all'anno di redazione del PGF |
| | | | Totale | Bosco | Pascolo prati radure | Altro | | | Ha | Ha | Ha | | | | A.B. unitaria mq/Ha | ** Soggetti n°/Ha | | | | | | |
| COMPRESA P | Calende | 108 | 20,32 | 19,88 | 0,44 | | 18 | 11p | | 20,26 | 0,06 | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 293,02 | 5.825,27 | | | | indeterminata |
| | Vallone di Calende | 123 | 4,70 | 4,70 | 0,00 | | 17 | 101-102-163p | | 4,70 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 32,70 | 1763 | 216,03 | 1.014,84 | | | | indeterminata |
| | Raia di Calende | 125 | 6,68 | 6,68 | 0,00 | | 18 | 11p | | 6,68 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 511,71 | 3.418,92 | | | | indeterminata |
| | Raia di Calende | 126 | 6,70 | 6,68 | 0,02 | | 18 | 11p | | 6,43 | 0,27 | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 399,47 | 2.670,23 | | | | indeterminata |
| | Orno | 139 | 3,70 | 3,62 | 0,08 | | 23 | 1p | | 3,70 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 273,00 | 987,92 | | | | indeterminata |
| | Vallone delle Querce | 141 | 8,05 | 8,05 | 0,00 | | 18 | 11p | | 8,05 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 276,01 | 2.221,04 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 23 | 29p-23 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Porcacciolo | 155 | 2,94 | 2,92 | 0,02 | | 23 | 33p | | 2,94 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 292,31 | 852,51 | | | | indeterminata |
| | Porcacciolo | 156 | 3,41 | 3,41 | 0,00 | | 23 | 33p | | 3,41 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 384,52 | 1.311,03 | | | | indeterminata |
| | Porcacciolo | 157 | 6,00 | 5,25 | 0,75 | | 23 | 33p | | 6,00 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 237,42 | 1.245,80 | | | | indeterminata |
| | Porcacciolo | 158 | 4,24 | 2,42 | 1,82 | | 23 | 33p | | 4,24 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 185,23 | 448,45 | | | | indeterminata |
| | Vallone delle Querce | 159 | 10,68 | 10,63 | 0,05 | | 23 | 29p-33p | | 10,68 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 578,69 | 6.152,81 | | | | indeterminata |
| | Porcacciolo | 160 | 4,71 | 4,57 | 0,14 | | 23 | 33p | | 4,71 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 471,12 | 2.153,79 | | | | indeterminata |
| | Valle del Porco | 161 | 12,84 | 11,55 | 1,29 | | 23 | 29p-33p | | 12,84 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 234,53 | 2.708,75 | | | | indeterminata |
| | Vallone del Porco | 177 | 9,32 | 9,32 | 0,00 | | 23 | 33p | | 9,32 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 581,78 | 5.422,09 | | | | indeterminata |
| | Montagna Grande | 178 | 9,50 | 8,82 | 0,68 | | 23 | 33p | | 9,50 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 254,80 | 2.246,81 | | | | indeterminata |
| | Montagna Grande | 179 | 6,01 | 5,89 | 0,12 | | 23 | 33p | | 6,01 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 303,84 | 1.788,82 | | | | indeterminata |
| | Montagna Grande | 180 | 8,14 | 6,50 | 1,64 | | 23 | 33p | | 8,14 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 163,04 | 1.059,87 | | | | indeterminata |
| | Montagna Grande | 181 | 2,36 | 2,36 | 0,00 | | 23 | 33p | | 2,36 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 433,71 | 1.021,46 | | | | indeterminata |
| | Vallone di Cola | 182 | 3,47 | 3,45 | 0,02 | | 23 | 33p | | 3,47 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 249,64 | 862,42 | | | | indeterminata |
| | Montagna Grande | 183 | 9,20 | 8,84 | 0,36 | | 23 | 33p | | 9,20 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 436,37 | 3.859,05 | | | | indeterminata |
| | Vallone di Cola | 184 | 7,91 | 6,45 | 1,46 | | 23 | 33p | | 7,91 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 205,10 | 1.323,16 | | | | indeterminata |
| | Apeticchia | 185 | 13,85 | 13,79 | 0,06 | | 23 | 29p-33p | | 13,85 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 775,38 | 10.696,26 | | | 5,17 | 130-150 |
| | Apeticchia | 186 | 12,88 | 12,81 | 0,07 | | 23 | 29p-33p | | 12,88 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 506,72 | 6.489,37 | | | | indeterminata |
| | Vallone di Cola | 201 | 8,68 | 8,66 | 0,02 | | 23 | 33p | | 6,68 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 592,03 | 5.129,57 | | | | indeterminata |
| | Vallone dell'Acero | 202 | 14,62 | 14,01 | 0,61 | | 23 | 33p | | 14,62 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 294,15 | 4.119,60 | | | | indeterminata |
| | Vallone di Valle dell'Acero | 203 | 11,45 | 10,97 | 0,48 | | 23 | 29p-33p | | 11,45 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 428,63 | 4.700,18 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 27 | 3p-151p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vallone della Scarrupata | 216 | 7,83 | 7,65 | 0,18 | | 23 | 33p | | 7,83 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 212,17 | 1.623,55 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 27 | 3p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Coste dell'Ausano | 217 | 16,50 | 16,15 | 0,35 | | 23 | 33p | | 16,50 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 420,29 | 6.788,37 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 27 | 3p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vallone di Valle dell'Acero | 218 | 13,14 | 13,11 | 0,03 | | 23 | 33p | | 13,14 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 654,65 | 8.582,07 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 27 | 3p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vallone della Scarrupata | 219 | 9,92 | 8,29 | 1,63 | | 27 | 3p | | 9,92 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 220,37 | 1.827,59 | | | | indeterminata |
| | Valle d'Acero | 222b | 8,30 | 8,08 | 0,22 | | 27 | 151p | | 8,30 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 37,96 | 822 | 259,38 | 2.097,05 | | | | indeterminata |
| | Valle d'Acero | 223b | 6,28 | 6,26 | 0,02 | | 27 | 151p | | 6,28 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 41,48 | 780 | 397,95 | 2.489,56 | | | | indeterminata |
| | Valle d'Acero | 224a | 21,07 | 20,30 | 0,77 | | 27 | 151p-152-157-158-159-160 | | 19,17 | 1,90 | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,88 | 670 | 471,58 | 9.572,98 | | | | indeterminata |
| | Vallone della Scarrupata | 242 | 16,28 | 15,55 | 0,73 | | 27 | 3p | | 16,28 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 344,26 | 5.353,21 | | | | indeterminata |
| | Coste dell'Ausano | 243 | 9,10 | 9,08 | 0,02 | | 27 | 3p | | 9,10 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 361,80 | 3.283,94 | | | | indeterminata |
| | Vallone della Scarrupata | 244 | 17,36 | 17,35 | 0,01 | | 27 | 3p-151p | | 17,36 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 680,59 | 11.807,11 | | | | indeterminata |
| | Grotta dei Briganti | 245 | 18,15 | 15,29 | 2,86 | | 27 | 3p-151p | | 18,15 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 400,22 | 6.119,13 | | | | indeterminata |
| | Scarrupata | 246 | 9,45 | 9,41 | 0,04 | | 27 | 3p-151p | | 9,45 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 630,35 | 5.932,27 | | | | indeterminata |
| | Vallone Cupo | 267 | 16,68 | 16,07 | 0,61 | | 27 | 3p | | 16,68 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 425,41 | 6.838,39 | | | | indeterminata |
| | Vallone Cupo | 268 | 17,07 | 17,07 | 0,00 | | 27 | 3p-151p | | 17,07 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 617,59 | 10.544,30 | | | | indeterminata |
| | Vallebona | 269 | 11,85 | 11,84 | 0,01 | | 27 | 1p-3p-151p | | 11,85 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 587,39 | 6.955,86 | | | | indeterminata |
| | Vallone Cupo | 270 | 18,41 | 18,08 | 0,33 | | 27 | 3p-151p | | 18,41 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 506,07 | 9.151,44 | | | | indeterminata |
| | Coste di Tannaro | 281 | 8,59 | 8,59 | 0,00 | | 28 | 1p | 6,63 | 1,96 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 614,22 | 5.276,65 | | | | indeterminata |
| | Coste di Tannaro | 283 | 34,30 | 33,98 | 0,32 | | 28 | 1p | 12,80 | 21,50 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 468,79 | 15.928,17 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 23 | 29p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPRESA V | Tronola | 313 | 9,06 | 7,60 | 1,46 | | 19 | 43p-323p | | 5,88 | 3,18 | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 311,04 | 2.365,36 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 25 | 9p-12p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 31 | 265p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 32 | 14p | | | | | | | | | | | | | | |

# RIEPILOGO GENERALE DELLE PARTICELLE FORESTALI

**Art. 108 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Classe economica (Compresa) | Particella forestale | | | | | | Dati catastali | | Area protetta - zonizzazione | | | Aree percorse dal Fuoco | | *Vincoli | Dati Dendrometrici | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Località | n° | Superficie in Ha | | | | Foglio | Particella | A | B | C | Anno | Ha | | Densità | | Pr unitaria mc/Ha | Pr totale mc | ***Pp unitaria mc/Ha | ***Pp totale mc | Incremento medio | Età all'anno di redazione del PGF |
| | | | Totale | Bosco | Pascolo prati radure | Altro | | | Ha | Ha | Ha | | | | A.B. unitaria mq/Ha | ** Soggetti n°/Ha | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPRESA PASCOLI | I morti | 27b | 7,44 | | 7,44 | | 12 | 1p | | 7,44 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | | | | | | | 13 | 1-16p-23p-24p-25-26-27-28p-29p-30p-31p-32 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle dei Morti | 29b | 6,55 | | 6,55 | | 13 | 16p-33p-34p-35-36-37-38-39-40-41-42p | | 6,55 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | Acero | 32b | 0,94 | | 0,94 | | 13 | 22p-51p-52p | | 0,94 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | Valle dei Sauci | 45b | 2,44 | | 2,44 | | 13 | 3p-15-16p-45p-46p-47 | | 2,44 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | Terrate | 47b | 8,30 | | 8,30 | | 13 | 6-22p-150p-151p-152p-153p-154-155-156-157-158-159-160p-161-162-163-164-165-166-167p-168p-180p-181 | | 8,30 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | Valle Foce di Caposele | 79b | 3,38 | | 3,38 | | 13 | 9p-10-15p-63-64-65-66-67-68-69-70p-71p-72p-73p-74p-75p-76p-77p-176-177-178 | | 3,38 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | Salve Regina | 83b | 2,98 | | 2,98 | | 13 | 15p | | 2,98 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | | | | | | | 20 | 5p-6-12p-31-32p-33p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vado dell'Asta | 84b | 1,28 | | 1,28 | | 13 | 15p-16p-17p-18-19-22p-127p-128-129-130p | | 1,28 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | Vado dell'Asta | 86b | 8,15 | | 8,15 | | 13 | 20p-21p-22p-131p-132p-133-134p-135p-136p-137p-138p-139p-140p-141 | | 8,15 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | | | | | | | 20 | 8-9-10-12-34-35-36p-37p-38 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monte Calvello | 137b | 3,89 | | 3,89 | | 20 | 12p | | 3,89 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | Tronola | 147a | 167,41 | | 167,41 | | 18 | 8p-11p | | 131,80 | 35,61 | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | | | | | | | 19 | 43p-323p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 29 | 1p-2-4-5p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 30 | 1p-23-47-66 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 31 | 8-265p-Y901 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 32 | 15-16 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 33 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tronola | 147b | 8,86 | | 8,86 | | 12 | 1p-46-47-48-167p-168-169p-170-171-172p-173p-175-401p-402 | | 1,53 | 7,33 | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | | | | | | | 19 | 30-36-238p-239-243-244 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tronola | 147c | 5,24 | | 5,24 | | 12 | 1p-21-44-247 | | 0,29 | 4,95 | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | Tronola | 147d | 1,83 | | 1,83 | | 12 | 1-45-145-146p-147p-153p-154p-155p-156p-160p-161p-162p-165p-258-259-260-263-264-265-267-269-270-272-274 | | 0,04 | 1,79 | | | | | | | | | | | |
| | Cervarolo di Sazzano | 175 | 17,92 | | 17,92 | | 20 | 13p-14p | | 4,15 | 13,77 | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | | | | | | | 25 | 10p-12p-21p-22-23p-24p-25-26-27-28-29-30-31p-32-34p-35-36-37-38-39-40p-41p-42p-43-44-45p-46-47-48-49p-50p-51p-52p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Coste di Cervialto | 232b | 15,20 | | 15,20 | | 24 | 3p-4p-330p | | 15,20 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | | | | | | | 26 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 28 | 4p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle dell'Acero | 249 | 2,71 | | 2,71 | | 27 | 151p | | 2,71 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | Valle dell'Acero | 255c | 0,39 | | 0,39 | | 27 | 151p | | 0,39 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | Piano dei Vaccari | 260b | 3,07 | | 3,07 | | 28 | 1p-2p-3p-4p | | 3,07 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | Vallebona | 273b | 1,22 | | 1,22 | | 27 | 151p | | 1,22 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | Sierro della Zà Popa | 291b | 1,72 | | 1,72 | | 28 | 6p | | 1,72 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | Colle del Leone | 292b | 4,56 | | 4,56 | | 28 | 1p | | 4,56 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | **TOTALI** | | **4.961,09** | **4.179,47** | **781,62** | **0,00** | | | **271,38** | **4.255,71** | **419,36** | | | | | | | **2.233.557,67** | | | | |

* = Vincoli:

| | |
|---|---|
| a | Idrogeologico (L. 3267/1923) |
| b | Autorità di Bacino (L. 18 maggio 1989, n. 183 – L. R. 07/02/1994, n. 8) |
| c | Uso civico (L. 1766/1927 – L. R. 11/1981) |
| d | Bellezze naturali (L. 1497/1939 transitata nel D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) |
| e | Piani territoriali paesaggistici (ai sensi dell'art. 149 del D.lgs. 29/10/99, n. 490) |
| f | Parco Nazionale (L. 6 dicembre 1991, n. 394) |
| g | Parco Regionale (L. R. 1 settembre 1993, n. 33) |
| h | Riserva, altro (L. 6 dicembre 1991, n. 394) |
| i | Legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 21 novembre 2000, n. 353) |
| l | Conflitti di proprietà e/o di confinazione tra le aree oggetto di pianificazione ed altri Soggetti privati e/o pubblici |
| m | Rete Natura 2000 |
| n | Altro - specificare |

** = Fustaie e fustaie transitorie - *n° soggetti/Ha* ; ceduo - *n° polloni/Ha e n° matricine/Ha*

Pr = Provvigione reale

*** = Se impossibilitati a calcolare la Provvigione potenziale/normale fornire motivazione

Pp = Provvigione potenziale

# RIEPILOGO GENERALE DEL PIANO DEI TAGLI/INTERVENTI

**Art .108 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno di intervento | Classe economica (Compresa) | Particella forestale | | | | Area protetta - zonizzazione | | | *Vincoli | Provvigione | | | Ripresa | | Descrizione Intervento | Saggio di Utilizzazione - % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A | B | C | | | | | | | | |
| | | n° | Superficie totale - Ha | Superficie utile boscata - Ha | Età al taglio | Ha | Ha | Ha | | Provvigione reale unitaria - mc | Provvigione reale totale - mc | Provvigione reale totale post intervento - mc | Ripresa reale unitaria - mc | Ripresa reale totale - mc | | |
| 2026-2028 | A | 109a | 11,29 | 11,29 | 110-130 | | 9,80 | 1,49 | a/b/c/d/g/i/m | 554,28 | 5.755,18 | 4.605,18 | 101,86 | 1.150 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 19,98 |
| 2026-2028 | A | 109b | 10,82 | 10,82 | 130-150 | | 10,75 | 0,07 | a/b/c/d/g/i/m | 574,11 | 5.997,30 | 4.797,30 | 110,91 | 1.200 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,01 |
| 2026-2028 | A | 110 | 26,99 | 25,56 | 110-130 | | 26,81 | 0,18 | a/b/c/d/g/i/m | 523,28 | 13.895,83 | 11.075,83 | 110,33 | 2.820 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 21,08 |
| 2026-2028 | A | 127 | 11,81 | 11,81 | 110-130 | | 10,37 | 1,44 | a/b/c/d/g/i/m | 550,80 | 6.503,17 | 5.393,17 | 93,99 | 1.110 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 17,06 |
| 2026-2028 | A | 143 | 23,06 | 22,99 | 130-150 | | 23,03 | 0,03 | a/b/c/d/g/i/m | 624,45 | 14.353,13 | 10.033,13 | 187,91 | 4.320 | Taglio di sementazione che preservi gli alberi del vecchio ciclo colturale rappresentati da grandi soggetti dalla chioma espansa in grado di garantire un'abbondante fruttificazione. Al taglio dovranno cadere i soggetti delle dimensioni minori, sottoposti o dalla chioma filata. | 30,09 |
| 2026-2028 | A | 144 | 12,71 | 12,66 | 110-130 | | 9,99 | 2,72 | a/b/c/d/g/i/m | 588,90 | 7.456,22 | 6.186,22 | 100,32 | 1.270 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 17,03 |
| 2026-2028 | A | 145 | 16,87 | 16,86 | 110-130 | | 13,01 | 3,86 | a/b/c/d/g/i/m | 650,57 | 10.966,35 | 8.766,35 | 130,49 | 2.200 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,06 |
| 2026-2028 | A | 165 | 8,60 | 8,60 | 130-150 | | 8,60 | | a/b/c/d/g/i/m | 609,98 | 5.248,35 | 4.198,35 | 122,09 | 1.050 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,02 |
| 2026-2028 | A | 209 | 31,70 | 31,52 | 110-130 | | 29,26 | 2,44 | a/b/c/d/g/i/m | 674,93 | 21.270,91 | 16.990,91 | 135,79 | 4.280 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,12 |
| 2026-2028 | A | 211 | 21,59 | 21,59 | 130-150 | 0,38 | 20,19 | 1,02 | a/b/c/d/g/i/m | 624,32 | 13.481,29 | 10.781,29 | 125,06 | 2.700 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,03 |
| 2026-2028 | A | 220 | 22,81 | 22,80 | 130-150 | | 22,81 | | a/b/c/d/g/i/m | 718,89 | 16.394,23 | 13.114,23 | 143,86 | 3.280 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,01 |
| 2026-2028 | A | 222a | 16,56 | 16,56 | 110-130 | | 16,56 | | a/b/c/d/g/i/m | 550,54 | 9.115,62 | 7.655,62 | 88,16 | 1.460 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 16,01 |

# RIEPILOGO GENERALE DEL PIANO DEI TAGLI/INTERVENTI

**Art .108 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno di intervento | Classe economica (Compresa) | Particella forestale | | | | Area protetta - zonizzazione | | | *Vincoli | Provvigione | | | Ripresa | | Descrizione Intervento | Saggio di Utilizzazione - % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A | B | C | | | | | | | | |
| | | n° | Superficie totale - Ha | Superficie utile boscata - Ha | Età al taglio | Ha | Ha | Ha | | Provvigione reale unitaria - mc | Provvigione reale totale - mc | Provvigione reale totale post intervento - mc | Ripresa reale unitaria - mc | Ripresa reale totale - mc | | |
| 2026-2028 | A | 223a | 10,58 | 10,58 | 130-150 | | 10,58 | | a/b/c/d/g/i/m | 578,04 | 6.113,21 | 4.893,21 | 115,31 | 1.220 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 19,95 |
| 2026-2028 | A | 224b | 6,50 | 6,50 | 130-150 | | 6,50 | | a/b/c/d/g/i/m | 781,97 | 5.080,22 | 4.060,22 | 156,92 | 1.020 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,07 |
| 2026-2028 | A | 233 | 34,69 | 34,69 | 110-130 | 0,12 | 34,57 | | a/b/c/d/g/i/m | 759,47 | 26.344,30 | 21.074,30 | 151,92 | 5.270 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,00 |
| 2026-2028 | A | 248 | 12,92 | 12,92 | 130-150 | | 12,92 | | a/b/c/d/g/i/m | 782,79 | 10.115,12 | 8.095,12 | 156,35 | 2.020 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 19,97 |
| 2026-2028 | A | 250 | 22,87 | 22,86 | 130-150 | | 22,87 | | a/b/c/d/g/i/m | 719,39 | 16.445,48 | 13.155,48 | 143,92 | 3.290 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,01 |
| 2026-2028 | A | 255a | 9,19 | 9,18 | 130-150 | | 9,19 | | a/b/c/d/g/i/m | 845,57 | 7.765,07 | 5.435,07 | 253,81 | 2.330 | Taglio di sementazione che asporti il 30% del volume totale per circa un 50% del numero degli alberi. Andranno eliminati gli alberi di minori dimensioni, lasciando quelli più grandi, dalla chioma più espansa in grado di disseminare abbondantemente. | 30,02 |
| 2026-2028 | A | 258 | 32,27 | 32,21 | 90-110 | | 32,27 | | a/b/c/d/g/i/m | 574,41 | 18.502,59 | 13.032,59 | 169,82 | 5.470 | Taglio di sementazione nelle zone di fustaia matura e adulta che asporti il 30% del volume totale per circa un 50% del numero degli alberi. Andranno eliminati gli alberi di minori dimensioni, lasciando a disseminare quelli più grandi, dalla chioma più espansa. Andranno rilasciati alcuni esemplari di ontano e tutti quelli di acero di Lobel, con l'eccezione di quelli dalla chioma compromessa. | 29,56 |
| 2026-2028 | A | 278 | 9,10 | 8,83 | 10-30 | | 9,10 | | a/b/c/d/g/i/m | 449,67 | 3.968,63 | 1.568,63 | 271,80 | 2.400 | Taglio di sgombero su circa il 70% della particella, dove il novellame è già affermato. Tagli secondari e di sementazione nel restante 30% della superficie. | 60,44 |
| 2026-2028 | A | 282 | 22,04 | 21,54 | 10-30 | | 22,04 | | a/b/c/d/g/i/m | 602,38 | 12.975,58 | 9.425,58 | 164,81 | 3.550 | Taglio secondario modulato sull'andamento della rinnovazione, assumendo a tratti il carattere di uno sgombero, dove il novellame è già affermato. Dove il novellame va insediandosi ma è ancora di dimensioni ridotte, taglio secondario. | 27,36 |
| 2026-2028 | A | 285 | 17,05 | 16,87 | 10-30 | 0,21 | 16,84 | | a/b/c/d/g/i/m | 578,75 | 9.760,98 | 6.240,98 | 208,65 | 3.520 | Taglio secondario che in alcuni tratti, dove il novellame è già alto e affermato, dovrà assumere il carattere di uno sgombero. Nel resto della superficie, taglio secondario che asporti circa il 50% della massa. | 36,05 |
| 2029-2031 | A | 166 | 32,90 | 32,70 | 130-150 | | 25,84 | 7,06 | a/b/c/d/g/i/m | 700,02 | 22.893,66 | 15.983,66 | 211,31 | 6.910 | Taglio di sementazione a carico degli alberi di minori dimensioni per circa un 50% del loro numero e del 30% del volume. Nella zona centrale della particella interessata da un sentiero protetto da una staccionata, l'intervento dovrà limitarsi ad un diradamento moderato dal basso che asporti gli alberi sottomessi e quelli che potrebbero risultare pericolosi per chi percorre il sentiero. Quest'ultimo intervento dovrà riguardare anche la zona più a valle prossima alla chiesetta di Santa Nesta. | 30,19 |

# RIEPILOGO GENERALE DEL PIANO DEI TAGLI/INTERVENTI

**Art .108 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno di intervento | Classe economica (Compresa) | Particella forestale | | | | Area protetta - zonizzazione | | | *Vincoli | Provvigione | | | Ripresa | | Descrizione Intervento | Saggio di Utilizzazione - % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A | B | C | | | | | | | | |
| | | n° | Superficie totale - Ha | Superficie utile boscata - Ha | Età al taglio | Ha | Ha | Ha | | Provvigione reale unitaria - mc | Provvigione reale totale - mc | Provvigione reale totale post intervento - mc | Ripresa reale unitaria - mc | Ripresa reale totale - mc | | |
| 2029-2031 | A | 167 | 37,65 | 37,54 | 130-150 | | 34,00 | 3,65 | a/b/c/d/g/i/m | 705,98 | 26.502,45 | 21.182,45 | 141,72 | 5.320 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,07 |
| 2029-2031 | A | 191 | 32,71 | 32,59 | 110-130 | | 23,00 | 9,71 | a/b/c/d/g/i/m | 545,93 | 17.789,46 | 14.579,46 | 98,50 | 3.210 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 18,04 |
| 2029-2031 | A | 192 | 36,38 | 32,37 | 130-150 | | 6,28 | 30,10 | a/b/c/d/g/i/m | 708,85 | 25.779,80 | 20.619,80 | 159,41 | 5.160 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 22,49 |
| 2029-2031 | A | 198 | 17,70 | 16,81 | 10-30 | | 17,69 | 0,01 | a/b/c/d/g/i/m | 426,20 | 7.164,28 | 4.144,28 | 179,65 | 3.020 | Taglio secondario differenziato secondo l'insediamento della rinnovazione. In alcuni piccoli tratti, in presenza di novellame già insediato, si potrà procedere con un taglio di luce che asporti circa il 50% del volume. In altri, dove non si è intervenuti con il taglio precedente, taglio di rinnovazione che asporti non più del 50% del numero degli alberi scelti tra quelli di minori dimensioni. | 42,15 |
| 2029-2031 | A | 199 | 14,12 | 14,12 | 130-150 | 9,58 | 4,54 | | a/b/c/d/g/i/m | 700,58 | 9.892,12 | 8.002,12 | 133,85 | 1.890 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 19,11 |
| 2029-2031 | A | 208 | 35,41 | 35,39 | 110-130 | | 26,82 | 8,59 | a/b/c/d/g/i/m | 731,15 | 25.871,89 | 20.691,89 | 146,37 | 5.180 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,02 |
| 2029-2031 | A | 212 | 29,47 | 29,38 | 110-130 | 28,38 | 1,09 | | a/b/c/d/g/i/m | 584,80 | 17.184,32 | 14.254,32 | 99,73 | 2.930 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 17,05 |
| 2029-2031 | A | 215 | 3,49 | 3,49 | 130-150 | 2,57 | 0,92 | | a/b/c/d/g/i/m | 882,19 | 3.075,08 | 2.455,08 | 177,65 | 620 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,14 |
| 2029-2031 | A | 228 | 24,40 | 24,00 | 110-130 | | 23,79 | 0,61 | a/b/c/d/g/i/m | 655,90 | 15.740,71 | 12.540,71 | 133,33 | 3.200 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,33 |
| 2029-2031 | A | 229 | 34,06 | 33,85 | 110-130 | | 24,34 | 9,72 | a/b/c/d/g/i/m | 656,47 | 22.221,33 | 17.751,33 | 132,05 | 4.470 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,12 |
| 2029-2031 | A | 230 | 35,75 | 35,75 | 110-130 | | 30,71 | 5,04 | a/b/c/d/g/i/m | 694,55 | 24.812,18 | 19.842,18 | 139,02 | 4.970 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,02 |

# RIEPILOGO GENERALE DEL PIANO DEI TAGLI/INTERVENTI

**Art .108 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno di intervento | Classe economica (Compresa) | Particella forestale | | | | Area protetta - zonizzazione | | | *Vincoli | Provvigione | | | Ripresa | | Descrizione Intervento | Saggio di Utilizzazione - % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A | B | C | | | | | | | | |
| | | n° | Superficie totale - Ha | Superficie utile boscata - Ha | Età al taglio | Ha | Ha | Ha | | Provvigione reale unitaria - mc | Provvigione reale totale - mc | Provvigione reale totale post intervento - mc | Ripresa reale unitaria - mc | Ripresa reale totale - mc | | |
| 2029-2031 | A | 271 | 9,54 | 9,54 | 130-150 | | 9,54 | | a/b/c/d/g/i/m | 791,16 | 7.543,93 | 5.653,93 | 198,11 | 1.890 | Taglio di sementazione che asporti il 25/30% del volume totale per circa un 40/50% del numero degli alberi. Andranno eliminati gli alberi di minori dimensioni, lasciando a disseminare quelli più grandi. Il taglio dovrà essere particolarmente cauto nelle zone di gramineto ed in quelle dove è più sviluppato il rovo. | 25,04 |
| 2029-2031 | A | 280 | 12,50 | 12,50 | 130-150 | | 12,50 | | a/b/c/d/g/i/m | 995,39 | 12.445,64 | 10.325,64 | 169,60 | 2.120 | Taglio di sementazione che asporti il 30% del volume totale per circa un 50% del numero degli alberi. Andranno eliminati gli alberi di minori dimensioni, lasciando a disseminare quelli più grandi. Il taglio dovrà essere particolarmente cauto nelle zone di gramineto ed in quelle dove è più sviluppato il rovo. | 17,04 |
| 2029-2031 | A | 286 | 18,28 | 18,28 | 10-30 | | 18,28 | | a/b/c/d/g/i/m | 641,11 | 11.678,64 | 7.458,64 | 230,85 | 4.220 | Taglio secondario modulato sull'andamento della rinnovazione, assumendo a tratti il carattere di uno sgombero e a tratti il taglio di sementazione. In quest'ultimo caso, andranno eliminati gli alberi di minori dimensioni per circa un 50% del loro numero. | 36,01 |
| 2029-2031 | A | 288a | 20,22 | 20,01 | 10-30 | | 20,22 | | a/b/c/d/g/i/m | 598,70 | 11.978,22 | 8.068,22 | 195,40 | 3.910 | Taglio secondario modulato sull'andamento della rinnovazione, assumendo a tratti il carattere di uno sgombero, dove il novellame è già affermato, nella zona a nord interessata marginalmente dall'intervento precedente. Taglio di sementazione eliminando gli alberi di minori dimensioni per circa un 50% del numero. | 32,64 |
| 2032-2035 | A | 96 | 26,62 | 26,42 | 90-110 | | 21,85 | 4,77 | a/b/c/d/g/i/m | 548,63 | 14.492,60 | 11.862,60 | 99,55 | 2.630 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 18,14 |
| 2032-2035 | A | 111 | 15,84 | 15,50 | 110-130 | | 13,54 | 2,30 | a/b/c/d/g/i/m | 649,50 | 10.129,42 | 8.379,42 | 112,90 | 1.750 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 17,38 |
| 2032-2035 | A | 142 | 18,17 | 18,17 | 110-130 | | 18,17 | | a/b/c/d/g/i/m | 625,77 | 11.371,23 | 9.441,23 | 106,22 | 1.930 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 16,97 |
| 2032-2035 | A | 151 | 19,82 | 17,33 | 10-30 | | 19,66 | 0,16 | a/b/c/d/g/i/m | 395,48 | 6.854,78 | 4.504,78 | 135,60 | 2.350 | Taglio secondario per favorire l'affermazione della rinnovazione insediata. Nei tratti migliori andrà eseguito lo sgombero, mentre in alcuni si dovrà procedere con la sementazione. Rinfoltimento con selvaggioni di faggio nelle zone rimaste scoperte dal taglio precedente, eccessivamente intenso. La particella dovrà essere chiusa al pascolo. | 34,29 |
| 2032-2035 | A | 152 | 15,90 | 15,87 | 10-30 | | 15,90 | | a/b/c/d/g/i/m | 471,55 | 7.481,12 | 4.861,12 | 165,09 | 2.620 | Taglio secondario modulato sull'andamento della rinnovazione: ove il novellame va insediandosi ma è ancora di dimensioni ridotte, taglio di luce asportando gli alberi di maggiori dimensioni per circa il 50% del volume. Taglio di sementazione nella zona non interessata dall'intervento precedente, eliminando gli alberi di minori dimensioni per circa un 50% del loro numero e un 30% del volume. | 35,01 |
| 2032-2035 | A | 162 | 27,59 | 27,59 | 130-150 | | 27,59 | | a/b/c/d/g/i/m | 660,40 | 18.221,50 | 14.581,50 | 131,93 | 3.640 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 19,98 |

# RIEPILOGO GENERALE DEL PIANO DEI TAGLI/INTERVENTI

**Art .108 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno di intervento | Classe economica (Compresa) | Particella forestale | | | | Area protetta - zonizzazione | | | *Vincoli | Provvigione | | | Ripresa | | Descrizione Intervento | Saggio di Utilizzazione - % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A | B | C | | | | | | | | |
| | | n° | Superficie totale - Ha | Superficie utile boscata - Ha | Età al taglio | Ha | Ha | Ha | | Provvigione reale unitaria - mc | Provvigione reale totale - mc | Provvigione reale totale post intervento - mc | Ripresa reale unitaria - mc | Ripresa reale totale - mc | | |
| 2032-2035 | A | 163 | 12,59 | 12,59 | 130-150 | | 12,59 | | a/b/c/d/g/i/m | 623,77 | 7.854,42 | 6.284,42 | 124,70 | 1.570 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 19,99 |
| 2032-2035 | A | 164 | 26,74 | 26,74 | 130-150 | | 26,74 | | a/b/c/d/g/i/m | 717,75 | 19.195,34 | 15.355,34 | 143,61 | 3.840 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,01 |
| 2032-2035 | A | 169 | 17,92 | 17,89 | 130-150 | | | 17,92 | a/b/c/d/g/i/m | 859,32 | 15.373,90 | 12.293,90 | 172,16 | 3.080 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,03 |
| 2032-2035 | A | 170 | 12,62 | 12,60 | 130-150 | | | 12,62 | a/b/c/d/g/i/m | 813,44 | 10.249,18 | 8.199,18 | 162,70 | 2.050 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,00 |
| 2032-2035 | A | 188 | 15,60 | 15,55 | 110-130 | | 15,60 | | a/b/c/d/g/i/m | 726,38 | 11.298,37 | 9.028,37 | 145,98 | 2.270 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,10 |
| 2032-2035 | A | 189 | 24,37 | 24,36 | 130-150 | | 24,37 | | a/b/c/d/g/i/m | 586,58 | 14.290,68 | 11.430,68 | 117,41 | 2.860 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,02 |
| 2032-2035 | A | 193 | 19,98 | 19,96 | 130-150 | | | 19,98 | a/b/c/d/g/i/m | 644,23 | 12.858,01 | 10.288,01 | 128,76 | 2.570 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 19,99 |
| 2032-2035 | A | 194 | 11,99 | 11,98 | 130-150 | | | 11,99 | a/b/c/d/g/i/m | 640,71 | 7.673,12 | 6.133,12 | 128,55 | 1.540 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,06 |
| 2032-2035 | A | 204 | 12,28 | 11,85 | 70-90 | | 12,28 | | a/b/c/d/g/i/m | 647,65 | 7.673,03 | 6.483,03 | 100,42 | 1.190 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 15,51 |
| 2032-2035 | A | 205b | 11,18 | 11,18 | 130-150 | | 11,19 | | a/b/c/d/g/i/m | 574,11 | 6.416,66 | 5.136,66 | 114,49 | 1.280 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 19,94 |
| 2032-2035 | A | 221 | 8,36 | 8,33 | 110-130 | | 8,36 | | a/b/c/d/g/i/m | 731,54 | 6.096,84 | 3.646,84 | 294,12 | 2.450 | Taglio secondario differenziato secondo l'insediamento della rinnovazione. In alcuni piccoli tratti, in presenza di novellame già insediato, si potrà procedere con un taglio di luce che asporti circa il 50% del volume. Nella zona centrale, dove non si è intervenuti con il taglio precedente, o dove è stato molto debole e la copertura arborea è ancora chiusa, taglio di rinnovazione che asporti non più del 50% del numero degli alberi scelti tra quelli di minori dimensioni. | 40,21 |

# RIEPILOGO GENERALE DEL PIANO DEI TAGLI/INTERVENTI

**Art .108 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno di intervento | Classe economica (Compresa) | Particella forestale | | | | Area protetta - zonizzazione | | | *Vincoli | Provvigione | | | Ripresa | | Descrizione Intervento | Saggio di Utilizzazione - % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A | B | C | | | | | | | | |
| | | n° | Superficie totale - Ha | Superficie utile boscata - Ha | Età al taglio | Ha | Ha | Ha | | Provvigione reale unitaria - mc | Provvigione reale totale - mc | Provvigione reale totale post intervento - mc | Ripresa reale unitaria - mc | Ripresa reale totale - mc | | |
| 2032-2035 | A | 232 | 40,81 | 40,72 | 130-150 | 0,08 | 40,73 | | a/b/c/d/g/i/m | 684,86 | 27.884,35 | 22.294,35 | 137,28 | 5.590 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,04 |
| 2032-2035 | A | 255b | 12,00 | 12,00 | 70-90 | | 12,00 | | a/b/c/d/g/i/m | 776,62 | 9.315,82 | 5.585,82 | 310,83 | 3.730 | Taglio secondario differenziato secondo l'insediamento della rinnovazione. In alcuni piccoli tratti, in presenza di novellame già insediato, si potrà procedere con un taglio di luce che asporti circa il 50% del volume. Nella zona a valle, dove non si è intervenuti con il taglio precedente, o dove è stato molto debole e la copertura arborea è ancora chiusa, taglio di rinnovazione che asporti non più del 50% del numero degli alberi scelti tra quelli di minori dimensioni. | 40,02 |
| 2032-2035 | A | 259 | 27,71 | 27,14 | 110-130 | | 27,71 | | a/b/c/d/g/i/m | 610,71 | 16.576,11 | 13.196,11 | 124,54 | 3.380 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,39 |
| 2032-2035 | A | 260 | 19,87 | 19,76 | 90-110 | | 19,87 | | a/b/c/d/g/i/m | 688,46 | 13.603,31 | 10.863,31 | 138,66 | 2.740 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 20,14 |
| 2032-2035 | A | 261a | 16,20 | 16,20 | 110-130 | | 16,20 | | a/b/c/d/g/i/m | 658,75 | 10.672,27 | 8.542,27 | 131,48 | 2.130 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 19,96 |
| 2032-2035 | A | 262 | 16,87 | 16,87 | 110-130 | | 16,87 | | a/b/c/d/g/i/m | 483,49 | 8.154,82 | 6.524,82 | 96,62 | 1.630 | Diradamento moderato dal basso. Ove necessario eliminazione dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato deperimento anche del piano dominante | 19,98 |
| 2032-2035 | A | 272 | 24,79 | 24,77 | 10-30 | | 24,79 | | a/b/c/d/g/i/m | 605,70 | 15.004,61 | 10.844,61 | 167,95 | 4.160 | Taglio secondario differenziato secondo l'insediamento della rinnovazione. In alcuni piccoli tratti, in presenza di novellame già insediato, si potrà procedere con lo sgombero. In altri, dove non si è intervenuti con il taglio precedente, taglio di rinnovazione che asporti non più del 50% del numero degli alberi scelti tra quelli di minori dimensioni. | 27,73 |
| 2032-2035 | A | 279 | 11,41 | 11,41 | 130-150 | 2,28 | 9,13 | | a/b/c/d/g/i/m | 706,57 | 8.059,76 | 6.349,76 | 149,87 | 1.710 | Taglio di sementazione nei tratti di fustaia adulta e matura, con l'asportazione di circa il 50% del numero degli alberi scelti tra quelli di dimensioni minori. In alcuni tratti, dove l'intervento novellame è già insediato, potrà assumere il carattere di un taglio secondario. | 21,21 |
| 2032-2035 | A | 288b | 21,68 | 21,57 | 130-150 | | 21,68 | | a/b/c/d/g/i/m | 787,00 | 16.976,21 | 12.646,21 | 200,74 | 4.330 | Taglio di sementazione che asporti il 30% del volume totale per circa un 50% del numero degli alberi. Andranno eliminati gli alberi di minori dimensioni, lasciando a disseminare quelli più grandi. Andranno rilasciati alcuni esemplari di ontano e tutti quelli di acero di Lobel, con l'eccezione di quelli dalla chioma compromessa. | 25,51 |
| 2032-2035 | A | 294 | 27,74 | 24,72 | | | 27,74 | 157,48 | a/b/c/d/g/i/m | 642,07 | 17.801,05 | 11.401,05 | 258,90 | 6.400 | Taglio secondario. | 40,32 |
| **TOTALI** | | | **1.303,25** | **1.286,63** | | | | | | | **841.661,01** | **650.291,01** | | **191.370** | | |

## RIEPILOGO GENERALE DEL PIANO DEI TAGLI/INTERVENTI

**Art .108 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno di intervento | Classe economica (Compresa) | Particella forestale | | | | Area protetta - zonizzazione | | | *Vincoli | Provvigione | | | Ripresa | | Descrizione Intervento | Saggio di Utilizzazione - % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A | B | C | | | | | | | | |
| | | n° | Superficie totale - Ha | Superficie utile boscata - Ha | Età al taglio | Ha | Ha | Ha | | Provvigione reale unitaria - mc | Provvigione reale totale - mc | Provvigione reale totale post intervento - mc | Ripresa reale unitaria - mc | Ripresa reale totale - mc | | |
| 2026-2028 | C | 17 | 14,66 | 13,88 | | | 14,66 | | a/b/c/d/g/i/m | 851,45 | 11.823 | 9.463 | 170 | 2.360 | Moderato diradamento dal basso a carico dei soggetti del piano dominato e dei peggiori del piano dominante. | 19,96 |
| 2026-2028 | C | 24 | 8,75 | 8,68 | | | 8,75 | | a/b/c/d/g/i/m | 482,35 | 4.186 | 3.356 | 96 | 830 | Moderato diradamento dal basso a carico dei soggetti del piano dominato e dei peggiori del piano dominante. Nel diradamento andranno favorite specie diverse dal faggio, come l'acero opalo, l'ontano napoletano e il cerro. | 19,83 |
| 2026-2028 | C | 53 | 6,87 | 6,61 | | | 6,87 | | a/b/c/d/g/i/m | 617,33 | 4.083 | 3.453 | 95 | 630 | Debole diradamento dal basso che elimina i soggetti peggiori e quelli sovrannumerari, soprattutto se di origine agamica. | 15,43 |
| 2026-2028 | C | 68 | 8,44 | 6,16 | | | 8,44 | | a/b/c/d/g/i/m | 176,67 | 1.178 | 978 | 32 | 200 | Diradamento della fustaia transitoria a prevalenza di carpino nero; l'intervento dovrà incidere soprattutto sui polloni di carpino nero, favorendo la roverella, l'acero opalo, il cerro e l'ontano napoletano. | 18,38 |
| 2026-2028 | C | 70 | 33,18 | 23,39 | | | 27,19 | 5,99 | a/b/c/d/g/i/m | 634,16 | 14.831 | 12.591 | 96 | 2.240 | Diradamento da moderato a forte delle conifere per favorire l'insediamento e la progressiva affermazione delle latifoglie. | 15,10 |
| 2026-2028 | C | 72 | 17,41 | 11,71 | | | 13,63 | 3,78 | a/b/c/d/g/i/m | 396,38 | 4.642 | 3.972 | 57 | 670 | Diradamento da moderato a forte delle conifere per favorire l'insediamento e la progressiva affermazione delle latifoglie. | 14,43 |
| 2026-2028 | C | 73 | 11,99 | 7,46 | | | 11,99 | | a/b/c/d/g/i/m | 232,57 | 1.742 | 1.452 | 39 | 290 | Diradamento moderato dal basso. Selettivo a carico delle conifere. | 16,72 |
| 2026-2028 | C | 78 | 21,15 | 13,61 | | | 3,62 | 17,53 | a/b/c/d/g/i/m | 501,76 | 6.839 | 5.609 | 90 | 1.230 | Diradamento moderato dal basso, a scapito soprattutto del pino nero; andranno favorite le latifoglie e la douglasia. | 18,01 |
| 2026-2028 | C | 8 | 7,38 | 7,27 | | | 7,38 | | a/b/c/d/g/i/m | 605,89 | 4.405 | 3.525 | 121 | 880 | Moderato diradamento dal basso a carico dei soggetti del piano dominato e dei peggiori del piano dominante. | 19,98 |
| 2029-2031 | C | 116 | 5,06 | 5,04 | | | 5,06 | | a/b/c/d/g/i/m | 386,95 | 1.949 | 1.609 | 67 | 340 | Diradamento moderato dal basso. | 17,44 |
| 2029-2031 | C | 29a | 8,29 | 7,57 | | | 8,29 | | a/b/c/d/g/i/m | 640,55 | 4.850 | 3.980 | 115 | 870 | Debole diradamento dal basso, più lieve nelle aree di fustaia matura e più intenso nelle aree di fustaia e perticaia. | 17,94 |
| 2029-2031 | C | 31 | 17,68 | 17,41 | | | 17,68 | | a/b/c/d/g/i/m | 385,25 | 6.708 | 5.628 | 62 | 1.080 | Diradamento selettivo che colpisce soprattutto le conifere. Intervento di grado debole nelle aree con faggio e ontano napoletano, cercando di conservare entrambe le specie, in particolare l'acero montano. | 16,10 |
| 2029-2031 | C | 41 | 9,26 | 8,93 | | | 9,26 | | a/b/c/d/g/i/m | 573,02 | 5.116 | 4.286 | 93 | 830 | Moderato diradamento dal basso a carico dei soggetti del piano dominato e dei peggiori del piano dominante. Nel diradamento andranno favorite specie diverse dal faggio, come l'acero opalo, l'ontano napoletano e il cerro. | 16,22 |
| 2029-2031 | C | 44a | 7,99 | 7,70 | | | 7,99 | | a/b/c/d/g/i/m | 658,45 | 5.071 | 4.201 | 113 | 870 | Moderato diradamento dal basso a carico dei soggetti del piano dominato e dei peggiori del piano dominante, soprattutto se di origine agamica. | 17,16 |
| 2029-2031 | C | 45a | 19,12 | 18,68 | | | 19,12 | | a/b/c/d/g/i/m | 536,08 | 10.012 | 8.342 | 89 | 1.670 | Debole diradamento dal basso, soprattutto nelle aree di fustaia matura; più intenso nelle aree di fustaia adulta e perticaia. Eliminazione del pino silvestre. | 16,68 |
| 2029-2031 | C | 46 | 16,25 | 15,14 | | | 16,25 | | a/b/c/d/g/i/m | 465,43 | 7.046 | 5.836 | 80 | 1.210 | Debole diradamento dal basso, soprattutto nelle aree di fustaia matura; diradamento selettivo anche piuttosto intenso a carico dei pini, per liberare le latifoglie. | 17,17 |
| 2029-2031 | C | 47 | 4,99 | 4,94 | | | 4,99 | | a/b/c/d/g/i/m | 491,81 | 2.430 | 1.990 | 89 | 440 | Diradamento selettivo a carico del pino nero per liberare le latifoglie e favorirne l'affermazione. Debole diradamento nelle aree di faggio. Salvaguardia del castagno e dell'ontano napoletano. | 18,11 |
| 2029-2031 | C | 62 | 12,88 | 10,43 | | | 12,88 | | a/b/c/d/g/i/m | 458,72 | 4.783 | 3.983 | 77 | 800 | Diradamento moderato dal basso per regolarizzare la densità, selettivo a carico del pino nero per liberare le latifoglie e favorirne l'affermazione. | 16,72 |

# RIEPILOGO GENERALE DEL PIANO DEI TAGLI/INTERVENTI

**Art .108 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno di intervento | Classe economica (Compresa) | Particella forestale | | | | Area protetta - zonizzazione | | | *Vincoli | Provvigione | | | Ripresa | | Descrizione Intervento | Saggio di Utilizzazione - % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A | B | C | | | | | | | | |
| | | n° | Superficie totale - Ha | Superficie utile boscata - Ha | Età al taglio | Ha | Ha | Ha | | Provvigione reale unitaria - mc | Provvigione reale totale - mc | Provvigione reale totale post intervento - mc | Ripresa reale unitaria - mc | Ripresa reale totale - mc | | |
| 2029-2031 | C | 85 | 10,45 | 9,81 | | | 10,45 | | a/b/c/d/g/i/m | 410,65 | 4.027 | 3.357 | 68 | 670 | Diradamento da moderato a forte nei gruppi di conifere per favorire l'insediamento e la progressiva affermazione delle latifoglie. Diradamento moderato dal basso nelle latifoglie, salvaguardando le specie associate al faggio. | 16,64 |
| 2032-2035 | C | 100 | 14,02 | 13,40 | | | 14,02 | | a/b/c/d/g/i/m | 485,49 | 6.504 | 5.484 | 76 | 1.020 | Diradamento moderato dal basso nelle latifoglie, salvaguardando le specie associate al faggio. Diradamento da moderato a forte nei gruppi di conifere per favorire l'insediamento e la progressiva affermazione delle latifoglie. | 15,68 |
| 2032-2035 | C | 101 | 17,58 | 16,29 | | | 17,58 | | a/b/c/d/g/i/m | 522,12 | 8.504 | 7.214 | 79 | 1.290 | Diradamento moderato dal basso nelle latifoglie, salvaguardando le specie associate al faggio. Diradamento da moderato a forte nei gruppi di conifere per favorire l'insediamento e la progressiva affermazione delle latifoglie. | 15,17 |
| 2032-2035 | C | 102 | 11,66 | 10,68 | | | 11,66 | | a/b/c/d/g/i/m | 563,96 | 6.025 | 4.945 | 101 | 1.080 | Diradamento moderato dal basso nelle latifoglie, salvaguardando le specie associate al faggio. Diradamento da moderato a forte nei gruppi di conifere per favorire l'insediamento e la progressiva affermazione delle latifoglie. | 17,93 |
| 2032-2035 | C | 103 | 14,73 | 14,72 | | | 14,73 | | a/b/c/d/g/i/m | 462,78 | 6.814 | 5.594 | 83 | 1.220 | Diradamento moderato dal basso dell'ontano e delle altre latifoglie, salvaguardando le specie associate al faggio. Diradamento da moderato a forte nei gruppi di conifere per favorire l'insediamento e la progressiva affermazione delle latifoglie. | 17,91 |
| 2032-2035 | C | 104 | 5,17 | 5,14 | | | 5,17 | | a/b/c/d/g/i/m | 484,16 | 2.486 | 2.036 | 88 | 450 | Diradamento moderato dal basso dell'ontano e delle altre latifoglie, salvaguardando le specie associate al faggio. Diradamento da moderato a forte nei gruppi di conifere per favorire l'insediamento e la progressiva affermazione delle latifoglie. | 18,10 |
| 2032-2035 | C | 105 | 13,94 | 13,10 | | | 13,94 | | a/b/c/d/g/i/m | 611,77 | 8.013 | 6.683 | 102 | 1.330 | Diradamento moderato dal basso dell'ontano e delle altre latifoglie, salvaguardando le specie associate al faggio. Diradamento da moderato a forte nei gruppi di conifere per favorire l'insediamento e la progressiva affermazione delle latifoglie. | 16,60 |
| 2032-2035 | C | 106 | 3,04 | 3,04 | | | 3,04 | | a/b/c/d/g/i/m | 912,89 | 2.772 | 2.272 | 165 | 500 | Diradamento moderato dal basso. | 18,04 |
| 2032-2035 | C | 121 | 9,15 | 9,14 | | | 9,15 | | a/b/c/d/g/i/m | 574,43 | 5.248 | 4.308 | 103 | 940 | Diradamento moderato dal basso. | 17,91 |
| 2032-2035 | C | 136 | 9,47 | 9,46 | | | 9,47 | | a/b/c/d/g/i/m | 533,97 | 5.051 | 4.171 | 93 | 880 | Diradamento moderato dal basso dell'ontano e delle altre latifoglie, salvaguardando le specie associate al faggio. Diradamento da moderato a forte nei gruppi di conifere per favorire l'insediamento e la progressiva affermazione delle latifoglie. | 17,42 |
| 2032-2035 | C | 34 | 5,24 | 5,20 | | | 5,24 | | a/b/c/d/g/i/m | 338,20 | 1.759 | 1.439 | 62 | 320 | Debole diradamento dal basso che elimina i soggetti peggiori e quelli sovrannumerari. L'intervento sul pino nero potrà essere di grado forte o moderato per favorire l'affermazione del faggio o di altre latifoglie. | 18,19 |
| 2032-2035 | C | 48 | 9,42 | 8,75 | | | 9,42 | | a/b/c/d/g/i/m | 661,12 | 5.787 | 4.747 | 119 | 1.040 | Diradamento selettivo a carico del pino nero per liberare le latifoglie e favorirne l'affermazione. | 17,97 |
| 2032-2035 | C | 64 | 8,25 | 8,12 | | | 8,25 | | a/b/c/d/g/i/m | 460,81 | 3.740 | 3.110 | 78 | 630 | Diradamento selettivo a carico del pino nero per liberare le latifoglie e favorirne l'affermazione. Diradamento moderato dal basso sul resto della superficie dove prevalgono le latifoglie. | 16,84 |
| 2032-2035 | C | 65 | 8,08 | 7,94 | | | 8,08 | | a/b/c/d/g/i/m | 469,18 | 3.724 | 3.064 | 83 | 660 | Diradamento selettivo a carico del pino nero per liberare le latifoglie e favorirne l'affermazione. Diradamento moderato dal basso sul resto della superficie dove prevalgono le latifoglie. | 17,72 |
| 2032-2035 | C | 86 | 8,36 | 8,32 | | | 8,36 | | a/b/c/d/g/i/m | 697,92 | 5.806 | 4.756 | 126 | 1.050 | Diradamento moderato dal basso. Selettivo a carico delle conifere. | 18,08 |
| 2032-2035 | C | 87 | 9,30 | 9,18 | | | 9,30 | | a/b/c/d/g/i/m | 583,21 | 5.356 | 4.426 | 101 | 930 | Diradamento selettivo a carico del pino nero per liberare le latifoglie e favorirne l'affermazione. Diradamento moderato dal basso sul resto della superficie dove prevalgono le latifoglie. | 17,36 |

# RIEPILOGO GENERALE DEL PIANO DEI TAGLI/INTERVENTI

**Art .108 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno di intervento | Classe economica (Compresa) | Particella forestale | | | | Area protetta - zonizzazione | | | *Vincoli | Provvigione | | | Ripresa | | Descrizione Intervento | Saggio di Utilizzazione - % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A | B | C | | | | | | | | |
| | | n° | Superficie totale - Ha | Superficie utile boscata - Ha | Età al taglio | Ha | Ha | Ha | | Provvigione reale unitaria - mc | Provvigione reale totale - mc | Provvigione reale totale post intervento - mc | Ripresa reale unitaria - mc | Ripresa reale totale - mc | | |
| 2032-2035 | **C** | **88** | 3,12 | 3,00 | | | 3,12 | | a/b/c/d/g/i/m | 711,38 | 2.133 | 1.753 | 127 | 380 | Diradamento moderato dal basso nelle latifoglie, salvaguardando le specie associate al faggio. Diradamento da moderato a forte nei gruppi di conifere per favorire l'insediamento e la progressiva affermazione delle latifoglie. | 17,82 |
| **TOTALI** | | | **392,33** | **349,87** | | | | | | | **185.442** | **153.612** | | **31.830** | | |
| 2026-2028 | **FD** | **113a** | 7,06 | 7,06 | | | 2,98 | 4,08 | a/b/c/d/g/i/m | 425,22 | 3.002 | 2.331 | 95,10 | 671 | Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 4-6 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere selezionate preferibilmente in tratti di fustaia matura. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti | 22,37 |
| 2026-2028 | **FD** | **205a** | 22,40 | 22,40 | 90-110 | | 21,55 | 0,85 | a/b/c/d/g/i/m | 595,93 | 13.349 | 10.458 | 129,06 | 2.891 | Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 10-12 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere distribuite uniformemente nella particella. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | 21,66 |
| 2026-2028 | **FD** | **207a** | 23,11 | 23,11 | 130-150 | | | 23,11 | a/b/c/d/g/i/m | 759,74 | 17.558 | 13.627 | 170,10 | 3.931 | Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 16-18 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere selezionate preferibilmente nei tratti di fustaia matura, con almeno 2 gruppi situati nelle zone di fustaia a monte. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | 22,39 |
| 2026-2028 | **FD** | **206a** | 34,63 | 34,63 | | | 2,21 | 32,42 | a/b/c/d/g/i/m | 589,57 | 20.417 | 16.024 | 126,86 | 4.393 | Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 14-18 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere selezionate preferibilmente nei tratti di fustaia matura, con almeno 4 gruppi situati nelle zone di fustaia a monte. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | 21,52 |

# RIEPILOGO GENERALE DEL PIANO DEI TAGLI/INTERVENTI

**Art .108 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno di intervento | Classe economica (Compresa) | Particella forestale | | | | Area protetta - zonizzazione | | | *Vincoli | Provvigione | | | Ripresa | | Descrizione Intervento | Saggio di Utilizzazione - % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A | B | C | | | | | | | | |
| | | n° | Superficie totale - Ha | Superficie utile boscata - Ha | Età al taglio | Ha | Ha | Ha | | Provvigione reale unitaria - mc | Provvigione reale totale - mc | Provvigione reale totale post intervento - mc | Ripresa reale unitaria - mc | Ripresa reale totale - mc | | |
| 2026-2028 | FD | **206c** | 27,61 | 24,34 | | | 27,61 | | a/b/c/d/g/i/m | 590,94 | 14.383 | 11.591 | 114,70 | 2.792 | Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 11-14 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere selezionate preferibilmente nei tratti di fustaia matura, con almeno 2 gruppi situati nelle zone di fustaia a monte. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | 19,41 |
| 2026-2028 | FD | **206b** | 24,86 | 24,86 | 130-150 | | 24,86 | | a/b/c/d/g/i/m | 754,63 | 18.760 | 14.556 | 169,11 | 4.204 | Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 18-20 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere distribuite uniformemente nella particella. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | 22,41 |
| 2029-2031 | FD | **112** | 13,77 | 13,77 | | | 1,55 | 12,22 | a/b/c/d/g/i/m | 487,69 | 6.716 | 5.203 | 109,86 | 1.513 | Diradamento della pineta per favorire l'affermazione e l'insediamento del faggio. Il taglio potrà essere piuttosto intenso e assumere anche il carattere di un taglio di sgombero laddove il novellame è sufficientemente abbondante e affermato da garantire la perpetuazione del bosco. Nella faggeta, si eseguirà un taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 2-3 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere reperite soprattutto nelle zone di fustaia matura situate nel settore sud della particella. Si eseguirà inoltre un diradamento moderato dal basso nel resto della superficie interessata dal faggio, con salvaguardia degli alberi migliori per dimensioni e portamento nella zona adiacente all'ex caserma. | 22,53 |
| 2029-2031 | FD | **171** | 18,14 | 18,14 | | | 16,33 | 1,81 | a,g,l | 751,25 | 13.628 | 13.628 | 168,49 | 3.056 | Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 12 -14 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere distribuite uniformemente nella particella. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | 22,43 |

# RIEPILOGO GENERALE DEL PIANO DEI TAGLI/INTERVENTI

**Art .108 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno di intervento | Classe economica (Compresa) | Particella forestale | | | | Area protetta - zonizzazione | | | *Vincoli | Provvigione | | | Ripresa | | Descrizione Intervento | Saggio di Utilizzazione - % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A | B | C | | | | | | | | |
| | | n° | Superficie totale - Ha | Superficie utile boscata - Ha | Età al taglio | Ha | Ha | Ha | | Provvigione reale unitaria - mc | Provvigione reale totale - mc | Provvigione reale totale post intervento - mc | Ripresa reale unitaria - mc | Ripresa reale totale - mc | | |
| 2029-2031 | **FD** | **131** | 13,65 | 13,65 | | | 13,51 | 0,14 | a/b/c/d/g/i/m | 423,44 | 5.780 | 4.503 | 93,55 | 1.277 | Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 13-15 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere distribuite uniformemente nella particella. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | 22,09 |
| 2032-2035 | **FD** | **207b** | 22,95 | 22,95 | 135-155 | | 0,13 | 22,82 | a/b/c/d/g/i/m | 691,02 | 15.859 | 12.313 | 154,50 | 3.546 | Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 14-16 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere selezionate preferibilmente nei tratti di fustaia matura, con almeno 2 gruppi situati nelle zone di fustaia a monte. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | 22,36 |
| 2032-2035 | **FD** | **195** | 23,44 | 23,44 | | | 17,55 | 5,89 | a/b/c/d/g/i/m | 656,86 | 15.397 | 11.928 | 147,98 | 3.469 | Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 16-18 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere distribuite uniformemente nella particella. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | 22,53 |
| 2032-2035 | **FD** | **226** | 8,69 | 8,45 | 75-95 | | 0,38 | 8,31 | a/b/c/d/g/i/m | 636,59 | 5.379 | 4.891 | 57,73 | 488 | Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 3-4 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere selezionate nei tratti di fustaia adulta e matura. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | 9,07 |
| 2032-2035 | **FD** | **227** | 11,15 | 11,15 | 95-115 | | 0,17 | 10,98 | a/b/c/d/g/i/m | 574,26 | 6.403 | 5.012 | 124,79 | 1.391 | Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 4-5 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere selezionate nei tratti di fustaia adulta e matura. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | 21,73 |

## RIEPILOGO GENERALE DEL PIANO DEI TAGLI/INTERVENTI

**Art .108 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno di intervento | Classe economica (Compresa) | Particella forestale | | | | Area protetta - zonizzazione | | | *Vincoli | Provvigione | | | Ripresa | | Descrizione Intervento | Saggio di Utilizzazione - % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A | B | C | | | | | | | | |
| | | n° | Superficie totale - Ha | Superficie utile boscata - Ha | Età al taglio | Ha | Ha | Ha | | Provvigione reale unitaria - mc | Provvigione reale totale - mc | Provvigione reale totale post intervento - mc | Ripresa reale unitaria - mc | Ripresa reale totale - mc | | |
| 2032-2035 | **FD** | **148** | 25,72 | 25,72 | | | 15,08 | 10,64 | a/b/c/d/g/i/m | 629,58 | 16.193 | 12.595 | 139,88 | 3.598 | Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 17-19 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere distribuite uniformemente nella particella, includendo anche i tratti di fustaia giovane situati nella zona alta della particella. Per il resto dellaparticella non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | 22,22 |
| 2032-2035 | **FD** | **210** | 13,91 | 13,91 | | 7,82 | 6,09 | | a/b/c/d/g/i/m | 563,48 | 7.838 | 6.165 | 120,26 | 1.673 | Taglio di sementazione a gruppi con dimensioni comprese tra 2.000 e 4.000 m², per un numero complessivo di 4-5 gruppi distanziati tra loro di 50-80 metri. Le aree destinate alla rinnovazione dovranno essere distribuite uniformemente nella particella. Per il resto della superficie non interessata dal taglio di sementazione, si eseguirà un diradamento dal basso, favorendo la rimozione degli individui meno vigorosi per promuovere la crescita delle piante dominanti. | 21,34 |
| **TOTALI** | | | **291,09** | **287,58** | | | | | | | **180.661** | **144.824** | | **38.893** | | |
| **2026-2035** | **PASCOLI** | **27b** | 7,44 | | | | 7,44 | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | Erpicatura e concimazione con concime complesso ternario 8-20-24 (6 q/ha). L'operazione di concimazione deve essere ripetuta ad anni alterni, mentre l'erpicatura va eseguita ogni quattro anni.<br>Contenimento della felce aquilina da effettuarsi somministrando, contemporaneamente alla concimazione con concime 8-20-24, calce idrata nella quantità di 20 q/ha. Le superfici trattate devono essere sottoposte al taglio delle felci per tre volte durante la stagione vegetativa. Il taglio deve essere eseguito quando la maggior parte delle foglie è srotolata per metà.<br>Decespugliamento meccanico seguito dalla temporanea concentrazione dei carichi di bestiame. | |
| | **PASCOLI** | **29b** | 6,55 | | | | 6,55 | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | Erpicatura e concimazione con concime complesso ternario 8-20-24 (6 q/ha). L'operazione di concimazione deve essere ripetuta ad anni alterni, mentre l'erpicatura va eseguita ogni quattro anni.<br>Sfalcio delle spinose nel momento che precede la fioritura. | |

## RIEPILOGO GENERALE DEL PIANO DEI TAGLI/INTERVENTI

**Art .108 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno di intervento | Classe economica (Compresa) | Particella forestale | | | | Area protetta - zonizzazione | | | *Vincoli | Provvigione | | | Ripresa | | Descrizione Intervento | Saggio di Utilizzazione - % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A | B | C | | | | | | | | |
| | | n° | Superficie totale - Ha | Superficie utile boscata - Ha | Età al taglio | Ha | Ha | Ha | | Provvigione reale unitaria - mc | Provvigione reale totale - mc | Provvigione reale totale post intervento - mc | Ripresa reale unitaria - mc | Ripresa reale totale - mc | | |
| | **PASCOLI** | **32b** | 0,94 | | | | 0,94 | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | Erpicatura e concimazione con concime complesso ternario 8-20-24 (6 q/ha). L'operazione di concimazione deve essere ripetuta ad anni alterni, mentre l'erpicatura va eseguita ogni quattro anni.<br>Sfalcio delle spinose nel momento che precede la fioritura. | |
| | **PASCOLI** | **45b** | 2,44 | | | | 2,44 | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | Erpicatura e concimazione con concime complesso ternario 8-20-24 (6 q/ha). L'operazione di concimazione deve essere ripetuta ad anni alterni, mentre l'erpicatura va eseguita ogni quattro anni.<br>Sfalcio delle spinose nel momento che precede la fioritura. | |
| **2026-2035** | **PASCOLI** | **47b** | 8,30 | | | | 8,30 | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | Erpicatura e concimazione con concime complesso ternario 8-20-24 (6 q/ha). L'operazione di concimazione deve essere ripetuta ad anni alterni, mentre l'erpicatura va eseguita ogni quattro anni.<br>Decespugliamento meccanico della ginestra, seguito dalla temporanea concentrazione dei carichi di bestiame.<br>Sfalcio delle spinose nel momento che precede la fioritura. | |
| | **PASCOLI** | **79b** | 3,38 | | | | 3,38 | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | Erpicatura e concimazione con concime complesso ternario 8-20-24 (6 q/ha). L'operazione di concimazione deve essere ripetuta ad anni alterni, mentre l'erpicatura va eseguita ogni quattro anni.<br>Sfalcio delle spinose nel momento che precede la fioritura. | |
| | **PASCOLI** | **83b** | 2,98 | | | | 2,98 | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | Erpicatura e concimazione con concime complesso ternario 8-20-24 (6 q/ha). L'operazione di concimazione deve essere ripetuta ad anni alterni, mentre l'erpicatura va eseguita ogni quattro anni.<br>Sfalcio delle spinose nel momento che precede la fioritura. | |
| | **PASCOLI** | **84b** | 1,28 | | | | 1,28 | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | Erpicatura e concimazione con concime complesso ternario 8-20-24 (6 q/ha). L'operazione di concimazione deve essere ripetuta ad anni alterni, mentre l'erpicatura va eseguita ogni quattro anni.<br>Contenimento della felce aquilina da effettuarsi somministrando, contemporaneamente alla concimazione con concime 8-20-24, calce idrata nella quantità di 20 q/ha. Le superfici trattate devono essere sottoposte al taglio delle felci per tre volte durante la stagione vegetativa. Il taglio deve essere eseguito quando la maggior parte delle foglie è srotolata per metà.<br>Decespugliamento meccanico seguito dalla temporanea concentrazione dei carichi di bestiame. | |

## RIEPILOGO GENERALE DEL PIANO DEI TAGLI/INTERVENTI

**Art .108 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno di intervento | Classe economica (Compresa) | Particella forestale | | | | Area protetta - zonizzazione | | | *Vincoli | Provvigione | | | Ripresa | | Descrizione Intervento | Saggio di Utilizzazione - % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A | B | C | | | | | | | | |
| | | n° | Superficie totale - Ha | Superficie utile boscata - Ha | Età al taglio | Ha | Ha | Ha | | Provvigione reale unitaria - mc | Provvigione reale totale - mc | Provvigione reale totale post intervento - mc | Ripresa reale unitaria - mc | Ripresa reale totale - mc | | |
| | **PASCOLI** | **86b** | 8,15 | | | | 8,15 | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | Erpicatura e concimazione con concime complesso ternario 8-20-24 (6 q/ha). L'operazione di concimazione deve essere ripetuta ad anni alterni, mentre l'erpicatura va eseguita ogni quattro anni.<br>Sfalcio delle spinose nel momento che precede la fioritura. | |
| **2026-2035** | **PASCOLI** | **137b** | 3,89 | | | | 3,89 | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | Erpicatura e concimazione con concime complesso ternario 8-20-24 (6 q/ha). L'operazione di concimazione deve essere ripetuta ad anni alterni, mentre l'erpicatura va eseguita ogni quattro anni. | |
| | **PASCOLI** | **147a** | 167,41 | | | | 131,80 | 35,61 | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | Erpicatura e concimazione con concime complesso ternario 8-20-24 (6 q/ha). L'operazione di concimazione deve essere ripetuta ad anni alterni, mentre l'erpicatura va eseguita ogni quattro anni.<br>Contenimento della felce aquilina da effettuarsi somministrando, contemporaneamente alla concimazione con concime 8-20-24, calce idrata nella quantità di 20 q/ha. Le superfici trattate devono essere sottoposte al taglio delle felci per tre volte durante la stagione vegetativa. Il taglio deve essere eseguito quando la maggior parte delle foglie è srotolata per metà.<br>Sfalcio delle spinose nel momento che precede la fioritura.<br>Risanamento idrico delle superfici soggette a ristagni mediante l'apertura di canalette superficiali. | |
| | **PASCOLI** | **175** | 17,92 | | | | 4,15 | 13,77 | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | Erpicatura e concimazione con concime complesso ternario 8-20-24 (6 q/ha). L'operazione di concimazione deve essere ripetuta ad anni alterni, mentre l'erpicatura va eseguita ogni quattro anni.<br>Decespugliamento meccanico della ginestra, seguito dalla temporanea concentrazione dei carichi di bestiame.<br>Sfalcio delle spinose nel momento che precede la fioritura. | |
| | **PASCOLI** | **232b** | 15,20 | | | | 15,20 | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | Erpicatura e concimazione con concime complesso ternario 8-20-24 (6 q/ha). L'operazione di concimazione deve essere ripetuta ad anni alterni, mentre l'erpicatura va eseguita ogni quattro anni.<br>Sfalcio delle spinose nel momento che precede la fioritura. | |
| | **PASCOLI** | **249** | 2,71 | | | | 2,71 | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | Erpicatura e concimazione con concime complesso ternario 8-20-24 (6 q/ha). L'operazione di concimazione deve essere ripetuta ad anni alterni, mentre l'erpicatura va eseguita ogni quattro anni.<br>Sfalcio delle spinose nel momento che precede la fioritura. | |

## RIEPILOGO GENERALE DEL PIANO DEI TAGLI/INTERVENTI

**Art .108 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno di intervento | Classe economica (Compresa) | Particella forestale | | | | Area protetta - zonizzazione | | | *Vincoli | Provvigione | | | Ripresa | | Descrizione Intervento | Saggio di Utilizzazione - % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A | B | C | | | | | | | | |
| | | n° | Superficie totale - Ha | Superficie utile boscata - Ha | Età al taglio | Ha | Ha | Ha | | Provvigione reale unitaria - mc | Provvigione reale totale - mc | Provvigione reale totale post intervento - mc | Ripresa reale unitaria - mc | Ripresa reale totale - mc | | |
| 2026-2035 | PASCOLI | 255c | 0,39 | | | | 0,39 | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | Erpicatura e concimazione con concime complesso ternario 8-20-24 (6 q/ha). L'operazione di concimazione deve essere ripetuta ad anni alterni, mentre l'erpicatura va eseguita ogni quattro anni.<br>Sfalcio delle spinose nel momento che precede la fioritura. | |
| | PASCOLI | 260b | 3,07 | | | | 3,07 | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | Erpicatura e concimazione con concime complesso ternario 8-20-24 (6 q/ha). L'operazione di concimazione deve essere ripetuta ad anni alterni, mentre l'erpicatura va eseguita ogni quattro anni.<br>Sfalcio delle spinose nel momento che precede la fioritura. | |
| | PASCOLI | 273b | 1,22 | | | | 1,22 | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | Erpicatura e concimazione con concime complesso ternario 8-20-24 (6 q/ha). L'operazione di concimazione deve essere ripetuta ad anni alterni, mentre l'erpicatura va eseguita ogni quattro anni.<br>Contenimento della felce aquilina da effettuarsi somministrando, contemporaneamente alla concimazione con concime 8-20-24, calce idrata nella quantità di 20 q/ha. Le superfici trattate devono essere sottoposte al taglio delle felci per tre volte durante la stagione vegetativa. Il taglio deve essere eseguito quando la maggior parte delle foglie è srotolata per metà.<br>Decespugliamento meccanico seguito dalla temporanea concentrazione dei carichi di bestiame. | |
| | PASCOLI | 291b | 1,72 | | | | 1,72 | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | Decespugliamento meccanico seguito dalla temporanea concentrazione dei carichi di bestiame. | |
| | PASCOLI | 292b | 4,56 | | | | 4,56 | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | Erpicatura e concimazione con concime complesso ternario 8-20-24 (6 q/ha). L'operazione di concimazione deve essere ripetuta ad anni alterni, mentre l'erpicatura va eseguita ogni quattro anni.<br>Contenimento della felce aquilina da effettuarsi somministrando, contemporaneamente alla concimazione con concime 8-20-24, calce idrata nella quantità di 20 q/ha. Le superfici trattate devono essere sottoposte al taglio delle felci per tre volte durante la stagione vegetativa. Il taglio deve essere eseguito quando la maggior parte delle foglie è srotolata per metà.<br>Decespugliamento meccanico seguito dalla temporanea concentrazione dei carichi di bestiame. | |
| **TOTALI** | | | **259,55** | | | | | | | | | | | | | |

# RIEPILOGO GENERALE DEL PIANO DEI TAGLI/INTERVENTI

**Art .108 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno di intervento | Classe economica (Compresa) | Particella forestale | | | | Area protetta - zonizzazione | | | *Vincoli | Provvigione | | | Ripresa | | Descrizione Intervento | Saggio di Utilizzazione - % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A | B | C | | | | | | | | |
| | | n° | Superficie totale - Ha | Superficie utile boscata - Ha | Età al taglio | Ha | Ha | Ha | | Provvigione reale unitaria - mc | Provvigione reale totale - mc | Provvigione reale totale post intervento - mc | Ripresa reale unitaria - mc | Ripresa reale totale - mc | | |

* = Vincoli:

| | |
|---|---|
| a | Idrogeologico (L. 3267/1923) |
| b | Autorità di Bacino (L. 18 maggio 1989 n. 183 – L. R. n. 8 del 07/02/1994) |
| c | Uso civico (L. 1766/1927 – L. R. 11/1981) |
| d | Bellezze naturali (L. 1497/1939 transitata nel d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004) |
| e | Piani territoriali paesaggistici (ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 29/10/99 n. 490) |
| f | Parco Nazionale (L. 6 dicembre 1991 n. 394) |
| g | Parco Regionale (L. R. 1 settembre 1993 n. 33) |
| h | Riserva, altro (L. 6 dicembre 1991 n. 394) |
| i | Legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 21 novembre 2000, n. 353) |
| l | Conflitti di proprietà e/o di confinazione tra le aree oggetto di pianificazione ed altri Soggetti privati e/o pubblici |
| m | Rete natura 2000 |
| n | Altro - specificare |

# LIBRO ECONOMICO

**Art. 108 e art. 109 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno (o stagione silvana) di intervento | Particella forestale | Riferimenti catastali | | Provvedimenti autorizzativi* | | | | | Ripresa prevista | | Ripresa effettuata (mc - kg) | | | Comunicazione di taglio | | Impresa Forestale (Nominativo) | Contratto (Data) | Consegna (Data) | Certificato di regolare esecuzione (Data) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fg. | n. | E.D. | Parco - Riserva | A. di B. | V.I. | Altro | mc | Ha | Tronchi mc | Tronchetti mc | Legna da ardere Kg | Prot. | Data | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| * = | U.O.D. - Unità Operativa Dirigenziale |
| | A. di B. - Autorità di Bacino |
| | E. D. - Ente Delegato |
| | V. I. - Valutazione d'Incidenza |
| | Altro: per es. autorizzazione paesaggistica |

# LIBRO ECONOMICO

**Art. 108 e art. 109 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno (o stagione silvana) di intervento | Particella forestale | Riferimenti catastali | | Provvedimenti autorizzativi* | | | | | Ripresa prevista | | Ripresa effettuata (mc - kg) | | | Comunicazione di taglio | | Impresa Forestale (Nominativo) | Contratto (Data) | Consegna (Data) | Certificato di regolare esecuzione (Data) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fg. | n. | E.D. | Parco - Riserva | A. di B. | V.I. | Altro | mc | Ha | Tronchi mc | Tronchetti mc | Legna da ardere Kg | Prot. | Data | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| * = | U.O.D. - Unità Operativa Dirigenziale |
| | A. di B. - Autorità di Bacino |
| | E. D. - Ente Delegato |
| | V. I. - Valutazione d'Incidenza |
| | Altro: per es. autorizzazione paesaggistica |

# LIBRO ECONOMICO

**Art. 108 e art. 109 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno (o stagione silvana) di intervento | Particella forestale | Riferimenti catastali | | Provvedimenti autorizzativi* | | | | | Ripresa prevista | | Ripresa effettuata (mc - kg) | | | Comunicazione di taglio | | Impresa Forestale (Nominativo) | Contratto (Data) | Consegna (Data) | Certificato di regolare esecuzione (Data) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fg. | n. | E.D. | Parco - Riserva | A. di B. | V.I. | Altro | mc | Ha | Tronchi mc | Tronchetti mc | Legna da ardere Kg | Prot. | Data | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| * = | U.O.D. - Unità Operativa Dirigenziale |
| | A. di B. - Autorità di Bacino |
| | E. D. - Ente Delegato |
| | V. I. - Valutazione d'Incidenza |
| | Altro: per es. autorizzazione paesaggistica |

# LIBRO ECONOMICO

**Art. 108 e art. 109 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno (o stagione silvana) di intervento | Particella forestale | Riferimenti catastali | | Provvedimenti autorizzativi* | | | | | Ripresa prevista | | Ripresa effettuata (mc - kg) | | | Comunicazione di taglio | | Impresa Forestale (Nominativo) | Contratto (Data) | Consegna (Data) | Certificato di regolare esecuzione (Data) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fg. | n. | E.D. | Parco - Riserva | A. di B. | V.I. | Altro | mc | Ha | Tronchi mc | Tronchetti mc | Legna da ardere Kg | Prot. | Data | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| * = | U.O.D. - Unità Operativa Dirigenziale |
| | A. di B. - Autorità di Bacino |
| | E. D. - Ente Delegato |
| | V. I. - Valutazione d'Incidenza |
| | Altro: per es. autorizzazione paesaggistica |

# LIBRO ECONOMICO

**Art. 108 e art. 109 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno (o stagione silvana) di intervento | Particella forestale | Riferimenti catastali | | Provvedimenti autorizzativi* | | | | | Ripresa prevista | | Ripresa effettuata (mc - kg) | | | Comunicazione di taglio | | Impresa Forestale (Nominativo) | Contratto (Data) | Consegna (Data) | Certificato di regolare esecuzione (Data) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fg. | n. | E.D. | Parco - Riserva | A. di B. | V.I. | Altro | mc | Ha | Tronchi mc | Tronchetti mc | Legna da ardere Kg | Prot. | Data | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| * = | U.O.D. - Unità Operativa Dirigenziale |
| | A. di B. - Autorità di Bacino |
| | E. D. - Ente Delegato |
| | V. I. - Valutazione d'Incidenza |
| | Altro: per es. autorizzazione paesaggistica |

# LIBRO ECONOMICO

**Art. 108 e art. 109 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno (o stagione silvana) di intervento | Particella forestale | Riferimenti catastali | | Provvedimenti autorizzativi* | | | | | Ripresa prevista | | Ripresa effettuata (mc - kg) | | | Comunicazione di taglio | | Impresa Forestale (Nominativo) | Contratto (Data) | Consegna (Data) | Certificato di regolare esecuzione (Data) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fg. | n. | E.D. | Parco - Riserva | A. di B. | V.I. | Altro | mc | Ha | Tronchi mc | Tronchetti mc | Legna da ardere Kg | Prot. | Data | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| * = | U.O.D. - Unità Operativa Dirigenziale |
| | A. di B. - Autorità di Bacino |
| | E. D. - Ente Delegato |
| | V. I. - Valutazione d'Incidenza |
| | Altro: per es. autorizzazione paesaggistica |

# LIBRO ECONOMICO

**Art. 108 e art. 109 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno (o stagione silvana) di intervento | Particella forestale | Riferimenti catastali | | Provvedimenti autorizzativi* | | | | | Ripresa prevista | | Ripresa effettuata (mc - kg) | | | Comunicazione di taglio | | Impresa Forestale (Nominativo) | Contratto (Data) | Consegna (Data) | Certificato di regolare esecuzione (Data) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fg. | n. | E.D. | Parco - Riserva | A. di B. | V.I. | Altro | mc | Ha | Tronchi mc | Tronchetti mc | Legna da ardere Kg | Prot. | Data | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| * = | U.O.D. - Unità Operativa Dirigenziale |
| | A. di B. - Autorità di Bacino |
| | E. D. - Ente Delegato |
| | V. I. - Valutazione d'Incidenza |
| | Altro: per es. autorizzazione paesaggistica |

# LIBRO ECONOMICO

**Art. 108 e art. 109 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno (o stagione silvana) di intervento | Particella forestale | Riferimenti catastali | | Provvedimenti autorizzativi* | | | | | Ripresa prevista | | Ripresa effettuata (mc - kg) | | | Comunicazione di taglio | | Impresa Forestale (Nominativo) | Contratto (Data) | Consegna (Data) | Certificato di regolare esecuzione (Data) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fg. | n. | E.D. | Parco - Riserva | A. di B. | V.I. | Altro | mc | Ha | Tronchi mc | Tronchetti mc | Legna da ardere Kg | Prot. | Data | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| * = | U.O.D. - Unità Operativa Dirigenziale |
| | A. di B. - Autorità di Bacino |
| | E. D. - Ente Delegato |
| | V. I. - Valutazione d'Incidenza |
| | Altro: per es. autorizzazione paesaggistica |

# LIBRO ECONOMICO

**Art. 108 e art. 109 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Anno (o stagione silvana) di intervento | Particella forestale | Riferimenti catastali | | Provvedimenti autorizzativi* | | | | | Ripresa prevista | | Ripresa effettuata (mc - kg) | | | Comunicazione di taglio | | Impresa Forestale (Nominativo) | Contratto (Data) | Consegna (Data) | Certificato di regolare esecuzione (Data) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fg. | n. | E.D. | Parco - Riserva | A. di B. | V.I. | Altro | mc | Ha | Tronchi mc | Tronchetti mc | Legna da ardere Kg | Prot. | Data | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| * = | U.O.D. - Unità Operativa Dirigenziale |
| | A. di B. - Autorità di Bacino |
| | E. D. - Ente Delegato |
| | V. I. - Valutazione d'Incidenza |
| | Altro: per es. autorizzazione paesaggistica |

Comune di Bagnoli Irpino (AV) Prot. n. 0005286 del 16-03-2026 arrivo Cat. 10 Cl. 1

Parco Regionale dei Monti Picentini

Prot. 749 Nusco lì 13 MAR 2026

Al Resp. del Servizio
Gestione patrimonio,
servizi tecnico manutentivi,
edilizia, urbanistica
del Comune di Bagnoli Irpino (AV)
P.E.C.: protocollo.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu

**OGGETTO**: RICHIESTA NULLA OSTA LL.RR. LL.RR. 24/95 e 25/25 e s.m. i. - Piano di Gestione Forestale 2025 – 2034, ambito comunale.
Richiedente: Amm. Comunale – Dott. Filippo Nigro Sindaco protempore.

**Premesso che:**

- parte del territorio del comune Bagnoli Irpino (AV), ricade nell'ambito della perimetrazione del Parco Monti Picentini, definita con D.G.R.n° 1539 /2003;
- il suddetto Comune ha trasmesso ISTANZA, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 408 in data 10.02.2026, ai fini del rilascio del rilascio del nulla osta per la esecuzione dei lavori specificati in oggetto;

**Visto:**

- Le norme di salvaguardia del Parco Regionale dei Monti Picentini BURC speciale del 27 maggio 2004 allegato "5" B;
- il Piano di Gestione Forestale di cui in oggetto;
- La Legge n. 394/1991 - la L.R. n. 24/1995, art. 5 e la L.R. 25/25, art. 21;

Avuto riguardo dell'esito della valutazione di incidenza ambientale

**Considerato che** dalla documentazione trasmessa ed esaminata, **si riscontra la compatibilità con le Norme di Salvaguardia del Parco Regionale dei Monti Picentini.**

Per i motivi di cui in premessa, per quanto di competenza, si concede

**NULLA OSTA**

ai fini delle determinazioni di cui all'art. 21 della L.R. n° 25/25 e s.m.i. ed art. 5 della L.R. n. 24/1995, Piano di Gestione Forestale 2025 – 2034, ambito comunale.
Richiedente: Amm. Comunale – Dott. Filippo Nigro Sindaco protempore.

**Il Resp. Del Procedimento**
*Dott.ssa Maria Rosaria Pasqualina Bardaro*

**Il Responsabile Amministrativo**
*Arch. Dario Dello Buono*

Parco Regionale dei Monti Picentini - Parco

ENTE PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI
Via Delle Stigmatine n. 11 - Palazzo Astrominica – 83051 Nusco (AV) tel. 0827 64413 www.parcoregionalemontipicentini.it
e-mail: info@parcoregionalemontipicentini.it PEC: parcopicentini@pec.it

Parco Regionale Monti Picentini prot. n. 0000749 del 13-03-2026 partenza

# C O M U N E D I B A G N O L I I R P I N O

**C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO**

**N. COD. FISC. 00133870642** **FAX (0827) 603005**
**C.C.P. N.12962833**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 98 DEL 08-04-2026**

Bagnoli Irpino, lì 08-04-2026

**N. 238 Registro Generale del 08-04-2026**

**DETERMINAZIONI SERV EDILIZIA TECN-MANUTEN E PATRIM**

**N. 98 DEL 08-04-2026**

Ufficio: TECNICO

**Oggetto:** PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA relativa al Piano di Gestione Forestale del Comune di Bagnoli Irpino. CUP: B42H20000000002 - Determinazioni - CIG

L'anno **duemilaventisei,** il giorno **otto** del mese di **aprile**,

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO**

adotta la seguente determinazione.

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 21 del 29.12.2025 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del I Settore dell'Area Tecnica "Edilizia privata e pubblica – Gestione patrimonio e Servizi Tecnico/Manutentivi" ed alla stessa sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art.4, co.2, del decreto legislativo n. 165/2001 nonché le competenze assegnate dall'art.107 del decreto legislativo n. 267/2000, decreto legislativo n. 165 / 2001 e dal vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché di ogni altra disposizione normativa o regolamentare eventualmente successiva;

**RICHIAMATE** preliminarmente:

- La Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 09.02.2026 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2026/2028 e dei relativi allegati;
- La Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 09.02.2026 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026 – 2028 e dei relativi allegati;
- la deliberazione di G. C. n. 27 del 25.02.2026, con la quale è stata approvata l'assegnazione ai responsabili degli uffici e dei servizi delle risorse dei capitoli delle entrate e delle uscite da gestire per l'esercizio finanziario 2026;

**ATTESA** la propria competenza circa l'adozione del presente provvedimento;

**PREMESSO:**

- che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- che con D.G.R.C. n. 324 del 19/03/2010, pubblicata sul BURC n. 24 del 29/03/2010, sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";
- che con D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010, pubblicata sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14/07/2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- che con Delibera di G.R. n. 62 del 23/02/2015, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 4 e 5 della L.R. 16/2014, è stato approvato un apposito "Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze di Valutazione di Incidenza" nel quale, tra l'altro, sono individuati i criteri sulla scorta dei quali il competente Ufficio regionale si pronuncia in merito alle richieste di attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza;
- che con la stessa deliberazione è stato disposto che:
  1. le procedure di cui al "Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza" si applicano a tutte le richieste di attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza pervenute dalla Direzione generale per l'Ambiente e l'Ecosistema alla data di emanazione della stessa deliberazione, fatta salva la possibilità di integrare le istanze già avanzate sulla scorta delle disposizioni di cui al citato Disciplinare;
  2. i Comuni in possesso della necessaria qualificazione, ma in assenza dei criteri di cui al Disciplinare non hanno formulato specificata richiesta, possono avanzarla al competente ufficio regionale nei novanta giorni successivi alla pubblicazione;
- che con Delibera di G.R. n. 814 del 04/12/2018, è stato aggiornato il suindicato Disciplinare e sono state approvate le nuove "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania" che sostituiscono integralmente quelle approvate con DGR 167/2015 e tengono conto sia delle disposizioni del Regolamento regionale n. 1/2010 che delle disposizioni della DGR 62 del 23/02/2015 nonché del nuovo "Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza" aggiornato alle disposizioni di cui all'art. 4 della L.R. 26/2018;
- che con Delibera della Giunta Regionale n. 280 del 30/06/2021, Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA, Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ. E AUTORIZ. AMB., U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali, sono state recepite le LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) - DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" ART. 6, PARAGRAFI 3 E 4".
- che con la stessa Delibera della Giunta Regionale sono state aggiornate le "LINEE GUIDA E CRITERI DI INDIRIZZO PER L'EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA IN REGIONE CAMPANIA".
- che le suindicate linee guida stabiliscono, nel caso di siti per i quali il soggetto gestore è un Parco regionale, ove la competenza in materia di VIncA è del Comune e l'ufficio individuato per le istruttorie è lo stesso Parco (es. Parco Regionale dei Picentini), le relative istruttorie si estenderanno anche ai termini del "sentito" di cui all'art. 5, co. 7 del DPR 357/1997, dandone evidenza nelle risultanze istruttorie e nel parere finale;

- che questo Comune ha aderito alla Gestione associata con i comuni aderenti, individuando ufficio Tutela dell'Ambiente dell'Ente Parco dei Monti Picentini, quale soggetto pubblico preposto alla valutazione di incidenza;

**CONSIDERATO:**

- che, con nota trasmessa dal Parco dei Monti Picentini del 13.02.2026, prot. n. 456, acquisita al protocollo dell'Ente in data 16.02.2026, prot. n. 1654, si esprimeva il parere favorevole alla Valutazione di Incidenza, relativa alla pratica n. 20/2026 (**CUP: 02**), presentata in data 03.02.2026 prot. n. 314, dal Sindaco del Comune di Bagnoli Irpino, relativa **al Piano di Gestione Forestale del Comune di Bagnoli Irpino. CUP: B42H20000000002 del Comune di Bagnoli Irpino;**
  - *che con verbale n.02 del 11.02.2026, la Commissione di Valutazione di Incidenza, istituita presso il Parco Regionale dei Monti Picentini, ha espresso parere favorevole alla Valutazione di Incidenza Appropriata con le prescrizioni in esso riportate e precisamente:*
  - *Obbligo del rispetto di tutto quanto indicato nello studio di Valutazione di Incidenza;*
- che il citato parere è espresso anche come Sentito favorevole ai sensi dell'art. 5, co. 7 del DPR n. 357/1997;
- che l'intervento non produrrà incidenza significativa sugli habitat e le specie potenzialmente presenti nei siti Rete Natura 2000 interessati;
- che l'intervento in oggetto interessa le particelle forestali di cui all'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**VISTA** la Determinazione del servizio edilizia tecn-manuten e patrimonio n. 73 del 05.03.2026 - R.G. n. 165 del 05.03.2026 con la quale è stato espresso il **PARERE FAVOREVOLE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA** relativa **al Piano di Gestione Forestale del Comune di Bagnoli Irpino. CUP: B42H20000000002 del Comune di Bagnoli Irpino,** indicando per mero errore la validità di anni 5 invece che di 10 anni dalla data del rilascio;

**RITENUTO** di dover provvedere con annullamento della suddetta determina e alla nuova emissione del provvedimento di Valutazione di Incidenza con l'indicazione corretta di anni 10 di validità;

**VISTO** il D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., la *D.G.R. n. 1216/2001 e ss.mm.ii., la* D.G.R. n. 324/2010 e la D.G.R.C. n. 683/2010;

**D E T E R M I N A**

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

1. **DI ANNULLARE** la Determinazione del servizio edilizia tecn-manuten e patrimonio n. 73 del 05.03.2026 - R.G. n. 165 del 05.03.2026;
2. **DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA** relativa **al Piano di Gestione Forestale del Comune di Bagnoli Irpino. CUP: B42H20000000002 del Comune di Bagnoli Irpino,** presentata in data 03.02.2026 prot. n. 314, dal Sindaco del Comune di Bagnoli Irpino, su conforme parere della Commissione di Valutazione di Incidenza, espresso con verbale *n.02 del 11.02.2026*:
3. **È FATTO OBBLIGO** per il proponente del rispetto delle prescrizioni stabilite dalla Commissione di Valutazione di Incidenza, come innanzi indicate ed espressi con verbale n. 02 del 11.02.2026.

   Il presente provvedimento:
   - ha valenza anche ai termini del "Sentito" di cui all'art. 5, co. 7 del DPR 357/1997;
   - ha validità di 10 anni dalla data del rilascio e viene pubblicato nella sezione del sito web istituzionale di questo Comune appositamente dedicata;
4. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento ai seguenti soggetti per l'adozione degli atti di propria competenza:

   -AL PARCO DEI MONTI PICENTINI;

   -ALLA STAZIONE CARABINIERI FORESTALI;

-ALLA COMUNITA' MONTANA TERMINIO-CERVIALTO"

5. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento a norma di legge.

Il Responsabile del procedimento
F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Donnarumma Caterina

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Lì

IL MESSO COMUNALE
F.to FARESE MARCELLO

---

E' copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Donnarumma Caterina

# RIEPILOGO GENERALE DELLE PARTICELLE FORESTALI

**Art. 108 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Classe economica (Compresa) | Particella forestale | | | | | | Dati catastali | | Area protetta - zonizzazione | | | Aree percorse dal Fuoco | | *Vincoli | Dati Dendrometrici | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Località | n° | Superficie in Ha | | | | Foglio | Particella | A | B | C | Anno | Ha | | Densità | | Pr unitaria mc/Ha | Pr totale mc | ***Pp unitaria mc/Ha | ***Pp totale mc | Incremento medio | Età all'anno di redazione del PGF |
| | | | Totale | Bosco | Pascolo prati radure | Altro | | | Ha | Ha | Ha | | | | A.B. unitaria mq/Ha | ** Soggetti n°/Ha | | | | | | |
| COMPRESA A | Peta di Piscacca | 6 | 16,15 | 16,15 | 0,00 | | 7 | 23-24-26-30p | | 16,15 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 37,51 | 640 | 411,1 | 6.639,82 | | | 4,11 | 90-110 |
| | Piscacca | 7 | 12,96 | 11,39 | 1,57 | | 7 | 22p-30p | | 12,96 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 44,91 | 653 | 504,9 | 5.750,98 | | | 6,31 | 70-90 |
| | Peta di Piscacca | 14 | 14,89 | 14,71 | 0,18 | | 7 | 22p-30p | | 14,89 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 43,70 | 714 | 507,1 | 7.459,36 | | | 5,07 | 90-110 |
| | Piscacca | 15 | 10,71 | 9,52 | 1,19 | | 7 | 22p-30p | | 10,71 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 42,49 | 686 | 455,1 | 4.334,71 | | | 4,55 | 90-110 |
| | Valle del Pero | 60 | 7,22 | 7,22 | 0,00 | | 13 | 15p-16p | | 7,22 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 42,29 | 901 | 454,0 | 3.276,24 | | | 4,54 | 90-110 |
| | Valle Foce di Capo Sele | 79 | 13,63 | 13,51 | 0,12 | | 12 | 1p-48p-176-177 | | 13,21 | 0,42 | | | a/b/c/d/g/i/m | 39,93 | 1534 | 355,2 | 4.799,51 | | | 4,44 | 70-90 |
| | | | | | | | 13 | 9p-11p-70p-71p-72p-73p-74p-75p-76p-77p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle del Pero | 81 | 12,26 | 11,94 | 0,32 | | 13 | 9p-15p-16p-127p | | 12,26 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,03 | 650 | 456,1 | 5.445,39 | | | 4,56 | 90-110 |
| | Colle del Leone | 95a | 17,06 | 17,02 | 0,04 | | 11 | 29p | | 13,04 | 4,01 | | | a/b/c/d/g/i/m | 37,14 | 762 | 420,5 | 7.157,06 | | | 4,20 | 90-110 |
| | | | | | | | 18 | 11p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Felicecchia | 95b | 11,31 | 11,15 | 0,16 | | 18 | 11p | | 11,11 | 0,20 | | | a/b/c/d/g/i/m | 42,13 | 1144 | 423,3 | 4.720,85 | | | 4,23 | 90-110 |
| | Corticella | 96 | 26,62 | 26,42 | 0,20 | | 18 | 8p-11p | | 21,85 | 4,77 | | | a/b/c/d/g/i/m | 48,60 | 1161 | 548,6 | 14.492,60 | | | 5,49 | 90-110 |
| | Valle Grande | 109a | 11,29 | 11,29 | 0,00 | | 18 | 11p | | 9,80 | 1,49 | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,39 | 1323 | 554,3 | 5.755,18 | | | 4,62 | 110-130 |
| | Fossa della Neve | 109b | 10,82 | 10,82 | 0,00 | | 18 | 11p | | 10,75 | 0,07 | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,40 | 1358 | 574,1 | 5.997,30 | | | 4,10 | 130-150 |
| | Fossa della Neve | 110 | 26,99 | 26,56 | 0,43 | | 18 | 11p | | 26,81 | 0,18 | | | a/b/c/d/g/i/m | 44,73 | 1089 | 523,3 | 13.895,83 | | | 4,36 | 110-130 |
| | Scaffa | 111 | 15,84 | 15,60 | 0,24 | | 18 | 11p | | 13,54 | 2,30 | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,67 | 593 | 649,5 | 10.129,42 | | | 5,41 | 110-130 |
| | | | | | | | 19 | 43 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lagarello | 115 | 17,52 | 15,78 | 1,74 | | 20 | 1p-2-12p-17-23-24-25-41-42 | | 17,50 | 0,02 | | | a/b/c/d/g/i/m | 38,67 | 608 | 443,4 | 6.995,86 | | | 4,43 | 90-110 |
| | | | | | | | 25 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lagarello | 117 | 12,32 | 11,99 | 0,33 | | 20 | 12p-13p | | 12,32 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 30,94 | 721 | 340,7 | 4.085,95 | | | 3,41 | 90-110 |
| | Lagarello | 118 | 18,58 | 15,43 | 3,15 | | 20 | 5p-7-12p-29-30-33p | | 18,58 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,55 | 470 | 645,6 | 9.960,98 | | | 7,17 | 70-90 |
| | Raja di Calende | 127 | 11,81 | 11,81 | 0,00 | | 18 | 11p | | 10,37 | 1,44 | | | a/b/c/d/g/i/m | 43,15 | 828 | 550,8 | 6.503,17 | | | 4,59 | 110-130 |
| | Valle Piana | 128 | 12,06 | 11,57 | 0,49 | | 18 | 11p | | 11,41 | 0,65 | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,86 | 1391 | 468,8 | 5.422,42 | | | 5,21 | 70-90 |
| | Teatro | 129 | 12,85 | 12,76 | 0,09 | | 18 | 11p | | 8,16 | 4,69 | | | a/b/c/d/g/i/m | 54,17 | 871 | 687,3 | 8.770,15 | | | 5,29 | 110-130 |
| | | | | | | | 29 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lagarello | 133 | 9,66 | 8,90 | 0,76 | | 20 | 12p-13p | | 9,66 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 40,16 | 498 | 523,5 | 4.659,68 | | | 4,76 | 90-110 |
| | Corsa dei Cavalli | 134 | 17,27 | 17,17 | 0,10 | | 20 | 12p-13p | | 17,27 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 48,99 | 671 | 576,4 | 9.897,83 | | | 4,80 | 110-130 |
| | Valle Piana | 142 | 18,17 | 18,17 | 0,00 | | 18 | 11p | | 18,17 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,10 | 1004 | 625,8 | 11.371,23 | | | 5,21 | 110-130 |
| | | | | | | | 23 | 29p-33p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle Piana | 143 | 23,06 | 22,99 | 0,07 | | 18 | 11p | | 23,03 | 0,03 | | | a/b/c/d/g/i/m | 42,47 | 667 | 624,5 | 14.353,13 | | | 4,46 | 130-150 |
| | Valle Piana | 144 | 12,71 | 12,66 | 0,05 | | 18 | 11p | | 9,99 | 2,72 | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,87 | 1053 | 588,9 | 7.456,22 | | | 4,91 | 110-130 |
| | Valle Piana | 145 | 16,87 | 16,86 | 0,01 | | 18 | 11p | | 13,01 | 3,86 | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,57 | 1053 | 650,6 | 10.966,35 | | | 5,42 | 110-130 |
| | Teatro | 146 | 18,85 | 18,80 | 0,05 | | 18 | 11p | | 14,26 | 4,59 | | | a/b/c/d/g/i/m | 40,72 | 770 | 490,8 | 9.226,09 | | | 4,09 | 110-130 |
| | | | | | | | 24 | 330p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 29 | 1p-5p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cervarolo di Sazzano | 150 | 21,55 | 21,49 | 0,06 | | 20 | 11p-12p-13p | | 21,55 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 39,76 | 549 | 524,1 | 11.261,31 | | | 4,37 | 110-130 |
| | | | | | | | 25 | 12p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cervarolo di Sazzano | 151 | 19,82 | 17,33 | 2,49 | | 20 | 13p | | 19,66 | 0,16 | | | a/b/c/d/g/i/m | 31,81 | 364 | 395,5 | 6.854,78 | | | 13,18 | 10-30 |
| | | | | | | | 25 | 10p-12p-21p-23p-24p-31p-33p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cervarolo di Sazzano | 152 | 15,90 | 15,87 | 0,03 | | 25 | 12p | | 15,90 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 38,38 | 489 | 471,5 | 7.481,12 | | | 15,72 | 10-30 |
| | Orno | 162 | 27,59 | 27,59 | 0,00 | | 23 | 29p-33p | | 27,59 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 51,09 | 1044 | 660,4 | 18.221,50 | | | 5,50 | 130-150 |
| | Orno | 163 | 12,59 | 12,59 | 0,00 | | 18 | 23 | | 12,59 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 41,16 | 532 | 623,8 | 7.854,42 | | | 5,20 | 130-150 |
| | | | | | | | 23 | 29p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle Piana | 164 | 26,74 | 26,74 | 0,00 | | 18 | 11p | | 26,74 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 50,45 | 779 | 717,7 | 19.195,34 | | | 5,98 | 130-150 |
| | Valle Piana | 165 | 8,60 | 8,60 | 0,00 | | 18 | 11p | | 8,60 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 42,39 | 602 | 610,0 | 5.248,35 | | | 5,08 | 130-150 |
| | Vallone Scurillo | 166 | 32,90 | 32,70 | 0,20 | | 18 | 11p | | 25,84 | 7,06 | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,05 | 841 | 700,0 | 22.893,66 | | | 5,83 | 130-150 |
| | | | | | | | 24 | 330p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 29 | 1p-5p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 30 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Creta Rossa | 167 | 37,65 | 37,54 | 0,11 | | 18 | 11p | | 34,00 | 3,65 | | | a/b/c/d/g/i/m | 53,68 | 986 | 706,0 | 26.502,45 | | | 5,88 | 130-150 |
| | | | | | | | 24 | 330p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 30 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 33 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Serroncelli | 169 | 17,92 | 17,89 | 0,03 | | 24 | 330p | | | 17,92 | | | a/b/c/d/g/i/m | 63,07 | 674 | 859,3 | 15.373,90 | | | 7,16 | 130-150 |
| | | | | | | | 30 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 31 | 17p-Y901p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 33 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Serroncelli | 170 | 12,62 | 12,60 | 0,02 | | 24 | 330p | | | 12,62 | | | a/b/c/d/g/i/m | 58,26 | 878 | 813,4 | 10.249,18 | | | 6,78 | 130-150 |
| | | | | | | | 30 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 31 | 7-11-17p-49-Y901p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cervarolo di Sazzano | 173 | 9,95 | 9,10 | 0,85 | | 25 | 12p-32-33p-34p-40p-41p-42p | | 9,95 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 48,00 | 539 | 641,8 | 5.842,88 | | | 5,35 | 110-130 |
| | Cervarolo di Sazzano | 174 | 24,88 | 24,67 | 0,21 | | 25 | 12p | | 24,88 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 51,44 | 1042 | 624,5 | 15.407,51 | | | 6,24 | 90-110 |
| | Apeticchia | 187 | 20,42 | 20,40 | 0,02 | | 23 | 29p | | 20,37 | 0,05 | | | a/b/c/d/g/i/m | 53,85 | 2064 | 492,4 | 10.042,54 | | | 4,92 | 90-110 |

# RIEPILOGO GENERALE DELLE PARTICELLE FORESTALI

**Art. 108 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Classe economica (Compresa) | Particella forestale | | | | | | Dati catastali | | Area protetta - zonizzazione | | | Aree percorse dal Fuoco | | *Vincoli | Dati Dendrometrici | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Località | n° | Superficie in Ha | | | | Foglio | Particella | A | B | C | Anno | Ha | | Densità | | Pr unitaria mc/Ha | Pr totale mc | ***Pp unitaria mc/Ha | ***Pp totale mc | Incremento medio | Età all'anno di redazione del PGF |
| | | | Totale | Bosco | Pascolo prati radure | Altro | | | Ha | Ha | Ha | | | | A.B. unitaria mq/Ha | ** Soggetti n°/Ha | | | | | | |
| | Apeticchia | 188 | 15,60 | 15,55 | 0,05 | | 18 | 11p | | 15,60 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 51,79 | 769 | 726,4 | 11.298,37 | | | 6,05 | 110-130 |
| | | | | | | | 23 | 29p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Montagna Grande | 189 | 24,37 | 24,36 | 0,01 | | 18 | 11p | | 24,37 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 44,40 | 739 | 586,6 | 14.290,68 | | | 4,89 | 130-150 |
| | | | | | | | 23 | 29p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ripa di Moggio | 190 | 12,93 | 12,93 | 0,00 | | 18 | 11p | | 12,93 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 38,67 | 877 | 454,8 | 5.882,28 | | | 3,79 | 110-130 |
| | Filettone | 191 | 32,71 | 32,59 | 0,12 | | 18 | 11p | | 23,00 | 9,71 | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,55 | 934 | 545,9 | 17.789,46 | | | 4,55 | 110-130 |
| | | | | | | | 23 | 29p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 24 | 330p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Terremoto | 192 | 36,38 | 36,37 | 0,01 | | 18 | 11p | | 6,28 | 30,10 | | | a/b/c/d/g/i/m | 52,28 | 986 | 708,9 | 25.779,80 | | | 5,91 | 130-150 |
| | | | | | | | 24 | 311p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 24 | 330p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 33 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Serra dei Frasci | 193 | 19,98 | 19,96 | 0,02 | | 24 | 278-279-280-281-297p-298p-299p-300p-328-330p-X1p | | | 19,98 | | | a/b/c/d/g/i/m | 44,80 | 620 | 644,2 | 12.858,01 | | | 5,37 | 130-150 |
| | | | | | | | 31 | 17p-Y901p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Serroncelli Soprani | 194 | 11,99 | 11,98 | 0,01 | | 24 | 275-286-291-295-296-297p-298p-299p-300p-330p-X1p | | | 11,99 | | | a/b/c/d/g/i/m | 48,95 | 1063 | 640,7 | 7.673,12 | | | 5,34 | 130-150 |
| | | | | | | | 30 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 33 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Serroncelli Soprani | 198 | 17,70 | 16,81 | 0,89 | | 25 | 12p-42p | | 17,69 | 0,01 | | | a/b/c/d/g/i/m | 29,43 | 330 | 426,2 | 7.164,28 | | | 21,31 | 10-30 |
| | Cervarolo di Sazzano | 199 | 14,12 | 14,12 | 0,00 | | 25 | 12p | 9,58 | 4,54 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 50,92 | 605 | 700,6 | 9.892,12 | | | 5,84 | 130-150 |
| | Cervarolo di Sazzano | 204 | 12,28 | 11,85 | 0,43 | | 23 | 29p-33p | | 12,28 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 54,30 | 1244 | 647,7 | 7.673,03 | | | 8,10 | 70-90 |
| | Fossa della Neve | 205b | 11,18 | 11,18 | 0,00 | | 23 | 29p | | 11,19 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,40 | 1358 | 574,1 | 6.416,66 | | | 4,78 | 130-150 |
| | Apeticchia | 208 | 35,41 | 35,39 | 0,02 | | 24 | 330p | | 26,82 | 8,59 | | | a/b/c/d/g/i/m | 53,85 | 803 | 731,1 | 25.871,89 | | | 6,09 | 130-150 |
| | | | | | | | 25 | 12p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stretta dell'Acernese | 209 | 31,70 | 31,52 | 0,18 | | 24 | 330p | | 29,26 | 2,44 | | | a/b/c/d/g/i/m | 54,69 | 1286 | 674,9 | 21.270,91 | | | 5,62 | 110-130 |
| | | | | | | | 25 | 12p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 31 | 17p-18p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Coste di Cervialto | 211 | 21,59 | 21,59 | 0,00 | | 25 | 12p | 0,38 | 20,19 | 1,02 | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,14 | 986 | 624,3 | 13.481,29 | | | 4,16 | 130-150 |
| | Coste di Cervialto | 212 | 29,47 | 29,38 | 0,09 | | 25 | 12p | 28,38 | 1,09 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,43 | 855 | 584,8 | 17.184,32 | | | 4,50 | 110-130 |
| | Valle Giamberardino | 215 | 3,49 | 3,49 | 0,00 | | 25 | 12p | 2,57 | 0,92 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 50,02 | 156 | 882,2 | 3.075,08 | | | 5,88 | 130-150 |
| | Impiccato | 220 | 22,81 | 22,80 | 0,01 | | 27 | 3p-151p | | 22,81 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 50,70 | 452 | 718,9 | 16.394,23 | | | 4,79 | 130-150 |
| | Valle d'Acero | 221 | 8,36 | 8,33 | 0,03 | | 27 | 3p-151p | | 8,36 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 48,32 | 490 | 731,5 | 6.096,84 | | | 6,10 | 110-130 |
| | Apeticchia | 222a | 16,56 | 16,56 | 0,00 | | 27 | 151p | | 16,56 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 43,32 | 473 | 550,5 | 9.115,62 | | | 4,59 | 110-130 |
| | Apeticchia | 223a | 10,58 | 10,58 | 0,00 | | 27 | 151p | | 10,58 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 43,97 | 517 | 578,0 | 6.113,21 | | | 4,13 | 130-150 |
| **COMPRESA A** | Terremoto | 224b | 6,50 | 6,50 | 0,00 | | 27 | 151p | | 6,50 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 53,33 | 397 | 782,0 | 5.080,22 | | | 5,59 | 130-150 |
| | | | | | | | 28 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle d'Acero | 225 | 16,29 | 16,29 | 0,00 | | 24 | 330p | | 15,92 | 0,37 | | | a/b/c/d/g/i/m | 62,70 | 1056 | 715,1 | 11.646,51 | | | 5,96 | 110-130 |
| | | | | | | | 27 | 151p-162 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 28 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle d'Acero | 228 | 24,40 | 24,00 | 0,40 | | 24 | 3p-330p | | 23,79 | 0,61 | | | a/b/c/d/g/i/m | 50,50 | 936 | 655,9 | 15.740,71 | | | 5,47 | 110-130 |
| | Sette Valli | 229 | 34,06 | 33,85 | 0,21 | | 24 | 3p-46-47-48-49-330p-332p | | 24,34 | 9,72 | | | a/b/c/d/g/i/m | 50,27 | 1052 | 656,5 | 22.221,33 | | | 5,05 | 110-130 |
| | Sette Valli | 230 | 35,75 | 35,72 | 0,03 | | 24 | 330p | | 30,71 | 5,04 | | | a/b/c/d/g/i/m | 56,74 | 1272 | 694,5 | 24.812,18 | | | 5,34 | 110-130 |
| | | | | | | | 25 | 12p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 26 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Chiuvarelli | 232 | 40,81 | 40,72 | 0,09 | | 24 | 3p-4p-330p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 25 | 12p | 0,08 | 40,73 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,86 | 814 | 684,9 | 27.884,35 | | | 4,565745865 | 130-150 |
| | | | | | | | 26 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vallone del Turco | 233 | 34,69 | 34,69 | 0,00 | | 24 | 330p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 25 | 12p | 0,12 | 34,57 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 58,66 | 1369 | 759,5 | 26.344,30 | | | 6,33 | 110-130 |
| | | | | | | | 26 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vallone del Turco | 235 | 13,14 | 13,14 | 0,00 | | 25 | 12p | 12,69 | 0,45 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 43,73 | 627 | 550,6 | 7.234,29 | | | 5,23 | 110-130 |
| | | | | | | | 26 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Coste di Cervialto | 236 | 11,10 | 11,10 | 0,00 | | 25 | 12p | 11,02 | 0,08 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 38,43 | 1564 | 376,3 | 4.178,65 | | | 3,76 | 90-110 |
| | Coste di Cervialto | 240 | 7,36 | 6,75 | 0,61 | | 25 | 12p | 7,36 | | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 653,6 | 4.409,75 | | | 5,45 | 110-130 |
| | Coste di Cervialto | 247 | 14,20 | 13,78 | 0,42 | | 27 | 3p-151p | | 14,20 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 54,60 | 806 | 629,6 | 8.676,71 | | | 6,30 | 90-110 |
| | Coste di Cervialto | 248 | 12,92 | 12,92 | 0,00 | | 27 | 151p | | 12,92 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 56,38 | 509 | 782,8 | 10.115,12 | | | 5,22 | 130-150 |
| | Impiccato | 250 | 22,87 | 22,86 | 0,01 | | 27 | 151p | | 22,87 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 51,26 | 522 | 719,4 | 16.445,48 | | | 4,80 | 130-150 |
| | Scarrupata | 251 | 13,98 | 13,98 | 0,00 | | 27 | 151p | | 13,98 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 51,54 | 586 | 736,6 | 10.295,25 | | | 5,26 | 130-150 |
| | Valle d'Acero | 253 | 11,59 | 11,59 | 0,00 | | 27 | 151p | | 11,59 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 52,67 | 556 | 795,6 | 9.223,16 | | | 6,12 | 130-150 |
| | | | | | | | 28 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle d'Acero | 254 | 15,01 | 15,01 | 0,00 | | 28 | 1p | | 15,01 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 57,23 | 647 | 889,3 | 13.347,26 | | | 7,41 | 130-150 |
| | Terremoto | 255a | 9,19 | 9,18 | 0,01 | | 27 | 151p | | 9,19 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 55,51 | 563 | 845,6 | 7.765,07 | | | 7,05 | 130-150 |
| | | | | | | | 28 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Terremoto | 255b | 12,00 | 12,00 | 0,00 | | 27 | 151p | | 12,00 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,65 | 457 | 776,6 | 9.315,82 | | | 6,47 | 130-150 |
| | | | | | | | 28 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle d'Acero | 256 | 17,21 | 17,18 | 0,03 | | 24 | 330p | | 17,21 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 55,25 | 763 | 720,0 | 12.369,50 | | | 6,00 | 110-130 |
| | | | | | | | 27 | 151p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 28 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle d'Acero | 257 | 8,93 | 8,87 | 0,06 | | 24 | 330p | | 8,93 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 41,48 | 399 | 631,5 | 5.601,97 | | | 5,26 | 110-130 |
| | | | | | | | 28 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle d'Acero | 258 | 32,27 | 32,21 | 0,06 | | 24 | 330p | | 32,27 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 46,30 | 484 | 574,4 | 18.502,59 | | | 5,74 | 90-110 |
| | | | | | | | 28 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |

# RIEPILOGO GENERALE DELLE PARTICELLE FORESTALI

**Art. 108 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Classe economica (Compresa) | Particella forestale | | | | | | Dati catastali | | Area protetta - zonizzazione | | | Aree percorse dal Fuoco | | *Vincoli | Dati Dendrometrici | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Località | n° | Superficie in Ha | | | | Foglio | Particella | A | B | C | Anno | Ha | | Densità | | Pr unitaria mc/Ha | Pr totale mc | ***Pp unitaria mc/Ha | ***Pp totale mc | Incremento medio | Età all'anno di redazione del PGF |
| | | | Totale | Bosco | Pascolo prati radure | Altro | | | Ha | Ha | Ha | | | | A.B. unitaria mq/Ha | ** Soggetti n°/Ha | | | | | | |
| COMPRESA A | Valle d'Acero | 259 | 27,71 | 27,14 | 0,57 | | 24 | 3p-330p | | 27,71 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 51,36 | 1077 | 610,7 | 16.576,11 | | | 5,09 | 110-130 |
| | | | | | | | 28 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pagliarolo | 260 | 19,87 | 19,76 | 0,11 | | 24 | 3p-4p | | 19,87 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,90 | 777 | 688,5 | 13.603,31 | | | 6,88 | 90-110 |
| | | | | | | | 26 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 28 | 1p-2p-3p-4p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle d'Acero | 261a | 16,20 | 16,20 | 0,00 | | 26 | 1p | | 16,20 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,85 | 1028 | 658,7 | 10.672,27 | | | 5,49 | 110-130 |
| | Valle d'Acero | 261b | 14,86 | 14,86 | 0,00 | | 26 | 1p | 0,76 | 14,10 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 40,93 | 1688 | 420,8 | 6.253,58 | | | 4,21 | 90-110 |
| | Pagliarolo | 262 | 16,87 | 16,87 | 0,00 | | 26 | 1p | | 16,87 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 40,89 | 1042 | 483,5 | 8.154,82 | | | 4,03 | 110-130 |
| | Chiuvarelli | 263 | 24,81 | 24,81 | 0,00 | | 26 | 1p | 22,30 | 2,51 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,84 | 960 | 585,3 | 14.523,02 | | | | indeterminata |
| | Piano dei Vaccari | 271 | 9,54 | 9,54 | 0,00 | | 27 | 151p | | 9,54 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 50,00 | 406 | 791,2 | 7.543,93 | | | 6,59 | 130-150 |
| | Piano Acernese | 272 | 24,79 | 24,77 | 0,02 | | 27 | 151p | | 24,79 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 605,7 | 15.004,61 | | | 20,19 | 10-30 |
| | Vallebona | 273 | 0,93 | 0,93 | 0,00 | | 27 | 151p | | 0,93 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,00 | | | | indeterminata |
| | Vallebona | 274 | 25,84 | 25,82 | 0,02 | | 27 | 151p | | 25,84 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 57,01 | 817 | 678,8 | 17.525,37 | | | 5,22 | 110-130 |
| | Raia della Scannella | 275 | 19,12 | 19,12 | 0,00 | | 27 | 151p | | 19,12 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 46,19 | 546 | 621,8 | 11.887,55 | | | 4,78 | 110-130 |
| | Valle d'Acero | 276a | 10,31 | 10,29 | 0,02 | | 27 | 151p | | 10,31 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 56,26 | 653 | 662,6 | 6.818,63 | | | 5,93 | 90-110 |
| | Valle d'Acero | 276b | 12,54 | 12,54 | 0,00 | | 27 | 151p | | 12,54 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 54,44 | 809 | 669,6 | 8.398,84 | | | 7,36 | 90-110 |
| | Vallebona | 277 | 18,56 | 18,56 | 0,00 | | 27 | 151p | 5,08 | 13,48 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,76 | 565 | 587,0 | 10.891,96 | | | 4,89 | 130-150 |
| | | | | | | | 28 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vallebona | 278 | 9,10 | 8,83 | 0,27 | | 27 | 151p | | 9,10 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 38,46 | 507 | 449,7 | 3.968,63 | | | 14,99 | 10-30 |
| | | | | | | | 28 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vallebona | 279 | 11,41 | 11,41 | 0,00 | | 27 | 151p | 2,28 | 9,13 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 40,14 | 364 | 706,6 | 8.059,76 | | | 5,89 | 130-150 |
| | | | | | | | 28 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vallebona | 280 | 12,50 | 12,50 | 0,00 | | 28 | 1p | | 12,50 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 42,88 | 437 | 995,4 | 12.445,64 | | | 6,64 | 130-150 |
| | Vallone dell'Acero | 282 | 22,04 | 21,54 | 0,50 | | 28 | 1p | | 22,04 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 29,76 | 295 | 602,4 | 12.975,58 | | | 20,08 | 10-30 |
| | Vallone dell'Acero | 284 | 17,45 | 17,45 | 0,00 | | 28 | 1p | | 17,45 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 43,24 | 416 | 642,4 | 11.206,95 | | | 4,28 | 130-150 |
| | Conca di Marco | 285 | 17,05 | 16,87 | 0,18 | | 28 | 1p-5p | 0,21 | 16,84 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 30,03 | 316 | 578,7 | 9.760,98 | | | 19,29 | 10-30 |
| | Conca di Marco | 286 | 18,28 | 18,22 | 0,06 | | 28 | 1p | | 18,28 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 43,93 | 567 | 641,1 | 11.678,64 | | | 21,37 | 10-30 |
| | Valle d'Acero | 288a | 20,22 | 20,01 | 0,21 | | 28 | 1p | | 20,22 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 37,19 | 584 | 598,7 | 11.978,22 | | | 19,96 | 10-30 |
| | | | | | | | 28 | 5p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Piano Acernese | 288b | 21,68 | 21,57 | 0,11 | | 28 | 1p | | 21,68 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,35 | 489 | 787,0 | 16.976,21 | | | 5,25 | 130-150 |
| | Conca di Marco | 291 | 28,65 | 28,62 | 0,03 | | 26 | 1p-3p-4p | | 28,65 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 54,53 | 1274 | 699,5 | 20.016,97 | | | 5,38 | 110-130 |
| | | | | | | | 28 | 1p-5p-6p-7p-8 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sierro della Zà Popa | 292 | 24,83 | 24,79 | 0,04 | | 26 | 1p | | 24,83 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 53,20 | 948 | 684,1 | 16.962,28 | | | 6,22 | 90-110 |
| | | | | | | | 28 | 1p-4p-5p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Colle del Leone | 294 | 27,74 | 27,72 | 0,02 | | 26 | 1p | | 27,74 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 44,74 | 630 | 642,1 | 17.801,05 | | | 4,28 | 130-150 |
| | | | | | | | 28 | 1p-4p-5p-7p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Piano Acernese | 295a | 15,83 | 15,71 | 0,12 | | 26 | 1p | | 15,83 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 43,75 | 897 | 480,2 | 7.545,81 | | | 4,37 | 90-110 |
| | | | | | | | 28 | 1p-4p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vallebona | 295b | 19,28 | 19,18 | 0,10 | | 26 | 1p | | 19,28 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 34,99 | 1529 | 297,4 | 5.704,78 | | | 3,30 | 70-90 |
| | Colle del Leone | 296 | 8,95 | 8,94 | 0,01 | | 26 | 1p | | 8,95 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 39,91 | 1395 | 359,0 | 3.211,39 | | | 3,26 | 90-110 |
| | | | | | | | 28 | 4p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Colle del Leone | 297 | 23,48 | 19,47 | 4,01 | | 26 | 1p | | 23,48 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 41,68 | 1406 | 386,2 | 7.521,63 | | | 4,29 | 70-90 |
| | | | | | | | 28 | 4p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vallone del Cupone | 298 | 10,72 | 10,72 | 0,00 | | 26 | 1p-4p | | 10,72 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 48,46 | 1876 | 505,6 | 5.421,38 | | | 3,89 | 110-130 |
| | | | | | | | 28 | 4p-7p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vallone del Cupone | 300 | 23,92 | 23,90 | 0,02 | | 26 | 1p | 20,81 | 3,10 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,75 | 1097 | 502,0 | 11.998,93 | | | 7,17 | 50-70 |
| | Felicecchia | 301 | 19,49 | 17,65 | 1,84 | | 26 | 1p | | 19,49 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 33,49 | 1224 | 290,8 | 5.131,88 | | | 3,23 | 70-90 |
| | Felicecchia | 302 | 20,89 | 20,86 | 0,03 | | 26 | 1p | 20,00 | 0,89 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,78 | 674 | 589,8 | 12.300,73 | | | 4,91 | 110-130 |
| | Coste di Cervialto | 304 | 22,47 | 21,85 | 0,62 | | 26 | 1p | | 22,47 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 35,98 | 1193 | 341,4 | 7.457,74 | | | 4,27 | 70-90 |
| | Colle delle Radici | 305 | 21,65 | 21,32 | 0,33 | | 26 | 1p-5p-8p | | 21,65 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 42,17 | 1588 | 393,4 | 8.387,27 | | | 4,92 | 70-90 |
| | Colle delle Radici | 306 | 18,48 | 18,47 | 0,01 | | 26 | 1p | | 18,48 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 46,14 | 761 | 531,3 | 9.811,10 | | | 5,31 | 90-110 |
| | Piano Migliato | 307 | 19,18 | 19,00 | 0,18 | | 26 | 1p | 11,47 | 7,71 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 52,49 | 1214 | 480,9 | 9.135,17 | | | 6,01 | 70-90 |
| | Vallebona | 308a | 21,10 | 20,90 | 0,20 | | 26 | 1p-8p | 5,25 | 15,85 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 43,02 | 906 | 480,0 | 10.030,67 | | | 2,53 | 190-210 |
| | Colle del Leone | 308b | 7,44 | 7,39 | 0,05 | | 26 | 1p | 6,99 | 0,45 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 64,25 | 1050 | 657,1 | 4.857,05 | | | 6,57 | 90-110 |
| | Piano Migliato | 309 | 16,88 | 16,85 | 0,03 | | 26 | 1p-5p-8p | | 16,88 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 39,77 | 1094 | 441,1 | 7.434,22 | | | 3,68 | 110-130 |
| | Colle delle Radici | 310 | 23,71 | 23,67 | 0,04 | | 26 | 1p-5p-6-7p-8p | | 23,71 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 43,54 | 842 | 487,4 | 11.537,81 | | | 4,87 | 90-110 |
| | Piano Migliato | 311 | 15,05 | 14,02 | 1,03 | | 26 | 1p-5p-7p-8p | | 15,05 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 44,56 | 1040 | 518,0 | 7.261,11 | | | 4,71 | 90-110 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPRESA BV | Cervarolo di Laceno | 149 | 10,02 | 9,98 | 0,04 | | 20 | 11p-12p-13p | | 10,02 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 50,31 | 854 | 474,6 | 4.735,62 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 25 | 12p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cervarolo di Laceno | 172 | 10,35 | 10,28 | 0,07 | | 25 | 12p | | 10,35 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 55,15 | 1002 | 569,6 | 5.857,28 | | | | indeterminata |
| | Cervarolo di Laceno | 197 | 19,60 | 19,58 | 0,02 | | 25 | 12p | 0,57 | 19,03 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 51,89 | 604 | 612,6 | 11.996,13 | | | | indeterminata |

# RIEPILOGO GENERALE DELLE PARTICELLE FORESTALI

**Art. 108 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Classe economica (Compresa) | Particella forestale | | | | | | Dati catastali | | Area protetta - zonizzazione | | | Aree percorse dal Fuoco | | *Vincoli | Dati Dendrometrici | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Località | n° | Superficie in Ha | | | | Foglio | Particella | A | B | C | | | | Densità | | Pr unitaria mc/Ha | Pr totale mc | ***Pp unitaria mc/Ha | ***Pp totale mc | Incremento medio | Età all'anno di redazione del PGF |
| | | | Totale | Bosco | Pascolo prati radure | Altro | | | Ha | Ha | Ha | Anno | Ha | | A.B. unitaria mq/Ha | ** Soggetti n°/Ha | | | | | | |
| | Costa della Guradia | 3b | 3,31 | 2,71 | 0,60 | | 7 | 27-30p-46-47-48 | | 3,31 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 57,05 | 1248 | 498,02 | 1.351,13 | | | | indeterminata |
| | Fieste | 4b | 10,01 | 1,70 | 8,31 | | 2 | 62 - 63 | | 2,48 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 64,19 | 109,29 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 3 | 40-41-57-58-94 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6 | 48 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Varco di Marro | 8 | 7,38 | 7,27 | 0,11 | | 7 | 22p-30p | | 7,38 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 43,91 | 787 | 605,89 | 4.404,82 | | | | indeterminata |
| | Valle Scura di Sopra | 16 | 16,36 | 10,63 | 5,73 | | 7 | 21-22p-41 | | 16,36 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 263,37 | 2.799,88 | | | | indeterminata |
| | Colle del Pozzo | 17 | 14,66 | 13,89 | 0,77 | | 7 | 22p | | 14,66 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 58,68 | 451 | 851,45 | 11.823,07 | | | | indeterminata |
| | Il Montagnone | 18 | 10,84 | 7,89 | 2,95 | | 7 | 22p | | 10,84 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 39,58 | 660 | 380,03 | 3.000,17 | | | | indeterminata |
| | Cauciogliara | 20 | 28,61 | 10,98 | 17,63 | | 7 | 22p-30p-34p-39p-49-50-51-52-57 | | 28,61 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 105,94 | 1.162,84 | | | | indeterminata |
| | Belvedere | 21 | 10,70 | 7,26 | 3,44 | | 7 | 22p-40-41-43-60-61 | | 10,70 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 264,61 | 1.920,89 | | | | indeterminata |
| | Castagna | 24 | 8,75 | 8,68 | 0,07 | | 7 | 22p-37-44-49-53-54 | | 8,75 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 35,31 | 501 | 482,35 | 4.186,04 | | | | indeterminata |
| | La Chiusa | 25 | 13,12 | 10,13 | 2,99 | | 7 | 22p-39p | | 13,12 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 12,04 | 312 | 116,70 | 1.182,34 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 12 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pettinicchio | 26 | 38,89 | 10,84 | 28,05 | | 7 | 22p | | 38,89 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 96,81 | 1.049,34 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 12 | 1p-2-9p-51-52-53-54-55-56-57 | | | | | | | | | | | | | | |
| | I Morti | 27a | 20,07 | 7,21 | 12,86 | | 7 | 22p | | 20,07 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 109,58 | 790,06 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 12 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 13 | 16p-23p-24p-28p-29p | | | | | | | | | | | | | | |
| | I Morti | 28 | 2,30 | 1,57 | 0,73 | | 13 | 16p-30p-31p | | 2,30 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 180,43 | 284,08 | | | | indeterminata |
| | Valle dei Morti | 29a | 8,29 | 7,57 | 0,72 | | 13 | 16p-33p-34p-42p | | 8,29 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 50,78 | 386 | 640,55 | 4.849,71 | | | | indeterminata |
| | Valle dei Lupi | 30 | 6,84 | 5,00 | 1,84 | | 13 | 2p-16p-43p | | 6,84 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 69,00 | 533 | 911,73 | 4.555,53 | | | | indeterminata |
| | Valle dei Lupi | 31 | 17,68 | 17,41 | 0,27 | | 13 | 16p-22p-42p | | 17,68 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 37,95 | 794 | 385,25 | 6.707,66 | | | | indeterminata |
| | Acero | 32a | 5,72 | 5,68 | 0,04 | | 13 | 16p-22p-51p-52p | | 5,72 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,96 | 793 | 444,04 | 2.522,09 | | | | indeterminata |
| | Acero | 33 | 10,84 | 10,61 | 0,23 | | 13 | 22p-52p | | 10,84 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 50,68 | 936 | 472,10 | 5.009,83 | | | | indeterminata |
| | Filettone | 34 | 5,24 | 5,20 | 0,04 | | 13 | 22p | | 5,24 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 38,83 | 793 | 338,20 | 1.758,76 | | | | indeterminata |
| | Valle del Limo | 37a | 8,72 | 7,16 | 1,56 | | 7 | 22p-34p-45p-55-56p-73p | | 8,72 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 207,70 | 1.486,55 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 11 | 20p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 12 | 1p-4-63p-64p-65-66-67-68-191 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle del Limo | 37b | 4,83 | 4,43 | 0,40 | | 7 | 22p-34 | | 4,83 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 214,43 | 950,32 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 11 | 20p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lo Stazzo | 38 | 14,31 | 10,05 | 4,26 | | 7 | 22p | | 14,31 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 37,02 | 826 | 345,85 | 3.475,38 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 12 | 1p-11p-12p-63p-64p-69-74-75-76-77-79 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lo Stazzo | 39 | 17,32 | 10,43 | 6,89 | | 12 | 1p-6-7-12p-59-60-61-62 | | 17,32 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 175,49 | 1.830,88 | | | | indeterminata |
| | Lo Stazzo | 40 | 11,15 | 5,26 | 5,89 | | 12 | 1p-8-9p-12p-13-58 | | 11,15 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 183,86 | 967,99 | | | | indeterminata |
| | Vallone dello Stazzo | 41 | 9,26 | 8,93 | 0,33 | | 12 | 1p-12p | | 9,26 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 52,46 | 494 | 573,02 | 5.116,04 | | | | indeterminata |
| **COMPRESA C** | Valle dei Sauci | 42 | 28,53 | 13,87 | 14,66 | | 12 | 1p | | 28,53 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 173,45 | 2.405,92 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 13 | 16p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle dei Morti | 43 | 14,36 | 12,46 | 1,90 | | 12 | 1p | | 14,36 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 48,51 | 616 | 488,78 | 6.087,99 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 13 | 16p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle dei Sauci | 44a | 7,99 | 7,70 | 0,29 | | 12 | 1p-3 | | 7,99 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,13 | 468 | 658,45 | 5.071,21 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 13 | 16p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle dei Sauci | 44b | 4,68 | 4,38 | 0,30 | | 12 | 1p | | 4,68 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 321,29 | 1.407,98 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 13 | 16p-44-45p-46p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle dei Sauci | 45a | 19,12 | 18,68 | 0,44 | | 13 | 2p-3p-15p-16p-43p-45p | | 19,12 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 44,57 | 533 | 536,08 | 10.012,45 | | | | indeterminata |
| | Terrate | 46 | 16,25 | 15,14 | 1,11 | | 13 | 16p-22p-48-49-50-52p | | 16,25 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,41 | 650 | 465,43 | 7.045,61 | | | | indeterminata |
| | Terrate | 47 | 4,99 | 4,94 | 0,05 | | 13 | 22p-160p | | 4,99 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 52,06 | 800 | 491,81 | 2.429,82 | | | | indeterminata |
| | Filettone | 48 | 9,42 | 8,75 | 0,67 | | 13 | 8p-22p-167p-169-170-171p-172-173p | | 9,42 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 61,70 | 546 | 661,12 | 5.787,16 | | | | indeterminata |
| | Vallone della Vecchiarella | 50 | 9,13 | 7,88 | 1,25 | | 11 | 20p-29p | | 9,13 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 282,57 | 2.226,58 | | | | indeterminata |
| | Orto di Calcio Lento | 51 | 21,56 | 3,53 | 18,03 | | 11 | 20p-26-27p-29p-42-43p-45 | | 21,56 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 66,53 | 235,17 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 12 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle del Limo | 52 | 31,14 | 5,37 | 25,77 | | 11 | 24-25-29p-38-39-40-41-43p-44 | | 31,14 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 75,11 | 403,23 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 12 | 1p-10-21-49-80-81-82-83-84 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Conca | 53 | 6,87 | 6,61 | 0,26 | | 7 | 22p-45-56p-73p | | 6,87 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 53,38 | 949 | 617,33 | 4.082,90 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 12 | 1p-68 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monte Caruso | 54 | 12,57 | 5,38 | 7,19 | | 12 | 1p-12p-116-121-130-131-132-133 | | 12,15 | 0,42 | | | a/b/c/d/g/i/m | 40,97 | 364 | 460,67 | 2.477,04 | | | | indeterminata |
| | Valle dei Sauci | 55 | 14,89 | 13,88 | 1,01 | | 12 | 1p-12p | | 14,89 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 69,18 | 796 | 822,89 | 11.423,50 | | | | indeterminata |
| | Monte Caruso | 56 | 13,22 | 7,29 | 5,93 | | 12 | 1p-12p-401p | | 13,22 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,88 | 462 | 486,42 | 3.546,89 | | | | indeterminata |
| | Valle Matauro | 57 | 35,36 | 23,27 | 12,09 | | 12 | 1p-14p-15-48p-178 | | 35,36 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 40,17 | 520 | 360,99 | 8.398,86 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 13 | 9p-15p-21p-62 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Colle Matauro | 59 | 12,88 | 10,18 | 2,70 | | 12 | 1p-14p-179 | | 12,88 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,64 | 696 | 458,14 | 4.665,20 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 13 | 4-9p-15p-16p-59-60 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle del Pero | 61 | 11,88 | 10,52 | 1,36 | | 13 | 15p-16p-54-55p | | 11,88 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 54,43 | 754 | 540,63 | 5.685,88 | | | | indeterminata |
| | Raia dell'Acera | 62 | 12,88 | 10,43 | 2,45 | | 13 | 16p-22p-53 | | 12,88 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,16 | 773 | 458,72 | 4.783,35 | | | | indeterminata |
| | Terrate | 63 | 12,05 | 10,68 | 1,37 | | 13 | 16p-22p | | 12,05 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 46,04 | 403 | 424,61 | 4.534,42 | | | | indeterminata |
| | Terrate | 64 | 8,25 | 8,12 | 0,13 | | 13 | 5p-22p-144-152p-153p | | 8,25 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 51,94 | 706 | 460,81 | 3.740,39 | | | | indeterminata |
| | Filettone | 65 | 8,08 | 7,94 | 0,14 | | 13 | 8p-22p-150p-151p-168p-171p-180p | | 8,08 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 48,53 | 645 | 469,18 | 3.723,68 | | | | indeterminata |
| | La Peta | 66 | 13,89 | 8,74 | 5,15 | | 13 | 5p-22p-145-146-147-148-149-182 | | 13,89 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 209,30 | 1.829,31 | | | | indeterminata |
| | Filettone | 67 | 13,70 | 11,11 | 2,59 | | 13 | 22p-173p | | 13,70 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 295,52 | 3.284,64 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 20 | 12p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Costa dell'Angelo | 68 | 8,44 | 6,67 | 1,77 | | 10 | 144-171 | | 8,44 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 176,67 | 1.177,60 | | | | indeterminata |
| | Valle Nova | 70 | 33,18 | 23,39 | 9,79 | | 11 | 27p-29p | | 27,19 | 5,99 | | | a/b/c/d/g/i/m | 65,62 | 634 | 634,16 | 14.830,55 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 12 | 1p-17-18-85-86-87-88 | | | | | | | | | | | | | | |

# RIEPILOGO GENERALE DELLE PARTICELLE FORESTALI

**Art. 108 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Classe economica (Compresa) | Particella forestale | | | | | | Dati catastali | | Area protetta - zonizzazione | | | Aree percorse dal Fuoco | | *Vincoli | Dati Dendrometrici | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Località | n° | Superficie in Ha | | | | Foglio | Particella | A | B | C | | | | Densità | | Pr unitaria mc/Ha | Pr totale mc | ***Pp unitaria mc/Ha | ***Pp totale mc | Incremento medio | Età all'anno di redazione del PGF |
| | | | Totale | Bosco | Pascolo prati radure | Altro | | | Ha | Ha | Ha | Anno | Ha | | A.B. unitaria mq/Ha | ** Soggetti n°/Ha | | | | | | |
| | S. Maria | 72 | 17,41 | 11,71 | 5,70 | | 11 | 29p | | 13,63 | 3,78 | | | a/b/c/d/g/i/m | 52,07 | 936 | 396,38 | 4.642,47 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 12 | 1p-12p-18-89 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 18 | 11p | | | | | | | | | | | | | | |
| | S. Maria | 73 | 11,99 | 7,49 | 4,50 | | 11 | 29p | | 11,99 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 232,57 | 1.741,60 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 12 | 1p-16 | | | | | | | | | | | | | | |
| | S. Maria | 74 | 6,36 | 5,05 | 1,31 | | 12 | 1p-20-105-106-107 | | 4,44 | 1,92 | | | a/b/c/d/g/i/m | 42,15 | 515 | 416,85 | 2.103,95 | | | | indeterminata |
| | Monte Caruso | 76 | 16,92 | 11,23 | 5,69 | | 12 | 1p-146-153p-154p-155p-156p-161p-162p-165p-167p-169p-172p-173p | | 15,61 | 1,31 | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,09 | 455 | 550,09 | 6.176,43 | | | | indeterminata |
| | Raia della Spina | 78 | 21,15 | 13,63 | 7,52 | | 12 | 47-48p | | 3,62 | 17,53 | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,14 | 442 | 501,76 | 6.839,24 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 13 | 11p-12p-13p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 19 | 31-36p-238p-262 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 25 | 12p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle Piana | 80 | 5,05 | 4,30 | 0,75 | | 12 | 48p | | 5,05 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 56,18 | 1391 | 389,89 | 1.677,23 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 13 | 11p-15p-77p-78-81-86-89-93-94 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vado dell'Asta | 82 | 16,15 | 9,39 | 6,76 | | 13 | 15p-16p-22p-55p-56- | | 16,15 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 195,19 | 1.832,04 | | | | indeterminata |
| | Salve Regina | 83a | 9,84 | 6,54 | 3,30 | | 13 | 15p-17p-18p-124-125-126-127p | | 9,84 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 204,07 | 1.335,51 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 20 | 5p-12p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vado dell'Asta | 84 | 13,47 | 10,04 | 3,43 | | 13 | 16p-18p-22p-57p-130p | | 13,47 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 209,9 | 2.108,06 | | | | indeterminata |
| | Valle Coscia | 85 | 10,45 | 9,81 | 0,64 | | 13 | 16p-22p-57p-142-143p | | 10,45 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 40,56 | 491 | 410,7 | 4.026,65 | | | | indeterminata |
| | Vado dell'Asta | 86 | 8,36 | 8,32 | 0,04 | | 13 | 20p-22p-131p-132p | | 8,36 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 66,96 | 988 | 697,9 | 5.806,28 | | | | indeterminata |
| | Vado dell'Asta | 87 | 9,30 | 9,18 | 0,12 | | 13 | 22p-135p-138p-139p-140p-143p | | 9,30 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 59,30 | 695 | 583,2 | 5.356,49 | | | | indeterminata |
| | La Peta | 88 | 3,12 | 3,00 | 0,12 | | 13 | 22p | | 3,12 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 52,66 | 442 | 711,38 | 2.132,50 | | | | indeterminata |
| | Vallone di Ciccociangia | 89 | 10,38 | 4,81 | 5,57 | | 13 | 22p | | 10,38 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 43,96 | 338 | 490,92 | 2.362,81 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 20 | 12p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vallone di Ciccociangia | 90 | 8,38 | 4,74 | 3,64 | | 13 | 22p | | 8,38 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 27,15 | 468 | 222,17 | 1.052,56 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 20 | 12p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Costa dell'Angelo | 92 | 7,84 | 4,23 | 3,61 | | 10 | 148p | | 7,84 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 21,76 | 1326 | 105,83 | 447,74 | | | | indeterminata |
| | Raia della Spina | 97 | 9,33 | 5,40 | 3,93 | | 12 | 48p | | 9,15 | 0,18 | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 183,70 | 991,83 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 13 | 11p-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 20 | 1p-18 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 25 | 1p-12p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Serro Tondo | 98a | 6,44 | 2,83 | 3,61 | | 13 | 18p | | 6,44 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 121,54 | 343,77 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 20 | 5p-12p-32p | | | | | | | | | | | | | | |
| **COMPRESA C** | Serro Tondo | 98b | 2,66 | 2,36 | 0,30 | | 20 | 12p | | 2,66 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 33,34 | 637 | 322,23 | 761,83 | | | | indeterminata |
| | Serro Tondo | 99 | 6,78 | 6,38 | 0,40 | | 13 | 18p-20p-22p-130p-134p-136p-137p | | 6,78 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,62 | 540 | 500,62 | 3.194,30 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 20 | 5p-12p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Serrone Pizzuto | 100 | 14,02 | 13,40 | 0,62 | | 20 | 12p | | 14,02 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 52,30 | 1027 | 485,49 | 6.504,07 | | | | indeterminata |
| | Serrone Pizzuto | 101 | 17,58 | 16,29 | 1,29 | | 20 | 12p | | 17,58 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,05 | 580 | 522,12 | 8.503,69 | | | | indeterminata |
| | Vado dell'Asta | 102 | 11,66 | 10,68 | 0,98 | | 20 | 10-12p-36p-37p-39 | | 11,66 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 55,15 | 719 | 563,96 | 6.024,94 | | | | indeterminata |
| | Valle di Liero | 103 | 14,73 | 14,72 | 0,01 | | 20 | 12p | | 14,73 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,29 | 687 | 462,78 | 6.813,63 | | | | indeterminata |
| | Serro della Falasca | 104 | 5,17 | 5,14 | 0,03 | | 20 | 12p-40 | | 5,17 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 51,38 | 728 | 484,16 | 2.486,46 | | | | indeterminata |
| | Serro della Falasca | 105 | 13,94 | 13,10 | 0,84 | | 20 | 12p | | 13,94 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 56,30 | 910 | 611,77 | 8.013,49 | | | | indeterminata |
| | Calvelluzzo | 106 | 3,04 | 3,04 | 0,00 | | 20 | 12p | | 3,04 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 55,08 | 416 | 912,89 | 2.771,70 | | | | indeterminata |
| | Tronola | 113b | 11,20 | 8,04 | 3,16 | | 19 | 36-39-287-288 | | 6,60 | 4,60 | | | a/b/c/d/g/i/m | 17,50 | 320 | 393,60 | 3.163,05 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 25 | 1p-3-4-5-6-12p-14-15-16 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tronola | 114 | 16,61 | 12,41 | 4,20 | | 20 | 1p-11p-12p | | 16,56 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,08 | 517 | 498,79 | 6.190,61 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 25 | 1p-6-12p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lagarello | 116 | 5,06 | 5,04 | 0,02 | | 20 | 12p | | 5,06 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 36,57 | 605 | 386,95 | 1.949,10 | | | | indeterminata |
| | Corsa dei Cavalli | 119 | 11,22 | 10,00 | 1,22 | | 20 | 12p | | 11,22 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 53,23 | 988 | 462,28 | 4.622,83 | | | | indeterminata |
| | Corsa dei Cavalli | 120 | 15,81 | 14,65 | 1,16 | | 20 | 12p | | 15,81 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,51 | 896 | 421,37 | 6.171,92 | | | | indeterminata |
| | Valle del Ghiro | 121 | 9,15 | 9,14 | 0,01 | | 20 | 12p | | 9,15 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,41 | 605 | 574,43 | 5.248,07 | | | | indeterminata |
| | Coste del Calvello | 122 | 10,92 | 10,50 | 0,42 | | 20 | 12p | | 10,92 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 52,19 | 884 | 470,79 | 4.944,86 | | | | indeterminata |
| | Orno | 124 | 9,53 | 9,53 | 0,00 | | 17 | 101-163p | | 9,53 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 35,33 | 1560 | 253,73 | 2.418,66 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 18 | 11p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 23 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pietra di Alessio | 130 | 11,27 | 2,62 | 8,65 | | 18 | 11p | | 9,66 | 1,61 | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 50,12 | 131,20 | | | | indeterminata |
| | Fontana di Sazzano | 132 | 18,37 | 13,41 | 4,96 | | 20 | 11p-12p-13p | | 11,27 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 55,51 | 741 | 607,52 | 8.148,93 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 25 | 12p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Corsa dei Cavalli | 136 | 9,47 | 9,46 | 0,01 | | 20 | 12p | | 9,47 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 52,77 | 767 | 533,97 | 5.050,96 | | | | indeterminata |
| | Monte Calvello | 137a | 9,80 | 9,62 | 0,18 | | 20 | 12p-13p | | 9,80 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 367,15 | 3.532,00 | | | | indeterminata |
| | Monte Calvello | 138 | 9,58 | 0,54 | 9,04 | | 20 | 12p | | 9,58 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 20,00 | 10,88 | | | | indeterminata |
| | Aria della Preda | 153 | 42,34 | 18,19 | 24,15 | | 20 | 12p-13p | | 42,25 | 0,09 | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 131,25 | 2.388,08 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 25 | 10p-12p-21p-23p-24p-31p-33p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sazzano | 154 | 41,14 | 13,92 | 27,22 | | 20 | 12p-13p-14p-15-16 | | 37,64 | 3,50 | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 137,49 | 1.914,20 | | | | indeterminata |
| | Piano di Sazzano | 176 | 14,85 | 12,91 | 1,94 | | 25 | 12p-45p-49p-50p-51p-52p | | 14,57 | 0,28 | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,24 | 377 | 601,56 | 7.766,40 | | | | indeterminata |
| | Gioco dei Colombi | 312 | 3,45 | 3,45 | 0,00 | | 16 | 2-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | a/b/c/d/i | | | | | | | | indeterminata |
| | Valle dell'Ulivo | 314 | 15,06 | 4,25 | 10,81 | | 12 | 1p-11p | | 15,05 | 0,01 | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 69,14 | 293,87 | | | | indeterminata |
| | Serrone Pizzuto | 315 | 8,01 | 3,25 | 4,76 | | 20 | 12p | | 8,01 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 120,82 | 392,13 | | | | indeterminata |
| | Il Casone | 316 | 2,32 | 2,17 | 0,15 | | 19 | 323p | | 2,32 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 268,40 | 583,68 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 31 | 264-265p | | | | | | | | | | | | | | |

# RIEPILOGO GENERALE DELLE PARTICELLE FORESTALI

**Art. 108 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Classe economica (Compresa) | Particella forestale | | | | | | Dati catastali | | Area protetta - zonizzazione | | | Aree percorse dal Fuoco | | *Vincoli | Dati Dendrometrici | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Località | n° | Superficie in Ha | | | | Foglio | Particella | A | B | C | Anno | Ha | | Densità | | Pr unitaria mc/Ha | Pr totale mc | ***Pp unitaria mc/Ha | ***Pp totale mc | Incremento medio | Età all'anno di redazione del PGF |
| | | | Totale | Bosco | Pascolo prati radure | Altro | | | Ha | Ha | Ha | | | | A.B. unitaria mq/Ha | ** Soggetti n°/Ha | | | | | | |
| COMPRESA FD | Tronola | 112 | 13,77 | 13,33 | 0,44 | | 25 | 8p-9p-12p | | 1,55 | 12,22 | | | a/b/c/d/g/i/m | 44,20 | 555 | 503,78 | 6.715,49 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 32 | 14p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tronola | 113a | 7,06 | 7,06 | 0,00 | | 25 | 7-8p-12p | | 2,98 | 4,08 | | | a/b/c/d/g/i/m | 31,31 | 544 | 464,75 | 3.281,14 | | | | indeterminata |
| | Tronola | 131 | 13,65 | 13,52 | 0,13 | | 25 | 12p | | 13,51 | 0,14 | | | a/b/c/d/g/i/m | 37,04 | 1048 | 427,59 | 5.780,01 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 32 | 14p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cervarolo di Laceno | 148 | 25,72 | 25,72 | 0,00 | | 25 | 12p | | 15,08 | 10,64 | | | a/b/c/d/g/i/m | 47,89 | 751 | 629,62 | 16.192,74 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 32 | 14p-49 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cervarolo di Laceno | 171 | 18,14 | 18,11 | 0,03 | | 25 | 12p | | 16,33 | 1,81 | | | a/b/c/d/g/i/m | 51,53 | 858 | 752,57 | 13.627,73 | | | | indeterminata |
| | Cervarolo di Laceno | 195 | 23,44 | 23,27 | 0,17 | | 25 | 12p | | 17,55 | 5,89 | | | a/b/c/d/g/i/m | 46,02 | 812 | 661,76 | 15.396,75 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 31 | 18p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cervarolo di Laceno | 196 | 25,49 | 25,48 | 0,01 | | 25 | 12p | | 21,96 | 3,53 | | | a/b/c/d/g/i/m | 37,78 | 462 | 544,78 | 13.880,16 | | | | indeterminata |
| | Apeticchia | 205a | 22,40 | 22,34 | 0,06 | | 23 | 29p | | 21,55 | 0,85 | | | a/b/c/d/g/i/m | 56,97 | 1832 | 597,59 | 13.348,90 | | | 5,98 | 90-110 |
| | | | | | | | 27 | 151p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Terremoto | 206a | 34,63 | 34,51 | 0,12 | | 23 | 29p-4-5-6-7-151-157 | | 2,21 | 32,42 | | | a/b/c/d/g/i/m | 58,62 | 2216 | 591,67 | 20.416,94 | | | | indeterminata |
| | Terremoto | 206b | 24,86 | 24,85 | 0,01 | | 23 | 29p | | 24,86 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 55,06 | 1209 | 754,96 | 18.763,97 | | | 5,39 | 130-150 |
| | | | | | | | 24 | 330p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 27 | 151p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Terremoto | 206c | 27,61 | 27,28 | 0,33 | | 24 | 38-39-40-54-55-56-57-58-59-60-61-330p | | 27,61 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 52,63 | 2063 | 527,20 | 14.383,40 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 27 | 8-9-151p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Terremoto | 207a | 23,11 | 23,11 | 0,00 | | 24 | 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-33-34-35-36-37-311p-330p | | | 23,11 | | | a/b/c/d/g/i/m | 50,57 | 686 | 759,80 | 17.557,52 | | | 5,43 | 130-150 |
| | Terremoto | 207b | 22,95 | 22,88 | 0,07 | | 24 | 301-310-330p | | 0,13 | 22,82 | | | a/b/c/d/g/i/m | 51,89 | 985 | 693,26 | 15.858,98 | | | 4,95 | 130-150 |
| | Cervarolo di Laceno | 210 | 13,91 | 13,90 | 0,01 | | 25 | 12p | 7,82 | 6,09 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 55,56 | 841 | 563,76 | 7.837,99 | | | | indeterminata |
| | Sette Valli | 226 | 8,69 | 8,45 | 0,24 | | 24 | 62-330p | | 0,38 | 8,31 | | | a/b/c/d/g/i/m | 62,49 | 2266 | 636,70 | 5.379,22 | | | 7,96 | 70-90 |
| | | | | | | | 27 | 151p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sette Valli | 227 | 11,15 | 11,06 | 0,09 | | 24 | 42-43-44-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-319-320-322-330p-332p | | 0,17 | 10,98 | | | a/b/c/d/g/i/m | 55,17 | 1540 | 579,04 | 6.403,03 | | | 5,79 | 90-110 |
| | Coste di Cervialto | 234 | 14,85 | 14,01 | 0,84 | | 25 | 12p-13p | 14,85 | | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 389,95 | 5.464,47 | | | | indeterminata |
| | Coste di Cervialto | 237 | 10,24 | 10,24 | 0,00 | | 25 | 12p | 10,24 | | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 456,15 | 4.669,44 | | | | indeterminata |
| | Valle Giamberardino | 239 | 11,36 | 11,29 | 0,07 | | 25 | 12p | 11,36 | | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 452,72 | 5.109,82 | | | | indeterminata |
| | Coste di Cervialto | 264 | 16,01 | 16,00 | 0,01 | | 26 | 1p-2p | 16,01 | | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 399,11 | 6.385,54 | | | | indeterminata |
| | Coste di Cervialto | 265 | 14,58 | 14,36 | 0,22 | | 25 | 12p-13p | 14,58 | | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 422,57 | 6.069,58 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 26 | 1p-2p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Coste di Cervialto | 303 | 9,19 | 9,18 | 0,01 | | 26 | 1p-2p | 9,19 | | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 486,20 | 4.463,00 | | | | indeterminata |
| COMPRESA P | Salve Regina di Piscacca | 1 | 13,23 | 12,76 | 0,47 | | 7 | 23p-30p | | 12,23 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 328,39 | 4.190,73 | | | | indeterminata |
| | Vallone di Piscacca | 2 | 13,59 | 12,75 | 0,84 | | 7 | 23p-24-25-26-30p-48 | | 13,59 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 345,57 | 4.407,67 | | | | indeterminata |
| | Costa della Guradia | 3a | 13,03 | 12,94 | 0,09 | | 7 | 27-30p-47 | | 13,03 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 49,77 | 776 | 627,65 | 8.120,08 | | | | indeterminata |
| | Costa della Guradia | 5a | 11,81 | 11,16 | 0,65 | | 7 | 30p | | 11,81 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 307,19 | 3.427,70 | | | | indeterminata |
| | Costa della Guradia | 5b | 2,27 | 0,53 | 1,74 | | 7 | 30p | | 2,27 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 26,55 | 14,06 | | | | indeterminata |
| | Coste di Villa Romana | 9 | 14,73 | 1,81 | 12,92 | | 7 | 22p | | 14,73 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 49,13 | 88,90 | | | | indeterminata |
| | Canale di Mariella | 10 | 10,22 | 7,85 | 2,37 | | 7 | 22p-30p | | 10,22 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 201,86 | 1.583,70 | | | | indeterminata |
| | Ripa dei Corvi | 11 | 14,69 | 13,25 | 1,44 | | 7 | 28-29-30p | | 14,69 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 273,80 | 3.628,36 | | | | indeterminata |
| | Monte Magnone | 12 | 5,36 | 5,19 | 0,17 | | 7 | 22p-30p | | 5,36 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 525,47 | 2.724,68 | | | | indeterminata |
| | Ripa dei Corvi | 13 | 13,97 | 12,63 | 1,34 | | 3 | 94-156 | | 13,97 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 245,36 | 3.098,93 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 7 | 30p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Acerito | 19 | 19,29 | 3,92 | 15,37 | | 7 | 22p-30p-34p | | 19,29 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 70,83 | 277,66 | | | | indeterminata |
| | Acerito | 22 | 4,59 | 3,57 | 1,02 | | 7 | 34p | | 4,59 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 351,23 | 1.253,82 | | | | indeterminata |
| | Conca | 23 | 17,92 | 16,96 | 0,96 | | 7 | 22p-34p-36 | | 17,92 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 33,18 | 689 | 339,69 | 5.762,61 | | | | indeterminata |
| | Guarella | 35 | 11,16 | 5,41 | 5,75 | | 11 | 20p | | 11,16 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 102,55 | 554,97 | | | | indeterminata |
| | Guarella | 36 | 5,16 | 5,07 | 0,09 | | 7 | 34p-73p | | 5,16 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,76 | 485 | 490,33 | 2.485,70 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 11 | 20p-29p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 12 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rompeciciuno | 49 | 10,17 | 4,17 | 6,00 | | 11 | 20p | | 10,17 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 97,39 | 405,69 | | | | indeterminata |
| | La Difesa e Camparella | 69 | 10,85 | 9,52 | 1,33 | | 10 | 126-128-129-132-144-153-156-163- | | 10,85 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 7,77 | 858 | 26,40 | 251,28 | | | | indeterminata |
| | Pasteria | 91 | 4,55 | 1,98 | 2,57 | | 15 | 113p | | 4,55 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 115,55 | 228,25 | | | | indeterminata |
| | Bocca di Calende | 93 | 19,12 | 13,29 | 5,83 | | 10 | 148p | | 19,12 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 137,26 | 1.824,53 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 15 | 113p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Calende | 94 | 20,38 | 19,82 | 0,56 | | 18 | 11p | | 20,38 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 283,17 | 5.611,65 | | | | indeterminata |
| | Calende | 107 | 24,34 | 24,24 | 0,10 | | 17 | 163p-164 | | 24,34 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 365,81 | 8.866,38 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 18 | 11p | | | | | | | | | | | | | | |

# RIEPILOGO GENERALE DELLE PARTICELLE FORESTALI

**Art. 108 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Classe economica (Compresa) | Particella forestale | | | | | | Dati catastali | | Area protetta - zonizzazione | | | Aree percorse dal Fuoco | | *Vincoli | Dati Dendrometrici | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Località | n° | Superficie in Ha | | | | Foglio | Particella | A | B | C | Anno | Ha | | Densità | | Pr unitaria mc/Ha | Pr totale mc | ***Pp unitaria mc/Ha | ***Pp totale mc | Incremento medio | Età all'anno di redazione del PGF |
| | | | Totale | Bosco | Pascolo prati radure | Altro | | | Ha | Ha | Ha | | | | A.B. unitaria mq/Ha | ** Soggetti n°/Ha | | | | | | |
| COMPRESA P | Calende | 108 | 20,32 | 19,88 | 0,44 | | 18 | 11p | | 20,26 | 0,06 | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 293,02 | 5.825,27 | | | | indeterminata |
| | Vallone di Calende | 123 | 4,70 | 4,70 | 0,00 | | 17 | 101-102-163p | | 4,70 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 32,70 | 1763 | 216,03 | 1.014,84 | | | | indeterminata |
| | Raia di Calende | 125 | 6,68 | 6,68 | 0,00 | | 18 | 11p | | 6,68 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 511,71 | 3.418,92 | | | | indeterminata |
| | Raia di Calende | 126 | 6,70 | 6,68 | 0,02 | | 18 | 11p | | 6,43 | 0,27 | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 399,47 | 2.670,23 | | | | indeterminata |
| | Orno | 139 | 3,70 | 3,62 | 0,08 | | 23 | 1p | | 3,70 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 273,00 | 987,92 | | | | indeterminata |
| | Vallone delle Querce | 141 | 8,05 | 8,05 | 0,00 | | 18 | 11p | | 8,05 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 276,01 | 2.221,04 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 23 | 29p-23 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Porcacciolo | 155 | 2,94 | 2,92 | 0,02 | | 23 | 33p | | 2,94 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 292,31 | 852,51 | | | | indeterminata |
| | Porcacciolo | 156 | 3,41 | 3,41 | 0,00 | | 23 | 33p | | 3,41 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 384,52 | 1.311,03 | | | | indeterminata |
| | Porcacciolo | 157 | 6,00 | 5,25 | 0,75 | | 23 | 33p | | 6,00 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 237,42 | 1.245,80 | | | | indeterminata |
| | Porcacciolo | 158 | 4,24 | 2,42 | 1,82 | | 23 | 33p | | 4,24 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 185,23 | 448,45 | | | | indeterminata |
| | Vallone delle Querce | 159 | 10,68 | 10,63 | 0,05 | | 23 | 29p-33p | | 10,68 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 578,69 | 6.152,81 | | | | indeterminata |
| | Porcacciolo | 160 | 4,71 | 4,57 | 0,14 | | 23 | 33p | | 4,71 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 471,12 | 2.153,79 | | | | indeterminata |
| | Valle del Porco | 161 | 12,84 | 11,55 | 1,29 | | 23 | 29p-33p | | 12,84 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 234,53 | 2.708,75 | | | | indeterminata |
| | Vallone del Porco | 177 | 9,32 | 9,32 | 0,00 | | 23 | 33p | | 9,32 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 581,78 | 5.422,09 | | | | indeterminata |
| | Montagna Grande | 178 | 9,50 | 8,82 | 0,68 | | 23 | 33p | | 9,50 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 254,80 | 2.246,81 | | | | indeterminata |
| | Montagna Grande | 179 | 6,01 | 5,89 | 0,12 | | 23 | 33p | | 6,01 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 303,84 | 1.788,82 | | | | indeterminata |
| | Montagna Grande | 180 | 8,14 | 6,50 | 1,64 | | 23 | 33p | | 8,14 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 163,04 | 1.059,87 | | | | indeterminata |
| | Montagna Grande | 181 | 2,36 | 2,36 | 0,00 | | 23 | 33p | | 2,36 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 433,71 | 1.021,46 | | | | indeterminata |
| | Vallone di Cola | 182 | 3,47 | 3,45 | 0,02 | | 23 | 33p | | 3,47 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 249,64 | 862,42 | | | | indeterminata |
| | Montagna Grande | 183 | 9,20 | 8,84 | 0,36 | | 23 | 33p | | 9,20 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 436,37 | 3.859,05 | | | | indeterminata |
| | Vallone di Cola | 184 | 7,91 | 6,45 | 1,46 | | 23 | 33p | | 7,91 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 205,10 | 1.323,16 | | | | indeterminata |
| | Apeticchia | 185 | 13,85 | 13,79 | 0,06 | | 23 | 29p-33p | | 13,85 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 775,38 | 10.696,26 | | | 5,17 | 130-150 |
| | Apeticchia | 186 | 12,88 | 12,81 | 0,07 | | 23 | 29p-33p | | 12,88 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 506,72 | 6.489,37 | | | | indeterminata |
| | Vallone di Cola | 201 | 8,68 | 8,66 | 0,02 | | 23 | 33p | | 6,68 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 592,03 | 5.129,57 | | | | indeterminata |
| | Vallone dell'Acero | 202 | 14,62 | 14,01 | 0,61 | | 23 | 33p | | 14,62 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 294,15 | 4.119,60 | | | | indeterminata |
| | Vallone di Valle dell'Acero | 203 | 11,45 | 10,97 | 0,48 | | 23 | 29p-33p | | 11,45 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 428,63 | 4.700,18 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 27 | 3p-151p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vallone della Scarrupata | 216 | 7,83 | 7,65 | 0,18 | | 23 | 33p | | 7,83 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 212,17 | 1.623,55 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 27 | 3p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Coste dell'Ausano | 217 | 16,50 | 16,15 | 0,35 | | 23 | 33p | | 16,50 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 420,29 | 6.788,37 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 27 | 3p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vallone di Valle dell'Acero | 218 | 13,14 | 13,11 | 0,03 | | 23 | 33p | | 13,14 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 654,65 | 8.582,07 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 27 | 3p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vallone della Scarrupata | 219 | 9,92 | 8,29 | 1,63 | | 27 | 3p | | 9,92 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 220,37 | 1.827,59 | | | | indeterminata |
| | Valle d'Acero | 222b | 8,30 | 8,08 | 0,22 | | 27 | 151p | | 8,30 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 37,96 | 822 | 259,38 | 2.097,05 | | | | indeterminata |
| | Valle d'Acero | 223b | 6,28 | 6,26 | 0,02 | | 27 | 151p | | 6,28 | | | | a/b/c/d/g/i/m | 41,48 | 780 | 397,95 | 2.489,56 | | | | indeterminata |
| | Valle d'Acero | 224a | 21,07 | 20,30 | 0,77 | | 27 | 151p-152-157-158-159-160 | | 19,17 | 1,90 | | | a/b/c/d/g/i/m | 45,88 | 670 | 471,58 | 9.572,98 | | | | indeterminata |
| | Vallone della Scarrupata | 242 | 16,28 | 15,55 | 0,73 | | 27 | 3p | | 16,28 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 344,26 | 5.353,21 | | | | indeterminata |
| | Coste dell'Ausano | 243 | 9,10 | 9,08 | 0,02 | | 27 | 3p | | 9,10 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 361,80 | 3.283,94 | | | | indeterminata |
| | Vallone della Scarrupata | 244 | 17,36 | 17,35 | 0,01 | | 27 | 3p-151p | | 17,36 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 680,59 | 11.807,11 | | | | indeterminata |
| | Grotta dei Briganti | 245 | 18,15 | 15,29 | 2,86 | | 27 | 3p-151p | | 18,15 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 400,22 | 6.119,13 | | | | indeterminata |
| | Scarrupata | 246 | 9,45 | 9,41 | 0,04 | | 27 | 3p-151p | | 9,45 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 630,35 | 5.932,27 | | | | indeterminata |
| | Vallone Cupo | 267 | 16,68 | 16,07 | 0,61 | | 27 | 3p | | 16,68 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 425,41 | 6.838,39 | | | | indeterminata |
| | Vallone Cupo | 268 | 17,07 | 17,07 | 0,00 | | 27 | 3p-151p | | 17,07 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 617,59 | 10.544,30 | | | | indeterminata |
| | Vallebona | 269 | 11,85 | 11,84 | 0,01 | | 27 | 1p-3p-151p | | 11,85 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 587,39 | 6.955,86 | | | | indeterminata |
| | Vallone Cupo | 270 | 18,41 | 18,08 | 0,33 | | 27 | 3p-151p | | 18,41 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 506,07 | 9.151,44 | | | | indeterminata |
| | Coste di Tannaro | 281 | 8,59 | 8,59 | 0,00 | | 28 | 1p | 6,63 | 1,96 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 614,22 | 5.276,65 | | | | indeterminata |
| | Coste di Tannaro | 283 | 34,30 | 33,98 | 0,32 | | 28 | 1p | 12,80 | 21,50 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 468,79 | 15.928,17 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 23 | 29p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPRESA V | Tronola | 313 | 9,06 | 7,60 | 1,46 | | 19 | 43p-323p | | 5,88 | 3,18 | | | a/b/c/d/g/i/m | | | 311,04 | 2.365,36 | | | | indeterminata |
| | | | | | | | 25 | 9p-12p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 31 | 265p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 32 | 14p | | | | | | | | | | | | | | |

# RIEPILOGO GENERALE DELLE PARTICELLE FORESTALI

**Art. 108 del Regolamento regionale n. 3/2017**

| Classe economica (Compresa) | Particella forestale | | | | | | Dati catastali | | Area protetta - zonizzazione | | | Aree percorse dal Fuoco | | *Vincoli | Dati Dendrometrici | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Località | n° | Superficie in Ha | | | | Foglio | Particella | A | B | C | Anno | Ha | | Densità | | Pr unitaria mc/Ha | Pr totale mc | ***Pp unitaria mc/Ha | ***Pp totale mc | Incremento medio | Età all'anno di redazione del PGF |
| | | | Totale | Bosco | Pascolo prati radure | Altro | | | Ha | Ha | Ha | | | | A.B. unitaria mq/Ha | ** Soggetti n°/Ha | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPRESA PASCOLI | I morti | 27b | 7,44 | | 7,44 | | 12 | 1p | | 7,44 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | | | | | | | 13 | 1-16p-23p-24p-25-26-27-28p-29p-30p-31p-32 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle dei Morti | 29b | 6,55 | | 6,55 | | 13 | 16p-33p-34p-35-36-37-38-39-40-41-42p | | 6,55 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | Acero | 32b | 0,94 | | 0,94 | | 13 | 22p-51p-52p | | 0,94 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | Valle dei Sauci | 45b | 2,44 | | 2,44 | | 13 | 3p-15-16p-45p-46p-47 | | 2,44 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | Terrate | 47b | 8,30 | | 8,30 | | 13 | 6-22p-150p-151p-152p-153p-154-155-156-157-158-159-160p-161-162-163-164-165-166-167p-168p-180p-181 | | 8,30 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | Valle Foce di Caposele | 79b | 3,38 | | 3,38 | | 13 | 9p-10-15p-63-64-65-66-67-68-69-70p-71p-72p-73p-74p-75p-76p-77p-176-177-178 | | 3,38 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | Salve Regina | 83b | 2,98 | | 2,98 | | 13 | 15p | | 2,98 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | | | | | | | 20 | 5p-6-12p-31-32p-33p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vado dell'Asta | 84b | 1,28 | | 1,28 | | 13 | 15p-16p-17p-18-19-22p-127p-128-129-130p | | 1,28 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | Vado dell'Asta | 86b | 8,15 | | 8,15 | | 13 | 20p-21p-22p-131p-132p-133-134p-135p-136p-137p-138p-139p-140p-141 | | 8,15 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | | | | | | | 20 | 8-9-10-12-34-35-36p-37p-38 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monte Calvello | 137b | 3,89 | | 3,89 | | 20 | 12p | | 3,89 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | Tronola | 147a | 167,41 | | 167,41 | | 18 | 8p-11p | | 131,80 | 35,61 | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | | | | | | | 19 | 43p-323p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 29 | 1p-2-4-5p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 30 | 1p-23-47-66 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 31 | 8-265p-Y901 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 32 | 15-16 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 33 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tronola | 147b | 8,86 | | 8,86 | | 12 | 1p-46-47-48-167p-168-169p-170-171-172p-173p-175-401p-402 | | 1,53 | 7,33 | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | | | | | | | 19 | 30-36-238p-239-243-244 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tronola | 147c | 5,24 | | 5,24 | | 12 | 1p-21-44-247 | | 0,29 | 4,95 | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | Tronola | 147d | 1,83 | | 1,83 | | 12 | 1-45-145-146p-147p-153p-154p-155p-156p-160p-161p-162p-165p-258-259-260-263-264-265-267-269-270-272-274 | | 0,04 | 1,79 | | | | | | | | | | | |
| | Cervarolo di Sazzano | 175 | 17,92 | | 17,92 | | 20 | 13p-14p | | 4,15 | 13,77 | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | | | | | | | 25 | 10p-12p-21p-22-23p-24p-25-26-27-28-29-30-31p-32-34p-35-36-37-38-39-40p-41p-42p-43-44-45p-46-47-48-49p-50p-51p-52p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Coste di Cervialto | 232b | 15,20 | | 15,20 | | 24 | 3p-4p-330p | | 15,20 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | | | | | | | 26 | 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 28 | 4p | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valle dell'Acero | 249 | 2,71 | | 2,71 | | 27 | 151p | | 2,71 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | Valle dell'Acero | 255c | 0,39 | | 0,39 | | 27 | 151p | | 0,39 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | Piano dei Vaccari | 260b | 3,07 | | 3,07 | | 28 | 1p-2p-3p-4p | | 3,07 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | Vallebona | 273b | 1,22 | | 1,22 | | 27 | 151p | | 1,22 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | Sierro della Zà Popa | 291b | 1,72 | | 1,72 | | 28 | 6p | | 1,72 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | Colle del Leone | 292b | 4,56 | | 4,56 | | 28 | 1p | | 4,56 | | | | a/b/c/d/g/i/m | | | | | | | | |
| | **TOTALI** | | **4.961,09** | **4.179,47** | **781,62** | **0,00** | | | **271,38** | **4.255,71** | **419,36** | | | | | | | **2.233.557,67** | | | | |

* = Vincoli:

| | |
|---|---|
| a | Idrogeologico (L. 3267/1923) |
| b | Autorità di Bacino (L. 18 maggio 1989, n. 183 – L. R. 07/02/1994, n. 8) |
| c | Uso civico (L. 1766/1927 – L. R. 11/1981) |
| d | Bellezze naturali (L. 1497/1939 transitata nel D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) |
| e | Piani territoriali paesaggistici (ai sensi dell'art. 149 del D.lgs. 29/10/99, n. 490) |
| f | Parco Nazionale (L. 6 dicembre 1991, n. 394) |
| g | Parco Regionale (L. R. 1 settembre 1993, n. 33) |
| h | Riserva, altro (L. 6 dicembre 1991, n. 394) |
| i | Legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 21 novembre 2000, n. 353) |
| l | Conflitti di proprietà e/o di confinazione tra le aree oggetto di pianificazione ed altri Soggetti privati e/o pubblici |
| m | Rete Natura 2000 |
| n | Altro - specificare |

** = Fustaie e fustaie transitorie - *n° soggetti/Ha* ; ceduo - *n° polloni/Ha e n° matricine/Ha*

Pr = Provvigione reale

*** = Se impossibilitati a calcolare la Provvigione potenziale/normale fornire motivazione

Pp = Provvigione potenziale

Nusco lì 13.02.2026

**Al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune**

**e p. c. al proponente**

In riferimento alla pratica in esame **(CUP 02)**, per i successivi provvedimenti di competenza si trasmette estratto del verbale n. 02 del 11.02.2026 della Commissione di Valutazione di Incidenza, di seguito fedelmente riportato, tra virgolette-

"**pratica n. 20/2026** presentata in data 03.02.2026 prot. 314 - Proponente: Dott. Filippo Nigro in qualità di Sindaco Pro-Tempore del Comune di Bagnoli Irpino (AV) - PIANO DI GESTIONE FORESTALE 2025-2034 – La Commissione visto ed esaminato gli atti presentati, visti i Piani di Gestione adottati con DGR 617/2024, esprime parere favorevole alla Valutazione di Incidenza Appropriata con l'obbligo del rispetto di tutto quanto indicato nello studio di Valutazione di Incidenza.
Il presente parere copre il periodo di vigenza temporale del Piano di Gestione Forestale. Si precisa che per tutti gli interventi previsti nella pianificazione, non rientranti nel piano dei tagli (utilizzazione boschiva) gli stessi dovranno essere sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza.

- Il presente parere vale anche come sentito favorevole ai sensi dell'art. 5, co. 7 del DPR 357/1997;
- Resta a cura del Responsabile del Procedimento l'acquisizione dei pareri occorrenti per legge, riportati nell'elenco dei pareri necessari per la realizzazione e l'esercizio del P/P/P/I/A-

***Il Resp. del Procedimento Dott.ssa Maria Rosaria Pasqualina Bardaro***

*Testo e-mail inviata da protocollo.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu a parcopicentini@pec.it il 02-02-2026 alle 16:09*
*protocollata con il n.314 del 03-02-2026*

La presente annulla e sostituisce la precedente pec prot. 998 del 02.02.2026.

Distinti saluti.
Ing. Caterina Donnarumma

Tit.:5.6
Rif. int. 2026_7800

# Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

SETTORE COMPATIBILITÀ IDROGEOLOGICA STRUTTURE INFRASTRUTTURE E PIANIFICAZIONE SOTTORDINATA

N.B.: Protocollo e data in filigrana

*Riscontro PEC del 2/03/2026*

**Al Comune di Bagnoli Irpino**

*protocollo.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu*

**Al Dott. For. Giovanni Gammarano**

*g.gammarano@epap.conafpec.it*

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 13228/2026 del 07-04-2026
Doc. Principale - Class. 05.06 - Copia Documento

**Oggetto:** *Piano di Gestione Forestale decennio 2025-2034.* **PARERE**

Si premette, che con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino, di cui alla L. 183/89, e contestualmente istituite le Autorità di bacino distrettuali, tra le quali la scrivente, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, e che l'esame istruttorio delle istanze di parere formulate a questa Autorità è condotto, con riferimento ai vigenti piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle suddette ex Autorità di Bacino, con specifico riguardo a quelli pertinenti per l'ambito territoriale (Unit of Management - UoM) in cui ricadono le opere/interventi oggetto dell'istanza, nonché ai piani di gestione distrettuali delle acque e del rischio di alluvioni (www.distrettoappenninomeridionale.it).

Tanto premesso, con riferimento all'oggetto ed alla documentazione trasmessa in relazione agli aspetti di propria competenza la scrivente Autorità di bacino distrettuale osserva quanto segue:

- ✓ il progetto in esame è relativo al Piano di Gestione Forestale decennale dei beni silvo pastorali di proprietà del comune di Sesto Campano (IS). Le attività programmate con il PGF in oggetto prevedono:
  - *interventi di miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di sistemazioni idraulico-forestali;*
  - *interventi di miglioramento boschivo;*
  - *interventi di taglio;*
  - *interventi di miglioramento dei pascoli;*
  - *miglioramento, recupero, manutenzione della viabilità di servizio, delle vie di accesso e della sentieristica;*
  - *interventi di valorizzazione turistica dei beni silvo-pastorali;*
  - *valorizzazione degli impianti sciistici;*
  - *interventi di prevenzione e lotta agli incendi;*

- ✓ il *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio di frana [PsAI-Rf], dell'ex Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno,* approvato con DPCM del 12/12/2006 (G.U. del 28/05/2007, n. 122), individua nelle aree interessate dagli interventi del PGF in oggetto una diffusa presenza di zone a rischio idrogeologico, perimetrate come aree a rischio molto elevato o potenzialmente alto, nelle quali le vigenti *Norme di Attuazione* del citato PsAI-Rf, perseguendo gli obiettivi di *incolumità delle persone, sicurezza delle strutture, delle infrastrutture e del patrimonio ambientale*, vietano in generale qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio, con le sole eccezioni previste dalle stesse norme (v. artt. 3 e 5), previo studio di compatibilità idrogeologica, redatto ai sensi degli artt. 17 e seguenti;

- ✓ in relazione a quanto sopra, si fa rilevare che la documentazione prodotta contiene il prescritto Studio di Compatibilità Idrogeologica, che risulta sufficientemente esaustivo di quanto prescritto dalle già menzionate norme;

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 13228/2026 del 07-04-2026
Doc. Principale - Class. 05.06 - Copia Documento

- ✓ con riferimento agli aspetti ambientali si evidenzia che il PGF in oggetto risulta coerente con i criteri indicati dalle Linee Guida del *Documento di Indirizzo ed Orientamento per la Pianificazione e Programmazione della Tutela Ambientale* [DIOPPTA], approvato il 5/04/06 (G.U. n. 164 del 17/07/06), che orientano le scelte progettuali verso la salvaguardia ed il corretto uso delle risorse naturali e, con particolare riguardo alle risorse agroforestali, indirizzano verso una gestione sostenibile del patrimonio boschivo;
- ✓ infine, si evidenzia che per il *Distretto dell'Appennino Meridionale* risultano approvati:
  - il *Piano di Gestione Acque* [PGA] - (Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, D.L.vo 152/06, L. 13/09), con DPCM del 10 aprile 2013 (G.U. n. 160 del 10/07/13) ed il *Piano di Gestione Acque II Fase*, con delibera n° 1 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino in data 03/03/2016;
  - il *Piano di Gestione Rischio di Alluvione* [PGRA] - *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale* (Direttiva 2007/60/CE, D.L.vo 49/2010, D.L.vo 219/2010), con delibera n° 2 Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino in data 03/03/2016;
- ✓ in relazione a ciò si fa rilevare che, nell'ottica di quanto atteso dalla programmazione comunitaria e nazionale relativa alla condizionalità ex ante prevista dai regolamenti comunitari per la fruizione di fondi FEASR, le azioni previste dai Piani Forestali concorrono all'attuazione dei suddetti Piani di Gestione.

Per tutto quanto sopra, la scrivente Autorità di Bacino distrettuale, verificato che gli interventi previsti nel PGF in oggetto risultano in linea generale ammissibili nel rispetto delle succitate norme e dei richiamati indirizzi, orientamenti, obiettivi e misure generali, esprime parere favorevole al Piano in epigrafe con le seguenti prescrizioni:

- evitare, nel rispetto dei vincoli imposti dal PsAI-Rf, la realizzazione di nuove infrastrutture nelle aree perimetrate a rischio o di attenzione molto elevata o elevata, a meno che non se ne attesti la non delocalizzabilità, valutandone, in tal caso, in maniera dettagliata e sulla scorta di indagini specifiche, la compatibilità idrogeologica con le problematiche perimetrate dal piano stralcio, al fine di verificare la eventuale necessità di prevedere interventi strutturali e/o non strutturali finalizzati a garantirne la fruizione in sicurezza;
- utilizzare nelle ceduazioni metodi di esbosco a basso impatto sul suolo (canalette, esbosco a soma, ecc.), contenendo l'estensione delle superfici da sottoporre a taglio ed evitando lo strascico e l'avvallamento, nonché l'apertura di nuove piste per l'esbosco o l'allargamento di quelle esistenti;
- evitare, per quanto attiene agli interventi di manutenzione della viabilità di servizio forestale, l'apertura di nuove piste o l'allargamento di quelle esistenti, avendo cura, per queste ultime, di adottare idonee soluzioni di regimazione e scarico delle acque superficiali al fine di impedire l'innesco di processi degradativi del suolo e delle acque;
- per quanto attiene agli interventi di manutenzione alle sistemazioni idraulico - forestali, attenersi a quanto previsto al *Titolo IV* delle *Misure di Salvaguardia* del *Piano Straordinario - Rischio idraulico* [PS-Ri], approvato dal C.I. con Del. n. 2 del 27/10/99 (G.U. del 24/11/99, n. 276).

**Il Dirigente Tecnico**
*dott. geol. Gennaro Capasso*

**Il Segretario Generale**
*dott.ssa geol. Vera Corbelli*

*Istruttoria tecnica: geol. I. Ricciardi*